

17

Ex libris Caroli Gerardi

64328



Handwritten text, possibly a signature or date, heavily obscured by dark ink smudges and stains.



PETRI PAVLI
PEREDÆ
SETABENSIS,

DOCTORIS MEDICI, ET
APUD VALENTINOS PUBLICI
Medicinæ Professoris,

IN

MICHAELIS IOANNIS PASCHALIS
METHODVM CVRANDI

SCHOLIA.

Addita in extremo operis disputatio medica, an Cannabis, & aqua, in qua mollitur, possint aërem inficere.

Opus recens recognitum, & Indicibus suis insignitum.

EDITIO NOVISSIMA.

Ex Libris  Caroli Gerardi

LYGDYNI,
Sumptibus Iacobi Cardon.

M. DC. XXX.

P E T R I F A V L I
P E R F E D
S E T A B E N S I S

DOCTORIS MEDICI ET
ABD VALENTINOS PAVIGI

Medicine Professor


III

MICHAELIS JOHANNIS PAVIGI
METHODYM CAVANDI

SCHOLIA

Adhuc in extremo opere de ratio medica, et de
pneuma, in qua medicina posuit aciem infirmis.

Opera per recognitionem et editionem hanc
EDITIO NOVISSIMA



1707
Pavipibus Jacobi Carbon

M. DC. LXX



ILL^{MO} AC REV^{MO}

DN. GASPARI
A CHIROGA,

Archiepiscopo Toletano, Hispaniarum
Primate, & fidei Catholicæ primo
cognitori,

Petrus Pereda Medicus, felicitatem.



OGITANTI mihi, Præsul Am-
plissime, cui studiorum meo-
rum primitias consecrarem, oc-
currebant multi, quibus me nul-
lum debere cognoscebam: quibûsque hone-
stè me labores meos, totâmque familiam
committere possem. Deerat autem aliis ma-
gnarum rerum cognitio, quam mihi ad hanc
rem apprimè necessariam videbam, aliis au-
toritas, quæ meas lucubrationes ab omni
reprehensione contineret: aliis denique pru-
dencia, quæ diuturno rerum usu & experien-
tia comparata, non parum utilitatis meo ope-

ri videbatur allatura. Quibus quidem omnibus, vitæ integritas, facilitas morum, generis splendor maximus, & summa inerant ornamenta virtutis. Tu tamen vnus ex omnibus præcipuè occurristi, in quem visa est natura, ex aliis haustas virtutum dotes transfudisse: & qui præter generis nobilitatem, augustam quidem illam, & planè regiam, multiplici rerum scientia, auctoritate, & prudentia, reliquos anteires. Quid enim memorem tuam in ferendis laboribus constantiam? in regendis clientium animis solertiam? in gubernandis populis sagacitatem? Quid referam beneficia, quibus me tibi deuinctum sentio, cùm fratrem meum in fidem tuam recepisti, & receptum maximis honoribus affecisti? Tacebône humanitatem, qua vnus maximè excellis? Dum enim quantos in litteris feceris progressus contemplor, te earundem ornamentum intueor: dum multarum disciplinarum perfectam cognitionem mihi ob oculos pono, quem tibi anteponam nescio. Denique vbi in omni virtutis genere præstantiam suspicio, tam exiguum tempus ad ista referenda doleo. Quæ ita esse, vel me tacente dignitatis gradus, in quem tanto optimorum hominum applausu euectus es, necessario comprobatur. Illi enim soli ad istam dignitatem, & honoris locum efferuntur, quibus maxima est

est cum virtute coniuncta sapientia, cum sapientia humanitas, & cum humanitate, summa Christianæ religionis observatio. Hæc Philippum Hispaniarum Regem æquissimum, ubi Archiepiscopus renunciatus es, non latuerunt. Hæc Toletanæ civitatis non ignoravit auctoritas. Hæc nullum genus hominum, etsi immane & barbarum, effugerunt. Omnes enim tuam probitatem, humanitatem in pauperes, facilitatem in amicos, & in cæteros integritatis splendorem agnoscunt. Atque, ut hæc omittam, ne videar meridiano Soli accensam facem attulisse, rem per se nobilem sermonis humilitate obscurasse, scias velim, me, Valentiniæ urbis medicum tui perpetuò observantissimum, ut medicinæ candidatis meo quocunque labore gratum facerem, Methodum quandam medendi à Paschalis huius urbis quondam medico insigni conscriptam, emendatiorem excudere, & scholiis illustriorem efficere voluisse. Qua in re quos sim æmulos habiturus, non ignoras, videor enim multos iam mihi blatterantes, & turpia effutientes audire, meque acriter accusantes, quod hæc scholia eo solum nomine ediderim, ut huic graui medico, & aliis practicis facerem iniuriam, non, ut studiosam iuventutem, immenso quodam schedarum onere, citra rationem oppressam,


& multoties prauè edoctâ meis vigiliis sub-
leuarem. Aliquos præterea deierantes, offen-
tationis gratia, non communis vtilitatis ra-
tione hunc laborem suscepisse. Scio & fore
alios, qui suo modo studeant aliquam mihi
infamiae notam inferre. Quod omnes, te pa-
trono, quantum aspernet, animus ipse, quem
tua nobilitas ad hæc scribenda fecit, testatur.
Spero enim me tua humanitate, fide, & no-
mine tanquam Miltiadis clypeo tectum, in-
trepidè omnes aduersariorû ictus elusurum:
neque futurum esse quemquam, qui, si te mi-
hi, operique meo defensorem audierit, non
penitus obmutescat, & eos, quos in me antea
dentes acuerat, non facile obrundat. Hos igi-
tur, Præsul Amplissime, primos labores meos,
rudes sanè & impolitos, meæ tamen in te ob-
seruantiae, & voluntatis sempiternæ monu-
menta accipies, eosq; pro tua sapientia ita fo-
ue, vt qui me tui semper studiosissimum au-
dierunt, iidem intelligant quo tibi magis
deberem, denuò te maiora apud me benefi-
cia collocasse. Experiètur enim ij lectis scho-
liis forrasse, communi vtilitati à me fuisse in-
seruitum, & ob eam rem faciliùs, quod à te
postulo, perpetrasse. Quod vt facias, te ve-
hementer etiam atque etiam rogo, efficies
enim vt qui in puluere & tenebris diutissimè
vixi, excusso nunc puluere & fugatis tene-
bris,

bris, per te in loca clariora euadam, omnem-
que laborem contemnam, si hunc tibi gra-
tum cognouerim. Vale litterarum decus, &
ornamentum, & totius Hispaniæ fidus ful-
gentissimum, tuumque Peredam nominis
tui, & gloriæ propugnatorem acerrimum,
ut fratrem quem apud te habes, & quem tibi
esse charissimum cognosco, ama. Id si fece-
ris, & me tibi iam maximè deuinctum sum-
mo beneficio in perpetuum obliga-
bis, & ad maiora aggredien-
da nunc quasi dormien-
tem excitabis.

ã

4

LECTO



LECTORIS.



MEDICINA, *qua tota est practica, cum habeat finem opus aliquod, nempe sanitatis consecutionem, in duas precipuas partes diuiditur: quarum una sanitatem presentem tuetur: & altera, curando morbos, eam restituit. Curatio morborum ab empiricis experientia, à methodicis verò communitatibus quibusdam perficitur. Quorum curatio non rectè procedit, quia nec omnes morbi curantur experientia, neque curamus hominem uniuersalem Proinde Hippocrates, Galenus, & alij docti viri methodo rationali, quæ ex indicationibus constat, morbos curant. Sic multi libros ediderunt, in quibus morborum docent curationem methodo rationali. Inter quos Michaël Paschalius enumeratur, vir sua etate doctus, & expertus: cuius liber per omnium manus circumfertur, & ex ipso multi morborum remedia desumunt. Ceterum cum hic vir doctus scripserit tempore, quo multe false barbarorum sententiae vigeant, & veritates Galeni,*

Galenī, quas modò multorum annorum lectione
habemus, erant occulta. Proinde in eius librum,
qui inter alios breuiora, & usitata habet remedia
(quod optimum est) scholia scribere decreui: ut
ex iis, quæ ipse rectè docuit, & quæ addita à nobis
sunt ex rei natura, optima & legitima fieret
morborum curatio. Tu lector amice

hæc accipe, neque morosè
reprehendas.

AMI

adhibere non, non edidit videri
Egregij meos colas videri tamen ipse
Aureus hanc videri inuit, que hoc meretur
Collato tunc, huc videri ille probat
Quem super hæc, & deinde omnis videri
Tunc adit in lucem hanc edidit, adque saluare
Nemine non solum nostro, dociditque patitur
Videmus enim Bonifacius amice, quem augur olim
Amis Phœbe libet videri conuincit.
Tunc hanc patitur videri, deinde, meretur.

AMICVS AD VINCENTIVM
GISBERTVM.

Quæris quid, Gisberte, noui sit: nil ego præter
Hoc vnū scio (namque aliis, quæ plurima vulgus
Nunc hominum narrat, non est cur immorer, ad te
Cum scribam magni Hippocratis, doctique Galeni
Scripta volutantem, vel quæ sunt seria, cumque
Arctantem breuibus chartis, atque ordine pulchro.)
Alta igitur cum concepisset mente Pereda,
Est Asclepiadum qui vnus, foetum, & pariturus
Iam esset, eum excipere ipsa sinu male sana refugit
Tellus, pallenti inuidia stimulata medentum:
Sic, qua concepit foetum, non edidit vrbe
Egregij mens culta viri: partus tamen ipse
Aureus hanc urbem inuisit, quæ flore medentum
Collato tumet, huic vni cupit ille probari,
Quem stupet hæc, & deinde omnis mirabitur ætas:
Tèque adit in lucem nunc editus, atque salutat
Nomine non solum nostro, doctique parentis,
Verum etiam Bonifantis amici, quem auguror olim
Artis Phœbææ sidus fulgere coruscum.
Tu hunc partum Gisberte fove, defende, meretur.

MICHAEL IOANNES
PASCHALIVS AD
inuidum.

I Am nouus exorior : iam depositaque senectū

Humo tollentem splendida colla vides?

Me tamen exuta nitidum prodire senectū

Palles? tu palles ergo nitore meo?

Eterno ō viuinam tu iam squallore regare:

Exuias liceat nec posuisse tibi.

At contrā eterno niteat splendore Pereda,

Cuius sic macula tersit amica manus.

PAV

PAVLVS ASTOR DERTVSENSIS
PHILOSOPHIÆ CANDIDATVS
de sui magistri Scholiis.

Hippolyti lacera vt vidit, disiectaque passim
Membra Deus, pulchris qui nitet vsque comis:
Ingemuit casum iuuenis miseratus acerbum,
Atque salutari contigit illa manu.
Præsentem sensisse Deum quæ tacta, & in auram
Hanc ipsam vitæ mox rediisse ferunt.
Impete barbarico sic, & compage soluta
Artis, Phœbe, tuæ, membra Pereda legit:
Hippocratis pandensque sinus, & laxa Galeni
Æquora percurrrens, hinc opem, & inde petit:
Nec magis Hippolytus tibi, quàm tu Phœbe Peredæ
Debes, inuentum qui tibi seruat idem.

SYLLA



SYLLABVS CAPITVM QVÆ HOC LIBRO

continentur.

LIBRI PRIMI

CAP. I.	D e pilorum decidentia.	fol. 1. a
2.	De morbo Gallico.	11. b
3.	De ulceribus capitis manantibus, & curatione pediculorum capitis, & aliarum partium.	17. a
4.	De dolore capitis à quacunque causa contingat ipsum dolore affici.	23. a
5.	De phrenetide.	24. b
6.	De lethargo.	29. b
7.	De vertigine.	31. b
8.	De morbo comitiali.	33. b
9.	De melancholia.	38. b
10.	De incubone.	42. a
11.	De iis qui amore insaniunt.	43. a
12.	De apoplexia.	45. b
13.	De paralyfi, Latinis resolutione.	48. a
14.	De conuulsione.	50. b
15.	De tremore.	54. b
16.	De ophthalmia.	55. a
17.	De imbecillo aspectu.	58. a
18.	De albugine oculorum.	59. b
		De

SYLLABVS

19. De suffusione.	59.b
20. De dolore aurium.	61.a
21. De sanguinis è naribus profluvio.	62.b
22. De rubedine faciei.	65.b
23. De dolore dentium, atque etiam de ipsis denigratis & mobilibus.	67.a
24. De angina.	68.b
25. De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.	71.a
26. De orthopnea, asthmate, dyspnea.	74.a
27. De peripneumonia & pleuritide.	76.b
28. De sanguinis sputo.	81.a
29. De empyemate, id est, suppuratione & tabe.	83.a
30. De palpitatione cordis & syncope.	86.a
31. De imbecillitate ventriculi, & dolore & inflammatione eiusdem.	90.b
32. De singultu.	93.a
33. De appetentia immodica, quam medici caninam appellare solent.	94.a
34. De cibi fastidio.	94.b
35. De cholera.	97.a
36. De diarrhoea.	99.b
37. De lyenteria.	104.a
38. De dysenteria.	106.a
39. De tenesmo.	109.a
40. De cholico dolore, & ileo.	110.a
41. De inflammatione hepatis.	115.b
42. De obstructione hepatis.	117.b
43. De ictero.	119.b
44. De hydrope.	122.a
45. De lienis obstructione.	127.a
46. De suppressione urinae.	128.a
47. De renum calculo & vesica.	131.a
48. De ardore urinae.	137.b
49. De mictu sanguinis.	140.a
50. De	

CAPITVM.

50. De diabete.	140.b
51. De lumbricis.	142.b
52. De hamorroidibus.	145.b
53. De procidentia ani.	149.b
54. De procidentia uteri.	150.b
55. De immodicis mensibus.	151.b
56. De suppressis mensibus.	155.a
57. De uteri suffocatione.	158.b
58. De mola uteri.	160.b
59. De partu laborioso, & secundis detentis.	161.b
60. De ramice.	164.a
61. De arbritide.	167.a

LIBRI SECVNDI

CAP. I. D E syncho.	172.b
2. D E febre ardenti.	180.a
3. De tertiana exquisita.	183.b
4. De tertiana notha.	187.a
5. De quotidiana.	188.a
6. De quartana.	189.a
7. De febribus compositis.	192.a
8. De hectica.	192.b
9. De febre pestilenti.	198.a
10. De exanthematibus, quæ à nostris medicis variola & morbilli dicuntur.	205.b

FINIS.

CAPITVM

1465
1475
1485
1495
1505
1515
1525
1535
1545
1555
1565
1575
1585
1595
1605

De...
1. De...
2. De...
3. De...
4. De...
5. De...
6. De...
7. De...
8. De...
9. De...
10. De...
11. De...
12. De...
13. De...
14. De...
15. De...

LIBRI SECUNDI

1715
1805
1815
1825
1835
1845
1855
1865
1875
1885
1895
1905
1915
1925
1935
1945
1955
1965
1975
1985
1995
2005

CAP. I. De...
1. De...
2. De...
3. De...
4. De...
5. De...
6. De...
7. De...
8. De...
9. De...
10. De...
11. De...
12. De...
13. De...
14. De...
15. De...

FINIS



PETRI PAVLI
P E R E D Æ
S E T A B E N S I S,
 I N

MICHAELIS IOANNIS PASCHALII
 methodum curandi,
SCHOLIA.

*De pilorum decidentia, in quo multa continentur
 tyronibus necessaria ad curationem
 omnium morborum.*

CAPVT I.



DE C I D E N T I A pilorum (quam caluitiem ap-
 pellamus) affectio capitis est, qua vniuersi eius
 capilli defluunt. Prouenit ea aut ob cutis rari-
 tatem, aut ob humoris defectum, ex quo ipsi ge-
 nerantur, atque nutriuntur. Porro si à cutis laxi-
 tate id contingat, promptè & à calore, & à fri-
 gore caput læditur: quod raritatis proprium signum est. Sin
 ex alimenti defectu, primùm extenuantur, deinde concidunt
 vniuersi. Quam rem in iis, qui tabe laborant, quotidie cerni-
 mus euenire, maximum inde argumentum desumentes,
 decidentium pilorum ob alimenti deiectionem tabis indicium
 esse. Huiusmodi affectio morbi Gallici symptoma plerun-
 que est, vbi non tam ex prædictis fit causis, quàm ex humo-
 rum corruptela: à qua & Alopeciam, & Ophiasim fieri Gal.
 existimat. Quo in casu cutis colorem spectare oportet. Nam
 si pro naturæ modo albidior sit, pituitæ soboles erit morbus:
 sin pallidior, bilis flauæ: sin nigrior, atræ bilis: sin rubicundior,
 sanguinis. Sed anteaquam vitam etiam considerabimus prius,

*Descri-
 ptio.
 Causa.*

Signa.

DE CVRAND. MORB.

tamen scientes, quæ qualem humorem soleant adaugere. Pilo-
Curatio rum decidentia (nam de vero caluitio hîc non agimus) cura-
Primò tur, primùm, si à sanguine fiat, victu refrigerante & exsiccante,
Victus & sanguinem minuente: si à flava bile, victu refrigerante &
ratio. humectante, vt sunt aër frigidus arte paratus, nempe floribus,
herbis, liquoribus, si naturalis non reperiatur: cibus sit pri-
sana hordeacea, lactuca, cucurbita, portulaca, & ius pulli re-
frigeratum, illis vel similibus. Nocent huic calida, vt piper,
cinnamomum, eruca, cape, & similia. Si fiat à pituita, cura-
tur primùm victu calefaciente, & siccante. Quare exercitatio,
& motus præsertim ventriculo vacuo maximè huic pròdest,
quemadmodum & vsus rerum calidarum, vt sunt piper, cro-
cus, cinnamomum, fœniculus, & similia; frigida, quæ pitui-
tam augent, nocent: vt pisces, herbae frigidae, & legumina
omnia præter cicera. Si ab atra bile fiat, primum curatur victu
calefaciente, & humectante, & quiete, & aëre similis veris, &
iure gallinae & arietis, cum borragine, vel buglossa. Quæ
attram bilem augent, huic incommoda sunt, vt caro bubula,
hircina, leporina, & ceruina, caseus antiquus, & omnia salsa.
In omni tamen pilorum decidentia, quæ humores corrup-
punt, diligentissimè vitanda sunt, vt inordinata ratio sumendi
cibos, veluti si cibus difficilioris concoctionis præcedat alte-
rum facilioris. Fugienda etiam est ciborum multitudo in ea-
dem mensa, tum cibatio post cruditatem, necnon exercitatio
immodica statim ab esu: lac denique, & butyrum, si aliis ali-
mentis, præsertim piscibus iramixta comedantur, vitari debent:
quoniam maximè humores corrumpunt, elephantiasimque effi-
cere solent.

Secundò Deinde curetur decidentia pilorum sanguinea per sectionem
Sectio basilicae dextrae, educaturque sanguinis quantitas respondens
vena. plenitudini: habeaturque ratio præcipua roboris facultatis, se-
cundò magnitudinis morbi, vt Gal. lib. de rat. curandi per san-
guinis missionem docuit. quanquam Hippocrat. 4. de rat. vict. in
morbis acutis, præter illa duo, ætatem floridam addit, & Galenus
in commentario quartum considerandum esse iudicat, videlicet
aëris dispositionem. Hæc tamen omnia sub duobus primis com-
prehenduntur.

Tertiò Tertiò, post sanguinis missionem euacuetur bilis flava se-
Purga- quenti potione, qua etiam sanguinis feruor, & caliditas im-
tio. modica remittitur. ℞. medullæ cassiæ fistulae recens per setam
extractæ. & medullæ tamarindorum in aqua mente prius in-
fusorum, si fuerit ventriculi imbecillitas, an. ʒ. ss. rhabarba-
ri electi infusi per noctem in aqua. endiuia ʒ. j. electuarij de
suc

succo rosarum. ʒ. ij. ꝑ. decoctionis florum cordialium. q. s. misce, & fiat potio sumenda in aurora.

An verò sumpto medicamento purgante ante opus ince- *De som-*
ptum sit semper dormiendum, discrimen est inter authores: eo- *ne in po-*
rum tamen verior pars vult parum esse dormiendum sumpto *ne.*
medicamento purgante benigno & liquido: diutius tamen
post medicamentum potens & liquidum: multò diutius post
medicamentum medium inter liquidum & solidum quòd à no-
stris medicis dicitur bolus. Maxime verò dormiendum erit sum-
pto medicamento siue benigno, siue potenti, in formam pilula-
rum, quia primum minori calore eget, dum reducitur de potentia
ad actum: vltimum verò maiori.

Opere autem incepto semper somnus nocet, nisi sit immo-
deratum opus egens restrictione, Post opus sufficiens per ho-
ram ante prandium ad lauandum ventriculum, & intestina bibat
ʒ. iiij. iuris sine sale, vt noster Valentinus mos est, vel ʒ. *Valenti-*
iiij. decocti hordei cum cortice, addendo ʒ. j. sacchari: quo de- *ni Itali.*
cocto Itali vtuntur. In prandio parcè comedat, & à prandio
dormiat. Die verò sequenti mundificentur intestina sequenti,
vel simili clystere. ℥. decocti foliorum maluarum, violarum,
sictæ, furfuris & hordei ʒ. xv. olei rosati ʒ. iiij. sacchari rubei
ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster: & si opus fuerit, adde diaca-
tholiconis ʒ. j.

Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile, euacuanda est *De con-*
medicamentis cholagogis, prius tamen facta illius leui con- *coctione*
coctione. Nolo in præsentia demonstrare, quid sit conco- *bilis.*
ctio, neque quomodo medicorum coctio fieri soleat in dupli-
ci transmutatione, naturali videlicet (quæ circa alimenta ver-
satur, nihil aliud est, quàm alteratio nutrimenti ad propriam
qualitatem nutriti) & altera, quæ in putrida substantia ver-
satur, & est alteratio cessare faciens putredinem manente sub-
stantia, autore Galeno vltima parte artis paræ. Nolo etiam
hic ostendere, an omnis humor præter sanguinem corru-
ptus, vel putridus, vel ad nutrimentum ineptus egeat secunda
concoctione: neque libet mihi explicare, an tenuis humor,
qualis est flaua bilis, indigeat ea, vt reuera indiget: quæ an
fieri debeat per reductionem ad mediam substantiam in-
crassatione (vt crassus humor concoquitur attenuatione)
non est præsentis instituti. Quidam ex recentioribus volunt
tenuem humorem calidis & attenuantibus medicamentis
concoqui, quibus dedit ansam errandi comment. 24. lib. 1.
Aphor. quo loco Gal. docet concoctionem in morbis acutis (si
necessaria sit) faciendam esse melicrato decocti origani,

DE CVRAND. MORB.

mentastri, pulegij & similium. Alij volunt renuem humorem per se nulla concoctione egere, contra quos est autoritas Hippocr. Gal. & aliorum autorum, ratio, & experientia crisis factæ. 7. vel 14. die morborum, qui fiunt à flaua bile: quæ in eorum initio bona esse non potest propter priuationem concoctionis. Concoctione enim, autore Gal. lib. 1. de crisis, celeritatem, & certitudinem iudicij ostendit. Villanouanus contra Manardum, & contra alios docet nullum humorem corruptum putridum, & ineptum nutritioni, cōcoqui posse. Hæc omnia in expos. 22. aph. lib. 1. tractanda sunt nobis. tamen hoc loco sufficit, humores neque à natura, neque ab arte rectè euacuari posse non præcedenti concoctione: quæ licet à calore nativo præcipuè fiat, alia tamen multa coadiuant, vt sunt syrapi, decocta, succi & aquæ, quæ vias aperiendo in obstructione (quæ in omni febre dependente ex putredine humorum inuenitur) vel reducendo substantiam rei concoquendæ ad mediocritatem, vel illius acrimoniam & intemperiem corrumpendo præparant. Quilibet igitur humor ante vacuationem concoctione eget, crassus tamen difficilius concoquitur. Sed vt sit tyronibus omnibus notus catalogus medicamentorum omnium humores concoquentium, quæ sequuntur adiecimus.

*Medicamenta humorem bilosum concoquentia sunt,
qua sequuntur.*

Primò omnia medicamenta frigida, à primo ordine vsque ad tertium, siue sint in forma decocti, vel succi, vel aquæ: quibus vsi sunt Arabes, & alij multi. Neque quorundam iuniorum ratio de vi perniciosa plumbi, & æris, quibus distillantur aquæ vi ignis, obstat. Cùm etiam omnia medicamenta composita fiant illis vasis: dum tamen decocta & succi inueniri possint, eis est vtendum, propter maiorem facultatem. Aquæ omnes fermè præter rosaceam, violaceam & vitis, carent proprio odore, & sapore. Vbi tamen aquis vtendum est propter defectum simplicium, vel ægrotantium gustum, augenda est quantitas earum. Sunt etiam medicamenta hæc in forma melicrati (quo Græci utebantur propter sacchari inopiam, vel in forma syrapi, quibus nos vtimur) propter sacchari copiam, & ægrotantium delectationem, præcipuè in morbis calidis: nam multi fieri solent syrapi cum melle in morbis frigidis. Pestilentes tamen pharmacopolæ, si syrupos frigidos melle vel saccharo rubro conficiant, ægros interficiunt: quos poena capitali puniendos censeo.

In phar-
macopo-
las. Fla-
uâ bile
conco-
quentia. Simplicia flauam bilem concoquentia (quæ officinarum more scribuntur, ne à pharmacopolis vnum pro alio infirmis tribua

tribuat) sunt hæc: Endiuia, Cichorea, Lactuca, Portulaca, Cucurbita, Vermicularis, Semperuina, Virga pastoris, Solatium, Umbilicus Veneris, Nenuphar, & alia similia. Composita, sunt syrupus acetosus. S. syrup. endiuia. S. syrup. de iuiubis, oxysacchare. S. syr. endiuia comp. syr. violarum. syr. rosarum. syr. de succo acetosæ. syr. de agresta. syr. de pomis. syrup. acetositis citri, syrup. acetositis limonum, syrup. de nenuphare. syrup. de papauere: iulep rosarum & violarum.

Simplicia, quæ pituitam concoquere valent calefaciendo, attenuando, incidendo, & aperiendo meatus, sunt fceniculum, petroselinum, hyssopus, scabiosa, betonica, capillus veneris, pulegium, calceamentum, satireia, menta, serpillum, origanum, melissa, pæonia, mel, & similia. *Pituita conco- quetia.*

Composita, sunt syrupus acetosus s. rhodomel, syrup. de bizantiis, oxymel. s. syrup. de liquiritia, syrup. capillorum veneris. syrup. acetosus compos. syrup. de hyssopo. oximel compos. syrup. de stichados. syrup. de eupatorio. syrup. de absinthio. syrup. de prassio, & oximel scilliticum.

Simplicia, quæ atram bilem concoquere valent, sunt borrago, buglossa, lupulus, fumus terræ, scolopendria, ceterac, tamariiscus, rubea tinctorum, & similia. Composita, sunt syrup. borraginis, syrup. buglossæ, syrup. de pomis, syrup. de fumo terræ, s. & comp. quamuis comp. pro parte sit purgans. Syrup. regis Sabor ex Mesue cap. de melancholia sanguinea. syrup. de epithimo. Concoquuntur humores calidi & tenues breui tempore: frigidi & crassi longiori: exhibendo semel, vel bis, vel ter in primis humoribus, videlicet tenuibus, qui parua egent concoctione. In crassis autem & frigidis, multo tempore. Quare errant qui in omni morbo perpetuò ter exhibent hæc medicamenta, cum quandoque fieri possit vacuatio ab arte sine concoctione ab eadem facta, quando talis à natura perfecta est: Dosis tamen syruporum vnaquæque est ʒ. j. cum semisse vsque ad duas, & aquarum est trium vnciarum. Carpetani solent, & optime, tantum dosim vnam syruporum & aquarum præscribere: etsi opus fuerit maiori concoctione, secundam, quandoque tertiam & quartam dosim præscribunt. Nos verò Valentinus tres simul doses describere solemus, quem morem non laudo, cum sæpe maior sit sufficiens minor concoctione, sæpe maior sit necessaria, vt prædiximus. Galli autem syrupos aliquis miscent, addentes sacchari parum, & peluerem aliquem: quam mixtionem lento igne confectam syrupum aromatizatum appellant. Concoquetur bilis flaua Valentino more sic ʒ. syrup. endiuia s. & oxysaccharæ. lan. ʒ. iij. misce. *Atram bilem conco- quetia.* *Error exhiben- tium sy- rupos.* *Dosis syr. Ca- stella.* *Valentini.* *Galli.*

DE CVRAND. MORB.

item ℥. aquarum cichoreæ, endiviæ & lactucæ an. ℥. iij. misce. Eodem modo dabitur forma syruporum & aquarum pituitam vel atram bilem concoquentium, quamvis (vt prædiximus) maiori egeant concoctione pituitosi humores, maxime verò atrabiliarij. ¶ His itaque concoctionibus humorum fiat eorum vacuatio propriis & necessariis medicamentis, tum simplicibus, tum compositis, quorum catalogum nota.

Purgantia flauam bilem.

Simplicia purgantia flauam bilem, sunt hæc, rhabarbarum, scammonium, myrobalani citrini, cassia fistula, manna, tamarindi, succus rosarum, aqua casei, & aloë. Composita verò sunt electuarium de succo rosarum, elect. diaprunis solutiuum, elect. de psyllio, quo non vtuntur Valentini: hiera. s. pilulæ de hiera. s. pilulæ de rhabarbaro, pilulæ aureæ, pilulæ aggregatiuæ, quamvis bilem mixtam cum pituita euacuent, quemadmodum & elect. diaphænicon, cuius vis non transit hepar.

Pituita.

Simplicia medicamenta pituitam purgantia, sunt agaricus, turbit, myrobalani, chebuli, emblici, bellirici, colloquintida, euphorbium, esula, hermodactyli: Composita, sunt diaphænicon, electuarium indum vtrunque, benedicta hiera. s. & composita, pilulæ de hiera. elephanginæ, aggregatiuæ, de agarico, cochia de hermodactylis maiores, lucis foetida, stomachica, sine quibus esse nolo.

Atram bilem.

Simplicia purgantia atram bilem, sunt myrobolani indi, lapis armenus, lapis lazuli, sena, epithimum, polypodium, sunt tamen præter iuniores, qui damnant lapidem armenum, quia non cognoscitur: & lapidem lazuli, propter eius vehementiam. Si tamen bene præparetur lapis lazuli, & lauetur, est medicamentum cardiacum, cum confectio Alchermes Regum hoc lapide etiam bene lauato constet. Composita, sunt diasene, confectio medicaminis, quod scripsit Hamec Hiera Rufi, pilulæ indæ, pilulæ de fumo terræ, de lapide armeno, de lapide lazuli.

De lapide lazuli.

Formula purgantium medicamentorum compositorum, quarum tres purgant bilem flauam, tres pituitam, aliæ verò tres, atram bilem, dictæ sunt: perpetuò tamen non est exhibenda similis quantitas, cum varianda sit secundum naturam ægri & humoris: certa enim rei quantitas neque calamo scribi potest, neque lingua proferri: imò quod difficilius est, idem homo in diuersis ætatibus diuersam habet naturam, vt constat ex Hip. aph. 20. secundi lib. quibus iuuenibus aluus, &c. Et propterea optimè Hip. libello de purgantibus medicamentis docuit, quæ à medico sunt considerata in purgandis humoribus: quibus etiam egeat interrogationibus: vbi etiam docuit alimenta non rectè adhibita morbum efficere, quantò magis medicam

dicamenta, à quibus potentiùs alteratur nostrum corpus.

Prima formula potionis purgantis flauam bilem.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ ʒ. vj. Potio.
rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuix ʒ. j. liqui-
nanti ḡ. iij. elect. de succo rosarum ʒ. iij. syrup. violarum ʒ. j.
decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potio.

Secunda formula buccellarum quas bolos appellant purgantium flauam bilem.

℞. Medullæ cassiæ fistulæ recens per setam extractæ; vel Boli.
loco eius diaprunis simp. ʒ. ʒ. elect. de succo rosarum ʒ. iij.
sacchari quod s. misce, & fiant septem buccellæ, & plures, si
opus fuerit.

Tertia formula pilularum purgantium eandem bilem flauam:

℞. massæ pilularum aurearum ʒ. j. diagridij optimi ḡ. iij. Pilulæ.
fiant cum aqua endiuix pilulæ septem, & aurentur, si diues fue-
rit. Poterit æger, si non potest deglutire pilulas, neque potionem
bibere, aut detinere, ad euacuandam bilem flauam accipere ḡ.
v. vel vij. diagridij optimi cum ʒ. j. syrup. violati, vel cum ʒ. j.
conseruæ violarum, vel borraginis, vel rosarum, vel cum iure
sine sale. Poterit etiam si abhorret à medicaminibus mali sapo-
ris, accipere ʒ. ij. syrup. rosarum alexandrinarum, vel rhodo-
mellis earundem rosarum.

Prima formula potionis purgantis pituitam.

℞. diacatholiconis ʒ. ʒ. elect. indi maioris ʒ. iij. rhodo- Potio.
mellis ʒ. j. aquæ fceniculi, quod s. misce, & fiat potus.

Secunda formula buccellarum purgantium pituitam.

℞. diaprunis simp. ʒ. vj. agarici trochiscati ʒ. j. elect. in-
di maioris ʒ. iij. sacchari, q. s. misce, & fiant septem buccellæ,
seu boli.

Tertia formula pilularum purgantium eandem pituitam.

℞. pilularum de agarico & de hiera simp. an. ʒ. ʒ. diagridij. Pilulæ.
ḡ. iij. cum aqua fcenic. fiant pilulæ vij. & aurentur.

Prima formula potus purgantis atram bilem.

℞. medullæ cassiæ recenter per setam extractæ ʒ. vj. con- Potio.
fectionis medicaminis hamee & diasenæ. an. ʒ. iij. syrup. borra-
ginis ʒ. j. decocti florum cordialium, addendo ʒ. ʒ. epithymi &
folliculorum senæ, q. s. misce, & fiat potus, fieri potest cum sero ca-
prino decoctum.

Secunda formula bolorum purgantium bilem atram.

℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ per setam ʒ. ʒ. Boli.
pulueris epithymi ʒ. j. confectionis medicaminis hamee. ʒ. iij.
& ʒ. sacchari, q. s. misce, & fiant boli vii. saccharo cooperti.

Tertia formula pilularum purgantium atram bilem.

Pilula.

℞. pilularum de fumo terræ & indarum, an. 3. ℞. diagridij ḡ.iiij. cum sero caprino fiant pilulæ viij. & aurentur, si non fuerit pauper. Similibus formulis vti poteris addendo, vel minuendo quantitatem medicamentorum purgantium tam simplicium quàm compositorum, secundum variam quantitatem, & naturam humorum, & ægri: vnum est tamen maximè considerandum, ne tempore quo purgare volumus ægrum misceamus plura medicamenta siue simplicia, siue composita: nam tempore breui multorum medicamentorum mixtura non potest vnicam temperaturam, & formam acquirere. Actio illa, quam medici barbari fermentationem appellant, sufficienti & longo tempore eget, quamuis interdum maiori, interdum minori, secundum variam naturam simplicium temporis, & regionis. Quemadmodum theriaca magna ad sui generationem, seu fermentationem sex, vt minimum, eget mensibus, antea tamen dum recens, & non fermentata esset, somnum inducit à 3. ℞. vsque ad j. 3. postea verò corruptis formis & temperamentis omnium simplicium, introductaque vnica forma, & temperatura, calida est in fine secundi ordinis. Compositum enim medicamentum purgans si recens fuerit, non potest fœlicem & optatum finem inducere: nam prius vnum medicamentum purgabit altero, quandoque vnum impedit opus alterius.

*Error
quorundam.*

Quare errant Medici nostri in purgandis ægris varia medicamenta miscentes, cum sufficiat vnum, aut alterum, etiam si humor euacuandus sit mixtus, cum inueniri possit medicamentum vnicam temperaturam & formam habens, quod purgare valeat mixtum humorem. Quemadmodum diaphænicon; & pilulæ aggregatiuæ. Sed quia in vsu medicamentorum purgantium timor est, ne maior copia humoris educatur quàm conueniat ad quam facultas necessario soluitur, cum cuicunque vacuationi sit annexus casus virtutis, aliquando quoque ab immodica purgatione fiunt alij affectus præter naturam, vt febris. Quare perpetuò vacuatio parca tutior est immodica: natura enim sæpe vel euacuat, vel resoluit derelictum à medicamento humorem: immodica tamen & laboriosa purgatio ferè semper fieri solet à medicamentis prauam ac venenosam qualitatem habentibus: benigna enim & salubria, vt cassia fistularis, rhabarbarum, manna, tamarindi, & myrobalani omni tempore, omni ætate, & etiam vterum gerentibus audacter tribui possunt.

Si scire cupis quæ sint benigna, & quæ valentia, & qua hæc egeant præparatione & correctione; Mesues suo i. lib. doctissime tradit, & post ipsum breui epitome Ioannes Tagantius duobus

duobus libris de purgantibus medicamentis simplicibus, quorum priori vniuersales canones Mesuæ collegit, posteriori vero simplicia omnia Medici summè necessaria quinquaginta quinque capitibus scripsit, & illorum veram cognitionem etiam cum Græcis demonstrat, & aliis paucioribus componuntur omnia fermè medicamenta purgantia, quorum dos in forma elect. rarò excedit ʒ. iiij. & in forma pilularum ʒ. j. quamuis si clementibus & benignis tantùm componantur, dos augeri possit.

Ad integram tamen & veram huius rei cognitionem (præter ea quæ Mesues suo antidotario, & Arnaldus de Villanoua, & nunc eruditus Fuchsius suo Nicolai Mirepsij opere medicamentorum scriptam reliquerunt) notare numerum sequentium medicamentorum purgantium, præcipuè eorum quibus nostræ officinæ, & nos vtimur. Hic tamen quantitatem scammonij, esulæ, colocynthidis, hellebori, & similibus potentium, vnciæ vnius electuarii, & drachmæ vnius pilularum demonstrabo, quod non parum necessarium est medico: alioqui tanquam cæcus in foueam caderet. Animaduertendum tamen est ʒ. g. xxiiij. continere, quamuis multi granis xx. constare velint, apud primos ʒ. constat xxiiij. ʒ. vel viij. ʒ. scire etiam oportet in constituendis electuariis ʒ. iiij. puluerum indigere lb. j. mellis, aut sacchari.

Diaphænicon Mesuæ tota compositio constat lib. vj. scammonij quantitas est viginti duarum drachmarum: erant ergo qui duodecim drachmas tantùm miscent. Huius electuarii quælibet vncia constat viginti duobus granis scammonij: propter dactylos tamen eius vis non transit hepar. Dosis eius est à drachmis quatuor & semis vsque ad drachmas decem & semis.

Error nonnullorum.

Electuarij rosarum compositio Mes. constat libris tribus, & vnciis octo, scammonij quantitas est duodecim drachmarum: quælibet vncia huius electuarii habet grana decem & nouem scammonij cum dimidio: cuius dos sunt drachmæ quinque.

Confectionis medicaminis, quod scripsit Hamec Mes. constat libris quinque compositio, scammonij quantitas est drachmarum duodecim: quælibet vncia huius electuarii habet grana tredecim cum dimidio scammonij, dos eius est à drachmis duabus vsque ad quatuor.

Electuarij indi maioris Mes. compositio constat libris sex habet hæc compositio præter alia potenter purgantia drachmas duodecim scammonij: & eius quælibet vncia habet grana duodecim scammonij: dos est drachmarum quatuor.

DE CVRAND. MORB.

Electuarii indi minoris compositio constat libris quatuor, habent drachmas duodecim scammonii : quælibet igitur vncia huius electuarii habet grana decem & octo scammonii, dosis est dragmarum quatuor & semis apud Mesuen, licet videatur maior inesse vis huic, quam electuario indo maiori.

Electuarii diaprunis solutiui Nic. quælibet libra habet drachmas septem scammonii : quare quælibet eius vncia habebit grana triginta octo scammonii : dosis eius est drachmis duabus usque ad vnciam semis, quamvis Nic. vnius castaneæ quantitatem tribuat.

Electuarii de succo rosarum Nic. compositio libris duabus constat, habetque drachmas duodecim scammonii, quare quælibet eius vncia habet triginta sex grana scammonii, dosis est à drachmis duabus usque ad quatuor. Nicol. tamen castaneæ quantitatem tribuit.

Benedictæ. s. Nic. compositio est trium librarum cum dimidia, habet hoc medicamentum drachmas quinque scammonii, & drachmas decem esulæ, quælibet eius vncia grana octo cum dimidio scammonii habet, & grana decem, & septem esulæ, dosis est ad modum castaneæ Nicolao, aliis à drachmis duabus usque ad vnicam vnam.

Hiera Logodionis Nico. compositio est librarum duarum & octo vnciarum, eius quælibet vncia habet scammonii minus quam duo grana, & colocynthidis grana triginta sex. Dos is est Nicolao ad modum castaneæ, aliis tamen à drachmis duabus & semis, usque ad drachmas quatuor : quæ in clysteribus verò datur, vncia vna & semis.

Electuarii Sebesten Montagnanæ compositio est trium librarum & trium vnciarum, & eius quælibet vncia habet grana sex cum dimidio scammonii : dos is est dragmarum quinque vel sex.

Electuarii Elefscoph Mes. compositio est libræ vnius cum dimidia, habetque drachmas sex scammonii, & totidem turbit, eius quælibet vncia habet scammonii & turbit an. viginti quatuor grana. Dos is est à drachmis tribus & semis usque ad quatuor & semis.

Electuarii de psyllio Mes. compositio constat libris quatuor cum dimidia, & eius quælibet vncia habet scammonii grana viginti sex, & tertiam partem grani : dos is est à drachmis tribus usque ad drachmas quatuor & semis.

Electuarii de psyllio Montagnanæ compositio constat libris octo, habetque eius quælibet vncia scammonii grana viginti quatuor. Dos is est à drachmis quatuor usque ad quinque.

Pilularum aurearum Nic. compositio est trium vnciarum, habet scammonij drachmas quinque, habetque drachma earum scammonii grana quindecim: dosis est à drachma vna vsque ad scrupulos quatuor, Nicolaus dat nouem vel vndecim ad magnitudinem ciceris, huius magnitudinis septem habet quælibet drachma.

Pilularum aggregatiuarum Mesu. compositio est sex vnciarum, & duarum drachmarum: habet scammonii drachmas sex, & quælibet drachma habet scammonij grana octo, & tres quartas grani vnus. Dosis est à drachma vna vsque ad drachmam vnā & semis.

Pilularum fumarie Auicennæ compositio est vnciarum triū, & trium drachmarum, habet drachmas quinque scammonij, & earum quælibet drachma grana tredecim, & tertiam partem grani vnus: dosis est à scrupulis iij. vsque ad drachmas ij.

Pilularum fœtidarum Mes. compositio est vnciarum septem, & drachmatum duarum, habet scammonij drachmas tres, & esulæ drachm. duas & colocynthidis drachmas quinque: quælibet drachma earum habet scammonij grana tria & tres quartas grani vnus, & esulæ grana duo cum dimidio, & colocynthidis grana sex, & quartam grani vnus purgant potenter. Quare errant qui cum Rhase c. de resolutione dant drachmas duas & s. cū earum dosis sit à drachma vna vsque ad scrupulos quatuor.

Pilularum mezereon Mes. compositio est vnciarum duarum, habetque drachmas quinque mezereon, & quælibet drachma earum grana viginti duo cum dimidio: quare earum vsus est suspectus, nisi in morbis magnis, & præsentē virium robore: dosis est à scrupulis duobus vsque ad drachmam vnā. Error quorundam.

Pilularum hermodactylorum maiorum Mes. compositio est vnciarum octo, habet quælibet drachma earum colocynthidis grana sex, & tres quartas grani, & euphorbii grana tria cum dimidio, & hermodactylorum grana sex, & tres quartas grani: dosis est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum hermodactylorum minorum Mes. compositio est vnciarum trium, quæ habet scammonij drachmas duas & semis, & earum quælibet drachma scammonij grana septem cum dimidio, & hermodactylorum grana quindecim, dosis est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Pilularum Arabicarum Nic. compositio est vnciarum vndecim, habet scammonij drachmas octo, & quælibet drachma scammonij grana sex cum dimidio: dosis est ab vncia vna vsque ad vncias duas,

DE CVRAND. MORB.

Pilularum cochiarum Rhase compositio est vnciarum trium & drachmæ vnius, & quartæ partis drachmæ vnius, habet scammonij drachmas duas & semis, & colocynthidis drachmas tres & quartam drachmæ vnius, & turbit drachmas quinque, & quælibet drachma habet scammonij grana sex, & fermè bis tertiam partem grani vnius, & colocynthidis fermè octo grana, & turbit grana propè quindecim. Quare errant qui cum Rhase cap. de cephalalgia drachmas duas & semis dant, cum earum dosis sufficiens sit drachmæ vnius.

*Error
quorun-
dam.*

Pilularum indarum Mes. compositio est vnciarum septem, & drachmarum quatuor: habet hellebori drachmas quinque, & colocynthidis drachmas quatuor, & eius quælibet drachma hellebori grana sex, & colocynthidis grana quatuor, & quatuor quintas vnius grani: dosis Mes. est à drachmis duabus vsque ad drachmas tres, quamuis drachma vna nostris temporibus sufficiat, vt multis placet.

Pilularum de lapide lazuli Mes. compositio est vnciarum septem, drachmarum quatuor, habet scammonij & hellebori nigri an. drachmas duas & semis: & earum quælibet drachma scammonij & hellebori an. grana tria: dosis est drachmarum duarum cum aqua casei, & succedit foelix vacuatio.

Pilularum de Agarico Mes. compositio est vnciarum trium, habet colocynthidis drachmas duas, & turbit drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & turbit grana quindecim: dosis est Mes. drachmarum duarum, alij vero dant scrupulos quatuor tantum.

Pilularum de elaterio Nico. Compositio est sex vnciarum cuius dimidium est elaterium: quare quælibet drachma habet grana triginta sex elaterij & ideo potenter purgant, & non sunt in vsu. Dosis est ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam.

Pilularum de opopanace Mes. compositio est vnciarum septem & quatuor drachmarum: habet scammonij drachmas duas, & colocynthidis drachmas quinque, & earum quælibet drachma colocynthidis grana sex, & scammonij grana duo, & quinta duas grani: dosis est à drachma vna vsque ad drachmam vnam & semis.

Pilularum de Euphorbio Mes. compositio ex duarum vnciarum: habet hellebori & colocynthidis an. drachmas duas, & quælibet earum drachma hellebori & colocynthidis an. grana octo: dosis est à drachma semis vsque ad vnam.

Pilularum sine quibus esse nolo Nico. compositio est vnciarum quatuor: habet scammonij fermè drachmas tres & semis: & earum quælibet drachma scammonij grana octo: dosis est Ni-
colao

colao decem, vel tredecim pilulæ ciceribus similes, & est pondus drachmæ vnius, & semis, aliis verò est à drachma vna vsque ad drachmas duas.

Ex his & similibus quæ à doctoribus scribuntur, scire potest medicus dosim medicamentorum compositorum purgantium, quamuis simplicium dosim prius oportet cognoscere, etiam si talium in compositis propter correctionem & alia maior quantitas dari potest: scammonium enim solum & non correctum malo coroneo rarò datur: si quantitas excedat grana septem, in electuario de succo rosarum, vel diaprunis solutiuo, passim dantur grana decem & octo, vel plura, cum dosi eius sit vnciæ semis.

Vnum tamen est maximè considerandum à nobis, ne vtamur medicamentis potenter, & violenter purgantibus, vt sunt scammonium, colocynthis, helleborus, & similia, nisi rarò, & in magnis morbis, & cum sunt bene correctæ, præsertim in febribus, & morbis calidis. Nostri enim temporibus (quæ in hoc fæliciora sunt) vti possumus semper etiam in vterum gerentibus & pueris clementioribus, quæ benedicta dicuntur, vt sunt mannum Arabum, *Benedicta medicamenta.* cassia fistula, rhabarbarum, myrobalani & tamarindi: tempore tamen Græcorum pruna damascena erant cognita clementissima in purgando, & aloë quoque.

Facta iam totius euacuatione siue per sanguinis missionem *Redit ad curatio-* cum oportet, siue per medicamenta purgantia, necesse est euacuare à parte affecta per partes proximas, scilicet per nares vel palatum, præcipuè cum est materia pituitosa: de his *Deriuatio* tamen cap. de apoplexia fiet sermo copiosior. Laborans hoc morbo sæpe post totius euacuationem mandat sequentem apophlegmatismum (quod nostri barbari medici masticatorium appellant) præcipuè ventriculo vacuo. ℞. pulueris mastichis, sinapis, piperis, pyrethri, zinziberis, origani, thymi, pulegij. *Apophlegmatismus.* an. ʒ. ʒ. cum syrupo de stichade fiant pilulæ ad ciceris magnitudinem. Naribus quoque sæpe tunc admoueat sequens liquor: ore tamen pleno aqua: ne descendat ad ventriculum prædictus liquor. Cuius hæc est descriptio. ℞. succorum cyclamini, siclæ, *Errhinum.* ceparum, & maioranæ an. ʒ. ʒ. pulueris piperis & castorei an. ʒ. ʒ. misce. His iam factis, raso capite & confecto panno lineo præcipuè in causa frigida, vbi maiori opus est frictione, admouenda sunt parti affectæ olea, vnguenta, & alia medicamenta, de quibus Gal. primo de compositione secundum locos, tñ causa & Aëtius 6. sermone c. 55. & Paulus 3. lib. Nos tamen duo tantum vnguenta describemus experta, & optima prius alopeciciæ, quæ fit à causa calida: posterius ei, quæ fit à frigida. ℞. pul

DE CVRAND. MORB.

Causa frigida.

pulveris corticum auellandarum, amygdalarum, castanearum, & nucum rostarum an. 3. ij. pulveris stercoris caprarum. 3. ij. olei laurini, & rutæ an. 3. ij. olei rosarum. 3. j. aceci coclearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo vtere in defluvio hoc pilorum, quod fit à raritate cutis & penuria materiæ pilos generantis: cui etiam confert mixtura ex oleis lentisci, myrtillorum, & omphacino cum laudano. Alterum vnguentum conferens causæ frigidæ est sequens. ℥. pulveris vtriusque hellebori, staphisagriæ, sinapis, piperis, stercoris columbi, radicum cannarum, & foliorum ficuum an. 3. i. oleorum euphorbii, castorei & rutæ an. 3. ij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum, quo sæpe vngatur pars depilata præcedente forti frictione, & incisione aliquarum partium, quæ non est facienda, cum est causa calida.

Postquam de pilorum decidentia egimus, non erit extra præsens institutum in præsentia agere de iis quæ pilos augent, & quæ ipsos aureos efficiunt, & tandem de iis quæ nigros reddunt.

Augētia pilos.

Frequens & assidua frictio, & capitis lotio decocto adianti auget pilos, dicitur tricomenes, quia facit luxuriare capillos, & subnasci, vel polytricum, quia creat capillorum multitudinem: & dicitur etiam callitrichon, quod crines denset, crispet, pulchriorésque reddat, ab aliis ebenetrichon appellatur, præcipuè genus nigrum: vox enim ebeni capillum significat nigrum: est officinis capillus veneris. Pectinatio etiam assidua idem efficit: & quæ causas pilorum augent præsertim effectricem, vt vinum, & alimenta omnia calida, & vaporosa.

Idem facit lotio frequens decocti agrimonix, corticis ulmi, verbenæ, corticis salicis, absinthii, abrotani, seminis lini combusti, & cineris radicis arundinum, adde in fine parum lactis capri- ni. Lotio aquæ vitæ addendo parum aquæ rosarum, vel myrthil- lorum idem solet efficere.

Aureos reddentia.

Aureos efficiunt capillos multa, quorum nostræ sceminae satis plenam & certam tenent cognitionem: inter ea tamen, quæ maximam habent vim, est aqua (qua aurum ab argento separatur, & dicitur ab illis fortis) cautè tamen est admouenda, nam si tangat cutim & carnem, corrodet.

Aqua mellis per distillationem facta vitreo instrumento aureos reddit pilos, & sine cutis & carnis nocumento, quamuis ipsos scindat. Decoctum seu lixiuium ex cinere genistæ seu genestæ, (quam spartum seu spartion appellant, & Arabes albahin seu albrachim) capillos aureos sine dubio efficit, hoc quotidie nostræ Valentinx experiuntur.

Nigros efficiētia.

Nigros capillos multa faciunt, vt Dioscorides, Gal. Paul. & Aëtius volunt, de quibus omnibus in præsentia agere esset præ-
ter

ter nostrum institutum : aliqua tamen experta primò simplicia, deinde composita scribemus: semen myrti semen papaueris nigri, cortex nucis, cortex mori celsi, sumac, alcanā, & lac ficuum, folia cupressi, fumus picis liquidæ, fumaria.

Compositum hoc pilos satis nigros efficit, quorum nigror viginti diebus conseruatur, accipe calcis viuæ integræ (quæ dicitur gleba) libræ j. ß. infundatur in aqua per diem facta noua infusione quinquies, eiectis prioribus aquis, postea reiecta aqua, adde illi calci lotæ lithargyrii puluerizati ʒ. j. ß. horis sex, & tali mixtura unge pilos nocte ponendo desuper folium brassicæ, vel pannum lini : postea præcedenti eorum leui frictione, seu agitatione, lauentur sapone & lixiuio communi clementi : est expertum. Hoc quoque medicamentum ipsos nigros reddit. Accipe lixiuii potentis, quo saponarii vtuntur lib. i. pulueris lithargyrii. ʒ. i. bulliant simul, donec pili candidi illo liquore nigrescant, facto sæpe & sensim experimento, deinde conseruetur liquor, quo actu calido, cùm opus fuerit, poteris nigros facere capillos, interponendo pectinem inter cutim & capillos, quos, cùm denigrati fuerint, exsiccari, & aqua calida ablui oportet.

Scholium.

DEcidentia pilorum, quam caluitiem.) Pili vera partes non sunt, quia vita carent, & vero nutrimento. Cùm tamen habeant propriam circumscriptionem in corpore, & per se consistere possint: inter partes numerantur à Gal. 2. de temperamentis, ubi inter veras nostri corporis partes, eorum temperamentum inquit: & dicatur. 1 4. methodi, ubi pilorum defectum morbum in numero partium deficiente appellat. His pilis (qui in corpore generationem habent necessariam, ex excrementum euacuatione) abutitur natura ad ornatum & tegumentorum: ut in illis, qui in capite, & mento implantantur, videre est. Qui verò in superciliis habentur, humores à capite per frontem defluentes, ne oculos ingrediantur, prohibent: sicut pili palpebrarum exigua corpuscula. Cùm ergo decorum inter alia pili in nobis concilient, meritò eorum curam suscipimus, corrigentes affectus, qui in eis præter naturam euenire solent. In plis consideramus substantiam (hoc est ipsos pilos) in defluuium pilorum, caluitie, Alopecia, & Ophiasis: colorem verò in vitilagine. ¶ Defluuium pilorum si largè sumatur, omnia vitia, in quibus pili deficiunt, comprehendit: propriè tamen (de quo nunc agimus) tantum significat omnium pilorum defectum. Hic morbus est in numero deficiente, non quia deficiat vera pars, sed quia deficit pars ad ornatum corporis necessaria: ac proinde, cùm deficit, est restituenda, ac si esset una ex partibus, quæ vera sunt. Habet morbus hic duas causas. Raritatem cutis unam, & alteram defectum

Qua ratione pili partes corporis

Quid sit defluuium pilorum.

DE CVRAND. MORB.

Causa defectum nutrimenti. Raritatem cutis cognoscemus. 1. Quia pili, qui defluuij exciderunt, eandem quam antea habebant, crassitiem, seruant: non pilorum. enim sunt extenuati, cum alimentũ eis non defecerit. 2. ex causa aliqua, qua praecessit, rarefaciente cutem: med. scilicet calido, aut lotione aliqua calefaciente. Si nutrimenti defectus causa est, cum colliges 1. ex tenuitate pilorum, excrementũ enim, quod cuti aduenit, est paucum & exigue apponitur. 2. ex morbo precedente: solet enim vt plurimum hoc defluuium febrem ardentem, aut tabem sequi, de eo enim Gal. 1. de comp. med. secundum locos cap. 2. sic scribit: consuevit hæc circa pilos oblatio, saepe iis qui agrotarunt accidere, raro autem circa morbũ.

Quid Caluities defluuium pilorum est, sed in Sincipite tantum ob cutis caluities duritiem, & siccitatem eueniens: proinde qui in pueritia hanc cutem & eius habent multam siccam, in senectute calui sunt: unde non recte causa. Arist. caluitiem dixit fieri ob inopiam humoris calidi: neque Hiero ob raritatem cutis, neque Argenterius ob defectum terreĩ excrementi: reuera enim in caluis excrementum non deficit, non potest tamen penetrare ob cutis densitatem, ac proinde Gal. aliquando caluitiem ad defectum humorum refert, non quod deficiant, vt diximus: sed quia non possunt penetrare, & sic videntur deficere. Atque hæc est caluities ætatis discursu facta: est enim altera vt morbi in iuuentute etiam eueniens, potissimum mulieribus ex raritate cutis & defectu alimenti. Hanc autem à prima distingues, quia caluities ratione ætatis adueniens, sensim fit, quia sensim cutis densatur: at illa, qua vi morbi accidit, affatim & repente sauit.

Quid sit Alopecia & Ophiasis sunt casus pilorum capitis, non omnium, alopecia sed aliquorum, vnum in duobus est malum: distinguuntur tamen ob & ophia- figuram, & squammas: nam in ophiasi laesa capitis pars serpenti assis. similatur, squamosaque est. Qua ab occipite duorum digitorum latitudinem non excedens, vsque ad aures serpit. At alopecia (qua alopecia à vulpe nomen accepit) nullam propriam habet figuram: & in ea & ophia- cutis squammis caret. utraque affectio fit à vitiosis humoribus persis. vitiosos humores seu corruptos non intelligens cum Rondoletio tenues & serosos, sed sanguinem prauum, biliosum, pili, aut melancolicum: ex eo enim (cum minus recte mutetur, & nutriat) non assurgunt excrementa, qua sunt materia pilorum: possumus etiam per vitiosos humores, adustos, aut praua qualitate infectos intelligere.

Vitiligo Vitiligo est cutis deprauatus color.

quid. Curabis supradictos affectus hoc modo, à defluuio pilorũ incipiens. Curatio hoc n. cum sit morbus in numero partiũ deficiente, curabitur restituendo defluuij partem qua deficit: qua cum excremento tertia concoctionis tanquã ex pilorum. materia generetur, oportebit alimentũ attrahere parti, vt ea nutrita, excrementis abundet. Opus præterea erit cutẽ roborare, & reducere ad moderatã densitatẽ. Hæc cõmodè præstabimus medicamentis calefacientibus

cientibus (sic enim legedum est, & non humectantibus, ut legitur 2. Corrigitur de comp. secundum locos cap. 2.) modicè adstringentia permiscentes, tunc locus calida enim attrahent sanguinem, & sic sua substantia caliditatem Galeni. cutis (si aliqua est) temperabit, cum temperatum, aut minus calidum, id quod magis calidum est refrigeret. Iam ergo astate raso capite, & hyeme tonsis capillis, frictione utemur leui, ut ex attracto sanguine calida intemperie curata, roboretur cutis, & ad mediocrem densitatem restituatur. Deinde oleis lentiscino, mirrhino, aut nostro Hispano, cum laudano ad unguenti formam redactis ungemus caput. Præterea in hoc defluuium pilorum, non est sanguis mittendus ratione affectus: quia neque raritas cutis, neque defectus alimenti euacuatio-nem postulant: neque est purgandum, quia non contingit ex cacochymia, & si in venis vitiosus sit sanguis prædicta exercebimus remedia: non propter affectum pilorum, sed venarum: ac proinde non videtur audiendus auctor, cum dicit pilorum defluuium à sanguine ortum, curari sanguinis missione: non enim video, quo modo à sanguine aut alio humore oriri possit.

Sanguinis missio in defluuium pilorum.

Reprehenditur auctor.

Caluities si ratione ætatis contingat, non potest curari, quia neque curatur densitas à siccitate procedens: at caluities in morbo orta, ea ratione, qua alopecia, curari solet.

Curatio caluitiei.

Alopecia & ophiasis cum ex vitiosis humoribus malè partem nutrientibus proueniant, curantur, purgantes peccantem humorem. Quem ex cutis colore cognosces: cutis enim in qua desiderantur pili, humoris redundantis admittit colorem. Id etiam deprehendes ex antea acta vita, natura hominis, & anni tempore. Neque omittenda hoc in loco erit sanguinis missio, si affectus venarum postulet, hoc est sanguis vitiosus, & si obiicias Gal. hoc remedium omisisse, respondeo, consultò id fecisse, tantum agens de partis affectu. Post purgationem ad Apophlegmatismos accedes: hi enim ex ventriculis cerebri & venis aliquantulum euacuabunt. Ultimo administrabis topica, hoc est localia medicamenta. Quæ constabunt ex medicamentis discutientibus prauos humores cutis, & attrahentibus sanguinem. Qualia sunt Thapsia mixta cum cerato ex oleo confecto, ut eius calida vis tepescat: synapi etiam, Euphorbium & alia valde calida, temperata tamen, ne exulcerent. hoc in loco aduertere oportet, nos non agere de pilorum defluuium à morbo Gallico eueniente, de quo postea disputaturi sumus.

Alopecia & Ophiasis curatio.

Obiectio.

Colorem in pilo curabimus, remedium applicantes utiligini quod alimentum cuti adharens dissipet, & attrahat sanguinem: ut parte rectè nutrita, excrementum colorem in pilo mutet.

Curatio coloris in pilo.

An verò sumpto medicamento purgante. Cum nullum medicamentum purgans actu, cognitum extet, nisi fortè pilula de chamelea Dioscoridis: sed omne potentia, purgandi facultatē habeat, inde habuit ortum controuersia, qua queritur: An post assumptionem medicamenti purgantis sit dormiendum. Batici semper, Valentini tantum nō.

An ab assumptione purgantis sit dormiendum.

DE CVRAND. MORB.

medica- in solidis medicamentis somnum imperant. Et verò existimo medica-
menti mentum siue liquidum sit, siue solidum etiã in vigilia in actum re-
purgãtis duci. Nisi ventriculus sit languidus: tunc enim in omnibus medica-
fit dor- mentis somnus utilis est, longior in solidis, breuior verò in liquidis.
miendũ.

Opere autem incepto semper somnus.) Multis rationibus dor-
Cur post miendum non est, quando humor attractus à medicamentis purgan-
assum- te, inceptit expelli. 1. Quia cum excretio per aluum sit actio volunta-
ptionem ria, in somno, (in quo oriatur animalis facultas non fiat, sequentur
medica- que ea incommoda, quæ ex humore in ventriculo & intestinis violen-
menti ter detento sequi solent, angustia, morsus, cardialgia & similia alia.
purgãtis 2. Quia in somno ex reuocatione sanguinis ad interna, replentur ve-
non sit na per quas humor peccans à medicamento trahitur. 3. Quia tem-
dormiã- pore somni calor reuocans, mutabit medicamentum in familiarem hu-
dum. morem. Consuetudo autem quam seruabant auctor, & sui temporis

An ab *medici ius gallinæ insulsum tribuentes ante prandium, iam aboleta*
assumptio- est, & meritò: quia reuera ius gallina, aut arietis non extergit: imò
ne medi- impedit purgationem, obtundendo vim medicamenti. Medicamentum
camenti autem extergendi vim habens à nobis tribui solet in die purgationis,
purgãtis aut in sequenti die. Si in die purgationis tribuatur, statim post medi-
fit ali- camenti assumptionem id fiat, quando medicamentum est validũ: vt
quid ex- nulla eius portio in ore ventriculi maneat, vel vt medicamentum ad
hibendũ. fundum ventriculi descendat, in his hominibus qui ab amaris sentiũt
 molestiam, & in his qui facile vomunt. Die sequenti, quando medi-
 camentum validum est, decocto hordei cum cortice, & pauco saccaro,
 aut alio extergente utimur propter dictam rationem. Quod si pur-
 gatio diminuta præcessit, clysterem extergentem, & purgantem, ex
 diacatholicon, benedicta, aut confectioe hamec infundes.

Quid sit Si fuerit pilorum decidentia à flaua bile.) Humores in corpore,
humor quidam sunt turgētes, & alij in aliqua parte firmati. Turgentes hu-
turgens. mores dicuntur illi qui in loco putredinis, tantam tenuitatē & acri-
 moniam contraxerũt, vt irritata expultrice partiũ facultate, eos hinc
 inde expellat, unde turgentia duas habet cōditiones. Prima, vt humor
 hinc inde moueatur, eo modo quo animal coitũ appetens. 2. est, vt pars
 irritetur ad expellendum. Ac proinde Hip. Turgentiam aliquãdo col-
 locat in humoribus, cum 4. Aph. sent. 1. eos turgere scribit: & aliquã-
 do in parte 3. de fracturis sent. 18. ita vt partē turgere nil aliud sit,

Quid sit quàm incitari ad rei moleste expulsionem. Humores firmati illi sunt,
humor qui in aliqua quiescunt parte, obstructi, vt in febribus, aut inculcati,
non tur- vt in tumoribus præter naturã. Iam si humor turgeat, statim hoc est
gens. in principio morbi, purgãte medicamento educẽdus est, ex Hip. 2. Aph.
Purga- sent. 22. indicatione sumpta ex eius tenuitate, ob quã nec ab obstru-
ctio hu- ctione eius transitus impeditur. Quod nõ est difficile intellectu illi, qui
moris non ignorat, obstructionem in vena, aut arteria non claudere omninò
turgētis. meatum. Dices nonne Gal. 1. Aph. com. ultimo in turgentia occasiõẽ

arripit

arripuit propinandi decoctum ex thymo, origano, hyssopo, aut alio simili, quod vehementer extenuande facultatem habeat. Respondeo, Galenū supradictis uti medicamentis, non propter obstructionem, ut ipsam aperiant ad purgandum, quoniam hoc etiam seruandum est in humoribus non turgentibus: sed quia aliquando, turgente humore in principio non potest purgare: quia medicamentū deficit, tunc accepta hac occasione, exhibet aperientia, ut obstructione aliquantulum aperta, cesset putredo, & cum ipsa turgentia. Si humor sit in parte firmatus, purgandus non est, quin coctio precedat: iuxta praeceptum Hipp. 1. aph. sent. 2. 2. ubi concocta medicari (quod est purgare) praecipit, quod semper obseruandum est etiam in multo humore, cum purgatio concoctionem impediat, & coctio quietem requirat, hac autem concoctio à natura humoris fit, quae semiputrem humorem alterat, reducens ad benignū id quod non turpescit: reliquum verò tanquam inutile expellens, ut in Crisibus expellitur. quo tempore solā instituimus victus rationē. Quod si natura non expellit, aut non integrè expellit, tunc debet medicus ei suppetias ferre, & purgatione facta eius defectū supplere, aliter sequetur recidiva, ut aph. 1. 2. lib. 2. nos docet, ut autem id commodè prestare possimus aduertenda est sententia Hip. 9. lib. 2. aph. quae sic habet, Corpora quaecunque quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere: quod est, ante assumptionem medicamenti purgantis, debet corpus preparari. Quinque autem modis fieri solet corporis preparatio: prima cum ante assumptionem medicamenti vomitu, aut deiectione per aluum que mox purgant, aqua tepida, & lubricantibus medicamentis consuetā reddimus naturam ad tales euacuationes: quam preparationem tantumquam notam emissam fuisse ab Hippocrate scribit Gal. 4. aph. com. 13. corpus Secundo, Preparamus corpus humectantes ipsum, alimentis, potu ad purgandum, & quiete. quando helleboro purgare volumus 4. aph. sent. 13. gatione in violentia motus sequatur convulsio, ob consensum, qui est inter nem. orificium ventriculi & cerebrum 3. Preparatio exercetur, quando humorem crassum attenuamus, sicut 4. cum glutinosum incidimus. Ultima verò nil aliud est, quam meatum aperire, quae videbitur aliquibus concidere cum 3. & 4. quia incidere glutinosos humores, & attenuare crassos, nil aliud est, quam aperire. reuera tamen res est diuersa: aperimus enim obstructionem, ut incidimus & attenuamus, etiamsi non sit obstructio. Hac autem corporis preparatio varia, non solis medicamentis, sed alimentis etiam & potu exercenda venit: nam quid proderit assumere medicamentū humorem attenuans, si carnem An sit hircinam, vinum crassum, & alia, quae crassos generare solent humores praeparare non omittimus? Ac proinde non mirandum, si medicamentū purgans, rarius et si optimū, non agat, aut si euacuet, cum torminibus tamen & mala humor tolerantia. Praeter dictas corporis preparationes, quas arte prestamus tenuis. ad humores commodè purgandum, nullam aliam à Gal. aut Hip. legimus scriptā: proinde existimo errare eos medicos, qui humorem tenuem

DE CVRAND. MORB.

preparant, eum incrassando. quia si humorē crassum attenuamus, ut liberē educatur, qua ratione adducti humorē bilosum, qui ex sua natura tenuis est, incrassabunt? Respondent aliqui, eius preparationem non esse incrassationem, sed acrimonia retusionem. Quod falsum esse hinc intelliges, humor bilosus post coctionem debet purgari iuxta sententiā Hip. lib. 1. aph. 22. & cum in coctione bilis victa à natura mitior reddatur, ut Gal. lib. 2. de rat. vic. in mo. acutis com. 44. docet superfluus ergo erit labor eorum, qui temperare conātur bilem, ut eam expulsionī preparēt. Quid autem debeamus in tenui humore efficere, breui accipe. Si humor tenuis peccat tenuitate, incrassandus est, ut crassior & frigidior factus non penetret, & hoc nomine minorem inferat molestiam, ut in dolore colico à bile facto videre est. Quia bilis si non qualitate, sed quantitate peccet, ita ut corpore educenda sit, varia eget preparatione: si sit in pectore, ut in pleuritide contigit, attenuanda erit, consule Gal. propter eam rationem, quam capite de pleuritide videre poteris: si verò humor tenuis in asperis pulmonū arteriis, à capite distillans inclusus maneat, cum in tussi impetu aëris educi debeat, aliquantulum incrassandus est, ne ab aëre ob tenuitatem diuulsus, ibidem immoretur, de his tamen preparationibus humoris tenuis non agimus, quia nō fiunt eo consilio, ut humorē medicamento purgante euacuemus: quē si purgare intendimus, nulla procuratione eget, sicut neque aqua in hydropē. Quod si in tertiana & ardētī febre, qua à bile fiunt, attenuatibus utimur, ea propter humorem crassum, obstruentem praestamus: non enim humor tenuis obstruere potest, ut lib. 2. agentes de febribus explicabimus. Ex dictis intelliges, errare eos, qui syrupos, humores concoquere affirmant, cum humoris coctio à sola natura fiat: nisi dicamus concoquere illa medicamenta, qua seruant naturā vim, & calidum innatum. Syrupi verò, quos hi concoquentes appellant, corpus preparantes ducendi sunt, ut paulo suprā docuimus.

Primò omnia medicamenta frigida] Medicamentū, quo corpus Syrupus ad purgationem paramus, syrupus nominatur. Hic duplex est, unus duplex, clarificatus in officinis seruari solitus, qui nil aliud est, quā medicamentum liquidum ex succis, aut aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis, aut saccaratis, ad saporis gratiam, aut custodiā diuturnitatem. Talis est syrupus fumi terre, borraginis, & similes alij, quorum dosis est ℥. ij. cum duplo decocto aliquarum herbarum. Alter Apozima dicitur, quod medici in agrorum domibus praescribunt ex decoctis herbarū & radicū cū melle aut saccharo. Paratur etiam ex aquis, & ex syrupis officinarum, decoctis tamen, permixtisque seminibus aut trociscis. Solent multi aquis per alambicum ceat uti extractis cum saccharo, aut aliquo syrupo clarificato uti: ut corpus aquis preparent. Qui mos non placet Musa, & aliis scrupulosis hominibus, distilla- variis rationibus adductis. Quidam ex eo quod aqua per alambicum auiis. extracta caliditatem contrahant. Ne proinde in his distillatis aquis, solūm

solum concedunt calidarum vsum & non frigidarum. nisi frigida aqua seruet odorem rei, à qua distillatur (ut est aqua rosarum) tunc enim concedunt ipsam. Alij harum aquarum vsum non probant, existimantes eas ex are aut plumbo prauam acquirere qualitatem. Horum rationes leues sunt: pradieta enim aqua. neque calorem acquirunt, neque qualitatem ex are aut plumbo. Non acquirunt calorem, quia non vruntur, & ita si calefiunt statim illa caliditas euanescit: non acquirunt prauam qualitatem: quia neque plumbum, neque as tunc liquantur. Existimo ego non esse vtendum his aquis stillatitiis, eo quod solum medicamenti tenuem partem continent, cum nos aliquando crassam & roborantem desideremus: tum quia succus potentiùs agere solet. Verum est, coactos aliquando vii debere stillatitiis aquis, in penuria herbarum, qualem non habemus in hac Valentina ciuitate.

Simplicia flaua bilē] Hec medicamenta neque concoquētia sunt, neque his debemus preparare corpus ad purgationē bilis: ut ex superiorib. didicisti. Adde hac esse frigida, & proinde augere obstructionē.

24. Pilularum de fumo terræ.] Tria hoc loco animaduertit autor: Examin-
Primum tempore quo purgare volumus, non esse miscenda plura nantur
medicamenta purgantia, quia tempore breui non potest fieri ferment- tria qua
tatio, ac proinde non poterunt in vnā formā venire. Secundum aduertit
compositum medicamentum recens non posse rectē purgare, quia prius autor.
vnū altero purgabit, & vnū impedit opus alterius. Tertium in pur-
gationibus tutiorē esse euacuationem parā, immodica. Hac ille. Qua Ad vtē-
rutinā postulant. Quod primò admonet, non posse cōstare. Quamuis dū pur-
enim medicamenta composita, in officinis seruata, fermentationem gātibus
patiantur: potissimū atatis tempore, quam colligimus ex eorum in eorū
ebullitione, non proinde ut eis utamur, expectandum erit, ut fer-
mentatio absoluta sit. Nam ante ipsam & postea, imò vigente etiam tatione.
fermentatione, ipsis utimur cum felici successu. Neque enim tūc me-
dicamenti vis impedita est. Secunda admonitio etiam est falsa. Gal.
enim lib. quos quibus & quādo purgare oportet cap. ultimo, agens de Equā-
mixtione medicamentorum purgantium precipit, ut medicamenta lis pur-
purgantia, que miscentur, nisi consentiētia, ut equalis fiat purgatio. gatio
Est autem equalis, quando medicamenta simul operātur, aut quan- quid sit.
do cessante vno ab actione, alterum incipit: ita ut fiat continua eua- Mala
cuatio. Nam si vno cessante, longo post tempore alterum incipiat Loquil-
agere, est inaequalis euacuatio, ac proinde damnanda, quia vires, lati ver-
quo tempore refici debent, conflantur. Qua in parte admoneo fio.
lectorem, ut in versione Loquillati aduertat vltimum caput libri. In im-
Quos, & quando purg. oportet, ita enim malè versum est, ut Latina modica
lectio contrariū habeat ab iis, qua in Græca continentur. Vltima ad- purgatio
monitio auctoris seruanda est. Si autem cōtingat immodica purgatio, ne quid
quam faciendū

DE CVRAND. MORB.

quam ex defectu virtutis colliges, succurrere poteris frictione partium extremarum. Offam etiam panis bis cocti, aut regij à nostris dicti in optimo vino intinctam offeres. Eiusdem etiā panis interiora vino ebriata, & cinnamomo inspersa supra ventriculum appones.

De morbo Gallico. CAP. II.

*Descri-
ptio mor-
bi Gal-
lici.*

Causa.

Signa.

Est morbus Gallicus, quem & Hispanum & Neapolitanum nominant, nostro sanè malo hisce temporibus affectus notissimus, antiquioribus verò ne per somnium quidem notus detestandus tamen perpetuò, qui cùm à pudendis incipiat, in linguam terminatur vario & dolorum & pustularum pro-uentu, ac præcipuè noctm corpus discrucians. Fit autem à quatuor humoribus à naturali temperie per exustionem in malignam quandam naturam degenerantibus, à contagio vt plurimum primò affectis. Deprehenditur hoc malum, quia in pudendis à principio pustulæ apparent, crustis obiectæ, siccæ & lactea nonnunquam sanie manantes. Iam & in fronte, & circa radices capillorum pustulæ, seu veriùs dixeris, tubercula diuersi coloris oriuntur, modò circa vllius medicamenti opem desiccata, modò hinc inde frequenter renascentia. In capite summa inest grauitas, in collo, humeris atque adeò omnibus articulis perpetuus, cruciatus, dolorificis ibi tumoribus præter naturam obortis: qui cùm difficile discutiantur, tardèque suppurentur, in nodos sæpe ac durities migrant. Ad extremum fauces palatū-que & insuper lingua nigris fœtidisque erumpentibus pustulis turpiter exeduntur.

*Victus
ratio.*

Hic morbus curatur primò victu humectante, & in actiuis temperato, vel parum calido: quæ atram bilem efficiunt, maxime nocent, vt caro leporina, bubula, hircina, & ceruina, caseus antiquus, omnia falsa, & legumina: similiter quæ facile putrescunt, vt pisces, & lac. Conferunt, quæ bonum succum efficiunt, vt panis optimi tritici, pullus gallinaceus, gallina, caro arietina, hispanica, vitulina, hœdi, corurnicis & similium: de quibus libello de bono & malo succo, libris de tuenda valetudine & de facultatibus alimentorum multa à Galeno tradita sunt copiosissimè: perpetuò tamen considerandæ sunt vires ægri, & morbi magnitudo: consideranda quoque est sententia Hippocratis i. lib. aphor. quibus semel, aut bis, &c. in cibandis omnibus ægris, vtatur, si potest, exercitatione: præsertim ventriculo vacuo, abstineat venere & animi perturbationibus, quæ bilem atram augment, vt sunt ira, tristitia, & similes.

*Sanguinis
missio.*

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit morbus recens: vbi vires sunt maiores secta vena iecoraria, aut comuni, vt sanguinis copia respondeat plenitudini, fiatque vacuo

ventri

ventriculo & intestinis, nisi timeatur subita suffocatio, aliquando bis aut ter sanguis est mittendus.

Tertiò concoctione per hæc vel similia. ℞. syrupi fumarie. *Syrupus*
f. & borraginis. an. ℥. vj. syrupi fumarie comp. & de epithymo *prapa-*
an. ℥. ij. misce. Item. ℞. aquarum fumarie, borraginis, lupulo- *rans.*
rum, & quinque radicum an. ℥. viij. misce, facta iam concoctione,
diebus nouem.

Quarto vacuatione atræ bilis, per hoc, vel simile medicamen- *Purga-*
tum. ℞. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ ℥. vj. confectio- *tio.*
nis medicaminis quod scripsit Hamec. ℥. iij. β. diachar rami ℥.
ij. β. syrup. borraginis ℥. j. decocti florum cordialium, quod f.
misce, & fiat potus. Vel. ℞. pilularum de fumo terræ & hermo-
dactylorum maiorum an. ℥. β. diagridij ḡ. iij. cum aqua bu-
glossæ, fiant pilulæ vij. Deinde per aliquot dies roboretur ven-
tricus, & partes principes, sanguisque purior efficiatur ele-
ctuario diarhodon Abbatis, vel conserua borraginis, vel bu-
glossæ cum aqua, aut decocto borraginis, vel buglossæ, vel fumi
terræ. Fiat quoque bis, vel ter in mense corporis purgatio, his,
aut similibus pilulis. ℞. pilularum de fumo terræ, hermoda-
ctylorum maiorum, & indarum. an. ℥. ij. cum aqua buglossæ
fiant pilulæ xv. adde cuilibet earum granum j. optimi diagridij,
doses tres.

Quintò vtatur exercitio forti & balneo, donec sudet copio- *Exerci-*
sè, bibat tunc per aliquot dies, oleum commune quantitatis. ℥. *tatio*
iiij. cum ℥. j. optimi sacchari. His omnibus solet curari Gallicus *balneū.*
morbus, si fuerit recens: qui si habuerit pilorum decidentiam,
eget præter iam dicta frequenti capitis rasione, frictione &
lotione frequenti decocto pulegij, stichados, origani, saluiæ,
roris marini & camomillæ, & similibus. Si his omnibus mede-
ri non possumus huic morbo, adhibebitur syrupus sequens. ℞. *Syrupus*
Corticis ligni indici, seu Guaiaci in minimas partes diuisi. ℥. *ex deco-*
viiij. Interioris eiusdem similiter incisi. ℥. iij. senæ. ℥. ij. epithy- *elo gua-*
mi, polypodij an. ℥. j. fumarie, borraginis, cichoreæ, rostri por- *iaci.*
cini, radicum buglossæ. an. m. ij. florum cordialium an. m. j. li-
quiritiæ, radicum diureticarum an. ℥. β. fiat decoctum in li-
bris viginti quatuor aquæ optimæ, prius per diem in ea in-
fuso ligno guaiaco ad medietatem secundum artem. Cuius
percolati accipe libras decem, & cum quatuor libris sacchari
fiat syrupus non perfectè decoctus ad modum mulsæ: cui
addes pulueris hermodactylorum. ℥. ij. pulueris diarhodon ab-
batis ℥. ij. cinnamomi electi ℥. j. Cuius dosis summo mane
erunt vnciæ quinque, vel sex. Hic syrupus in omni tempore *Laus*
etiam prægnantibus, & febrientibus est exhibendus intrepidè & *ius*
si opus fuerit, dum bibit hunc syrupum æger, euacua ipsum *rapi.*

DE CVRAND. MORB.

*Altera
purga-
tio.*

per pilulas superius scriptas, vel per medicamentum hoc, si non possit deuorare pilulas. ℞. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholicon an. ʒ. j. confectionis medicaminis Hamec, & diasenæ an. ʒ. vj. diachartami & conseruæ buglossæ an. ʒ. iij. syr. borraginis, quod s. misce, & fiat confectio ad modum opiata: dosi cochlearia duo semel in hebdomada.

*Aqua li-
gni gua-
iaci.*

Si his peractis semper morbus permanserit, forsan curabitur aquis signi guaiaci, prima valentiori, quæ bibitur bis in die, in aurora & nocte à cœna parca per quinque horas: & altera clementiori seu debili, quæ sola in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam erit potus: quarum formæ sunt hæ, quamuis secundum variam naturam morbi, & ægri, temporis & regionis, possint fieri valentiores, vel clementiores. ℞. ligni guaiaci lima vel torno in minimas partes diuisi lib. j. aquæ optimæ lib. xx. maneant per diem simul deinde decoquantur ad medietatem, cuius colatura, reiecta parte terrestri, seruetur in vase vitreo, quæ erit prima potentior, eius dosi est vnciæ quinque, vel sex. Deinde accipe lignum primæ aquæ, & iterum cum libris triginta aquæ decoquatur: donec quinta pars consumatur, & hæc erit secunda remissior prima. Quibus iam bibitis fiant aliæ duæ eiusdem formæ, vel similis, mutata aliquantum natura earum, si opus fuerit. Et finitis aquis secundæ libræ ligni guaiaci, fiant ex tertia & quarta libra eodem modo, donec æger sanetur. Accipiat quilibet hebdomada tres ex pilulis superius scriptis, vel duo cochlearia confectionis purgantis.

*Aqua
smylacis
aspera.*

Fiunt ad idem efficiendum aquæ ex aspera smylace nostri temporis, & est sarça parrilla, quæ ab India ad Hispaniam aduehitur, forma earum est. Accipe vncias sex dictæ sarçæ parrillæ conquassatæ, & per diem naturalem infunde in libras duodecim optimæ aquæ, deinde decoquatur ad medietatem, cuius colatura in vase vitreo conseruetur, sumenda mane, & vespere, quantitate vnciarum quinque, & hæc est prima valentior. Deinde accipe eandem smylacem asperam prius decoctam, & in libris triginta aquæ decoquito donec quinta, vel sexta pars consumatur: & hæc erit secunda mitior ad potum in prandio & cœna, & inter prandium & cœnam. Quibus finitis parentur aliæ eiusdem, vel similis formæ, quemadmodum fiunt ex ligno

*Tempus
curandi
morbum
Gallicū.*

guaiaco. Tempus accipiendis iis commodius est Ver, deinde Autummus. Æstas verò est vehementer inepta & aduersa. Hyems accommodatior æstate, & Vere & Autumno deterior. Nostri quoque temporibus reperta est radix chyna, cuius aqua curare solet morbum Gallicum, & articulare, de qua liber extat scriptus à doctissimo Vessalio. Lege etiam methodum propinandi decoctum huius radicis apud Amatum Lusitanum

centuria 2. curat. 3 r. rectissime traditam. Victus ratio (dum bibuntur hæ aquæ) præscripta est iam superius, quamuis in cœna nullæ carnes sunt exhibendæ, sed panis nauticus, vulgò bis coctus, vux passæ, vel radix buglossæ condita, vel cucurbita condita: præcipue si fuerint Castellani. Semper tamen est sequenda Hippocratica veritas superius repetita, quibus semel, aut bis, &c.

Curatur quoque morbus hic usu vini sancti, quamuis bilio-
sis & dispositis ad hecticam minus, quàm aqua ligni guaiaci
conferat. Eius forma hæc est. ℞. corticis ligni indicis lima vel
torno diuisi in partes minimas ʒ. ix. interioris eiusdem ʒ. iiii.
folliculorum senæ, epithymi, polypodij an. ʒ. j. fiat decoctum in
libris viginti quatuor aquæ ad medietatem, de cuius colatura
accipe lib. decem, quibus probè calefactis adde vini generosi
lib. quindecim, & omnia simul maneant in vase fictili, donec
calor absumatur, postea conseruetur mixtura in vasis vitreis:
quibus adde pulueris hermodactylorum vncias duas: bibat in
aurora, & vespere libram semis, huius vini loco primæ aquæ po-
tentioris, & fiat ex ligno, & cortice iam prius decoctis aqua pro
potu in prandio & cœna cum libris viginti quatuor aquæ, do-
nec quarta pars consumatur, qua bibita & vino fiat secundo eo-
dem modo, vt dictum est superius, cum de aqua ligni guaiaci
agebamus. Hoc tamen breuius quàm aquæ solæ curare potest
etiam antiquum Gallicum morbum.

Si fuerit antiquus, & curatu difficilis, fortiolemque poscat
curationem, facta iam clementiori medicina nisi morbi &
symptomatum magnitudo solitum ordinem inuertat (nam
authore Celso lib. 2. non potest vehementi malo succurrere, nisi
æquè vehemens auxilium) potentioribus opus erit, inter quæ à
multis expertum est, & à me laudatum medicamentum ex
mercurio, brachiis, & aliis partibus externis admotum ordine
consueto, consentientibus viribus ægri, quia vbi illæ non ad-
sunt, non oportet laborare: neque facultas ipsius argenti viui
est tunc pertimescenda, cum olim sæpe morbis multis leuiori-
bus adnoueretur, vt scabiei. Galenus tamen nunquam fecit pe-
riculum de eo, an interiori sumptum, vel exteriori admotum in-
terficiat.

Expertum à nobis vnguentum hoc. ℞. axungie porcine
sine sale ʒ. iij. oleorum laurini, de lilio & rutæ an. ʒ. j. β. thēria-
cæ magnæ ʒ. iij. rubæ tinctorum ʒ. ij. argenti viui ʒ. iij. croci,
cinnamomi, an. ʒ. j. musci & ambre an. ʒ. iij. misce & fiat vn-
guentum. Poterit augeri, vel minui aucto, aut imminuto mer-
curio, habita ratione virium ægrotantis & morbi. Certa rei
quantitas neque præfiniri potest, neque scribi. Aliquando suffi-

*Vinum
sanctum.*

*Antiqui
& diffi-
cilis
morbi
curatio.*

*Facul-
tas ar-
genti viui
anti-
menda.*

*Vnguen-
tum.*

DE CVRAND. MORB.

cit prima vnguenti admotio, aliquando duæ sunt necessariae, aliquando tres, & plures quàm sex, quod per sudores, alui excretiones, & oris deprehendes. Partes quibus admouetur, sunt extremæ, videlicet brachia, tibiæ, spina, & venter versus inferiores partes.

*Qua
partes
inungē-
da.*

At cor & ventriculus omnino custodiantur, ne ab illo medicamento lædatur pars nobilis, vel ei, & tori seruiens. Vnguentum cum admouetur, sit actu bene calidum, & habitaculum, & si non sudauerit, ægri pedibus apponantur lateres calidi cum vino: quod si his non sudauerit, neque oris excretiones, neque alui deiectiones habuerit, cum iis vel saltem aliqua ex ipsis euacuationibus soleat hoc medicamentum morbum hunc curare: tunc totius suffitu erit opus dempto capite, ne vis venefica per nares & palatum cordi, & aliis partibus noceat. Quare æger stans vestiatur conopæo, quod vulgò dicitur pauallon, capite solo nudo apparente, & inter illius tibiæ supra prunas spargatur sequens puluis. ℞ cinnabrij. 3. j. rubear tinctorum, cinnamomi, & croci an. 3. ℞ misce, & fiat puluis ad primum suffitum, & si opus fuerit, fiant duo vel tres: tunc, imò etiam tempore vnguenti ex mercurio habeat in ore crySTALLUM vel aliquem liquorem astringentem, & repellentem ad defensionem dentium & oris. Si verò fuerint vlcera, & caliditas, quemadmodum fermè semper esse solent, lauetur sæpe os sequenti mixtione. ℞. aquæ plantaginis 3. iiij. aquæ portulacæ, rosarum, & lactucæ an. 3. ij. ℞. rhodomellis, syrupi rosarum, & oxysaccharæ. S. an. 3. ij. pulueris aluminis vsti, & mastichis. 3. ij. misce: hoc vel simili medicamento curantur oris vlcera. Aliarum verò partium vlcera omnia, si fuerint sine ossium corruptione solent curari sine medicamentis externis, facta curatione totius corporis per ea, quæ diximus: ossium tamen corruptio cauterio eget, & propria curatione, quæ ab erudito chirurgo administrabitur. Nonnulli in curatione huius morbi antiquissimi, & fortissimi, præter iam dicta vtuntur pilulis addendo grana aliqua pulueris Ioannis de Vigo: ego non auderem vti illo puluere, ne in parua quidem quantitate & correcto: quia est corrodens medicamentum: fit ex argento viuo, & aqua, seu lixiuio forti & potenti, quo aurifices vtuntur. Illius tamen autor. Vigo secunda parte sui operis in peste dat duo grana huius pulueris, quæ (ipso dicente) vomitu & ventris profluuiio violenter purgant, in colica quoque grana duo eiusdem pulueris cum drachma femis philonij Romani laudat tanquam vtile & optimum auxilium: eius tamen vis corrodens externis partibus clemens est, & sine periculo, & pauci doloris: aliquando tamen opus

*Puluis
Ioannis
de Vigo
non pro-
batur in
pilulis.*

opus est miscere parum vnguenti albi, ne dolor magnopere Pulvis
intendatur, & ideo vnguento superiori loco argenti viui inde- *Ioannis*
re parum huius pulueris, potentius hoc esset, & tutius, quàm *de Vigo*
interius assumere. Qui deuorandum esse hunc puluerem cen- *exterius*
sent, aquis frigidis, & cordialibus, & aliis corrigunt. Huius *admotus*
pulueris emendatio, autore Petro Andrea Matthæolo Senen- *landa-*
si fit. ℞. pulueris præcipitati ex Mercurio (qui fit, vt docet *tur.*
idem Matthæolus, libro de ratione curandi morbi Gallici. j. Corre-
3 ij. aquaram plantaginis & acetosæ. an. 3. ij. macerentur *ctio pu-*
per noctem, & summo mane prioribus aquis eiectionis de inte- *lueris.*
gro alias eiusdem ponderis super infunde in vase æneo, seu te-
staceo, ad ignem collides, & non cesses agitare ferrea, vel li-
gnea spatula, donec in puluerem redigantur, ex quo sic corre-
cto poteris pilulas, quæ sequuntur, componere, & fiet maior
correctio. ℞. electuarij cordialis Conciliatoris. ʒ. ss. marga- *Pilula.*
ritarum præparatarum, hyacinthorum, pulueris præcipitati,
seu Vigonis an. ʒ. v. pulueris diamusci, & diamargaritonis fri-
gidi. an. ʒ. ss. fiant ex his catapotia quinque, quæ sumantur ante
solis ortum. Hæc enim eodem autore breuiter tempore Gal-
lici morbi dolores tollunt educendo vomitu & eiectione pi-
tuitam, & atram bilem. Plurima aliorum morborum genera
idem doctor hoc puluere curauit, addendo diuersa medicamen-
ta, pro ratione diuersorum morborum, quod ego quemadmo-
dum dixi, periculosum existimo, etiam si præter autoritatem
Pauli, & Arabis Auicennæ, tot experimentis sit credendum, &
cum Hippocrate extremis morbis extrema exquisitè remedia
optima sint. Laudat similiter hic autor in hoc, & aliis morbis,
qui ex atra bile fiunt pilulas ex helleboro, quas Mes. capite de
co ex Haly describit: earum tamen vsus in vere tantum iuueni-
bus & robustis confert.

Scholium.

Est morbus Gallicus.) *Varia ac diuersa de Morbi Gallici es-* *Varia*
sentia apud doctores extant sententia. Montanus hunc mor- *sententia*
bum, intemperiem iecoris calidam & siccam in certa specie nobis de essen-
ignotam esse existimat. Fracastoreus ad humorem pituitosum eum tia mor-
refert: Musa eum venenum, & contagionem epydemicale facit. Hi bi Galli-
omnes decipiuntur. Montanus quia videmus multoties iecur calidum ci refra-
& siccam, & non inficere omnes humores: Fracastoreus, quia hominis tantur,
melancholici sanguinei & biliosi, eo afficiuntur: Musa verò, quia
hic morbus caret illis symptomatis, quæ à veneno contingunt, neque
plures interficit, neque causam habet communem. His ergo omissis
simul cum ortus, & eius originis inuestigatione quia ad curatio-
nem non est necessaria, breui eius essentiam hanc ratione accipe.
Morbi,

DE CVRAND. MORB.

Essentia morbi Gallici. Morbi, qui nostrum inuadunt corpus, quidam manifesta qualitate afficiunt, ut qui calidi, frigidi, humidi, & sicci sunt. Alij verò toto temperamento, ut venena, & qua contagione inficiunt, inter quas est morbus Gallicus. Qui nil aliud est, quàm Morbus totius substantia inficiens iecur & humores in eo contentos. In hac definitione, morbus est genus, quo communicat cum aliis morbis: reliqua partes definitionis differentia sunt. Cùm dicimus totius substantia, separamus hunc morbum ab aliis, qui manifesta qualitates sunt: ultima parte qua eum inficere iecur, & humores in eo contentos diximus, distinguimus morbum Gallicum, ab aliis morbis etiam totius substantia, peste, scabie, ophthalmia, & aliis qui non agunt in iecur, sed alias respiciunt partes. Modus, quo his morbus generatur, hic est. Etsi contactu, osculis, poculis, pectinibus, vestibus, linteis, lactatione infantis factò, hic morbus contrahatur aliquando: ut plurimum tamen ex venereo congressu ob coniunctam conuersationem & calorem id contingit. Ex eo enim in pene, aut mulieris pudendo aliqua portio humoris infecti relinquitur, qui aliquando generans vlcus, & aliquando sine vlcore inficit humores proximos, & hi vicinos quoad iecur concipit illam prauam qualitatem: quam communicat humori cacochymo, hoc est in massa superfluitante: si talis non reperitur, partem sanguinis inficit, inde sequuntur morbi varij, cùm humor infectus non possit gubernari à natura. Hac ratione si sanguis infectionem admittat, sunt phlegmones, & pustula rubra. Si verò unus ex aliis humoribus, molestus cum sit ad aliquam partem decumbat, faciet pustulas, tumores, dolores & ulcera, distincta tamen pro varia humoris natura, verum tamen est, tandem in hoc morbo humores crassos generari, & abundare in corpore: si iecur sit frigidum, pituitam, si calidum, atram bilem. Quæ cùm non possit gubernari, neque à natura mutari ob prauam qualitatem detinetur & adurit, ita ut perueniens ad partes eas exulceret non parcens etiam ossibus ex sua natura duris, hic morbus antiquis medicis ignotus, nostris temporibus Dei beneficio, ut effrenem hominum libidinem reprimeret, apparuit. Quamuis hoc non placeat Vallesio (viro in medicina studioso & docto) qui 4. Epy. com. 1. hunc morbum veteribus cognitum fuisse confirmat, ex Hippocrate, qui 3. Epyd. Sec. 3. sent. 4. morbos recenset, quos in morbo Gallico in dies experimur, ulcera sordida, capitis & menti glabritiem sine febre, & cum exulceratione pudendorum, & faucium, ossa etiam excisa & nudata. Mirandum tamen est de tanto viro, hætenus non animaduertisse in morbo tam populari rem aliquam nouam veteribus incognitam, quum poterat ex contagione, causis, & curatione colligere. ex contagione, quia illa antiquorum ulcera alios non inficiebant, at ea quæ nunc in hoc apparent morbo contagiosa sunt, & ex ipsis solet sequi profluium pilorum. Ex causa, quia apud antiquos pilorum decidentia duas tantum habuit causas,

Modus quo generatur morbus Gallicus.

Vallesius reprehenditur.

causas, ut in primi capitis scholio docuimus: at morbus Gallicus unā tantum habet eis ignotam, nempe vitium excrementi: tu adde dolores, qui etsi eos expertos habuerit antiquitas, non tamen illi semper exacerbabantur nocte, ut in huius morbi doloribus contingit. Curatio præterea hunc morbum nouum esse demonstrat. Pustula enim cutis apud illos, purgato corpore cessabant. Quas in hoc morbo nisi totum habitum corporis euacuemus, perseverantes & cum ingentissimo dolore experimur. Dolores apud antiquos anodymis cessabant: at in hoc morbo magis exacerbantur. Et in summa, nisi medicamenta Alexipharmaca, quæ oppugnent prauam morbi Gallici qualitatem, adhibeantur, nunquam curabitur perseverante semper humorum infectione. sunt autem Alexipharmaca *symlax aspera, indica, lignum Guaiacum & Argentum viuum.*

Hic morbus curatur primo victu.] *Malè præscribit autor rationem victus hominibus morbo Gallico affectis, non semper debet esse lapsus. humidus, sed aliquando humidus, & aliquando sicca. humidus cum natura est sicca, & humor redundans siccus. Sicca verò in natura humida & humore humido. Neque etiam debet semper alimentum in actiuis qualitatibus temperatum assumi, cum enim est infectio in bile, refrigerante alimento: cum in pituita, aut melancholia, calfaciente utendum est. Quia si imperamus in his alimenta temperata, prout licebit, debent alterari. In corpore frigido calidis, pipere borragine: in calido frigidis, lactuca, ptyzana & similibus.*

Secundò sanguinis missione.] *Semper constante virtute in Gallico affectu sanguinem mittes, si sit plethora, ut euacues: si cacochymia ob sanguinem vitiosum.*

Tertiò concoctione.] *Omnem morbum Gallicum in Melancholico humore collocat auctor, ac proinde non est mirandum, si syrupi ab eo præscripti respiciant. Nos verò qui hunc morbum in omnium etiam aliorum humorum exuperantiis collocamus, non unum solum, sed eum qui redundat, præparare solemus.*

Quartò euacuatione atræ bilis.] *Pro vario humore peccante, & proinde infecto, vario medicamento purgante utere: neque sequaris auctorem, semper purgando melancholiam, crassissime enim errabis, & cum maximo agrotantis dispendio.*

Quintò exercitio fortè.] *Morbus Gallicus nostri cui tyrannus, his famulis gaudet, pustulis, ulceribus pudendi, buboribus, gonorrhœa, defluuiis pilorum, tumoribus præter naturam & tantis doloribus: ex quibus eius tempora colligimus. Principium, cum pudendi ulcera apparent, loquimur enim modo de his, qui cum coitum contraxerunt. Augmentum cum inguina inflammantur, & maius augmentum, cum iecur & humores in eo contenti inficiuntur, statum verò ex totius corporis infectione, quam ex pustulis, doloribus, tumoribus & pilorum defluxio cognoscimus. ubi aduertendum*

DE CVRAND. MORB.

tendum est, hunc affectum, in quocunque tempore coniunctum habere humorem: Nam in principio humor fluit ad ulcus, in augmento ad bubonem, quo tempore in iecore humores iam sunt infecti in statu

Curatio pustularum. omnia mala, qua in cute apparent, ex humoribus etiam pendet. Quae ratione his omnibus malis succurres, breuiter explicabo. Si pustula in cute appareant, cum oriantur ex humore praua qualitate infecto, ac proinde irritante partes ad sui expulsionem, curanda sunt, primo sanguinem mittentes in plethora, ut euacuemus, in cacochimia, ob sanguinis vitium: sanguinis autem missio non solum bis aut ter, sed constante virtute, etiam sexies & septies facienda est. Postea purgato humore peccante, tandem ad decoctum ex smylace aspera & Guaiaco deueniendum: ut sudoribus habitum corporis euacuemus. Pustulas vero exsiccabimus aqua forti, aut aqua plantaginis cum

Curatio ulceris pudendi. alumine decocta. Si ulcus sit in pudendo, cum hoc caliditatem aliquam habeat ex motu & fricatione contractam, prius auferenda erit lotione ex aqua rosacea, nenupharis aut alia, quae frigida sit: deinde sordes (qua impediunt ulceris consolidationem) auferes pauco puluere Vigonis cum unguento albo permixto, ut extersio sit sine morfu. Quod si labia ulceris dura sint aut ulcus difficiliter curetur, solo puluere tunc utendum: quo & extergimus, & partem illam callosam consumimus, ulcere mundificato cicatrici induces, miscens alumen, tartarum, & aruginem, cum vino albo & aqua rosacea, ita ut aluminis sit maior quantitas, minor Tartari, & adhuc minor aruginis: & si difficulter ulcus cicatricem admittit, unguento ex mercurio ungenda sunt inguina, & pudendum. Hoc enim exsiccatur

Curatio bubonis. ulcera, corrigit intemperiem, & extinguit morbi seminarium. Bubonem hoc modo curabis. Cum bubo sit intemperies cum affluxu humoris, habet aliquid factum, & aliquid quod fit: id quod fit prauidebis, reuelles aliò humorem fluentem ad locum affectum. Reuulsio hac sanguinis missione exercebitur, secta basilica eiusdem partis, quae cum loco affecto rectitudinē seruat. Id verò quod in tumore factum esset, curari debet, euacuatione, quae sectione vena pedis eiusdem partis commodè fit: ultimò applicabis supra bubonem emplastrum diachilonis puluerem iridis inspersum, ut dirigatur humor per halitum. Quod si non possit digeri sed ad suppurationem mutetur medicamenta suppurantia adhibenda erunt. Pus autem extrahemus non quem admodum chirurgi faciunt medicamento caustico aperientes abscessum quoniam dolorem excitabimus magnum, & inde fluxionem ad partem languidam ex sua natura: sed scalpello sectionem facies, folium myrti representante, ut puri via pateat ex Gal. 13. metho.

Curatio gonorrhoeae. c. 5. Neque enim hac in parte sequendus est Musa ante suppurationem aperiens bubonem ne dolore excitato augeamus affectum. Gonorrhoea sequitur, quae duplex est, una propria, in qua assidue semen emittitur, de qua non agimus modo: altera improprie dicta, cum per

pudendum

pudendum substantia alba fluit, qua non est semen, sed pus. Quod colligimus, quia semen sine dolore emitti solet, at pus cum dolore, hac improprie & per similitudinem. Gonorrhœa est, qua in morbo Gallico apparet, ex multis enim vlcusculis in parte interna penis ortis pus egreditur, dolorem sentientes non solum in illa puris excretionem, sed etiam in pudendi erectione, ob partis ulcerata tensionem. Curatur hac sanguinis missione primo, ne ob dolorem attracto humore fiat inflammatio, & ut portio humoris peccatis euacuetur. Qua purgabimus, & ultimo extergemus, cicatricemque inducemus, in vlceribus, decoquētes hordeū cum rosis, eique mel rosatum colatum permescentes. Quo decocto syphone siue piulco sape urina meatū lauare oportet, aut hoc alio. ℞. aqua plantaginis ℥. viij aqua rosarum ℥. iij rhodomellis ℥. ij. collyrii albi rasis ℥. ij. dissoluantur, & misce. Si sit magnus dolor, collyriū sic cum opio: urina. n. acrimonia (quia in transitu vlcuscula mordicationem parit tēperanda erit, bibentes decoctionē maluarum & liquiritia cum serupio rosaceo aut violaceo. Et si magnus sit ardor, syrupo de mucilaginibus à Marthao. de gradi. descripto utemur, quem capite de ardore urina à me habes descriptū. Solet aliquando in vlceribus predictis cum multū durant, caruncula innasce, & impedire transitum urina. Qua curabitur ea ratione, qua Laguna & Amatus Lusitanus docent. Decidentia pilorū in morbo Gallico ostēdit antiquos medicos Curatio eum non cognouisse. Ipsi. n. ut in i. habes scholio, à duabus tantū can- deciden- sis defluere pilos scripserunt, cū in morbo Gallico à nulla ex illis ene- tia pilo- niat, sed à prauitate excrementi. Remedia ad eiusmodi defluuiū mul- rum in ta habet Anton. Musa in suo li. de morbo Gallico inscripto. Ego unum morbo solum describā, quo si utaris, prohibebis ne pili decidant, & excisi re- Gallico. nascantur: quo d expertissimum habemus, hoc autē est unguentum ex Mercurio paratū, quo humeri articulos, vertebrae colli, & retro aures iungere debes, quoad in ore iam incipiant vlcera apparere. Tumores præter naturā cessabunt sanguinis missione, seruata rectitudine, facta purgatione, decocto smylacis, & supra tumorem hoc utens medicamento ℞. emplastrū de ranis & cōtra durities ana partes æquales, extendatur super alutā ad formā dandā. Dolores in morbo Gallico sine tumore aliquo solēt molestiā inferre alicui, aut multis partibus: hi curantur primo sāguinis missione, ut impediamus fluxum humoris ad partē dolentem. 2. humoris peccatis purgatione, & decocto ligni Guaiaci aut smylacis, & si his non cessent unguento ex Mercurio par- Modus tem dolentē ungemus: aut si sit in multis partibus dolor, uniuersalem quo pa- faciemus unctionē. Præterea in supradictis affectibus, decoctum ligni ratur Guaiaci & mylacis à nobis propinatum fuit non solum ut sudorem decoctū moueremus, sed ut prauam morbi qualitatem his medicamentis, qua ex Gua- illi toto temperamento contrariātur radicatus (si fieri hoc potest) enel- iaco, & leremus. Solet autem decoctum variē parari. Aliqui libram ligni in & smy- duodecim libris aqua decoquunt ad medicitatis consumptionem. lace in- Quibus dica.

DE CVRAND. MORB.

Quibus omissis, cum vehementem decoctionem imperent, nos duplex solemus parare decoctum unum (quod vulgo aquafort dicitur) decoquentes usque ad medietatem: quatuor uncias ligni minutatim incisi, & per quatuor horas in duodecim libras aqua infusi: secundum illud idem lignum in triginta libris aqua usque ad tertiae partis consumptionem igni lento etiam coquentes. Qua eadem ratione smylacem preparamus, primo decocto mane & vespere utimur, ut sudorem moveamus: secundo vero in prandio & coena loco aqua consueta. Quod tertio quoque die faciendum est: ubi aduerte in his decoctis recte administrandis naturam, aetatem, & tempus anni esse considerata. Nam si haec calida sint, in decoctione miscenda, quae temperent caliditatem horum medicamentorum, qualia sunt borrago, & endivia: si vero frigida, quae aliquantulum augeant calorem, stechadam, maioranam & similia miscebis. Neque oportet hoc in loco aliquorum consuetudinem sequi, cum syrupis humores preparanti-

Quando bus miscent senam & alia medicamenta purgantia. Ex Hippocrate liceat in enim didicimus, coctionem postulare quietem. Aliquando tamen, morbo quando scilicet hic morbus totum habitum corporis occupavit, possumus cum multis euacuationibus per cutem, urinam, & alium praecedente semper purgatione. Quae ratione hoc decocto utimur aliquando. **Gallico** **multis** **uti euacuationibus.** ℞. polypodij, senae & hermodactylorum ana ℥. j. ℞. radicum diureticarum ℥. ij. & borraginis fumi terrij, cicorea, agrimonia an. man. j. ligni sancti minutatim incisi & smylacis asperae ana ℥. ij. sena, Polypodium, & hermodactyli ponantur in ligatura, & decoquantur omnia in duodecim libris aqua usque ad medietatis consumptionem.

Præterea cum decoctum propinamus, an victus in principio debeat esse tenuis aut crassus non caret controuersia. Itali (sicut in morbis acutis efficere solent) victu utuntur crasso, usque ad diem decimum quartum gallinas, hepata gallinarum, lactes, hados & similia concedentes: at postea panem biscoctum solum, aut cum uvis passis. Hispani contra victum tenuem laudant in principio, crassum vero procedente morbo, eoque in progressu morbi praecurantur multae euacuationes, quas non poterit agrotus inedia utens tolerare. Melius tamen faciet, qui cum distinctione cibabit: in robustis utens Italorum victu, at Hispanorum in his, qui vires habent languidas.

Curatio Si fuerit antiquus & curatu difficilis, quando tumores & dolores per unguenta. dum est ad unctiones factas unguento ex Mercurio, seu argento vivo parato: solet autem argentum viuum multis modis parari primo e ratione qua docuit Vigo suum preparare pulcre: assumptis argentum viui praeparatio. aqua, qua aurifices aurum ab argento separant, eo usque percoquentes, donec tota humiditas assumpta sit, & massa remaneat: quae rupto viro extractio

extracta precipitatum dicitur. Quo utendū non est in vnguentis, quæ solent ad morbum Gallicum parari: ob eius vehementiā qua exiccat corpus, ita ut febrē inducat hecticā. Iacobus Syluius corio preparat: ponit enim argentū viuum in corio, & exprimit, assumitq; eam portionem, quæ coriū penetravit, quia tenuis est: reliquam crassam tanquam inefficacem relinquens. Aliqui preparant coquentes illud cum aceto. Alij ipsum vrunt in vitreo vase sine humore aliquo. Mathiolus preparare solet argentū viuum & precipitatum Vigonis, aqua plantaginis vel solani, quod nonnulli tanquam rem secretam seruant. In hac Valentina ciuitate preparamus argentum viuum cum axungia porcina, quia hac eius motum retardat, tum quia nolumus vrere medicamentum, quod sua frigiditate debet agere. Vnguentum ergo huic rei accommodatū non potest describi, quia pro vario affectu, natura & tempore, variè solet parari: vsui tantum tamen nobis hoc est.

℞. Mercurij ℥. iij. ss. extinguatur in axungia porcina sine sale exa- Vnguen-
ctissimè, olei laurini & vulpiniana. ℥. ij. cineris vitis ℥. j. ss. theriaca tum ex
magna ℥. ss. mastichis, & thuris an. ℥. iij. cerusa ℥. j. ss. misce, & fiat argento
linimentum ad modum vnguenti: huius compositionis basis est Mer- uiuo.
curius, axungia illud extinguit, hoc est facit, ne hinc inde moueatur,
& simul temperat ipsum sicut thus & theriaca magna: cinis facit
ipsum penetrare & exiccare vlcera, olea discutunt, cerusa verò ob
corpulentiam additur, hoc vnguento inungenda est pars, aut articuli.
Neque audiendi sunt, qui existimant humorem, qui tumorem in cute
generat, per eandem partem esse euacuandū, cum per ipsam impetum
faciat: nullum enim inuenies medicamentum, quod eius crassitiem
attenuet, præter hoc vnguentum. Argentum enim viuum adiutum
aliis medicamētis, ex toto corpore euacuat, suāque frigiditate humo-
res ab habitu corporis repellit interius ad loca euacuationi accommo-
data. Mathiolus (quem multi sequuntur) ex puluere Vigonis, aqua
plantaginis extincto, pilulas cōstruit ex granis quinque istius pulue- Pilula
ris, electuario diamargaritonis frigido, confectiōe Gentilis cōtra me- Mathio-
lancholiam, & syrupo aliquo. Alij bonum componunt ex precipitato li darn-
& cardiaca confectiōe. Abstineretamen oportet ab his, neque per os nantur,
assumenda sunt, eo quod exiccant partes principes, & dissenteriam
sapissimè inducunt. Si enim habemus medicamenta, quæ humorem
securè purgant, cur purgabimus cum periculo? Aliqui hunc morbum
curant suffitu ex cinnabrio vulgò vermillo: quo etiam medicamento Curatio
ob vehementiam non vtor. Quid si eo utaris, caue ne inspiretur va- per suffi-
por, quia est infestissimus thoraci & nervis. tum:

De vlceribus capitis manantibus, quæ à Græcis acho-
res, & à iunioribus barbaris tineæ dicuntur. Et de cu-
ratione pediculorum capitis, & aliarum partium.

DE CVRAND. MORB.

CAPVT III.

Descriptio ulceræ capitis manantium. **Q**UAS Græci Achores dicunt, Plinius manantia capitis ulcera appellat Vulgus, quia vestium tineis simillima sunt, capitis tineas nominavit. Est autem, autore Paulo, hic morbus affectio quædam capitis tenuissimis foraminibus cutem perforans, quibus glutinosus humor depellitur. Causam habet nitrosam, salisamque pituitam, seu mixtum quendam humorem, qui partim tenuem saniem ac mordacem, partim verò crassum succum in se habet: vnde si qui excernitur humor tenuis sit biliosam dominari saniem coniicimus, si crassus, atque glutinosus, pituitam. Pediculorum verò generatio, quam perdiculationem Latini, Græci phthiriasim nominant, à calidis fit humoribus, crassis tamen, sed cutim subeuntibus, atque in eius profundo pediculos generantibus. Quod plurimum etiam iuuat, & immundities, & crassorum ciborum, earumque rerum usus, quæ excrementa ad cutim detrudunt, vt ficus. Morbus per se patet.

Curatio. **V**ictus. Curatur primò hic morbus victu temperato in actiuis, & humido, & alimentis boni succi: vt pullo gallinaceo, gallina, & similibus. Omnia quæ atram bilem generant, maximè nocent: de quibus capite superiori de curatione morbi Gallici abundè dictum est.

Concoctio. **S**ecundò materiam apparentibus his, & similibus. ℞. syrupi fumarie. S. borraginis. an. ʒ. iij. rhodomellis, syrup. endiuie compositi. an. ʒ. ij. misce. Item. ℞. decocti borraginis, fumarie, radicis buglossæ, & petroselini addendo parum epithymi libram vnā semis.

Purgatio. **T**ertiò, vacuantibus per medicamenta conferentia, quæ humorem terrestrem mixtum cum seroso tenui purgant: de quibus superiori cap. disputauimus, vt ℞. diacatholiconis. ʒ. vj. confectionis medicaminis Hamec. ʒ. iij. diachartami & electuarij de succo rosatum an. ʒ. j. syr. buglossæ. ʒ. j. aquæ borraginis quod s. misce, fiat potus. Præter hanc primam purgationem est utilis & necessaria leuis purgatio, bis saltem in mense, inter quas accipiat electuarium diarhodonis abbatis, vel conseruam borraginis cum decocto, vel aqua buglossæ, vel borraginis. Hæc & similia tollunt nocumenta, quæ ventriculo, hepati, cordi, & toti corpori inferre solent purgantia medicamenta, fiat leuis purgatio per pilulas has. ℞. pilularum indarum. ʒ. iij. agarici trochiscati. ʒ. ij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ quindecim: adde diagridij. ʒ. decem, & aurentur ad usum, tres pro dosi. Si non potest deuorare pilulas, vtatur hac mixtura

mixtura. ℞. diacatholicon. & diasenæ : an. ʒ. j. diacarthami & confectionis, medicaminis Hamec. an. ʒ. ʒ. agarici trochilcati ʒ. ij. syr. portaginis. q. s. misce, & fiat confectio : dosis cochlearia duo.

Quartò, vacuantibus à parte affecta per loca propinqua, videlicet, per palatum & per nares : vt si succus ficlæ adinoneatur naribus, vel puluis piperis, vel mandat mastichen, vel alia composita: de quibus capite de apoplexia abundè dicemus. *Derivatio.*

Quintò, repellentibus, & astringentibus, si incipiant achores, quod lotionè assidua partis affectæ, decocto baccharum myrti, plantaginis, rosarum, portulacæ & similium fiet : vel vngatur bis in die hoc vnguento. ℞. vnguenti albi. ʒ. j. ʒ. vnguenti rosati fantalati. ʒ. ʒ. misce. *Repulsio.*

Sextò, cùm morbus est in augmento, vel vigore, per ea quæ materiam partis affectæ extrahunt, & dissolunt : primò fiat lotio decocto vrticæ, lapathij, fumariz, fœnugræci, camomillæ, & similium, raso priùs capite : & vngatur hoc vnguento. ℞. succi lapathij. ʒ. j. olei camomillæ & laurini. an. ʒ. j. ʒ. olei rosarum. ʒ. ʒ. aceti cochlearium j. sulphuris. ʒ. ij. tuthiæ, spumæ argenti. an. ʒ. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. In hoc vlcere & aliis capitis affectibus laudantur à Galeno primo de compositione medicamentorum secundum locos, & à Paulo ʒ. lib. & ab Ætio. 6. sermone multa medicamenta : semper tamen à elementioribus est incipiendum, vt sunt duo superiora. In infantibus tamen omnia sunt suspecta, nisi quæ sequuntur. Primò post rationem victus nutricis debitam, capiti infantis sæpe adinoneatur semen sesami mansum, vel medulla, seu interior pars ossium mali perfici, vel frictio sæpe fiat carne porcina veteri cum cuti, decocta vino albo. Hæc conferunt ad dolorem, & impediendum inprementum, quamuis omnes fermè cutanei morbi capitis impediunt epilepsiam futuram in ipsis. Cùm ægroti nouem iam, aut decem annos nati sunt, fueritque hic morbus confirmatus, & factus ab humoribus adustis similiter, & crassis, cuti adeò contumaciter adhærentibus, vt in se quippiam schirrosum habeant, hi post vacationem egent medicamentis valentioribus, de quibus Gal. Paulus, & Aëtius locis iam dictis satis plenè scripserunt. Inter quæ sal, sæx vini adusta, & arsenicum laudantur, & alia his similia, sequens tamen medicamentum spectatum & probatum est in tinea, & aliis vetustis vlcerib. ℞. vtriusque hellebori, sulphuris viui, atramenti, auripigmenti, calcis viuæ, vitreoli aluminis, gallarum, fuliginis, cineris clauellatarum an. ʒ. ʒ. *Resolutio.* *Vnguentum.* *Ab ætate cōtraindicatio.* *Vnguentum præstantissimum.*

DE CVRAND. MORB.

*Vnguen-
tū nite.* ꝑ. argenti viui extincti, viridis æris. an. ʒ. ij. fiat ex his puluis, & cum sequentibus misceatur. ℥. succorum borraginis, scabiosæ, fumi terræ, & lapatij acuti an ʒ. j. ꝑ. bulliant omnia; & adde fæcis olei antiqui ʒ. iiij. aceti ʒ. ij. picis liquidæ ʒ. ij. ceræ, quod ꝑ. misce, & fiat vnguentum quo sine dubio curabitur hic morbus, dummodò post curationem ipsam fiat bis saltem in anno corporis euacuatio, ne natura assueta emittere à toto ad caput, iterum expellat. Hoc quoque vnguentum est optimum. ℥. gal-
larum ʒ. iiij. feminis cuscutæ ʒ. ij. arsenici rubri, aristolochiæ an. ʒ. iiij. salis armoniaci, fuliginis furni, sulphuris, amygdalarum amararum, colocynthidis, radicis papaueris, foliorum fici, foliorum oliuæ radicis arundinis viridis, aluminis, siephnemimitæ, myrrhæ, aloë, olibani an. ʒ. j. ꝑ. fiat ad formam vnguenti cum aceto ad solem.

Historia. Hoc quoque est probatum, & habet minorem vim & intrepide potest medicus vti eo. ℥. cineris capillorum humanorum ʒ. j. corticum auellandarum combustarum. ʒ. j. ꝑ. fæcis olei ʒ. iiij. mellis sine spuma ʒ. iiij. myrrhæ ʒ. j. ꝑ. aloës ʒ. croci ʒ. iiij. misce, & fiat vnguentum. Primum ex tribus iam dictis est potentius, & eo liberata fuit quædam iuuenis, quæ quatuordecim annos laborauit hoc morbo.

*Curatio
cū pileis.* Curatur etiam hic affectus à multis doctoribus, & à nostris fœminis nouem pileis, hac forma. Accipe pannum cæruleum lancum, super quem expende picem nigram, & resinam pini, & impone capiti raso, actu calidum: ibique adhæreat nouem diebus, deinde violenter extrahatur pileum adeò, vt pili euellantur saltem vulsellis, quas vulgò pinças vocamus, vel aliis ferreis instrumentis: postea lauetur caput decocto rerum dictarum, addendo parum hederæ: deinde imponatur secundum pileum eadem forma: & eodem modo imponatur tertium, & quartum, vsque ad nonum, seruando eundem ordinem, & modum in omnibus. Curabitur dubio procul, & forsan perpetuò habebit pilorum glabritiem, non secus ac si esset verum caluitium: semper tamen saltem per annum ab hac curatione fiat frequens corporis purgatio.

*Curatio
pedicu-
lorum.
Victus
ratio.
Sectio
vena.* Pediculi interficiuntur, & prohibentur ne fiant: primò debita ratione victus per ea, quæ bonum gignunt succum, & sanguinis corruptionem impediunt, & excrementorum augmentum: quare nimia copia ciborum, & eos immoderatus sumentium ordo nocet, similiter & ocium, & alia multa de quibus in libris de tuenda sanitate, & libello de bono & malo succo agit Galenus. Secundò per sectionem venæ iecorariæ, præcipuè, si sint rubri pediculi, aut corpus sanguineum. Teruò vacuantibus

in materiam putrem, à qua fiunt, per medicamenta propria humori, præcedenti illius concoctione per accommodata medicamenta: de quibus omnibus j. cap. dictum est: semper tamen prius est cognoscenda causa per sua signa. Quandoque sola vestium mutatio satis idonea est ad curationem morbi huius. Quartò post vacuationem curatur balneis aquæ marinæ, vel decocti lapathi, hederæ, absinthij, lupinorum, & similium. Quibus si addas parum hellebori & staphisagriæ, maior vis inerit balneo, seu lotioni.

Purgatio.

Balnea & lotiones.

Multa sunt, quæ pediculos necant, ut argentum viuum mixtum cum sanguine porci, & admotum scapulis, & parti mediæ inter thoracem & ventriculum. Hoc vnguentum potenter eos necat, si cum zona imponatur corpori, maximè si partes multæ corporis eo vngantur. ℥. olei ℥. iij. Mercurij extincti ℥. j. ceræ ℥. β. misce, & fiat vnguentum.

Necatio pediculos: Vnguentum.

De dolore capitis à quacunque causa contingat.

C A P V T I V.

Dolor capitis, quem cephalalgiam Græci vocant, barba-
 ri fodam, affectus est caput infestans, qui si diuturnus sit, cephalea appellatur: graue quidem malum est, & quod vel leui occasione vehementes excitet accessiones, ita ut neque strepitum, neque vocis ullius vehementiam, neque splendorem tollerare possit infirmus: sed obscuritatem, tranquillitatemque intra cubiculum quærat, idque ob doloris vehementiam: quippe malleo se nonnulli percuti arbitrantur, alii caput distendi, alii aliter affliguntur: idque aut media solum capitis parte, & hemisrania dicitur: aut omnibus simul, atque adeò vel intra caluariam vel extra, quod inde diiudicare poteris. Quibus enim intra caluariam morbus est, iis ad radices oculorum morbus porrigatur.

Descriptio & diuisione doloris capitis.

Prouenit generatim hoc malum, aut ob nudam intemperiem, aut ob succorum redundantiam, aut ob intemperiem simul, & succorum copiam, nonnunquam per consensum aliarum partium: sæpè etiam à causis externis (quas procataceticas dicunt) ut vitione, frigore, ictu, & ebrietate, aliisque huiusmodi. Si ab intemperie sola acciderit, à frigore quidem, atque calore obortus capitis dolor vehementior erit, ab aliis qualitatibus remissior: aut fortasse nullus, nisi frigori aut calori coniungatur. Communem autem notam habebit à quacunque fiat intemperie, quod nulla aderit grauitas.

Causa generales.

Causa solius intemperiei.

Signa solius intemperiei.

DE CVRAND. MORB.

in capite : quæ semper, cùm ab humore fit capitis dolor, adesse solet. Si à succorum redundantia contingat dolor : capitis, si quidem à sanguine, causam habet immoderatam victus rationem sanguinem generantis, vel quod ab euacuationibus, & exercitiis, aliisque rebus eius copiam minuentibus cessauit.

Causa sanguinei doloris. infirmus : cognoscetur id per has notas, rubor in facie adest, & oculis : venæ distenduntur, non maiores tantùm, sed etiã minores adeò, vt quæ præ tenuitate nullam sui phantasiam præbebant conspicuæ fiant. Pulsus magnus vehemens ac plenus, vrina subruffa, & crassa, dolor capitis grauans.

Causa doloris biliosi. Si à bile, hunc efficere possunt capitis dolorem, quæcunque immoderate vniuersum corpus, atque adeò caput & calc faciunt, & siccant & bilis insuper copiam coaceruant : cuiusmodi sunt ira, dolor sollicitudo, vigiliæ, labor, exercitatio, inedia, abstinentia, cibi bilem procreantes, ætas vicens, hominis temperamentum biliosum, æstas, atque alia id genus. Qui sic affecti sunt, dolore acriore, magisque pungente, quàm superiores tentantur : os his amarescit, sitiunt, & generatim omnia quæ bilem generare diximus, pro notis sint : quin ea quoque, quæ in iis quos calor solis infestat, reperiuntur : accidit autem ipsis morsus interim maior, & pallor faciei, siccitasque oculorum, & narium, & linguæ.

Signabiles doloris. Si à pituita, quæcunque pituitam in capite coaceruant, hanc peperisse affectionem certum est, vt holera, fructus, pisces, lac, aer frigidus, vitæque nullis negotiis impedita, ac deserta.

Causa doloris à pituita. Quæ omnia considerare oportet, & insuper ægri temperamentum, ætatem, anni tempus, & faciei alborem, vt ab his in morbi notitiam deducamur. Demum si à melancholia, causæ, & signa ex capite de melancholia petenda sunt.

Signa pituitæ. Si per consensum dolor capitis fiat, à ventriculo, vt plurimum oritur, sæpè etiam ab aliis partibus, vt vtero, hepate, & splene : vbi consideranda sunt signa, quæ primogeneam affectionem ab ea, quæ per consensum est, distinguunt : ea sunt, quod pars quæ per consensum aliam infestat, prior ipsa laborat, & pro modo intensiõis & remissionis eius morbi, quo ipsa afficitur. Illa similiter, aut intentius, aut remissiùs affligitur ; adde quòd hæc iugiter, illa quæ per consensum & sympathiam ægrotat, non necessariò semper, sed per interpellationem con-

Causa & signa doloris capitis à causis externis. dolet. Affectiones verò, causæ ; & signa partium, à quibus per sympathiam caput laborat, ex propriis capitibus desumenda sunt. Si à causis procatarëticis, nempe ab vstione, aut calore, causas ex sermone laborantis venabimur, cuiusmodi sunt longior in sole mora, aut in balneo, ira, exercitium, rerum cali-

calidarum, odoramenta, & flammæ vicinitas. Indicium laborantium cute attactu calida, & primo statim manus iniectum aridiore quamprimum elucet. Sic præterea affecti, præsertim qui ob ardorem laborant, rubris admodum sunt oculis. Si ab aliis fiat causis externis dolor capitis, eadem utemur methodo, causas ab ægro exquirentes. Quibus scitis, morbus proculdubio constabit.

Curatur sex remediorum generibus dolor hic, sit à sanguine fit: primò victas ratione frigida, & sicca, videlicet aëre (si naturalis non sit) arte refrigerato herbis, floribus, & aquis cum aceto, vtrosis, myrto, plantagine, violis & similibus. Cibus sit frigidus, & qui paucum generet sanguinem, vt sunt, lac amygdalarum dulcium parum tostorum (ne oleum earum noceat capiti) prifana hordeacea cum iure pulli gallinacei, si opus fuerit, lactuca cocta, & postea cum aceto rosato, similiter cucurbita, & cichorea, & similia maximè conueniunt. Quæ sanguinem multum augent, & calefaciunt, nocent, vt caro & oua. Magis etiam quæ vaporosa sunt, vt vinum, eruca, sinapi, cæpe, & alia prima mensa iuuant, quæ aluum lubricant, vt pruna damascena, & vix passæ sine granis. Secunda quæ prohibent vaporum ascensum, claudendo ventriculi orificium, vt sunt caro malorum cotoneorum saccharo condita, mala cotonea, & pira tosta, & coriandrum præparatum.

Secundò, sanguinis missione, præcedenti ventris lenitione per hunc clysterem, vel similem. ℞. maluarum, foliorum violarum, siclæ, furfuris, mercurialis. an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias quindecim, cui adde olei violarum 3. j. olei rosarum 3. iij. cassiæ fistulæ præparatæ & diacatholicanis an. 3. j. salis 3. misce, & fiat clyster. Facta iam ventris vacuatione, scindatur, si fuerit plenitudo totius, media vena, quæ rectitudinem habet cum capite, quia ad cephalicam terminatur & ab hepate vacuat per iecorariam, & mittatur sanguis respondens plenitudinem. Si verò non fuerit plenitudo totius, cephalica secetur, nisi ex suppressis mensibus, & hæmorrhoidibus dolor factus fuerit. Tunc enim tibiæ, vel pedis vena incidenda est, secta vena media primò & secundò humerali, si oportuerit.

Tertiò, repellentibus sanguinem fluentem ad caput potestate & actu frigidis, si fuerit in æstate, & æger inuenis: & in hyeme & sene tantum potestate frigidis, qualia sunt aqua, aut succus rosarum, endiuix, portulacæ, lactucæ, plantaginis, semperuiri, solani, singula per se vel mixta cum illis, aut

DE CVRAND. MORB.

*Contra
indican-
tia.*

cum aceto, & oleo rosarum futuræ coronali facta rasi-
one sæpè admoueantur, vel ab alto in modum torrentis impellan-
tur ad maiorem penetrationem, quamvis Galenus ea in par-
te capitis statim sensit citissimam clarissimamque refrigera-
tionem sola infusione rosacei frigidi. Hæc tamen repel-
lentia, astringentia, & roborantia partem affectam, nocent,
si fuerit febris. Inhibent enim transpirationem febrilis va-
poris, augentque febrim: nocent quoque cum materia iam par-
tem obsederit, quia ibi eam detinent. Denique si fuerit ce-
phalalgia cum catharro nocent, quia per compressionem eum
augent.

*Purga-
tio.*

Quartò, purgantibus bilem flauam turgentem, aut proxi-
mam turgenti medicamentis cholagogis. Pars enim calidior,
& tenuior sanguinis in bilem conuertitur. Medicamenta hæc
simplicia, & composita multa sunt, de quibus capite 1. egi-
mus. Vnum tamen est maximè notandum, huic affectui præ-

*Salu-
bria me-
dicamē-
ta qua.*

ter naturam non conferre purgantia medicamenta vehemen-
tia, quæ malefica & insalubria dicuntur, sed bona & salu-
bria, vt cassia fistularis, manna Arabum, tamarindi, pruna
damascena, rhabarbarum, & mirobalani citrinæ. Prima enim
calefaciunt nimis sanguinem, & eum ad superiora mouent.
Altera verò sanguinis feruorem tollunt, bilémque benignè

Potio.

vacuant: ℞. cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ
tamarindorum, an. ʒ. ʒ. rhabarbari electi infusi per noctem
in qua indiuiæ ʒ. j. ʒ. decocti florum cordialium, pruno-
rum damascenorum, iuiubarum, & drachmæ vnius corti-
cum myrobolanorum, citrinarum quod sufficit, misce &

Pilula.

fiat potus, cui adde syrupi violarum ʒ. j. Si non possit bibere
potum, vel amat magis pilulas, accipiat ʒ. j. pilularum de
rhabarbaro. vel ʒ. j. pilularum de hiera. S. hæc purgant sine
nocumento.

*Sectio
vena ad
deriuā-
dum.*

Quintò, sanguinis missione ex vena frontis vacuante ma-
teriam sanguineam à parte affecta, & materiam biliosam, &
sanguineam in capite fixam digerentibus, seu clementer re-
soluentibus: qualia sunt fofus capitis ex seminibus althææ,
fœnugræci, lini, floribus camomillæ, meliloti, & similibus

Topica.

in sufficienti aqua coctis. Oleum camomillæ, vel de semine
lini, vel lumbricorum, si capiti admoueatur idem faciet. Simi-
liter si pullus gallinaceus, vel paruus canis, vel pullus colum-
borum recens per spinam scissorum, vel pulmo arietis actu
calidus.

*Alter-
atio.*

Sextò, remediis frigidis sanantibus intemperiem calidam
relictam in capite ab humoribus calidis: qualia sunt quæ dixi-
mus

mus in tertio genere. Hoc quoque vnguentum est optimum inter hæc genera remediorum. ℞. olei rosarum ℥. j. olei violarum ℥. ℞. mucilaginis, psyllij ℥. iij. aceti rosati cochlearium. j. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Biliofa cephalalgia eisdem sex præsidiorum generibus curatur: primò victu refrigerante, & humectante, prohibente generationem bilis, aut genitam temperante: qualis est victus febricitantium febre biliosa, frigidior tamen sit victu laborantium cephalalgia sanguinea. *Curatio biliosa, Victus.*

Secundò, venæ humeralis sectione, præcipuè si dolor sit vehemens reuulsionis gratia, ne fiat inflammatio in membranis cerebri, minor tamen copia sanguinis euacuanda est in hac, quàm in sanguinea. *Reuulsio.*

Tertiò, concoquentibus materiam biliosam medicamentis annotatis primo cap. & his: ℞. syrupi rosarum ℥. iij. oxy-saccaræ. S. ℥. ij. misce. Item ℞. aquarum cichoreæ, endiuia, & acetosæ an. ℥. iij. misce, vel ℥. ix. decocti prædictorum, vel similibus medicamentorum. *Concoctio.*

Quartò, vacuantibus bilem medicamentis cholagogis, de quibus vide caput primum vt hoc. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum. an. ℥. s. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ℥. iij. squinantij. ℥. iij. diaprunis solutiui ℥. iij. syr. violarum ℥. j. decocti florum cordialium quod s. misce, & fiat potus: vel si abhorret à potu. ℞. pilularum de rhabbaro, & assaiaret. an. ℞. s. diagridij ℥. iij. cum aqua buglossæ, fiant pilulæ septem, & auerentur. *Purgatio.*

Quintò, & magis tertio post secundum genus repellentibus & refrigerantibus frigidis etiam actu, de quibus diximus in curatione sanguineæ cephalalgia: quamuis in hac frigidiora conferant. *Repellentia.*

Sextò, calidam intemperiem alterantibus frigidis, sincipiti Reverso ex alto inflicti: qualia sunt iam dicta in curatione sanguineæ cephalalgia, & fortiora vsque ad narcotica & stupefacientia tactum. His tamen cautè vttere, ne noceas parti principi, & frigidæ, soporémque altissimum inducas, à quo pauci liberentur, sed quomodo eis & quando sit vtendum, capite de curanda phrenitide demonstrabitur, & cap. de colico dolore. Naribus quoque sunt admouenda frigida, vt aqua rosata, & similia, non nostra camphora, quia calida est. *Refrigerantia.*

Pituitosa cephalalgia eisdem sex remediorum generibus curatur. Primò, victu calefaciente, & siccante, vt aëre æstiuo, vel arte facta per ignem, ac suffitu cinnamomi, caryophyl- *Curatio pituitosa.*

DE CVRAND. MORB.

Vitæ. lorum, & similibum aromatum, vel anthos, vel calendulæ, vel aliorum similibum. Cibus sit panis fermentatus & salsus, habens parum anisi: vel melanthij, vel saccari, vel sit bis coctus. Carnes sint musculosæ, & auium montanarum, & animantium, quæ exercitio vtuntur, & non sint pituitosa. Piper, & alia aromata maximè conferunt, & omnia calida, nisi vaporosa sint: vt allium, cæpe, & similia: hæc enim nocent, quia caput feriunt, & vapores sursum ferunt. Quare sinapi, eruca, & crocus (nisi in parua quantitate vt medicamenta) lædunt, pisces, herbæ frigida, & legumina, ciceribus demptis, & tandem pituitosa similiter nocent.

Concoquentia. Secundò apparantibus pituitam, attenuantibus, & incidentibus: de quibus i. cap. vt hoc, vel simili. ℞. rhodomellis ℥. vj. oxymellis S. iij. misce. Item. ℞. decocti saluiae, fœniculi & petroselini lib. j. ℞.

Vacuantiæ. Terriò, vacuantibus pituitam medicamentis phlegmagogis, de quibus cap. i. & hoc ℞. diacatholiconis ℥. v. agarici trochiscati. ℥. j. diaphæniconis. ℥. iij. rhodomellis. ℥. j. aquæ fœniculi q. s. misce & fiat potus: vel si magis amat pilulas. ℞. pilularum assaiaret, & cochiarum an. ℥. ℞. diagridij ḡ. iij. cum aqua sticados, fiant pilulæ septem: & aurentur, si fuerit diues. In hac cephalalgia bis & ter est necessaria purgatio, secunda vehementior prima per pilulas cochias, & tertia vehementior secunda per pilulas cochias, & foetidas, vel de oponaco, vel serapino, aut per potum ex electuario indo maiori, & hiera logodionis & aliis similibus, præcedenti maiori concoctione ante secundam purgationem per syrupos de duabus radicibus, & de sticados, & oxymelli compositum, & decoctum rerum calidarum: & ante tertiam purgationem præcedat maxima concoctio per syrupum de quinque radicibus, syrupum de sticados S. & oxymel squilliticum cum decocto rerum intensè calidarum: vel aquis, vt sunt saluia, ros marinus, sticados, arethum, origanum, & similia. Et quia hæc cephalalgia diuturna est, præter has tres purgationes magnas utilis erit, & necessaria purgatio frequens sine custodia, clementior siue per scrupulum vnum pilularum cochiarum factis tribus pilulis, siue per cochlearium electuarij indi maioris, vel huius mixturæ. ℞. diaphæniconis & diacatholiconis an. ℥. j. agatici throchiscati & turbit gummosi an. ℥. ij. electuarij indi maioris ℥. ℞. rhodomellis. q. s. misce, & fiat confectio ad modum opiata.

Auertentia. Quartò reuellentibus, seu auertentibus deorsum pituitam, quæ sursum per impetum ruit: qualia sunt præter dicta ter

tertio genere, acres clysteres, & balani, seu suppositoria, de quibus capit. de morbo comitiali, & de apoplexia, & partium extremarum dolorifica vincula, & frictiones validæ, & lotio eandem partium decocto rerum capitalium: cuiusmodi sunt ros marinus, salvia, ruta, sticados, & origanum, & similia. Cucurbitulæ ceruici & scapulis affixæ sunt optimæ in hoc genere. Repellentia quoque remissa frigida, & calidis astringenti- *Repellē-*
bus mixta sunt vtilia: & etiam in lethargo cum Galeno 13. me- *tia cum*
thodi: vt ℥. aquæ rosarum ʒ. vna aceti ʒ. ꝑ. pulueris castorei *astrin-*
3. j. misce. *gētibus.*

Quintò, particularis euacuatio post prædictas, & post pri- *Deriuā-*
mam purgationem est necessaria per loca propinqua parti affe- *tia.*
ctæ, videlicet per palatum & nares: qualia sunt succus siclæ, aut maioranæ naribus instillatus, vel puluis piperis, aut sæpe man- ducet ex sequentibus apophlegmatismis, seu masticatoriis. ℥. pulueris mastichis ʒ. ij. pyrethri, zinziberis, & galangæ an. ʒ. j. cum syrupo de sticade, aut aqua maioranæ, aut cera fiant glo- buli ad magnitudinem lupinorum. De his tamen capite de apo- plexia copiosius.

Sextò, dissipantibus pituitam capitis, & corroborantibus ventriculum, & totum corpus, ne iterum tanta copia pitui- *Discu-*
tæ gignatur. Electuarium, rosatæ nouellæ vel aromatici ro- *tientia,*
sati Gabr. vel diacimini multis diebus in aurora in quantita- *q̃ robo-*
te duarum drachmarum cum decocto, vel aqua, vel syrupo *rantia.*
capitali comedatur, dissipabit enim pituitam capitis. Idem facit diamusculus dulcis, vel amarus, vel theriaca magna, vel mithridatum. Hæc mixtura erit optima in hoc genere. ℥. diamusci dulcis ʒ. j. ꝑ. diambrae ʒ. ꝑ. pulueris aromatici ro- *Mixtu-*
sati Gabr. pulueris diagalangæ, & rosatæ nouellæ. an. ʒ. ij. *ra vtilis*
syr. de sticade q. s. misce & fiat confectio, cui adde theriacæ magnæ, & mithridati an. ʒ. j. dosis est cochlearium vnum cum aqua saluiæ, vel sticados, vel his simili. Parti dolenti admo- *Topica.*
uenda sunt & vnguenta calida, & fots ex decocto rerum capitalium. Hoc vnguentum est optimum tunc ℥. olei rutæ & lauri an. ʒ. j. pulueris euphorbij, castorei, & sticados an. ʒ. *Vnguen-*
ꝑ. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum. In diurno dolo- *tum,*
re, ne æger in pessimos cerebri morbos incidat, vel in suffusio- nem (quam cataractam medici barbari appellant) venæ tem- porum incidantur, sanguisque copiosè per eas egrediatur: hoc tamen auxilium, quamquam multis placet, mihi est su- spectum, quia periculosum est, & nostris temporibus inusi- tatum. Et in eo vtile hoc potentiale causticum, si futuræ co- ronali admoveatur. ℥. vnguenti rosati ʒ. j. cantharidarum *Auxiliū*
3. ij. *suspe-*
ctum.

Cauterium.

3. ij. pulueris sinapis, & stercoris columbini an. 3. j. misce. Hunc antiquum dolorem curant multa, & parua actualia cauteria aurium. Alii cauteria actu futurae coronali admouent: hæc enim materiam partis dolentis extrahunt. Alii filo lineo, vel argento per ceruicem traiecto, quod setale vocant, hunc dolorem antiquum curant. Oleum pyrethri & castorei, si capiti admoueat, optimum est auxilium. Semen quoque rutæ cum castoreo, si cum vino & oleo decoquantur, & parti laboranti apponantur, erit præsens medicamentum. Idem potest efficere cataplasma ex centurea, betonica, & branca visina, si cum vino & oleo fiat.

Cephalalgia, quæ fit ab atra bile curatur, quemadmodum melancholia, de qua cap. 9. huius libri.

Curatio melancholia.

Curatio eius, quæ fit per consensum.

Cephalalgia per consensum totius, ut in febribus, vel partibus alicuius, videlicet ventriculi, iecoris, splenis, vel matricis, curatur per præcisionem causæ prius curato morbo partis primò affectæ: nisi symptomata ad se curam trahant: horum tamen suis in locis fiet mentio. Sed quia frequentius fit per consensum ventriculi: tunc si sit multitudo bilis euaporantis, euacuetur. Et comedat panem succo malorum granatorum acidulcium, vel agrestæ, aut acetosæ intinctum, aut cum rob. malorum cotoneorum.

Curatio eius, quæ fit ab

ictu vel æstu.

Curatio eius, quæ fit ab

ictu vel casu.

Victus.

Sectio venæ.

Cephalalgia ab æstu curatur eodem modo, quo curantur cephalalgia sanguinea, & biliosa ultimo genere remediorum.

Cephalalgia à casu, vel ictu, curatur primò tenui victu, prohibente generationem tumoris præter naturam in parte affecta. Nutriatur ergo lacte amygdalarum, cucurbita, saccaro condita, uvis passis, pyris, & cotoneis tostis: abstineat à carnibus & vino.

Secundò, sanguinis missione per sectionem venæ mediæ, si fuerit plenitudo: vel humeralis, si non fuerit. Si vulnus sit, consule doctum chirurgum. Si autem tumor fuerit absque vulnere, ab initio parti affectæ oleum rosaceum cum puluere myrthillorum & rosarum est admouendum: vel mica panis cum aceto, & aqua decocta cum eodem puluere: post tertium diem hoc medicamentum est necessarium. ℞. emplastri contra conquassationem, & oxicroci an. partes æquales, extendantur super alutam ad formam datam partis dolentis.

Curatio eius, quæ fit ab

ebrieta-

te.

Cephalalgia ab ebrietate quandoque in mortem terminatur, aliquando non: quare ea, quæ Arist. tertia parte problematum docet, sunt maximè animaduertenda. Aphorismus quoque sextus quinti libri, & quinquagesimus sexti libri non est tradendus obliuioni, videlicet si ebrius quispiam repente ob

obmutuerit, &c. & quicumque sani dolore capitis, &c.

Victus.

Curatur hæc cephalalgia primò tenui, aut tenuissimo victu, & prohibente vaporum ascensum. Si vinum in ventriculo sit, ipsum euomere est necessarium frictione, aut titillatione radicis linguæ, & oris: digitis propriis, aut calamo oleo madefacto, vel per potum vnciarum trium syrupi acetosi. S. vel per decoctum seminis raphani, aut seminis anethi cum syrupo acetoso. S. Si per vomitum vinum non egeritur, tunc per vnciam vnam hieræ. S. aut vnciam semis diaphæniconis euacuetur: deinde dormiat, postea balneum ingrediatur, & partes extremæ oppositæ vinculis & frictionibus dolorificis afficiantur, vt ad se trahant atque à parte læsa reuellant: & oxyrhodinum hoc capiti sæpè apponatur. ℞. aquæ rosarum ℥. ij. olei rosarum ℥. j. aceti ℥. ss. misce. Brasicæ, præcipuè radix, prohibeat futuram ebrietatem, & curam factam. Vltimò alatur pullis gallinaceis, cum agresta, vel acetosa decoctis pyris, & malis cotoneis tostis, & in fine mensæ puluere coriandri cum faccaro. Potus sit aqua decoctionis coriandri præparati, aut brasicæ.

Vomitus.

Potio.

Oxyrhodinum.

In cephalalgia tamen antiqua siue continua, siue cum intermissione, necessaria est frequens purgatio per pilulas clementes, seu benignas, quales sunt de Hiera S. Galeni, & similes à cœna, vt vis earum citius & melius ad caput ascendat. Neque hoc pugnat Hippocrati neque Gal. licet Fuchsius in suis paradoxis aliter sentiat: miscuit enim Gal. succum aliorum cum medicamentis caput purgantibus. Quare Aëtius sexto sermone dum minuit croci quantitatem in Hiera, quoniam caput purgat, non est laudandus, neque crocus (vt ipse vult) caput multum percutit, cum, autore Plinio, qui crocum prius biberint, crapulam non sentiant.

Anti-

qua ce-

phalal-

gia cu-

ratio.

Fuchsius

Aëtius.

Scholium.

Dolor capitis, quem cephalalgiam.] Nomine capitis eas partes intelligimus, quæ cerebrum continent, proinde omnes siue externa, siue interna sint, cōsideranda veniūt. Externa sunt, Pili, cutis, pinguedo, mēbrana carnosā, & periostiū, quod in hac parte Pericranium eius appellari solet. Cranion est pars media. Partes interna sunt dura & tenuis meninx, cerebrū, cerebellum, glandula ossis cunei. Nervi orientes à cerebro, mamillares processus, & alia. Ex his partibus quadam sentiunt, quadam sensu destituuntur. Non sentiunt pinguedo, cranion & cerebrum, reliqua omnes sentiunt. Quamuis de venis, & arteriis cōtrouersia sit ob locū. Gal. qui habetur 16. de usu par. c. 12. ubi venas & arterias sensu omnino expertes facit: ille tamē locus corruptus tibi apparebit, si legas eiusdē lib. c. 2. ibi enim partes sentiētes enume-

Caput

quid, &

varia

Pericranium

eius par-

tes.

DE CVRAND. MORB.

Dolor rans non omittit venas, & arterias, sicut nec in multis aliis locis. **Dolor** symptoma est, actio scilicet deprauata sensus tactus, quia in eo obiectum percipimus aliter atque est. Morbus, ad quem sequitur, est soluta continuitas, manifesta, aut occulta. Manifesta fit à rebus contundentibus, & secantibus, occulta verò ab intemperie nuda, aut cum affluxu, dummodo sit calida, aut frigida, quia humida & sicca medio alio inferunt dolorem: fit etiam à tensione ab spiritu, aut humore facta. Quas omnes causas ad duas possumus reducere, externas, & internas. Dolorem capitis Gal. duplicem statuit. 3. de loc. affect. c. 9. distinctum ratione maioris, aut minoris, unum recentem, qui cephalalgia, & alterum inueteratum, qui cephalæa dicitur. In cephalalgia

Conside- curatione hac omnia considera. Primum à qua causa fiat dolor, ut ei rāda in prospiciamus. 2. an sit in partibus externis, an internis. Quia si est in cephalalgia externis, facilius curatur, neque postulat ita vehementia med. ut dolor à causa interna: praterquam quòd hic dolor requirit ea med. que curatione penetrent, 3. An dolor sit proprius c. hoc est excitatus à causa existente in c. an verò sit per consensum: ita ut causa extra c. in ventriculo, iecore, parte alia, aut toto corpore: hinc enim habebimus cognitā partem, cui med. sunt applicanda. 4. & ultimum cui intentos esse oportet, est: An caput sit languidum, siue natura, siue occasione, ita ut facile suscipiat causas dolorificas. An verò sit robustum, afficiatur autem à magnitudine causa. Hoc enim animaduerso intelligemus, an caput sit roborandum necne. Signa causarū doloris capitis in contextu leges.

Sanguis Curatur sex remediorum generibus.] Sanguis si causa est cephalalgie, sua multitudine distendens venas id præstabit. Proinde quomodo causa alimenti quantitas minuenda, ut paucus sanguis generetur: unde sit celaphalalgia non video, qua ratione exhibeat auctor vltum frigidum, nisi ratione consuetudinis id faciat: non enim necessum est, ut plethora intemperies calida sit coniuncta.

Sanguinis missio. Secundo sanguinis missione.] Ante sectionē vena oportet clystere euacuare intestina, ne à primis venis substantia inutilis attrahatur. In cephalalgia sanguinea complexus est affectuum, sunt autē affectus dolor, & plenitudo. Ex his dolor raro urget, ac proinde curato à causa, plenitudine scilicet est inchoanda. Plenitudo euacuationē postulat: cum autē ea que euacuant varia sint, inedia, frictio, balneum purgatio, & sanguinis missio: quo ex his utendū sit, deliberamus ex methodo medendi, quā doctissime Ludouicus Collado preceptor ex variis Gal. locis in sua Isagoge ad faciendā medicinam nobis tradidit. Cum ergo plethora sit affectus magnus, non poterit media, frictione, aut balneo euacuari, quia hæc sūt parua remedia: postulabit ergo nō purgationē, quia hæc cacochymia debetur: sed sāguinis missionē, quæ citò & multum euacuat sanguinē redundātem: atque hæc est qualitas remedij. Quantitatem eius ex affectu, anni tēpore, ætate, & aliis colligemus.

Occasio

Occasionem ex absentia cruditatis ventriculi, & animi deliquij, qua impellentia sunt. modū verò utendi (hoc est ex qua vena sanguinem mittere oporteat colligimus ex loco affecto. Qui cū cerebrum sit, cephalicam secabimus, unde malè auctor basilicā incidere iubet. Quasi humeraria nō etiam euacuet ex vena caua, ac proinde à toto corpore possumus etiam secare communem qua à capite & basilica euacuet. Si dolor capitis ex suppressione mensium aut hamorrhoidarū oriatur, distingues. Nam si causa in capite fuerit iam coaceruata, cephalicam secabis: & deinde prædictas mouebis euacuationes, sedato dolore. Si verò tantū fuerit consensus, ex crure secabis venam. Quòd si dolor capitis sit cum mensium fluxione, tunc considera, an hac euacuatio sufficiat ad plethorā deponendam. Si sufficit, non est secanda vena: si non sufficit, ex cephalica eam quantitatem sanguinis euacuabis, qua unā cum illa menstrua euacuatione plenitudini satisfaciat.

Tertiò repellentibus sanguinem.] Et si sanguis possit discutientibus euacuari, id nō licet in principio, ne ipsū caliditate attrahamus: euacuabimus ergò medicamentis replentibus. Si distillatio cū dolore coniuncta sit, considera an sit vrgens: si dolor vrgeat, utere repellentibus, si vrgeat distillatio nō his, sed frictionibus, ligaturis, & similib.

Repellentia autem bregmati applicantur, ut per suturas penetrent. Repel-

Quartò purgantibus.] Si cephalalgia sit à plethora, nulla caco-
chymia coniuncta, non erit purgandum. lentia.

Secundò venæ humeralis.] Aliqui sentiunt in cephalalgia bilio- In bilior
sa non esse secandā venam: ne agrū ducamus in ebullitione cholericor- sa cepha
rum, euacuato sanguine, qui est franū bilis. Hos omittimus tanquam lalgia
barbaros in sanguinis missione non solus sanguis, sed etiā innatās bi- secanda]
lis euacuetur. Nisi ergo multa sit quāritas bilis, & exigua sāguinis, est vena.
in hoc affectu sanguinem mittimus, non ut bilem educamus, id enim
purgatio præstat, sed ut reuellamus. Quia unā cum sanguine vitiosa
quantitas bilis effluens minuetur, & contrarium acquireret motum.

Sextò calidam intemperiem.] In biliosa cephalalgia aliquando cogimur importunam vigiliam, & magnum dolorem corrigere, sopientes facultatem animalē: cauere tamen semper oportet ne intemperiem cōtrariam frigidam inducamus. Vtemur ergo decocto lactuce
& seminis papaueris, miscentes chamemelum-caryophyllos, aut cin-
namomum ob penetrationem: hisque irregabimus caput. Si hac non
possunt somnum conciliare ad radices. Mandragora, & hyoscyamum,
aliāque fortiora, deueniemus. Ungemus etiam tempora oleo violaceo,
aut papauerino, aut unguento populeone, additis granis iij. aut iiij.
epij, corrigentes opium oleo styracis, chamemelino & aliis.

Ad vi-
giliam.]

Pituitosa cephalalgia.] Cū raro vires constent ob frigiditatem tosa ca-
kumoris, & cū cruditas sit in ventriculo, & habitu corporis: proin- phalal-
de in hac cephalalgia sanguinē non mittimus. Coquēda est ergo cru- gia non
ditas

DE CVRAND. MORB.

mitti- ditas primarum venarū rhodomelle oxymelle simplici, & mulsa, cū
mus sã- decocto fœniculi, capillorū veneris, & stecados in pauca quantitate.
guinem. Ea cocta purgabitur pilulis ex hiera, ex hiera etiā & mulsa. Crudi-
Purga- tatem verò vena causa fortioribus concoquemus, syrupis de hyssopo,
tio. serpillio, stecados: coctione apparente, valentioribus purgabimus, ut
Dolor docet auctor.

capitis Cephalalgia per consensum.] Dolor capitis aliquando contingit
per con- ob consensū totius corporis, qualis est ille, qui in febribus potissimum
sensus. biliosis excitatur, vtilagines enim tenues facile caput petunt. Distin-
gues ergo de febre, est enim intermittens, aut continua. In intermit-
tenti dolor capitis in hora accessionis excitatur. Tuncque non oportet
caput irrigare oxyrrhodino. Quia eius frigiditas detinebit vapores, qui
post accessionem dolorem conseruabunt, qui solet unā cum accessione
cessare, ac proinde euacuatione non eget: nisi voluerimus eo perdurāte
uti frictionibus crurum, & ligaturis. Si febris sit continua, aut habet
dolorem criticum, aut symptomaticum. Si dolor est criticus, nō est se-
dandus: si symptomaticus, distingue. Si dolor incipit unā cum febre,
curandus erit sectione vena, & repellētibz, ne dolor attrahat humo-
res ad caput. Si verò dolor non incipiat cum febre, sed post primam
aut secundam accessionem: si cessante exacerbatione cessat, non erit
curandus: si non cessat, curandus erit ob causam prædictam.

Cephalalgia à casu.] Aliquando in parte interna capitis dolor
citatur ex casu, cui admirabile est medicamentum à Guidone de-
scriptum. Quod ex iure gallina, aut (si est pauper) decocto intestino-
rum, aut ventriculorum (vulgò malcuinat) constat: in quo atteren-
dus est panis, fiat cataplasma, cui misce puluerem ex rosis, mirtillis,
coriandro preparato, baccis lauri, caryophyllis, cinamomo, loto odorato
(vulgò treuol) & aliis calidis.

De Phrenitide.

C A P. V.

Descri-
ptio &
dimissio.
Sedes
cerebri
diuersas
ladi
scribit.
Aëtius
ser. 6.
c. 2.
Signa.

PHrenitis inflammatio est cerebri, aut membranarum eius
cuius tres in vniuersum ponuntur differentiae à Gal. pro nu-
mero principum cerebri facultatum. Prima est, cū sola læditur
imaginatio, quæ in priore ventriculo sedem habet. Secunda, cū
ratio illæsis altis corrumpitur: quod in medio ventriculo fit. Ter-
tia, cū memoria amittitur manente & imaginatione, & ratione,
qui morbus posteriori cerebri parti inest, quæ omnia fusissimè à
Galeno tractantur iij. de loc. affect. Comitatur autem phreneti-
cos peruigilium: nonnunquam tamen inquietus & turbulentus
quidam somnus, ita ut subinde exurgentes exiliant, & vocife-
rentur. Cæterum si sanguinea sit phrenitis ridentes deli-
rant: si biliosa, velut furore quodam perciti sunt. Qui ple-
norem signorum notitiam desiderat, adeat Paulum libr. 3.

Oritur

Oritur autem phrenitis, aut à sanguine exuperante, aut à flaua bile cerebri substantiam, aut meningas eius imbuente. *Non-Causa.* nunquam per consensum à ventriculo fit, aliquando à toto, vt in febribus, & paraphrenitis vocatur.

Morbus igitur hic incipiens quinque auxiliorum generibus *Curatio.* curatur: primò victu tenui refrigerante, & astringēte, vel aqua *Victus.* hordei, ptisana hordeacea, aut succo malorum granatorum, vel limonum, aut lacte amygdalarum tostarum: cucurbita saccharo condita, radice buglossæ condita, pyris, aut malis cotoneis tostis, vel lactuca, aut cichorea cocta, & cum saccharo & aceto præparata. Abstineat omnino à vino, & carnibus, bibat aquam hordei, nisi facultas esset imbecilla: tunc enim ius pulli, aut gal- *Qua vi-* linæ teneræ est necessarium: in declinatione quoque & vinum *tanda* bene dilutum aqua. Aer si frigidus natura non est, arte refrige- *sunt.* retur & humectetur aqua rosarum, aceto, floribus, & herbis per aream sparsis. Obscurus quoque sit, diuersi enim colores & figuræ nocent. Astantes blandè cum alloquantur, quandoque tamen acerbius ipsum increpare debent.

Secundò auertentibus, vt cephalica secta, si non fuerit plenitudo: nam si adsit, media aut cubiti vena hepatica est secan- *Auer-* da. Aliquando etiam tiliarum, aut pedum venæ sunt secandæ, *tentia.* videlicet si ex suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus genita fuerit phrenitis. Præter primam sanguinis missionem sæpe ne- *Sectio* cessaria est secunda, & tertia, vbi fuerit plenitudo, & morbus *venæ.* post primam & secundam sanguinis missionem augetur. Perpetuò tamen robur virium sit præsens, quo deficientes, vel si ætas fuerit ante decimumquartum annum, vel post septuagesimum, sanguis extrahatur per cucurbitulas cum scarificatione *Cucur-* inter scapulas appositas, quamuis præsentem robore virium extra *bitule.* hanc ætatem possit secari vena. Auertunt quoque cucurbitulæ *Fric-* sæpe ceruici, scapulis & partibus infernis admotæ. Similiter *tion-* frictiones, & vincula artuum & partium extremarum, & lo- *nes &* tiones tiliarum decocto rerum partim attrahentium, partim *vincula.* inducentium somnum.

Vacuatio quoque per medicamenta cholagoga præcipuè *Purgan-* salubria, & benigna auertit: vt hoc. ℞. medullæ cassiæ fistu- *tia.* laris recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. iij. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ʒ. iij. syr. violati ʒ. j. decocti florum cordialium, quod s. misce, & fiat potus. Si fuerit magna copia bilis, medicamenta purgantia valentiora, vt (electuarium de succo rosarum, & diaprunis solutiu) erant necessaria, vt quinto genere auxiliorum dicemus.

Tertiò, repellentibus materiam fluentem, qualia sunt oxy-
d rhodinum

**Repellē-
tia.** rhodinum ex parte vna aceti, duabus olei rosarum, & quatuor aquæ rosarum, & alia: de quibus capite de sanguinea, aut biliosa cephalalgia dictum est. Hæc omnia sincipiti sunt admo- uenda, vel ab alto infligenda, aut collo pannus lineus madidus liquore repellente est circumponendus, vt impediatur motus, & ascensus humorum. Omnia tamen hæc ante mutanda sunt, quàm incalescant. An verò intensè frigida actu oporteat esse, an remissè, dictum est capite de cephalalgia sanguinea. Odores frigida naribus adiungantur sæpe, vt aqua rosarum, acetum, violæ, mirtus, nenuphar, santali, & similia.

**Admo-
nitio.**
Odores.
**Corrigē-
tia intē-
periem.** Quartò, corrigentibus calidam intemperiem à bile, aut san- guine bilioso relictam, & laxitatem viarum per quas ascendit: quæ sunt frigida & astringentia omnia, vt syrupus rosarum, de agresta, granatorum acidorum, & cotoneorum cum duplo aquæ rosarum, aut portulacæ, aut plantaginis, vel solani. Hæc & simi- lia sumantur mane, aut post cœnam, vt petant citiùs caput cum vaporibus à cibo elatis. Sincipiti quoque & fronti sunt admo- uenda dicta capite de cephalalgia sanguinea, aut biliosa.

**Digerē-
tia.** Quintò, digerentibus & vacuantibus materiam, quæ in meningibus superest per ea quæ bilem purgant, si non suffece- rit prima & vnica purgatio (de qua in secundo genere diximus) secundò per similia, vel valentiora medicamenta cholahoga, fiat vacuatio sumptis prius medicamentis concoquentibus bi- lem: qualia sunt iam dicta in superiori quarto genere remedio- rum. Capiti quoque ad materiam euacuandam, resoluendo admoveantur tertia quaque hora pulmo arietis calens naturali calore (si fieri possit) aut pullus gallinaceus, capo, canis par- uus, catulus, aut columbus per spinam sectus, & exenteratus, habens tamen calorem aliquem vitalem: & si supra hæc anima- lia sic parata apponatur parum pulueris sequentis, erit effica- cius remedium, somnūque inducet. ℞. florum camomil- læ, & meliloti an. p. ij. rosarum, violarum, & coriandri præ- parati an. p. ss. corticum papaveris albi ʒ. iij. contundantur omnia. Hæc resoluentia non conferunt, nisi in vigore & de- clinatione: ante tamen vigorem in ipso incremento est opti- mum auxilium ex alto in caput instillare lac humanum, aut caprinum actu calidum.

Pulvis.
**Admo-
nitio.**
**Decura-
tione
sympto-
matum
huius
morbi.** Et si vigilæ fuerint immodicæ, vt sæpe sunt, præsertim in biliosa phrenitide, ex alto infunde capiti hoc decoctum. ℞. hordei sine cortice ʒ. j. coriandri præparati, & corticum papa- veris albi an. ʒ. ss. florum camomillæ, rosarum, & violarum an. p. j. radicis iuschiami ʒ. ij. fiat decoctum cum libris tribus aquæ ad dimidium. Quia per vigilias febris & inflammatio augen- tur,

tur, facultasque omnis soluitur, summa cura oportet somnum *Vigilia.*
 conciliare: præter iam dicta, primò temporibus, & futuræ co- *Decocti.*
 ronali admouendum est vnguentum populeonis: secundò in
 cœna vtetur iure pulli gallinacei, si opus fuerit, cum lacte
 drachmæ vnius seminis papaueris albi. Tertiò naribus sæpe
 instilla oleum violaceum, aut papauerinum cum granis tribus,
 aut quinque opij. Quartò admoueaturo ano suppositorium mel-
 lis cum paucis opio.

Quintò, & vltimò: cū alia iam dicta non suffecerint, & mor-
 bus fuerit acutissimus, bibat drachmam semis vsque ad drach-
 mam vnā philonij Romani, dummodo non sit defectus ca-
 loris innati: quia ab his & similibus medicamentis narcoticis
 interiùs sumptis extinguitur paucus calor. Hæc tamen & simi- *Narcoti-*
 lia ante annum sunt pessima, & post annum, quo antiquiora, *ca qua*
 tanto meliora: vt docet Galenus duodecimo methodi. *meliora.*

Ischuria, seu vrinæ suppressio est alterum symptoma huius *Suppress-*
 morbi, cuius curatio capite proprio tradetur. Vnctio tamen ra *sio vri-*
 dicis penis, & pectinis oleo scorpionum cum cuniculi pingue- *na.*
 dine, & titillatio eiusdem penis promouet vrinam suppressam.
 Eandem suppressam mouent parietaria, & apium, & alia diure-
 tica vino cocta pectini admota.

Paraphrenitis est delirium non continuum, sed cum inter- *Para-*
 missione, symptomâque febris ardentis, & non inflammatio fa- *phreniti-*
 cta, sed fiens. Hanc febrem nostri medici proprietariam, seu ha- *dis cura-*
 bentem prauam & veneficam qualitatem appellant: cuius sym- *tio.*
 ptomatis curatio similis est fermè curationi phrenitidis, cū
 quæcunque curant morbum factum, curent & fientem, mitiori-
 bus tamen auxiliis hic affectus indiget Maior & prior cura est
 adhibenda feбри tanquam causæ, quam affectui: nisi symptoma
 ad se curam omnem traheret propter sui magnitudinem.
 Animaduertendum tamen est ne victus sit tenuis, vt in phreni- *Febris*
 tide absoluta, quia hæc febris propter malignitatem suam vene- *prius cu-*
 natam facultatem, & spiritum vitalem resoluit. *randa, si*

Quare maiori copia alimentorum eget, qui enim virili- *nil ob-*
 ter comedunt, liberantur meliùs à peste: nutriatur ergò la- *stet.*
 borans hoc symptomate iure gallinæ cum aqua carnis & suc- *Obser-*
 co agrestæ, aut acetosæ, aut malorum cotoneorum, aut limo- *na.*
 num, aut citri. Si fuerit magna imbecillitas, utilis & necessa-
 rius erit hic, aut similis huic clyster nutriendus & refrigerans,
 & purgans. ℞. iuris pulli gallinacei decocti cum hordeo sine *Clyster*
 cortice lib. l. cassiæ fistulatis præparatæ (si sit alius dura) ʒ. j. *optimus.*
 olei violarum. ʒ. iij. sacchari rubri ʒ. j. mucaginis psyllij aqua
 rosarum extractæ ʒ. ss. vitellorum ouorum numero 2. misce.

DE CVRAND. MORB.

Os & lingua quibus abluenda. Electuarium. Præter repellentia & reuellentia, siue per sanguinis missionem, siue per purgationem, & alia iam dicta superius, oportet humectare, refrigerare, & mundificare os & linguam, primò lacte amygdalarum dulcium, siue saccharo, & coctione: deinde mucagine seminis psyllij, & cotoneorum, aqua rosarum extracta, his sæpe & similibus os abluatur. Ad totius refrigerationem, & humectationem utile est electuarium diatrium santalorum, aut diarhodonis abbatis, aut diamargaritonis frigidi, si manè cum aqua endiuia aut buglossæ, aut iure pulli gallinacei refrigerato, hordeo sine cortice, aut lactuca, aut alia simili herba frigida sumatur aliquot diebus. Cor omni tempore, etiam ante vacuationem (quia non potest obstructione laborare, vt alia partes) hoc epithymate refrigeretur sæpe, atque adeò in horas.

Cardiaca confectio diuinitibus. ℞. aqua rosarum ℥. iiij. aquarum acetosæ & buglossæ an. ℥. ij. aceti albi ℥. β. pulueris diamargaritonis frigidi & santalorum omnium an. j. misce. Ad calorem febris remittendum, & corroborandum, & resistendum prauæ qualitati & venenosæ est optima hæc confectio cordialis. ℞. theriacæ de citro ℥. j. β. confectionis de hyacintho, & requiei magnæ an. ℥. iiij. conseruæ acetosæ, buglossæ an. ℥. β. pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præparati an. ℥. j. margaritarum electarum ℥. β. foliorum auri numero 2, syrup acetositatis citri, quod s. misce, & fiat confectio. Cuius dosis est cochlearium vnum omni hora cum aqua acetosæ, aut rosarum, aut buglossæ. Si fuerit pauper sola theriaca de citro erit bona. Similiter ad eundem affectum, & ad sitim conferet sæpe, præcipuè ventriculo vacuo, bibere aquam decocti hordei cum hac mixtura. ℞. iulep. rosarum ℥. iiij. syrupi acetositatis citri ℥. ij. misce. Aut cum hoc condito. ℞. conseruæ rosarum ℥. ij. conseruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. ℥. j. conseruæ borraginis ℥. β. sacchari, quod satis est, misce, & fiat conditum auro coopertum.

Pauperibus.

Mixtura.

Conditum.

Scholium.

Deliriū. Phrenitis inflammatio est cerebri.] Delirium (quod ex primo prorhetico.com. 1. insania dicitur) comprehendit sub se delirium in melancholicis, & furentibus, phrenitim & paraphrenitim, quæ ex consensu aliarum partium fit. Phrenitis, de qua modo disputamus, duobus sumitur modis. Primò largè. ita vt Typhomaniam etiam comprehendat, quæ est delirium cum inclinatione in somnum. De qua loquitur Hippocrates 3. Epid. p. 3. sent. 45. cum sic describit. Nullus autem phreniticorum vehementer insaniuit, vt in aliis: sed alia quadam veteriosa in somnum delatione, capite graui

uati moriebantur. Eodem etiam loco sent. 62. sic habet, Soriebantur in primis phrenitici, cum enim haberent, ut Galen. ait in com. caput affectum per se, facile illud suscepit humores crudos, qui tunc abundabant, à calore ad ipsum delatos. Hunc affectum, nempe delirium, cum inclinatione ad somnum vulgò appellamus modorrha, aut modorilla. De hac phrenitide improprie, quæ non est inflammatio, Phrenitis non disputamus modò: sed de altera quæ proprie phrenitis dicitur. tis quid. Hac nil aliud quàm delirium continuum cum febre acuta. Delirium genus est, quod communicat cum aliis deliriis: illa dictione continuum, differt phrenitis à paraphrenitide, hoc est, à delirio, quod in accessionibus febriū, pleuritide, peripneumonia, & ex vaporibus calidis ab ore ventriculi ad cerebrum ascendentibus contingit. Ultima definitionis parte phrenitis distinguitur à mania, & melancholia. Vallesius 3. epid. part. 1. comm. ultimo existimat de essentia Vallesij phrenitidis non esse delirium continuum, quoniam hoc interrumpi- lapsus. tur aliquando, neque semper æquè sit, quoniam agrotus ad mētem redit. Hoc colligit ex Hippocrate, qui supradictò loco agens de agroto in Dealcis horto habitanti, quarta inquit die vigilauit, delirauit aliquātulum, quinta non dorminit, delirauit septima: similiter octaua dorminit, intelligebat. Hic homo phreniticus erat, & ante solutionem morbi intelligebat, ergo non est necessum ut phreniticus semper deliret. Ad Galenum autem (qui phrenitim delirium continuum habere scribit) respondet, dici continuum, quia reditus ad mentem non habet certas intermissiones, & statas periodos, certè vir alioqui doctus non rectè considerauit phrenitidis essentiam. Si enim delirium ex inflammatione sequitur, perseverante inflammatione quomodo intermitteret, non erit continuum? Tum si phrenitis nō est delirium cōtinuum, quomodo distinguetur à paraphrenitide? Neque id rectè ex Hippocrate deprompsit, nunquam enim Hippocrates intermittere delirium in phrenitide scripsit: & si in illa sententia id voluit, non erat vera phrenitis, sed paraphrenitis. Quod si sit phrenitis illa, de qua loquitur, ut reuera est, non etiam rectè colligit, quia Hippocrates illa dictione (intelligebat) significat agrotum parū delirasse, id colligo ex die 1. in qua agrotus omnino, aut ut Vallesius vertit, semper mēte cōstitit: si omnino, ergo antea delirium remissum fuit, sed nō omnino. Phrenitis symptoma est in actione laesa principe. Phrenitis Morbus, ad quē sequitur est inflammatio cerebri, aut membranarū tis an sit eius: ubi per inflammationē tumorem præter naturam intellige, non morbus, quemlibet, sed eum, quem Erysipelas appellamus, in eo enim humor an sym- putrescens cerebrum calefacit, & deliriū excitat continuum ob captoma. loris perseverantiam: sit febris ob putridos vapores cordi cōmunicatos. Aliqui contendunt cerebrum non posse inflammationem pati, quia est pars rara, sicut & pulmo, carens venis & arteriis: secundo

DE CVRAND. MORB.

*An cere- ex Gal. qui tertio de Pras. ex pul cap. 8. pulmonem non posse affici
brū possit schirris sentit. Contrariam sententiam habemus ex Gal. 4. de Pras.
timore ex pul. c. 8. ubi cerebrum intemperiem cum fluxione & circa flu-
affici. xionem posse pati scribit. Inflammatio ergo potest esse in cerebro &
membrana tenui. Qua dua partes adherentes cum sint, affectiones
sibi communicant. Quod non est dicendum de dura meninge qua
Vallesij cum separata sit, sola potest affici, neque cerebrū ei consentire. Quod
lapsus. si aduertisset Vallesius, non scripsisset lib. 5. epid. posse esse inflam-
mationem in cerebro sine delirio, ex eo quod in fracturis capitis vi-
derit, inflammatione existente in dura meninge, hominem non deli-
rare. Rationes supradicta nil concludunt. Prima, quia pulmones ob
raritatem raro Erysipelate afficiuntur: cerebrū verò, cum sit molle
& non rarum, ea frequenter corripitur. Tum supponit rem falsam,
cerebrum enim arterias & venas habet, sed paucas. Secunda ratio-
ne, etiam si ostendat Galenum existimare cerebrum pulmonis schir-
ris non affici, reuera tamen mos est Galeni, id quod raro sit contem-
nere ac si nunquam contingeret: qua ratione quintanos circuitus
non admittit, sicut neque schirrum in cerebro & pulmone: cum re-
uera in his partibus contingat, ut aliquando vidimus in pulmone
arietis: & una eum Ludouico Collado in hominibus anatome disse-
ctis, raro tamen id euenit, quia schirrus ex crasso sanguine genera-
tur, & pulmo nutritur ex sanguine tenui, & cerebrum ex humido:
ac proinde Gal. non scripsit simpliciter non posse cerebrum & pul-
monem schirris affici: sed fortasse non posse affici: dicet quis, si phre-
nitis est propria cerebri passio, cur Gal. 4. lib. de cau. pul. c. 14. phre-
nitim non solum ex tenui meninge, sed & ex septo transuerso ortū
habere scribit? ideo enim ut ipsemet docet. 5. de loc. affec. c. 3. veteres
septum appellabant phrenas, quia hac parte inflammatione affecta
phrenitis sequi solet. Vallesius ad analogiam id refert, qua est inter
septum & cerebrum. Cuius sententia falsitas apparet ex varia &
Vallesij distincta natura cerebri & septi, cerebrum enim totum est sperma-
lapsus. ticum, at septum multa parte carnosum. Tum quia similitudo sub-
stantia est inter cerebrum & membranam. Quod si similitudo id
faceret, cur eandem non habet pulmo, & pleura, ex quorum inflam-
matione etiam sequitur delirium: obiectioni ergo hac ratione satis-
facere oportet. Cum ea inflammatio qua in septo est, respirationem
impediat (est enim septū respirationis instrumentum) calor augetur
in Thorace & corde, sanguisque attenuatur & bile scit, eoque nomi-
ne cerebrum ascendens herisypelas in eo generat: vel (quod idē est)
phrenitim. Hoc de locis affec. considerans Gal. dicebat delirium fa-
ctum à septo, pulmone, pleura, & orificio ventriculi differre, quod à
septo factum sit continuum: quod verò ab aliis partibus excitatur,
intermittat. Differt tamen septi phrenitis, ab alia qua primò in ce-
rebro*

rebro fit, quòd in hac statim apparet delirium : in illa verò, qua ex septo pendent, primò febris ex inflammatione, & deinde delirium sequatur. Et ideo Gal. delirium ex septo ortum parum à continuo distare affirmat, ubi non negat esse continuum, cum ibidem continuum faciat : sed parum ait à continuo distare, hoc est inter hac exiguum hoc esse discrimen, ut diximus: quod unum una cum febre incipiat, & alterum parum post febrem. Quo tempore apparens continuitatem sicut & primum servat. Vnde non est quod Vallesius admoneat Galenum, ut sileat illam dictionem parum, qua (ut ex dictis patet) necessario scribi debuit. Causa phrenitidis est fluxio sanguinis biliosi ad cerebrum. Differentie phrenitidis tres sunt, quas hac ratione colligo. Cum phrenitis delirium sit, & delirium comune sit imaginationi, & rationi, meritò una differentia phrenitidis erit, cum delirium in imaginatione, & altera, cum in ratione reperitur, tertia verò, cum utraque actio laesa est. Inde colliges presenti loco duos errores auctoris. Primum, cum memoriam laesam differentiam phrenitidis appellat. Alterum collocans actiones principes in cerebri ventriculis, qua in corpore eius sedem habent. Temperamentum enim cerebri tanquam anima instrumentum illas actiones exercet.

Malè
Vallesius
monito-
rem se
facit Ga-
leni.

Causa
phreniti-
dis &
differen-
tia.

Duo la-
psus au-
ctoris.

Potus.

Morbus igitur hic.] Cum febris acuta in phrenitide sit, & sitis, non est quod aqua hordei marceremus egrotantem, sed frigida simplici utamur. Et cum consuetudo in morbis sit seruanda, vinum bibant, paucum tamen & bene dilutum. Vtemur etiam carnibus, pullo scilicet gallinaceo solo, aut cum hordeo confracto (à nobis dicitur farto) lactuca, aut acetosa, qua oxalis dicitur. In summa requirunt phrenitici victum frigidum & humidum, aut frigidum et si coniunctam habeat siccitatem, quia hac debilitat agit.

Secundò auertentibus.] Cum phrenitis sit inflammatio habens aliquid factum, & aliquid fiens, id quod sit, debet prohiberi ne fiat, & factum curari. Qua omnia commodè in principio praestamus sanguinis missione, qua reuellit humorem aliò, & euacuat ex parte inflammata, inanitis enim eius venis iterum remigrat humor ad eas. Debet secari cephalica, et si sit plethora, quia rectitudinem seruans cum parte affecta, ex ea citam & multam euacuationem facit: hanc autem venam secamus, et si fiat phrenitis ex suppressione mensium: quia ex Galeno reuulsio non est facienda ex loco, à quo fluit humor, sed ex eo, ad quem fluit. Iubet etiam auctor bis aut ter esse secandam venam quando est plethora: qui ostendit, se ignorare sanguinis missionem in phrenitide tunc esse sistendam, quando non fluit tam multus sanguis ad locum affectum.

Curatio
phreniti-
dis,

Vacuatio quoque per medicamenta.] In phrenitide medicamento purgante non est utendum, ut postea dicemus.

Tertiò repellentibus.] In principio phrenitidis debemus euacua-

DE CVRAND. MORB.

re humorem in parte affecta inclusum. Quod prater sanguinis missionem prestat etiam medicamentum frigidum: hoc enim, ut auctor est Gal. 5. lib. sim. c. 4. duplici ratione euacuat, primo, repellendo, secundo una cum calore multam educendo humiditatem. Repellemus ergo oxyrrhodino, (quod ex aqua rosarum, oleo rosarum, & pauco aceto constat) aqua solacum aceto, succo lactuce cum aceto, & aliis similibus, in quibus acetum miscemus, quia prater frigiditatem quam habet, sua partium tenuitate alia cum eo mixta medicamenta deducit, per bregmasis suturas, per quas non solum vis medicamenti, sed & eius substantia usque ad cerebrum penetrat.

Humore
ex cere-
bro non
educi
purga-
tione.

Exami-
natur
medica-
mentum.

Vigilia
prospi-
ciendū.

Quinto digerentibus.] Materia, qua in cerebro continetur, non purgatione totius corporis, qua per aluum, aut vomitu fit, educenda est: sed per proprios cerebri meatus. Quod in declinatione, in qua euacuationis solius indicatio urget, fere ab omnibus obseruatur, capiti applicantes digerentia. Hoc nos non laudamus, quia ex Galeno humor faciens Erysypelas, tenuis cum sit, facile dissipatur. Aliqui hoc medicamento vtuntur. ℞. capitum papaueris num. 2. seminis lactuce. p. 1. cortices radices mandragoræ 3. j. florum cordialium 3. ij. chamemoli pug. ss. cariophyllorum num. 6. contundantur, & fiat puluis: quem immittunt in pulmonem arietis, aut intra columbum & bregmati apponunt. Hoc medicamentum inutile est in declinatione, optimum tamen in augmento & statu, cum repellat, somnum, conciliet, & leuiter digerat, qua omnia in statu desiderantur.

Et si vigilie fuerint immodice.] In augmento phrenitidis debemus ob vigiliam sopire facultatem, quam in lethargo excitamus. Vigilia symptoma est ad se aliquando trahens curationem, cum ita est immodica, ut deiciat vires: in ea enim ob perpetuum motum ad externa calidum innatum dissipatur, & una cum ipso spiritus. Decoctio ab auctore proposita optima est, adde tamen ei calendulam, cariophyllos, aut aliud calidum, quod narcoticam vim medicamenti reprimat, & penetrare ipsum faciat. Lotio etiam pedum cum decocto foliorum lactuce, capitum papaueris crasse contusorum & chamemelo. Si hac non prosint, utere unguentis c. de capitis dolore scriptis. Hac etiam potio, qua frequenter vtor, utilis est. ℞. emulsionem 3. j. seminis papaueris in aqua nenupharis extractam, syrupi papaueris 3. j. ss. confectiois de hyacintho 3. ij. cum aqua nenupharis q. s. misce, & fiat potio.

Paraphrenitis.] Delirium in accessione febris ardentis a magna fit caliditate, neque ibi est venenum, ut auctor existimat, cum symptomata veneni absint. An vero cardiaca confectio hoc loco proposita aliquid valeat, ex his qua capite de Syncope a me explicantur, intelliges.

De Lethargo. CAP. VI.

Lethargus, quem Latinorum nonnulli veterum nomināt, *Descri-*
prio. affectio est phrenitidi contraria: ab obliuione sic dicta, quod ea correptos rerum omnium obliuio inuadat: vnde mar-
 corem, & inexpugnabilem quandam dormiendi necessitatem *Diuisio.*
 cum obliuione & alienatione mentis eam dixeris. Lethargi (au-
 thore Aëtio) duplex origo est: quandoque enim à præcordiis, &
 visceribus per sympatiam oritur: quandoque in cerebro primò
 incipit: ac quibusdam statim ab initio euenit, quibusdam non
 nisi ex acutorum morborum decidentia, præcipuè ex phreniti-
 de, vbi ob medicamentorum stupefacientium vim ea cerebri
 pars fuerit refrigerata. Sæpissimè etiam à febre synocha in Le-
 thargum inciditur: & à pluribus aliis ægitudinibus, & genera-
 tim, omnibus, quas ingentes inanitiones consequuntur. Sed nec
 obliuisci oportet, quod sæpe in singulis diuturnarum febrium
 circuitibus ægrotantes sopor inuadit, quemadmodum in quo-
 tidianis, hemitritæo, & quartanis etiam nonnunquam vsu venit.
 Fit hoc malum à putrescente pituita posteriorem cerebri par- *Causa.*
 tem imbuente, & refrigerante, in somno impellente.

Comitatur autem lethargicos lenta quædam febricula, nec *Signa.*
 adeo vehemens, vt ea, quæ laborantes caro præcedere solet:
 quia in re lethargus & carus distinguuntur. Pulsus horum ra-
 rus est, magnus & vndosus, spiratio rara & imbecilla. Somno-
 lenti omnes huiusmodi sunt, desidiosus, ignaui interrogantibus
 ægrè respondent: sunt etiam vsque adeò obliuiosi, vt ad meien-
 dum sæpe excitati, porrectam matulam manu tenentes obli-
 uiscantur. Delirant porrò, & expergefacti clamantes intuen-
 tur, sed illico ad somnum reuertuntur. Oscitant frequenter, &
 quasi claudendi oris obliti hiantes persistunt. Supini iacentes
 ad pedes delabuntur, & increbrescente morbo velut cadauera
 segnes decumbunt. Quibusdam alius humidior est, aliis ita
 sicca, vt nihil reddat. Lotium præterea quale iumentorum esse
 solet, emittitur. Ad extremum stertentes veluti sepulti arctissi-
 mo somno tenentur.

Curatur lethargus quinque remediorum generibus. Pri- *Curatio.*
 mò, victu tenui calfaciente, & exiccante, vt aëre calido arte *Victus.*
 facto, si sit hyems, aut autumnus, suffitu rerum calfacientium,
 sereno & lucido. Parietes quoque ardeant picturis diuersis co-
 loribus: nutriatur mulla, aut iure ciccerum nigrorum, aut ptisa-
 na hordeacea, cum decocto fœniculi facta, aut graminis pincis
 saccharo conditis (est pygnonada Hispanis) aut cortice citri

DE CVRAND. MORB.

*Quali-
menta
noceant.* condito. Si facultas sit imbecilla, iure columborum & cicerum indigebit: semper tamen Aphorismum decimunoctauum primi libri sequere, considerando tempus, regionem, ætatem & consuetudinem infirmi. Omnia pituitosa alimenta maximè nocent, & vaporosa præter porrorum barbas, quæ si cum hordeo decoquantur, sunt optimæ. Inter cætera ceparum esus copiosius magis lethargum gignit, vix quoque recentes hunc morbum efficiunt. Potus sit decoctum cinnamomi, aut seminis fœniculi, aut aqua mellis potens, videlicet constans quatuor partibus aquæ, & vna mellis, & hæc erit nutrimentum optimum, vinum maximè nocet, nisi in declinatione, & in ægro imbecillo, & nisi sit debili stomacho.

*Auertē-
tia.* Secundò, auertentibus, vt sectione humeralis, aut mediæ, si sit plenitudo: extrahaturque sanguinis copia respondens plenitudini & viribus: & quia semper reformidanda est cruditas, ne sanguinis quantitas sit copiosa, diligenter obseruabitur. Auertunt etiam & clysteres acres, de quibus capite de apoplexia, quamuis aliquantò mitioribus indigeat lethargus. Cucurbitulæ scapulis admoueantur sæpe, & aliquando cum sanguinis vacatione, præsertim si æger fuerit iuuenis, & sanguineus. Vincula & frictiones dolorificæ partium extremarum satis reuelant. Vomitus sine violentia solius ventriculi auertit à capite, siue fiat sola frictione & titillatione oris, & linguæ, siue oxymelle. S. cum decocto seminis raphani, aut anethi, vel cum syrupo acetoso. S. & eodem, aut simili decocto. Vacuatio per Hieran. S. aut Agaricum trochiscatum auertit satis, aut per vnciam semis diaphæniconis.

*Repel-
lentia.* Tertiò, repellentibus actu calidis, quæ sint minus frigida quàm in phrenitide, & primo & secundo die capiti, præcipuè posteriori parti rasæ admoueatur oxyrhodinum ex aceto, oleo, & aqua rosarum: post secundum diem adde oxyrhodino pulueris castorei drachmam vnam, & semper iuxta septimum adde quantitatem eius, & loco olei rosati adhibe oleum ex lilio, & parum aceti squillitici.

*Vacuan-
tia.* Quartò, vacuantibus materiam à capite per medicamenta purgantia, præcedente prius concoctione, syrupis, & aquis, aut decoctis materiæ pituitosæ (de quibus caput primum vide) videlicet vsu rhodomellis, oxymellis compositi, aut syrupi ex hyssopo, aut ex stæchade cum oxymelle squillitico. Hoc, aut simili potu fiet vacuatio: ℞. diacatholiconis 3. v. electuarij indi maioris 3. iij. β. agarici trochiscati 3. j. rhodomellis 3. j. decocti communis quod s. misce, & fiat potus. Alexander Trallianus solebat purgare lethargicos medicamento:

℥. j. castorei ℥. diaridij ℥. ij. cum aqua, aut syrupo, vel decocto fiat potus, & post illum omnes ferme autores laudant illud, quamuis nostris temporibus minuenda sit quantitas diaridij, & augenda castorei, vt ℥. pulueris castorei 3. j. diaridij 5. vij. cum rhodomelle, fiant pilulae, aut potus. Ex hoc habemus medicamentum purgans bilem flauam, mixtum cum medicamento non purgante, fieri, purgans pituitam, vt in superiori mixtura experientia docuit. Similiter purgatorium bilis mixtum cum purgatorio pituitae purgat pituitam, vt in electuario indo scammonium mixtum cum turbit, & aliis purgat pituitam. Vacuatio quoque per loca proxima, videlicet per nares & palatum est necessaria: quare saepe naribus & palato admoveatur parum huius decocti. ℥. pulegij, origani, stachados, rutae an. m. j. sinapis, euphorbij an. 3. j. fiat decoctum cum libra vna aceti ad tertiam partem. Intrudatur puluis hic naribus: ℥. Pulueris hellebori & condisci an. 3. ij. misce. Os & palatum saepe fricentur mithrydato, & theriaca magna, & sale, haec & similia in forma apoplegmatis, & errhini vacuant materiam à capite per dicta loca, de his capite de apoplexia sermonem habebimus copiose: sed tamen oportet scire, lethargum semper omnia remedia desiderare minora, tum quia minor est morbus, quam apoplexia, tum propter febrem.

Deriuā-
tia.Errhi-
na.Apophle-
gmatis-
mus.

Euacuat & resoluit materiam sal cum milio bene tostus, callidus, & admotus capiti rasō. Idem fiet hoc cataplasmate: ℥. caricarum p. ij. sinapi p. j. cum aceto fiat cataplasma. Cucurbitulae benè ignitae occipiti affixae idem faciunt. Optimè quoque euacuat castoreum mixtum cum humanis capillis adustis, & aceto admotum capiti rasō, & excitat à somno.

Obser-
ua.

Eandem aut saltem parem vim habet hoc medicamentum: ℥. pyrethri, sinapis, scyllae an. 3. j. castorei, euphorbij an. 3. v. cum succo aphrodisiorum, aut sampsuchi, fiat cataplasma: si ante appositionem horum pili euellantur cum dolore, erit melius. Si morbus hoc diuturnus fiat, aeger multis diebus in aurora bibat tria, aut quinque grana castorei cum rhodomelle, aut syrupo de stechade, aut aqua saluiae, aut sampsuchi: vel accipiat drachmam vnam mithridati, aut theriacae magnae, aut diagalangae, aut diatrium piperum: post haec & in vigore maximè confert balneum decocti rerum calfacientium, vt pulegij, thymi, roris marini, saluiae, rutae, & similium. Obserua historiam Tralliani, quam Fuchsius lib. i. cap. i 3. de morbis curandis refert.

Topica.

Historia

Quintò, per ea, quibus symptomata huius morbi curantur,

Sympto-
tur,

DE CVRAND. MORB.

enatis cu tur, quæ solent esse duo præcipua, somnus videlicet profundus,
ratio. & excrementorum primæ & secundæ concoctionis suppressio.
 Primi curatio ex superioribus, præsertim quarto genere reme-
Somni diorum expositis peti potest: præter illa pedes, & tibiæ fricari
profundi debent vehementer cum sale & aceto. Odor rutæ decoctæ cum
curatio. aceto excitat à somno, similiter euulsio violenta pilorum ex
 partibus infernis & supernis, sonus tubarum, & voces scrofula-
 rum excitant à somno. Fumus qui æditur ex vstione pilorum
 hominis maximam ad hæc vim affert. Simili ratione fumus
 pennarum vulturis. Eiusdem est facultatis pulmo suillus capiti
 admotus. Tantundem efficiet sanguis testudinis fronti apposi-
 tus. Æquè est efficax frictio plantarum pedum vrtica & sinapi
 aceto decoctis. Pili capræ vsti, & cornu cerui, & capræ adustum
 si naribus admoveantur, possunt expergefacerè quamvis altissi-
 mè dormientem. Ad expellenda stercora, glandes acres, & cly-
 steres multum valent, (de quibus aliqua scripta extant capite
Suppres- de apoplexia) & alia pleræque hoc capite secundo, & quarto ge-
sa urina nere remedium explicata, maximo adiumento erunt. Suppressio
curatio. urinæ curatur iis, quæ diximus in extremo capite de curatione
 phrenitidis, & iis quæ dicenda sunt c. xlvj. huius morbi proprio

Scholium.

Circa Lethargus, quem Latinorum.] Lethargus ex sententia mul-
lethargi torum fit ex pituita non putri irrigante cerebrum, Qui ducti
essentiã sunt in hanc sententiam ex Gal. 1. Protre. par. 1. com. 1. ubi scribit,
refutan- Lethargum tunc contingere, cum pituita diluerit & humectauerit
zur. cerebrum. Hi errant, ut ostendit febris, qua comitatur Lethargum,
 qua sine putredine pituita excitari non posset, cum pituita humor
 frigidus sit. Neque Galeni locus eis fauet, quia etsi in eo pituitam
 madefacere cerebrum scriptum sit, intellige tamè ita madefacere, ut
 simul putrescat. Quod ei contingit, cum tumorè efficiens inculcatur,
 ut prohibitã habeat transpirationem: hoc ex eodem loco colliges, ubi
 Gal. phrenitim ait fieri, cum bilis locũ, in quo princeps anima pars
 residet, prehenderit: non enim inde rectè colliges, bilem sine putredine
 phrenitim efficere. Quod autè in lethargo pituita putreat Gal. 13.
 meth. c. 21. nos docuit. ubi noxium humorem, qui citra febrem altos
 innuehit sopores, in apoplexia, & cathoco reperiri scribit: humorè verò
 putridũ cum febre in lethargo. Quod autem tumorè efficiat pituita,
Lethar- eodem lib. c. 20. videbis: ubi Gal. Lethargum vitium contrariũ phre-
gus sym- nitidi secundum speciem esse affirmat, atque hac est causa, cur in
ptama principio similia postulent remedia. Lethargus est symptoma in
est. actione principe læsa, est enim abolita memoria, & ratiocinatio in-
 firma: sic & imaginatio. Qua in parte duos practicoꝝ errores
 collige,

collige, primum auctoris Rondoletij & aliorum lethargum diaidē. Duopra-
sium in lethargum morbum, & lethargum symptoma. Si enim est cūtorum
actio lesa, quomodo erit morbus? secundum auctoris, & aliorum errores.
etiam, qui ex phrenitide, cū in ea multum refrigeramus cerebrū,
lethargum fieri dicunt. Si enim somnus ille fit refrigeratione cere-
bri, & non ab œdemate, quomodo erit lethargus? Obiiciet nobis ali-
quis, in lethargo nōne pituita putrescens calore concipit, quomodo
ergo inclinationem ad somnum generat? Respōdeo, lethargus est in-
temperies cum affluxu humoris. Hic autem humor totus nō putret, Morbus
sed aliqua eius pars, reliqua suam seruat naturā. Pars qua putret, in le-
vapores mittit ad cor paucos, & nonnil calidos, indeque ortum ha-
bet in lethargo febris lenta. Reliqua verò pars, qua non putruit,
somnum inducit refrigerando, & humectando cerebrum: hac enim
ratione densatur, & spiritus animales incrassantur, quo tempore li-
berè facultas non potest alterare, ut ex 13. method. cap. 1. colliges.

Secundò auertentibus.] Cū lethargus sit tumor prater na- Sanguis
turam, postulat in principio reuulsionem, & euacuationem: quod nis mis-
commodè prestat sanguinis missio ex cephalica, quia rectitudinem sio.
seruat cum loco affecto, & hac ratione citò & multum euacuamus.
Neque est quod timeamus cerebri refrigerationem, cū caleat à
febre, & ab humore putri.

Tertiò repellentibus.] Repellimus in principio eo modo, quo Repellēs
diximus superiori c. Aliqui diuidunt medicamentum repellens in medica-
illud quod verè repellit, quale est oxyrrhodinum, & in illud, quod mentū.
impropriè repellens ab ipsis nominatur, eo quod unā cum frigidita- Refutā-
te habet aliquam caliditatem, quale est illud, quod c. de phrenitide tur qui-
descripsimus eo contextu qui habet. Quintò digerentibus, &c. Hec dam.
tamen diuisio ad libitum est ficta, cū calidum non repellat, adde
in principio inflammationis calorem nullum habere usum: dices
posse nos miscere calida ob penetrationem: neque propter hanc cau-
sam licet, cū acetum frigidum existens id præstet.

Quartò vacuantibus materiam.] Cū medicamentum pur- In le-
gans non educat humorem in tumore inclusum, sed eum qui est in thargo
venis, omittendum est, in declinatione ergo lethargi euacuandus est non pur-
humor à capite discutientibus, qua aliquantulum vehementia de- gandū.
bent esse ob humoris crassitiem: huiusmodi sunt oleum rutaceum, de Discu-
ssica, unguentum Aragon, & Marciat. Vtemur medicamento pur- tentia.
ganti, quod per nares (errhinum dicitur) euacuet attrahendo, ut est
euphorbium, helleborum album & alia mitiora, qualis est succus
beta, aut per os (apophlegmatismus appellatur) quod præstabimus
ungentes palatum hiera simplici: vel cum ea aliquid ex euphorbia
miscentes, medicamentum etiam masticatum utile erit. Capiti pi-
leos applicabimus ex rebus calidis mastiche satureia, cariophyllis,
corticibus

DE CVRAND. MORB.

corticibus citri, ruta, thymo, his pulueratis, & cum 3. ij. pliris arcon. Nicolai permixtis. His enim cerebrum corroboratur, & humor discutitur. Aut sacculos discutientes bregmati appone.

**Somnus
quid.**

**Aliqui
taxan-
tur.**

Quintò per ea.] Somnus naturalis à cerebro fit: hoc enim, cum requiescere vult, aut spiritus reficere, somnum inducit animalibus, primo de caus. symp. c. ult. Est ergo somnus naturalis quies facultatis animalis à cerebro inducta. Quies non est omnimoda, sed per quietem intelligit Gal. remissionem facultatis, reuera enim tempore somni descendit ad instrumenta sensus & motus, sed minor. Hac autem remissio à cerebro efficitur: unde malè Arist. humiditatem constituit causam somnam efficientem, cum ipsa potius sit causa iuuans: hoc superiori loco significauit Gal. Sic enim habet cerebrum cum quiescere vult somnum inducit, praesertim cum altrix in eo facultas humiditate fuerit instaurata. Malè etiam Argentorius somnum dixit fieri à reuocatione caloris natiui, eo quòd hic est instrumentum commune, cum instrumentum facultatis animalis sit spiritus animalis, & somnus in cerebro fiat. Maiorem videtur habere difficultatem locus Gal. 3. de caus. pul. cap. 9. ubi scribit, somnũ fieri cum natiuus calor ad alimentum se conuertit: huic tamen loco satisfacimus dicentes Gal. in eo non tradere causam somni, quam cerebrum esse docuit: sed tradere id quod in somno contingit, in eo enim fit reuocatio caloris consentiente facultate vitali, facultate animali: ut colligo ex 3. de caus. pul. c. 8. in somno hoc naturali facultates naturalis, & animalis roborantur: naturalis, quia calor reuocatur, animalis, quia quiescit ab opere. In eo verò somno, qui praeter naturam est, cum calidum innatũ longo tempore priuetur motu ad exteriora, & perseuerantem seruet motum ad interna, suffocatur. Ac proinde huic symptomati occurrere oportebit. Est autẽ somnus praeter naturam lógus, & qui difficilem habet expergesactionẽ. Fit autẽ à frigiditate, & humiditate. Humiditas enim grauat cerebri facultatem. Frigiditas verò, ut diximus, stupidũ reddit cerebrum, ipsum condensans, & incrassat spiritus animales, & hac ratione impedit alterationis descensum. Excitabimus ergo ex hac frigidityte & humiditate dormiẽtes: calidis & siccis, & attenuantibus pituitam, & discutientibus eam id praestabimus decoquentes saturciam, rutam, thymum & alia cum aceto, & naribus inspirantes vaporem Bregmati adhibebimus unguentum, ex oleo rutaceo, castorei, succo seilla cum cora constructum. His tamen medicamentis utere in augmento, non in principio, ne attrahas ad partem affecta.

**Somnus
praeter
naturã.**

De Vertigine. CAP. VI.

**Descri-
ptio.**

CVM in morbo obtenebrationes, hebetudinẽsque oculis obuersantur, & omnia rotari & circumferri videntur, malum

malum illud est, quod Latini vertiginem, Græci verò scothoma appellant. Valeant ergo barbari, qui nodum in scirpo quærunt, scotomiam à vertigine differre volentes. Nam si discrimen vllum ponendum sit in affectione, non in omnibus erit constituendum. Vnde Gal. 4. de rat. victi. in morbis acutis, commentario 43. differre inter se dinon, & scodinon autumat, cum enim caput circumagi videtur, dinon id est, vertigo vocatur affectio. Cum autem & præter id, tenebricosus fuerit aspectus, scotodinos, hoc est tenebricosa vertigo dicitur. Fit autem ob inordinatam spiritus flatusi motionem, qui vel in capite generatur, vel sursum ex infernis extollitur partibus. Qui præter ea, quæ dicta sunt, plura de vertigine volet cognoscere, adeat Gal. loco superius citato, & 3. de loc. affect. nobis enim breuitatem affectantibus hæc satis sunt.

Curatio non potest esse eadem in omnibus, semper tamen, quæ humores, & spiritus immobiles reddunt, conferunt: ut in accessione. aër temperatus, aut frigidus, & obscurus, quies, cibus frigidus, & astringens, excepta vertigine, quæ à pituita fit, quæ calidis indiget cibus. Sit quoque tenuis victus, quia morbos ex repletionem (cuiusmodi est apoplexia) gignit, nisi ex coitu, & fame fiat, in quibus cibi boni, & multi sanguinis sunt necessarij. In omni vertigine nocent alimenta difficilis concoctionis, & vaporosa, & rerum aspectatio, quæ in orbem torquentur, ante quæ celeriter mouentur, despiciere ab alto, & ambulare per loca periculosa. Ira, tristitia, & timor maxime nocent. In initio mensæ, quæ aluum molliunt, ut pruna damascena, passæ vuæ sine granis, sunt comedenda; in fine, quæ os ventriculi astringunt, & impediunt ascensum vaporum: ut caro malorum cotoneorum condita, aut coriandrum præparatum. Potus sit aqua ex cinnamomo, & aqua mellis, aut aqua decoctionis coriandri, si fuerit à causa calida. Vinum non bibat, nisi habeat ventriculum imbecillum, aut sit totius corporis defectus. In accessione quies est necessaria, & frictio partium infernarum, & odor rosarum, myrti, & similium, quæ spiritum animale quiescere faciunt. Si verò accessio fuerit magna, aut longa, vacuatio per acrem clysterem, aut glandem fiat, de quibus capite de epilepsia, aut apoplexia dicemus. Aliquando in ipsa accessione est necessaria sanguinis missio per venæ sectionem, vel per cucurbitulas cum scarificatione, ne transeat in epilepsiam, aut apoplexiam. Extra accessionem, quando est ex sanguine præcedenti debita ratione victus iam dicta, fiet sanguinis missio per sectionem venæ axillaris aut mediæ, si sit magna plenitudo; deinde concoquatur

DE CVRAND. MORB.

Purgatio. **Refrigeratio, & corroborantia.** quatur bilis per duos, aut tres dies syrupo rosarum cum decocto coriandir. Post hæc euacuetur bilis hoc, aut simili medicamento. ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. ss. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iij. ss. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ quod s. misce, & fiat porus: vel fiat vacuatio per ʒ. j. pilularum de rhabbaro: vltimò fiat corporis refrigeratio, & partium corroboratio per electuarium diarhodon Abbatis cum syrupo rosarum, aut aqua frigida, & astringente: & hepar vngatur ceroto santalato.

Ex bile flava. Quando fit à bile flava, eadem est curatio dempta sanguinis missione, quæ aut non fit, aut si fiat, minor copia sanguinis in hac, quàm in sanguinea extrahatur.

Ab atra bile. Ab atra bile rarò, aut nunquam fit: si autem fiat, inquire eius curationem capite de curatione melancholiæ. Quum est **Per consensum.** per consensum ventriculi, à quo sæpe nasci solet, vomitus statim est utilis, quem concitat decoctum seminis raphani, aut anethi, **Vomit.** aut triplicis cum syrupo acetoso, s. aut maiori, vbi opus est oxymelle. s. aut cum vncia vna oxymellis scillitici. Rarò in hoc morbo convenit vomitorium potentius, quia nocet commotio

Euacuatio. magna. Deinde euacuetur humor, qui est in ventriculo, per propria medicamenta purgantia præcedenti concoctione per rhodomel, aut syrupum de hyssopo, aut oxymel compositum cum decocto, aut aquis conferentibus. Hiera. s. aut pilulæ elephanginæ, aut agaricus trochiscatus aut diaphænicum, aut pilulæ stomachicæ optimè euacuant materiam detentam in ventriculo.

Corroboratio. Tandem quæ ventriculum corroborant, conferunt, siue sint interna, siue externa: de quibus cap. de curatione imbecil. ventriculi satis copiosè dicemus. Mica panis cum succo malorum cotoneorum sæpè comesta ventriculo vacuo vertiginem tollit.

Si fiet per consensum vteri, aut aliarum partium, suis in locis patefiet curatio.

A pituita. Quando est à pituita (à qua fit sæpe) post victum tenuem & calidum, secundo, decoquatur pituita per medicamenta dicta cap. j. incipiendo à mitioribus: vt est rhodomel, vsque ad valentiora: vt sunt oxymel compositum, syrupus de quinque radicibus, & oxymel scilliticum cum aquis, aut decoctis conferentibus.

Victus. **Concoctio.** **Purgatio.** **Observatio.** Tertiò, vacuantibus pituitam curatur, qualia sunt: agaricus, turbit. Hiera. s. & comp. diaphænicum, electuarium indum, & pilulæ de agarico, & alia multa dicta cap. j. Sed quia hic morbus diuturnus esse solet, multis purgationibus est utendum, sumpto initio à leuioribus ad valentiora, præcedente semper concoctione apta, & debita. Hoc medicamen-

tum

rum est medium. ℞. diacatholicon. ʒ. ʒ. Agarici trochiscati ʒ. j. diaphanicon ʒ. iij. ʒ. rhodomellis ʒ. j. decocti saluæ. quod s. *Pilula*
 misce, & fiat potus. Hæ pilulæ sæpe deuorantur, sunt efficaces. *nobilissi-*
valenque plurimum ad affectum hunc tollendum, & radicitus me.
 euellendum, caput & omnes sensus confirmant. ℞. nucis mu-
 scatæ, cubebæ, caryophyllorum, xyli aloës, mali ic his an. ʒ. j. cardamomi, spicæ, seminis maioranæ, rutæ, præoniæ, siseleos, zin-
 ziberis, asari, piperis an. ʒ. ʒ. agarici electi ʒ. iij. colocynthidis. ʒ. iij. myrobolanorum chebulorum ʒ. ij. serapini, hellebori an. ʒ. j. salis gemæ, nitri an. ʒ. ʒ. aloës hepaticæ pondus duplum, fiant pilulæ cum benedicta. Harum dosis est drachmæ vnus, & in vsu frequenti scrupuli vnus. Vacuatio per loca propin- *Deriva-*
 qua, videlicet per nares, & palatum est necessaria in formis di- *tio.*
 nerfis, de quibus dictum est cap. de cephalalgia pituitosa, & cap. de lethargo. copiosius tamē dicemus de eis cap. de apoplexia, vbi nomina omniū harū formarū, & barbaræ, & Latina indicabimus.

Vltimò, euacuanda est, & resoluenda materia capitis per in- *Resolu-*
 terna, & externa medicamenta, & cerebrum corroborantia: vt ʒ. *tio, &*
 j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut diatrion piperon, aut dia- *corrobo-*
 galangæ multis diebus sumpta cum ʒ. j. aquæ saluæ, aut sti- *ratio.*
 chados, aut toris marini, aut similis naturæ capitalis in forma aquæ, aut decocti, aut syrupi. Ceruix & caput vngatur oleo ru- *Topica.*
 tæ, aut laurino, aut costino aut ex castoreo. Emplastrum ex ruta scilla, serpillo, satureia, & cepa cum melle, & oleo camomillæ confectum capiti raso admotum cum lana succida omnem ver-
 tiginem tollit. Quidam laborans vertigine antiqua, post vacua- *Exem-*
 tionem per pilulas cochias curatus fuit lotionē assidua capitis *plum.*
 rasi decocto camomillæ, & rosarum. In diuturna vertigine, & fermè incurabili est summum auxilium venas non pulsatiles post aures abscindere. Quorundam experientia probatum au- *Exem-*
 xilium est cauterium prædictarum partium. Passus est quidam *plum al-*
 vertiginem propemodum insanabilem, amisso fere sensu cap. & *terum.*
 cum immenso stupore ob frigus intensum, & post multa reme-
 dia, quæ nihil profuerūt, cataplasinata ex sola vrtica toti capiti raso per noctem admoto curatus est, factus postea multis am-
 pullis plenis aquosa pituita, à quibus multa emanauit pituita.

Scholium.

Cum in morbo obtenebrationes.) Cum visa iudicamus cir- *Vertigo*
Cum molui, symptoma hoc à Græcis dynos, à Latinis vertigo di- *quid.*
 citur. 4. acut. com. 42. cum autem tenet rictosa simul coram oculis
 apparent cum visus amissione, scotodino dicitur affectio, à latinis
 e vertigo

DE CVRAND. MORB.

vertigo tenebricosa. 4. aphor. cum. 17. prædictæ duæ affectiones ratione maioris & minoris distinguuntur: tenebricosa enim vertigo maiorem causam arguit, nempe bilem adustam. Vertigo aliquando è febrilis euenit. 4. acutorum sent. 42. conante natura humores euacuare, de qua non agimus modò: sed tantùm de ea, quæ citra febrem contingit. Quæ vel fit ex proprio capitis affectu, vel per consensum. Per proprium affectum fit, cum humor, qui causa est vertiginis, est in cerebro. Id deprehendes ex eo, quòd nullius partis affecta signum apparet. Per consensum, cum à ventriculo, utero, alia parte est prima mali origo, ut ex signis affecta partis cognoscere poterimus. Vertigo est symptoma in actione laesa, deprauata scilicet imaginatio, quæ rem quietam circumuolui indicat. Hoc symptoma ex alio sequitur, quod est vitium excrementi, cum inæqualiter mouetur spiritus flatulentus in capite. Vnde intelliges non rectè colligere Lupeium ex 4. acut. com. 42. ex sola ventriculi vellicatione fieri vertiginem: reuera enim illa vellicatio ex humore fit, ex quo excitati vapores vertiginis sunt causa. Neque existimandum est, ut ferè omnes scribunt, vertiginem tunc fieri, cum spiritus flatulentus in cerebri ventriculis inæqualiter mouetur: sed opus est, ut ille spiritus causa descendat ad oculum, & ante humorem crystallinum motum illum motus exerceat: aliter enim non apparebunt res in gyrum moueri. Causa spiritus istius motus aut est externa, ut motus in gyrum, & vini potio: aut interna, quæ, ut diximus, vel est in capite, aut in alia parte. Morbus, ad quem sequitur vertigo, est intemperies frigida, in qua diminutus calor flatum excitat.

Vertigo à causa frigida fit. Extra accessionem quando est ex sanguine.] Cum omnis vertigo fiat à causa frigida 4. acut. com. 42. quia à calore diminuto spiritus eleuari solent: difficile certè videtur quæ ratione plethora vertiginis causa sit, nisi dicamus id fieri, eò quòd à plethora fiant interceptiones venarum, hoc est repletiones, à quibus solet calor obui, & spiritus non rectè diffilari, cum in vertigine sanguinem mittimus, Aetius præcipit euacuationem acervatim non esse faciendam, quia vertiginosi facile concidant: quod non erit seruandum, cum sanguinis missio iacente homine exercetur.

De Epilepsia, seu morbo Comitiali.

CAP. VIII.

Descriptio. **M**ORBUS comitialis (quem epilepsiam Græci vocant) concussio est omnium corporis partium non perpetua, ut in emprosthotano, opisthotano, & tetano conuulsionis speciebus, sed temporum interuallis accidens: neque hac solùm se ab illis differens, sed mentis quoque, ac sensuum obliuione: ut auctor est Gal. lib. iij. de loc. affect. cap. v. Cuius tres sunt differentie,

Diuisio.

rentiæ, quarum prima in cerebro per primatim affectionem fit: secunda per consensum ab ore ventriculi: tertia, quæ tamen & ipsa raro accidit, cum à parte aliqua incipit affectus post sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit: ut in eo puero accidit, è cuius crure velut frigida quædam aura per coxam, & lumbos in caput tendens quotidie cerebrum afficiebat: visus quoque est (autore Paulo) morbus comitialis ab utero in quadam muliere, quo tempore uterum gerebat, qui post edito fœtu quieuit. Omnibus tamen his formis commune est, quod cerebrum afficitur. Fit autem hic morbus à crasso humore pituitoso, aut melancholico, spiritus animalis meatum, qui in cerebri ventriculis est, obstruente. Cum verò per sympathiam, quis laborauerit, simile quiddam cerebrum patitur, ventriculo à re aliqua infestato: nam ut singultire hunc cernimus quoties aut ciborum mole grauatur, aut putres humores ipsum infestant, ita etiam & neruorum principium concuti credibile est, ut à se expellat, quicquid sit, quod à parte primò affectu ad ipsum effertur. Præcedit hunc morbum mœstitia corporis, atque animi inconstantia cum motu minimè voluntario, eorum quæ perceperunt, obliuio, insomniorum visiones turbulentæ, dolor capitis & faciei pallor: lingua præter hæc, inordinate mouetur, quam etiam nonnulli mordent. Inuadente accessione statim cœcidunt, conuellunturque, nonnunquam stertunt, & circumaguntur. Præcipuum verò, ac maximum signum est oris spuma: nam cætera communia sunt & in aliis morbis. Obnoxij huic morbo ante omnes sunt pueri, & inter hos recens in lucē editi, post hos adolescentes, ab his ætate constantes, omnium minimè senes & decrepiti. Hæc affectio proxima est apoplexiæ, cum idem locus utrobique laboret & idem humor in causa sit: verum apoplexia ob omnimodā carentiam illius potentiae, quæ ad neruos defluit, morbus autem comitialis, propter motum vitiosum generatur, ut habet Gal. ij. aph. com. xlv.

*Causa.**Causa humoris biliosi per sympathiam.**Signa.*

Morbus comitialis, si hæreditarius fuerit non suscipit curationem: si non fuerit hæreditarius, & cerebrum primò afficitur, difficilis est curatu: præfertim si æger sit natus xxv. annum, affectusque fuerit ante illam ætatem simili, aut eodem morbo. Infans recens natus (cuius multi fratres in eadem, aut simili ætate perierunt epilepsia) præcedenti prius optima præuisione in victu materno, si ante primam lactationem parum huius mixturæ acceperit, liberabitur à futura epilepsia. ℞. sacchari optimi bene puluerizati ℥. ij. olei sisamini recentis, aut amygdalarum dulcium quod s. misce, & fiat confectio ad modum loch: quæ non solum ante primam lacta-

*Curatio**Infantium cum**ratio**preseruans.**Victus.*

DE CVRAND. MORB.

tionem, sed multis diebus e& sumenda, semper tamen ventriculo vacuo. Aliqui loco olei ponunt butyrum recens, purgat hoc medicamentum prauos humores ventriculi, & intesti-
norum, à quibus pravi vapores ascendunt, epilepsiamque efficiunt. Paulus Aegineta infanti nato ante lac exhibet mel. Nostræ scēminæ Valentinae consilio medicorum ante lac etiam primum exhibent cum melle parum decocto puluerem radiceis pæoniæ, & fel testudinis, aut parum limoniatae smaragdorum.

*Duo me-
dicamen-
ta præ-
stantis-
sima.*

Ego sequutus multorum experientiam hæc duo medica-
menta summopere laudo, primum bis, aut ter in die sumptum,
alterum verò semel in hebdomada: hæc enim corroborant ce-
rebrum, nervos & ventriculum, & purgant ab eisdem parti-
tibus. ℞. limoniatae smaragdorum. ℥. ij. pulueris radiceis pæo-
niæ maris, & seminis eiusdem an. ʒ. j. coralli rubri præparati
ʒ. ij. visci quercini, & cranei humani puluerizati an. ʒ. ij. pul-
ueris vermium rubi, & succi rutæ an. ʒ. j. corn. cerui vsti &
vnicornis an. ʒ. ij. pulueris pullorum hirundinis adustorum ʒ.

*Clyster
in acces-
sione.*

℞. rhodomellis, aut syrupi de hyslopo quod s. misce, & fiat
confectio: ex qua sæpe accipiat infans quantitatem vnius ca-
staneæ ℥. Hieræ picæ. S. ʒ. ij. agauri trochiscati ʒ. iij. rho-
domellis ʒ. iij. misce, & fiat confectio. Dosis semel, aut bis in
hebdomada cochlearium vnum. Aliquando est necessarius hic
aut similis clyster præsertim in accessione ipsa. ℞. decocti ru-
tæ, saluæ, & roris marini an. ʒ. iij. ℞. olei rutæ ʒ. j. ℞. hieræ

Glādes.

logodionis ʒ. iij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. Glandes, seu
suppositoria hæc & similia sunt optima: pulueris hieræ picæ.
S. ʒ. iij. salis gemæ ʒ. ℞. mellis quod sufficit, misce, & fiant
duo suppositoria, aut tria. In ipsa quoque accessione frictiones
extremorum, vincula dolorifica & cucurbitulae scapularum

*Auertē-
tia, &
reuel-
lencia in
accessio-
ne.*

sine scarificatione ante primum annum, & post eum scarifica-
tione maximè conferunt. Curantur quoque infantes hoc labo-
rantes morbo cauteriis paruis auribus, & superiori parti cer-
uicis, quam nonnulli nucam appellant, admotis. Radix pæo-
niæ maris secta ad modum coronæ collo appensa præseruat ab
epilepsia.

*Diligen-
tior cu-
ratio, in
gratiam
Valenti-
norum.*

Eandem aut similem vim habet corallium, aut lapis sma-
ragdus, aut hyaspis viridis. At quia infantes, & pueri in no-
stra vrbe Valentia sæpe laborant hoc morbo, & percutunt, præ-
ratio, in ter dicta in curatione, & præseruatione eorum, his decreui
gratiam alia non pauca addere. De infanti summo mane postposito
Valenti- lacte, saltem iij. horis, quantitatem vnius ciceris huius mixtu-
norum. ræ, & liberabis eum ab epilepsia, Deo fauente. ℞. succi rutæ
coch

cochlearium vnum, folia auti numero v. lapidis smaragdi preparati ḡ. x. misce. Eandem, aut maiorem habet facultatem notum Plinij auxilium, quod affert Antonius Carthaginensis, vermiculorum lanuginosorum in rubo reperorum, quorum tres aut quatuor lacte, vel aqua mellissæ simul deuorentur Prodest mirum in modum infantibus hoc medicamentum, accipe cepæ album perforatum, plenum theriaca magna, & croco, decoctum in furno, & ab eo exprimatur succus: cochlearia tria bibat infans, reliquum in forma emplastri ventriculo impone. Confert quoque multum huic infantili morbo 3. j. frequenter sumpta hieræ. S. cum decocto roris marini, aut sal- *Syrupus.* uiæ. Summè prodest huic morbo puerorum, ventriculo mundificato cochlearium vnum huius syrupi. ℥: florum buglossæ, borraginis, rosarum, radicum, & seminum pæoniæ, gentianæ, limaturæ eboris, vineæ an. 3. ss. cranei humani 3. ij. croci ḡ. x. fiat decoctum in libris iiij. aquæ ad medietatem, de quo colato accipe libram vnam, & cum saccharo sufficienti fiat syrupus.

Si morbus comitialis fiat ex lacte in ventriculo infantum *Si ex la-* coagulato, à quo symptomata veneni generantur, hoc cata- *de coa-* plasma ventriculo bis aut ter admotum deiicit ventriculi re- *gulato* pletionem. ℥. foliorum vlmī p. iij. decoquantur in vrina pue- *in ven-* rorum & cum vncijs duabus butyri fiat cataplasma: paris, aut *triculo.* maioris facultatis est hoc. ℥. foliorum maluarum, absinthij, & vlmī an. p. ij. decoquantur in vrina hominis, & cum vncijs duabus butyri, & fermenti, & 3. j. olei nardini fiat cataplasma: quod ter admoveatur ventriculo ante, & retro. Sal cum melle *Sal cum* deiicit ventriculi repletionem, siue sit ex lacte coagulato, siue *melle.* corrupto, vel ab alia causa, auctore Gal. v. de sanit. tuenda, & iiij. de facultatibus alimentorum, cap. 14. Si mel & sal lacti miscean- tur, ipsius in ventriculo coagulationem impediunt, fallitur ergo *Error* Auicenna fen. 6. lib. 4. tr. 2. c. 21. de congelatione in stomacho, *Auicen-* dicens sal ita lactis coagulationem, vel (vt ita dicam) cascatio- *na.* nem efficere.

Si superioribus non euacuatur lac concretum in ventri- *Potio-* culo, neque eius symptomata finiuntur, præbe infanti 3. ss. *nes.* coaguli hædi, aut leporis, cum aqua pauca calamenti. Aut da, præsertim grandioribus hanc potionem. ℥. Pulueris calamenti 3. j. theriacæ magnæ, & coaguli hædi an. 3. ss. aquæ rubæ tinctorum 3. j. syrupi acetosi. S. 3. ss. misce. Hæc coagu- la, quamuis lac coagulatum non sit, id coagulant, coagula- tum verò dissoluunt, & per inferiora, aut per vomitum de- pellunt, quemadmodum theriaca magna veneno affectos

DE CVRAND. MORB.

Vis the- (teste Gal. in libello de theriaca ad Pisonem) nocet pueris, præ-
riaca fertim calidis, quia superat vires caloris naturalis, & spiritus
magna. infantium, & multum lætificat, & cordis spiritus dissoluit: mix-
ta tamen cum aliis, & eius parua quantitas dari solet audacter,
præsertim in hoc morbo mortem denuntiante.

Fœmina Valentina Valentinae fœminæ ad deliciendam ventriculi infantium plenitudinem, & cruditatem, exhibent mixturam seminis sinapis, milij & sesami cum rhodomelle, & oxysaccara composita, has non damno. Aliæ eis dant pulverem contra indigestionem, qui vulgò dicitur, la Pellejana, quia eius inuentrix fuit fœmina

Pellejana dam- Valentina dicta Pellejana: constat medicamentis calidis, & ferri fœce, quare has minus laudo. Aliæ præbent eis succum bursæ pastoris, quæ à Valentinis nominatur paxeripeu, hoc medicamentum restringit, & non purgat, nisi per accidens, ideoque has damno. Aliæ homicidæ imprudentes infantibus, ex-

Bursa hibent cerussam, aut argentum viuum, aut minium, quod medicamentum Betici vulgato proverbio derident. Aliqui phar-

Aduer- macopolæ eos interficiunt medicamentis valenter purgantibus, quos summè reprehendo, & pœna capitali dignos censeo.

te in pharma- Aliquando infantes afficiuntur capitis vlceribus manantibus, & *copolas.* tumoribus aurium, & mandibularum: & aliquando per nares, & palatum mucorem, & excrementa pituitosa depellunt: per has enim vias cerebrum, & nervi deponunt excrementa, quæ re-

Error tenta parere solent morbum comitiale. Quare errant imperiti medici, & fœminæ, dum hæc curare nituntur. Possem ego *emper-* in præsentia exempla aliquot adducere, sed brevitatis causa *eorum.* prætere.

Gran- Si fuerit æger grandior iam factus, in ipsa accessione summo studio oportet statim eum excitare, ne pereat subito, aut *diorum* in apoplexiam incidat: semper tamen considerandum est, an *curatio.* fiat per consensum ventriculi, aut aliarum partium: ut medicus possit iis patribus prius medicinam facere, de quibus suis locis dicemus. Quæ verò solent laborantem ex accessione excitare, & liberare, sunt vineula extremorum dolorifica, frictiones etiam illarum partium cum sale, & aceto, clysteres acres, & suppositoria valentiora, de quibus cap. de apoplexia loque-

Auer- mur: voces & strepitus magni excitant, quamvis maximi, & *tentia.* repentini soni extra accessionem eam inducere possint, & aliquando mortem inferre, ut contingit filio Matthæi de Gradi, *Exem-* repentino tubarum clangore. Conferunt quoque in ipsa *plum.* accessione in conspectum ægri illata magna lumina subito capite,

& corpore ægri erectis, & apertis palpebris. Si vinciantur dolorificè testes ægroti fiet proculdubio, vt ab epilepsia excitetur. Hoc quoque medicamentum sæpe naribus admotum idem efficitur solet: ℞. succi Cyclamini, pulueris seminis rutæ, & coaguli leporis an 3. ij. mouet enim sternutationem, & excitat: sed prius scindenda est vtrique humeralis, vel inter scapulas per cucurbitulas cum scarificatione sanguis est mittendus. Quod si prædictis non liberatur ab accessione, naribus impone sæpe parum huius pulueris: ℞ hellebori 3. j. castorei, euphorbij, condisi an. 3. β. misce, & fiat puluis.

Ioannes Agricola in lib. quem de Herbis inscripsit, cuiusdam aquæ meminit ex cerasis, quam etiam multi experti sunt, ipsius verba subiiciam. Ex cerasis distillata aqua certissimum statim affert remedium, cum primum in os epileptici iam paroxismo correpti inditur. Vnde illico reuiuiscit, & eodem temporis puncto surgit liberatus, neque vlllo spasmo amplius conuellitur, donec per clementum noua materia aucta, vt fieri solet, alius paroxysmus oriatur. Elicitur hac arte in vas exstillationi accom modum, imponuntur cerasa non multò antè decerpta, adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa contenti ex igne mediocri eliquatio, quem diligenter, vt rem pretiosam, atque ære multo redimendam, curabis asseruandam, de quo in os epileptici paroxysmo laborantis coeffundas 3. iiij. aut plures, & statim inhibebis impetum violenti morbi. Considerabis tamen ex tribus cerasorum generibus, ea esse ad hanc distillationem eligenda, quæ Valentinis dicuntur reginalis, dulcia quidem illa plus quàm alia duo genera, quorum alterum magis rubrum, alterum magis nigrum.

Extra accessionem si fiat à pituita, à qua ferè semper dependet, curatur quinque auxiliorum generibus. Primò victu calefaciente, & exsiccante, vt aëre, natura, aut arte parato, zinzibere, cinnamomo, caryophyllis, rore marino, stæcade, & similibus igni appositis, dummodo hæc non moueant, & detegant epilepsiam, qualia sunt pellis caprina, odor hepatis caprini, & suffitus cornu illius, lapis gagares ignitus naribus subiectus conuulsionem concitat. Hoc quoque facit suffitus sulphuris, apium, vt multorum est sententia, quibus videtur Plinius assentire, epilepsiam detegit. Contrarium scribit Gal. libello de puero patiente morbum comitiale, si Galeni sit. Suffitus ex galbano, & odor myrrhæ epilepsiam mouent, præsertim corpore non euacuato, quamuis nonnullis displiceat, cum apud eos, maximè huic morbo conferant, præsertim in declinatione. Dioscorides tamen sentit

*Deriuā
tia.*

*Aqua ce
rasorum*

*Extra
accessio-
nem.
Victus.*

*Mouētia
epilepsia*

DE CVRAN. MORB.

myrrham calfacere, astringere, glutinare, exsiccare, & sopire: nonnulli sunt, qui affirmant prædicta & similia medicamenta in accessione ipsa conferre, & intermissione nocere, & detegere, ut dictum est initio huius capitis de theriaca magna, & de coagulo in lactis coagulatione. Cibus sit, qui bonum, & paucum, & calidum sanguinem efficiat, ut est ius pullorum, columborum agrestium cum ciceribus nigris, & paucopipere: & quia solet esse diuturnus hic morbus, & eget multis euacuationibus maiori nutritione & liberaliore opus est. Utatur ergo turtura, perdice, pullo gallinaceo, gallina tenera, lepore paruo, & cuniculo: semper tamen parum piperis, aut cinnamomi, aut zinziberis addatur: aut eruca, aut sinapi melle conditum. Car-

Qua no- nes arietinae sunt bonae, praesertim in Hispania: capita tamen
ceant. arietum & hircorum pessima sunt, reperitur in eis iuccus putridus male olens, à quo forsan fiet epilepsia. Coturnix noxia est in hoc morbo, & forsan Arabes loco eius perdicem scripserunt, quanquam apud eos aequè perdix & coturnix nocent, quia solent laborare epilepsia. Similiter anguilla, pisces, legumina omnia præter cicera, herbae frigidae, lacticia, & omnia vaporosa, & cepae, allium, & quae sunt difficilia concoctu maximè obsunt. Cæna sit minor prandio. Potus erit aqua mellis, aut cinnamomi. Si verò habuerit ventericuli imbecillitatem, bibat vinum optimum bene aqua dilutum per horam saltem ante potum. Immodica agitatio, & motus nocet praesertim à cibo, coitus quoque & animi perturbationes.

Potus.

Ruulsio. Secundò, sanguinis missione (praesertim si sint signa sanguinis cum pituita) per sectionem duarum simul humeralium, & extrahatur sanguis respondens plenitudini. Si aetas & virium robur absint, extrahatur sanguis per cucurbitas cum scarificatione ex scapulis. Si ex suppressis mensibus, aut hemorrhoidibus genitus est hic morbus, venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ, in vere tamè magis còuenit sanguinis missio ad præseruationem.

Praeser- Tertiò, còcoquentibus pituitam, ut rhodomelle, ozymelle, S.
natio. & comp. syrupo de hyssopo, de stachade, de duabus radicibus, oxymelle scillitico, cum aquis, aut decocto capitali: videlicet, saluiae, praeoniae, stachados, & roris marini, & similium. Hæc materia per multos dies est apparanda, primò mitioribus, secundò post primam purgationem mediis, tertiò post secundam purgationem valentioribus, & si opus fuerit, quarto & quinto.

Còcoctio

Purgan- Quarto, phlegmagogis, de quibus primo capite diximus,
tia. ut drachma vna hieræ. S. cum drachma vna agarici trochiscati facto potu cum decocto, aut aqua capitali, pilula elephanginae, de

de agarico, Hiera composita, benedicta, pilulæ mastichinæ, diaphænicon, electuarium vtrunque indum: pilulæ cochix optimè euacuant pituitam. His pilulis sine magna custodia vti poterit: ℞. pilularum cochiarum, agarici trochiscati, & pilularum assa-
iaretan. ʒ. ij. optimi diagridij. ḡ. xv. cum aqua pæoniæ fiant pi-
lulæ xv. & aurentur: ad vsum tres pro dosi: aut si magis amat
aliam formam: ℞. diacatholicon. ʒ. j. ḡ. diaphænicon ʒ. j. aga-
rici trochiscati. ʒ. ij. electuarij indi maioris ʒ. iiij, pulueris rosa-
tæ nouellæ ʒ. ij. rhodomellis, quod sufficit, misce, & fiat confe-
ctio. Dosis semel in hebdomada cochlearium vnum.

*Pilule
ad vsum.*

Quintò, resoluentibus materiam reliquam, & cerebrum cale-
facientibus, & siccantibus, & roborantibus, ne postea similè ma-
teriam generet: qualia sunt theriaca magna, mithrydatū, & dia-
muscus dulcis, & pliris arcoticon, & conferua acori veri: quorū
drachma vna multis diebus summo manè cum vncijs duabus
aquæ, aut decocti, aut syrupi capitalis sumatur, post primam &
alias purgationes maximum in hoc genere auxilium erit.

*Confe-
ctio.
Resolu-
tio.*

Sequens quoque confectio est optima in hoc genere om-
ni hora sumpta, præsertim manè: ℞. limoniatæ sinaragdo-
rum. ʒ. j. ḡ. diamusci vtriusque an. ʒ. ḡ. theriacæ magnæ ʒ. ij.
pulueris galangæ, calami aromatici, & radicis pæoniæ an. ʒ. iiij.
cranei humani ʒ. j. syrupi de stachade quod satis est, misce,
& fiat confectio. Hoc electuarium est mirabile: ℞. pulue-
ris rosatæ nouellæ, & aromatici rosati an. ʒ. j. ḡ. pulueris ca-
lami aromatici, & galangæ an. ʒ. ij. pulueris cranei humani,
& coralli rubri præparati an. ʒ. j. sacchari dissoluti in aqua
pæonitæ quod s. misce, & fiat electuarium in tabulis. Cura-
tur hic morbus radice eryngij cum melle condita, si multis
diebus comedatur: aut sequenti conferua: carnis radicis pæo-
niæ, & eryngij prius benè decoctæ lib. mellis quod s. misce,
& fiat conferua: adde pulueris galangæ, & calami aromatici,
& cinnamomi an. ʒ. iiij. Nicolaus Florentinus vir magni
nominis nostris temporibus curauit nobilem quandam xl.
annos natam, quæ ab infantia affecta fuit eodem morbo
(quod Gordonius tanquam difficile non credit) hoc medi-
camento: ℞. herbæ sancti Pauli, seu paralesis (hæc dicitur à
Gattinaria costus, seu pipella, & à Dioscoride Phlomitis, &
est verbasculum) m. iiij. & cum iusta mellis parte fiat confer-
ua, cuius cuilibet libræ adde pulueris caryophyllorum, py-
rethri, & radicis pæoniæ an. ʒ. iiij. Dosis est vnciæ ḡ. cum aqua
aut syrupo capitali. Vncia vna & semis aquæ herbæ prædictæ
cum pauco saccharo, si triginta diebus bibatur, curat hunc mor-
bum. Eandem habet vim oleum terebinthinæ, si in quantitate

*Confe-
ctio opti-
ma.
Electua-
riū mi-
rabile.*

*Radix
eryngij.
Confer-
ua.*

*Obser-
ua.*

DE CVRAND. MORB.

medij cochlearij sumatur. Drachma vna sequentis pulueris est eiusdem ferme facultatis. ℞. cinnamomi electi, galangæ, spicæ, nardi an. ʒ. ʒ. pulueris cranei humani ʒ. j. ʒ. misce.

Cauteria laudantur.

Scilla vis.

Confectio ex scilla.

Consilium.

Laudatum & expertum remedium in hoc sunt cauteria actualia, & potentialia futuræ coronali admota, euacuant à parte affecta. Probatum est aliquos epilepticos vulneribus capitis affectos, curatis vulneribus nunquam in morbum comitiales recidisse. Medicamentum ex scilla est in hoc morbo summum remedium, præcedenti tamen prius euacuatione consentanea, autore Gal. in libello de puero morbo comitiali laborante, quod omnes post Galen. experti sunt. Accipe cæpe narcissi diuisum in partes minimas, ponaturque in vase vitreo, in quo prius mel conseruatum fuerit, luto, aut alia re bene obturato, & per quadraginta dies caniculares soli exponatur, & singulis quibuscque diebus multum moueatur, & agitetur: quo tempore exacto, accipe liquorem ex scilla expressum, & cum sufficienti mellis quantitate fiat confectio. Cuius dosis in iuuenibus, & senibus sit cochlearium vnum in singulos dies: puerorum verò dosis à quarto anno vsque ad decimum quartum erit dimidium cochlearij. Infantibus recens natis vsque ad quartum, & quintum annum minimè conuenit: illorum enim ætas non fert huius medicamenti valentem facultatem: neque potest vacuationes necessarias prius tolerare. In periculosis remediis non laudo audaces medicos: hoc enim auxilio infantem, & canem recens natos subito mori vidimus.

Scholium.

Duobus modis fit Epilepsia. Vallesij lapsus.

Ventriculi qui obstruuntur in epilepsia.

MORBUS comitialis.] Cùm Galenus Epilepsiam appellat conuulsionem, nomine conuulsionis motum conuulsium intelligit. Epilepsia duobus modis fit; primo, proprio cerebri affectu, secundo per consensum: Vallesius lib. 13. de loc. affect. Omnem Epilepsiam ait fieri ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, ac proinde miratur qua ratione possit fieri per consensum. Non animaduertens solam eam Epilepsiam, qua est propria cerebri passio, à dictis humoribus fieri, eam verò qua per consensum fit à vapore, aut alteratione ad cerebrum ascendente, ipsamque irritante ad eius expulsionem. Est tamen aduertendum epilepsiam fieri tantum ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, non omnes, sed secundum aut tertium: nunquam enim fit, ab obstructione anteriorum ventriculorum: ratio est, quia in epilepsia debet impedi transitus spiritus animalis, quod in obstructione anteriorum ventriculorum non contingit. Ex his multorum errores effugies. Primo Rondeletij: qui

qui epilepsiam sentit fieri ex obstructione meatuum, qui in anterioribus cerebri ventriculis pituitam ad glandulam huic rei dicatam expurgant. Quoniam etsi demus talem obstructionem, & pituitam in anterioribus ventriculis detentam, cum non sit prohibitus transitus spiritus ad principium spinalis medulla, non sequetur Epilepsia. Secundus error est eiusdem existimantis obstructionem cerebri, qua Epilepsia causa est, à tenui humore etiam fieri: reuera enim hoc repugnat natura humoris tenuis, qui penetrare potest, & non obstruere. Tum hoc etiā repugnat curationi eius epilepsia, qua est propria cerebri passio ab obstructione pendēs: hac enim attenuantibus crassos humores, & incidentibus glutinosos perficitur, quorum nullum humori tenui conuenit. Tertius error adhuc maior est Ioannis Langij, qui sentit Epilepsiam aliquando fieri ab obstructione à vapore crasso orta. Qua enim ratione vapor impedit transitum spirituum? Epilepsia proximè accedit ad apoplexiā, eò quòd obstructio incepta facile poterit crasso humore addito perfici. Aduenit hac frequenter pueris, cum septimestres sunt, & perseverat. usque ad annos pubertatis. 2. aph. sent. 45. lib. 5. sent. 7. pueris aduenit frequenter ob voracitatem, & robur facultatis expultricis. Cessat autem in pubertate ob magnam mutationem, qua viris ab aetate & coitu contingit, mulieribus verò ex menstrua purgatione. Post pueros frequenter hoc malum adolescentibus euenit, omnium minimè senibus, quia cum languidam habeant expultricem facultatem, non facile mouetur ad expellendum rei alicuius molestiam, quod Lupeius non animaduertit.

Morbus comitialis si hæreditarius.] Cum sani homines sanos, & agri agros generent: Epilepsia hæreditaria erit, cum patre, aut matre ea affectis, filius imbecillitatem capitis contrahit: hæc (quæ uis ab autore incurabilis fiat) curari potest roborato capite, & optimo victu. Preseruantur ab ea pueri, quorum fratres simile malo perierunt, melle cum pauco fœniculo cocto & despumato, & postea permixto cum oleo amygdalarum dulciū. Mel enim cum fœniculo attenuat crassos humores, & eos cōcoquit, oleum verò amygdalinū fluidam aluum seruat. Præterea ex medicamentis, qua laudantur ab autore, primum exhibendum non est: quia si pueri exiguum alimentū, etsi familiare, non possunt ferre in ventriculo, quæ ratione medicamentum ex tam variis & multis inutilibus rebus commixtum ferre poterunt? Præsertim cum supradictum ex melle medicamentum id efficiat. Tum si in officinis habemus paratos syruos pituitam incidentes & melancholiam attenuantes, ad quid crancum humanum, smaragdus puluis vermium rubi, & similia? Certè hic, & similes viri cum ad manum habeant medicamenta, ut admirationi sint, ad ea quæ difficulter parantur, & cum mi-

DE CVRAND. MORB.

nori utilitate, ne dicam incommodo confugiunt. Secundum medicamentum auctoris, si in ventriculo non sit pituitosus humor collectus, optimum est. Tertium vero, quod incipit, ℞. succi ruta, est omitendum: in eo enim auri folia inutilia, & smaragdus maxime laedens obstruendo, & incrassando humorem ingrediuntur, omittere etiam oportet Pliny medicamentum. Et in summa qui existimant aliqua esse medicamenta, qua epilepsiam curant occulta vi, decipiuntur maxime. Quia hic morbus manifestus est, nempe obstrutio, aut res cerebro contraria: siue sit alteratio, siue vapor, remedia ergo erunt etiam manifesta agentia, qualia sunt illa, qua morbo contrariantur.

Epilepsia non habet medica-
menta

toto tē-
peramē-
to ope-
rantia.
Epilep-
sia ex la-
ctis cor-
ruptio-
ne.

Si morbus comitialis fiat ex lacte.] Epilepsiam ex lactis corruptione curabis, prius interdicens lac, deinde purgans lo ventriculum puluere hiera picra, & rhodomelle si validus puer sit, ita ut sit 3. aut 3. j. & ℞. pulueris, & rhodomellis 3. ℞. cum decocto feniculi: in grandioribus puluere praedicto & terebentina 3. ij. cum decocto praedicto. Suppositorio reuellere poteris à ventriculo, ex 3. j. pul. hiera. 5. Gal. faciens duo suppositoria in sufficienti quantitate mellis, & addendo unicuique, si opus fuerit, salis gemma ʒ. ij. Neque opus erit uti coagulis, cum habeamus oximel Rhodomel, & alia similia lac coagulatum dissoluentia.

Plexitu-
do ven-
triculi.

Valentinæ fœminæ.] Hanc plenitudinem commodè depone-
mus hoc medicamento. ℞. hiera. 5. Gal. 3. j. oxizaccari. 5. 3. j. decocti hordei, quod s. misce, & fiat potio.

Extra accessionem si fiat.] Omnia calida & euaporantia, quia calefaciunt cerebrum, & vapore illud replent, fugienda sunt. Sanguis mittendus est ex cephalica, ut reuellemus à capite, & euacuemus ex cerebri ventriculis, vena enim cerebri inanita humorem attrahent ex eius ventriculis.

Euapo-
rantia
fugien-
da.

Quintò, resoluentibus materiam.] Nullum praestantius remedium curat Epilepsiam, quam sit optima victus ratio, & locus etiam siccus. Quod si aliquis habeat Epilepsiam, cuius curationis nulla sit spes, huic opus erit tempore veris sanguinem mittere ex parte longinquiori, ex pede scilicet ut reuellemus: tunc

In despe-
rata epi-
lepsia
aliquid
agendū.

enim nullus est adhuc in capite affectus postulans euacuatio-
nem. Purgatione etiam & optimo victu vrentes, accessio epilepsia, non ita frequenter, ut solebat, neque cum tanta molestia apprehendet.

De melancholia. CAP. IX.

Descri-
ptio.

Melancholia quædam est mentis alienatio citra febrem ab humore melancholico proveniens qui mentis sedem, quæ

quæ cerebrum est, occupat, & eius temperiem immutat. Trifariam ea fit, ut autor est Galen. Interdum enim vniuerso, qui in *Causa*
 venis continetur, sanguine melancholico affecto, cerebrum *& diu-*
 ipsum communem etiam totius corporis noxam sentiens ob *sio.*
 generale vitium afficitur: nonnunquam vero reliquo sanguine
 naturam seruante, & innocuo existente, solus is qui in cerebro
 inuenitur, dignus est, qui notetur, cum in melancholicam na-
 turam sit alteratus. Quod bifariam contingit: aut enim aliun-
 de in ipsum deriuatur, aut in ipsum genitus est, cum videli-
 cet internus calor, aut bilem, aut crassum, atrumque sangui-
 nem superassauerit. Quæ sanè distinctio non parum ad curatio-
 nem conducit. Siquidem vbi vniuersus corporis sanguis me-
 lancholicus extiterit, auspicari curationem à sanguinis missio-
 ne conuenit: vbi verò solum is, qui in cerebro continetur, infir-
 mus (quantum ad hanc attinet dispositionem) secta vena non
 indiget, quamuis ob aliam causam secari possit, quod aut pro-
 pter plethoriam erit faciendum, aut præseruationis gratia, ut
 Aetius opinatur.

Est præterea tertium melancholiæ genus, quod à ventriculo
 oritur, medicis plerisque hypochondriacum flatuosumque no-
 minatum, propter ascendentem in cerebrum melancholicam
 quandam exhalationem similem ei, quæ oculorum suffusiones
 inducit.

Operæ pretium autem erit, communes primum notas re-
 censere, post ad peculiare devenire. Sunt verò communes
 notæ, metus tristitia, hominum odium, & auersio. Variæ præ-
 terea sunt melancholicorum imaginationes: alij se fictilia
 vasa arbitrantur esse: alij animalia bruta, alij mortem expe-
 tunt: quam sibi non rarò consciscunt: simul etiam & perhor-
 rescunt eandem, atque abominantur: quod admiratione ma-
 gis dignum est. Nonnulli semper rident, Democritum imitati,
 alij Heraclitum referentes, in perpetuo sunt luctu. Sunt qui
 se Deo plenos, & cœlesti numine afflatos opinantur, futu-
 ræque prædicere posse. Sed longum esset omnes horum ima-
 ginationes recensere, & longius multo omnium causas red-
 dere, cum hæc vna res ex earum genere sit, quæ fieri non
 possunt. Verum si quis exercere se in hac contemplatione vo-
 let, licebit sanè illi per me, verum ea lege, ut philosophiæ
 conuenientia dicat, verbi gratia siccitatem, in eo qui se te-
 stam esse credebat, causam explicabit: in eo verò, qui se caput
 non habere arbitratur, & leuitatem, quam spiritus eleua-
 tus præstabat. In cuius curationem, præter alia dicitur exco-
 gitasse Philotimus pileum plumbeum, cuius pondere appres-

Signa
commu-
nia.

DE CVRAND. MORB.

*Signa
particu-
laria.*

sus caput se habere intelligeret. Iam ad peculiare notas accedamus. Eos qui per consensum totius corporis melancholici sunt, hæc sequuntur, graciles sunt, malicentieque, venas habent latas, hirti sunt, squalent, duri, nigri, aliquando rufi nonnunquam flani, denique vndeque & ex toto melancholici apparent, idque aut propria natura, aut propter vigilias, sollicitudines, iras, moerorem, ciborum usum & antea actam victus rationem, quæ ad torrendum sanguinem, & in melancholicum conuertendum aptissima est. Quæ postquam optimè consideraueris, cubiti insuper venam secato (certissimam enim hinc coniecturam facies) secabis autem mediam: quod si emanans sanguis melancholicus sit, pro laborantis viribus educatur, si purus & sincerus, nequaquam: sumpto hinc argumento, quod solum is, qui cerebrum occupat, sit melancholicus: qui aliter est, educendus. Hypochondriaca melancholia sic dignoscitur. Primò enim stomachi accidentia emergunt, flatus inquam gurgulationes, cruditates, eructationes acidæ, & alui defecatio, & ab egestionibus, vomitu, & eructatione percepta leuitas, & quod æger omnes molestias circa hypochondria versantes percipiat.

*Victus
ratio.*

Initio quinque auxiliorum generibus sanatur, nam confirmata ægrè, aut omnino nunquam curari potest. Primò, victu humectante, & in actiuis temperato, ut est ius arietis, & gallinæ cum borragine, aut buglossa alteratum. Bibat vinum buglossarum, id est, habens radicem buglossæ, rubrum, medium in ætate, & substantia, bene dilutum aqua. Quæ atrabilem gignunt, maximè nocent, ut falsa omnia, caro ceruina, hircina, bubula & leporina, nisi hæc tria animalia essent propinqua ortui: tunc ratione humoris optimi sunt alimenti. Legumina quoque nocent, & multum calida, qualia sunt eruca, sinapi, piper, zingiber, & similia. Animi perturbationes, & coitus immodicus satis nocent, aliquando tamen prodest, si moderatus sit: præsertim si ex semine detento, & corrupto profectus fuerit hic morbus. Blandè iis inferuendum est, aliquando tamen acribus sunt increpandi & tractandi, sed perpetuò cautè. Nam aliqui sunt obiurgandi, verberandi & vinciendi, ne manus violentas medico, aut aliis inferant. Sæpe oportet obseruare melancholici phantasiam, & imaginationem. Si quis enim eorum mente sua informet & fingat, in ventre se habere ranas, aut serpentes (ut quidam melancholici iam figurarunt) promittat medicus se animalia illa facile expulsum, & post purgantis medicamenti effectum ea animalia deiectionibus immixta viua ægrotos ostendat.

*Cibi me-
lancho-
lici.*

ostendat. Si æger cibum, potumque fastidiat, ei omnia ferme genera alimentorum, vt licebit, sunt offerenda, vt possit gratum sibi accipere. Si verò nihil, aut parum comederit, hoc nutriatur clystere. ℞. iuris gallinæ, decoctionis florum cordialium lib. j. oleorum violarum & amygdalarum dulcium an. ʒ. ij. butyri recentis, & cassiæ fistularis præparatæ an. ʒ. j. vitellorum ouorum nu. 2. misce, & fiat clyster. Nutriatur quoque bonis odoribus, præcipuè hac mixtura sæpe naribus admota. ℞. succi pomorum redolentium lib. j. aquæ rosarum ʒ. iij. vini albi optimi, & bene olentis ʒ. j. ʒ. misce. Somnus conciliandus est iis, quia longa est eorum vigilia, & maximè eis nocet. Quod si lactuca, & lac seminis papaueris non possint

*Clyster
nutriēs.*

*Somnum
indu-
centia.
Topica
soporife-
ra.*

Secundò, apparantibus atram bilem syrupo de pomis, de buglossa, de borragine, de fumaria. S. & comp. de epithymo cum duplo aquarum, aut decocti buglossæ, barraginis, fumaris, lupulorum, scolopendriæ. Hæc tamen multis diebus sunt bibenda quia terrestris est, & admodum resistit atra bilis.

*Præpa-
ratio.*

Tertiò, vacuantibus melancholiam, quæ si sit sanguinea, aut cum præsentia sanguinis: & si fiat per consensum totius, statim à legitima & iusta victus ratione est vena media seu communis secanda, autore Gal. iij. de loc. affect. cap. vj. sanguinisque tantum extrahendum est, quantum respondeat plenitudini: cum ex repressis mensibus, aut hæmorrhoidibus inhibitis nascitur, venæ tibiarum, aut pedum sunt incidendæ, & in confirmata iam & veteri frontis vena aperienda erit. Vacuanda quoque erit lenibus & clementibus, quæ hæc sunt epithymus, & aqua casei, & myrobalani indi: vt ℞. pulueris epithymi ʒ. ij. aquæ casei ʒ. iij. misce: vel epithymi ʒ. ʒ. corticum myrobalanorum indorum. ʒ. j. ʒ. fiat decoctum in vnciis sex feri caprini, donec vnciæ duæ consumantur.

*Vacua-
tio.*

*Sectio
vena.*

*Quæ ve-
na se-
canda.*

*Purga-
tio lenis.*

Deinde valentioribus, vt folliculis, sene, diasene, confectio- ne medicaminis quod scripsit Hamec, pilulis indis, & de fumo terræ. Multi quoque lapidem armenum, & lapidem stel- latum, seu lazuli laudant in purgando hoc humore, sed ego his non auderem vti simplicibus, neque in compositione, quia primus incognitus est, secundus verò est malignus, nisi fuerit bene electus, & præparatus lapis stellatus, in die ta- men purgationis per pilulas ab opere bibat æger decoctum

*Valen-
tior.*

*Deco-
ctum.*

fructuum,

DE CVRAND. MORB.

- die pur-
gationis
sumen-
dam.** fructuum, & florum humectantium: vt sunt vuarum passarum sine gra-
nis, pruna damascena, violarum, borrago, & similia: ne intempe-
ries sicca à medicamento sicco multum intendatur. Quia mor-
bus hic est diuturnus, necessaria est vacuatio frequens, quæ fiet
optimè hac confectione. ℞. cassiæ fistulæ præparatæ ʒ. ij. con-
fectionis medicaminis Hamec, & dialenæ an. ʒ. j. conferuæ
Cōfectio borraginis. ʒ. ss. pulueris diarhodon abbatis. ʒ. ij. syr. buglos-
sæ, q. s. m. & fiat confectio. dosis est cochlearia duo semel
Puluis in hebdomada. Puluis hic optimus & ferme diuinus est, exper-
saluber- tusque à multis grauissimis medicis, & eo multi melancholici
rimus. curati sunt. ℞. epithymi ʒ. iiij. lapidis lazuli optimi, agarici
trochiscati an. ʒ. ij. scammoni. ʒ. j. caryophyllorum numero
Laudes 20. misce, & da. ʒ. ij. cum sero ouino, aut caprino, aut aqua
huius borraginis, aut buglossæ: hoc medicamentum dilige, & eo
pulueris. vtere, si vis salutem ægris restituere, & honores assequi. Dicitur
à quibusdam puluis benedictus.
- Auersio.** Quartò auertentibus à cerebro & corde ad ignobiles partes:
vt partium extremarum frictionibus, vinculis, foru ex decocto
Clyster. rerum parum calidarum, cucurbitulis, balneis, & clysteribus: vt
hoc: ℞. maluarum, fumaris, borraginis, lupulorum an. m. j. epi-
thymi, senæ an. ʒ. iiij. fiat decoctum. de quo accipe lib. j. cassiæ
fistularis præparatæ ʒ. j. olei violarum & sesaminis an. ʒ. ij. sa-
lis. ʒ. ij. misce, & fiat clyster.
- Discutiē-
tia, corro-
borātia,
& alte-
rantia.** Quintò, reliquias resoluentibus, & corroborantibus ca-
put & cor & tandem humectantibus, & intemperiem capitis
& totius siccam sanantibus, primum fit per diamuscum dul-
ce, & amarum, per electuarium de gemmis, per electuarium
lætificans, Rhasis in quantitate drachmarum duarum, cum
aqua buglossæ. Fit etiam resolutio, & illarum partium prin-
Cōfectio cipum corroboratio per hanc confectionem. ℞. margarita-
rum ʒ. ss. hyacinthorum, zaphiirorum, smaragdorum, vtriuf-
que corallij an. ʒ. ss. cinnamomi, macis, galangæ, nucis
muscatæ an. ʒ. j. caryophyllorum, piperis longi cubebarum,
ligni aloës, storacis, calamithæ, seminis basiliconis an. ʒ. ss.
croci ʒ. j. musci ambriæ an. ʒ. iiij. sacchari candi, carniū
vuarum passarum an. ʒ. j. conferuæ borraginis, & buglossæ an.
ʒ. j. aquæ rosarum, muscatæ sac ʒ. j. chari optimi, quod sat est,
misce & fiat confectio: dosis quolibet mane drachmarū trium
**Simpli-
cia robo-
rantia
caput.** cum vnciis tribus aquæ buglossæ. Corroborant etiam caput
auellanæ & amygdalæ tostæ à cibo, & coriandrum præpara-
tum, & sequens pileum, ℞. coriandri præparati ʒ. ij. rosarum,
**Pileum
eo robo-
r. ns.** florum borraginis, buglossæ, & violarum an. ʒ. ss. cubebarum,
nucis muscatæ, stechados, maioranæ, anthos an. ʒ. j. corticum

papaueris albi ʒ. iij. in puluerem redigantur omnia, & fiat pileū,

Intemperies sicca curatur balneo totius capitis ex maluis, violis, althea, lactucis, borragine & buglossa, capitibus & intestinis veruecum. Capiti raso admoveatur butyrum recens, & farina hordei, vel hoc vnguentum, quod spinæ etiam admoendum est ad totius humectationem. ℞. olei amygdalarum dulcium ʒ. ij, olei violarum, & papaueris an. ʒ. j. β. butyri recentis ʒ. j. mucilaginis altheæ & fœnugræci an. ʒ. ij. axungię gallinæ ʒ. iij. ceræ quod s. misce, & fiat vnguentum.

Si sit per consensum partium circa hypochondria, habitatione victus iam dicta superius, cui addes in hac & in omni carnem accipitris, cum succo maioranæ, quæ habet miram facultatem in curanda melancholia, & pulli noctuæ. Est etiam experta in curatione eius aqua per distillationem ex muribus boni pastus cum gallina & aquis cordialibus facta, forsan est in muribus vis, & natura curandi hunc morbum, quemadmodum in accipitre, qui accipiter nutritur muribus. In præcedenti quoque euacuatione, & aliis multis remediis præter sanguinis missionem, quia rarò in hac confert, summopere est resolvens flatusosus spiritus, quod primò & præcipuè fiet per clysterem hunc, & similem, tertio quoque die iniectum. ℞. blitis, matricariæ, cuscuthæ, melissæ, maioranæ an. m. β. polypodij, senæ, carthami an. ʒ. j. epithymi, thymi an. ʒ. β. ameos seminis aneti, seminis fœnuculi & carui an. ʒ. iij. fiat decoctum, de quo accipe ℥. i. cui adde diasenæ, hieræ logodionis, & confectionis medicaminis Hamec. an. ʒ. β. olei camomillæ, & de lilio an. ʒ. ij. salis. ʒ. ij. misce. Spiritus flatusosus dissipatur foru ex camomilla, meliloto, calendula, rore marino, radicibus quinque diureticis, seminibus anethi, fœniculi, cymini, ameos, carui, & baccis lauri ventriculo semper vacuo, saltem bis in die, & post forum quotidie ad dissipandum flatum venter vngatur hoc vnguento. ℞. olei anethi, de lilio, laurini & rutæ an. ʒ. j. pulueris rosatæ nouellæ & diacymini an. ʒ. ij. ceræ quod sufficit, misce & fiat vnguentum. Si ante cibum comedat cochlearium vnum huius pulueris, flatus valenter dissipatur. ℞. coriandri præparati ʒ. j. pulueris buglossæ ʒ. β. cina-momi electi, cortici citri, seminis fœniculi, anisi, & carui, an. ʒ. iij. origani ʒ. ij. ligni aloës ʒ. j. sacchari ʒ. iij. misce, & fiat puluis. Syrupus sequens est ad flatum dissipandum accommodatissimus, & caput cum corde corroborandum. ℞. serici crudi ʒ. ij. seminis basiliconis, caryophyllorum, foliorum citri an. ʒ. j. corticum mali cidonei & corticum citri an. ʒ. iij. radicum buglossæ, nu. 7. foliorum buglossæ m. iij. fiat decoctum

Alteratio.

Vnguentum humectans

Hypochondriaca curatio.

Accipitris & murium vis.

Clyster flatus dissipans.

Topica.

Forma.

Vnguentum. Puluis.

Syrupus dissipans flatus, & firmans caput.

DE CVRAND. MORB.

*Pauperibus
utilia.*

decoctū in quantitate debita aquæ, de qua accipe quantitatem conuenientē ad lib. iiii. optimi sacchari, & fiat syrupus, aromatizetur hoc puluere mastichis, zinziberis, galangæ, zedoariæ, spicæ an. 3. ij. ligni aloës, caryophyllorum, nucis muscatæ, an. 3. j. musci, ambre an. ʒ. j. Dosis. ʒ. ij. Pauperes tamen loco eius, & dluites si velint vtatur electuario rosatæ nouellæ, aromatico rosato, diacymino, & similibus. Si melancholia fiat per consensū hepatis, aut splenis, aut vteri, aut aliarū partiū curatis illis facilis erit curatio huius morbi, de quibus suis in locis agemus.

Scholium.

*Quid
melan-
cholia.*

*Morbus
in epile-
psia.*

*Duplex
melan-
cholia.*

*Corrigi-
tur Gal.
locus.*

Melancholia quædā est.] Melancholia hoc in loco, non humore, sed affectum ē causa nomen assumentē significat. Est enim deliriū sine febre cū metu & tristitia. In hac definitione deliriū est genus, quo cōmunicat cum phrenitide & mania. Reliquis verò partibus melancholia ab eis distinguitur, quia phrenitis est cum febre, mania sine metu & mæstitia. Pars affecta est cerebrū, ut constat ex actione eius laesa. In ea j. n. imaginatio est deprauata, multipliciter tamen 2. de caus. symp. cap. ultimo, ita ut stultorum infinitus sit numerus. Morbus ad quē sequitur (loquentes de ea que proprius affectus) est intēperies frigida, & sicca cerebri ex melancholico humore orta. Humor melancholicus, cū non solū habeat generationē ex hepate frigido, sed ex caliditate sanguinis tenuem partem consumente: proinde non est mirandū si per febriles morbos multi melancholici fiant. Melancholia hac aut fit per propriū affectū, aut per consensum. Per propriū affectū euenit, quādo humor melancholicus in ipso cerebro continetur. Quod bifariam contingit, primò cū melancholia ibi generatur, secundo cū aliunde fluit. In cerebro generatur à caliditate sanguinem excitante, eūque melancholicum efficiente, vnde corriges locum lib. 3. de loc. affec. c. 6. qui sic habet. In cerebro (hoc enim sub audiendum est) melancholicus humor genitus est, cum videlicet internus calor, aut flauam bilem, aut crassum atrūque sanguinem assauit. Delendum enim est totum hoc (aut flauam bilem, aut) quia flaua bilis assata sit atra bilis, non autem melancholia. Aliunde fluit melancholicus humor cum lien (à quo expurgatur) minùs rectē ipsum attrahit: Aut iecur multā generat melācholiā, aut, cū ab alia causa in venis conseruatur, tunc enim in cerebro, languidum si sit, colligitur. Per consensum excitatur melancholia, quando ex hypochondriis ortum habet, quam solent medici hypochondriacam nominare. Hanc melancholia morbi diuisionem consideramus propter curationem; quia si in toto corpore contineatur sanguis melancholicus, serabimus venā, ut renellamus à cerebro. Si
verò

verò in hoc affectu solus sanguis, qui est in cerebro melancholicus sit, abstinendum erit à vena sectione, euacuemus optimum sanguinem, & qui necessarius est ad coctionem melancholici humoris: nisi ipsum eduxeris ratione plethoræ.

Est præterea tertium in melancholiæ genus.] Melancholia per Melan-
consensum hæc est. Quæ fit à vaporibus melancholicis ex venis ven- cholia
triculi ascendentibus ad caput, etiamsi non sint acres: unde hæc in per. con-
parte errauit Iacotius. Hic autem melancholicus humor in venis ven- sensum.
triculi detentus, & obstructione faciens aliquando putrescit, & ali-
quando non. Si putrescit, calorem in illis venis generat, quæ intel-
xit nomine inflammationis Diociles, non autem phlegmonem, ut multi
male voluerunt, eritque cum siti. Quod si hæc putredo effatu digna
sit, Melancholia habebit febrem adiunctam. Si humor in venis præ-
dictis non putrescat, ichores melancholici ad ventriculū descendentes
acidum ructum, ladentque eius coctionem: cumque error primæ coctio-
nis non possit emendari, in secunda, corpus male nutrum gracile scet.

Melancholia signa communia sunt metus, & mœstitia, si multū Melan-
perseuerent, 6. aph. sent. 2. 3. adde tamen sine causa manifesta: signa cholia si-
communis hæc dicuntur, quia conueniunt melancholia, quæ est præ- gna.
prius affectus, & illi quæ per consensum accidunt. Causa tristitia &
timoris est cerebri, & spiritus animalis (qui ex sua natura debet
esse lucidus) obtenebratio. Hæc autem, in ea quæ fit per propriū affe-
ctum, ab humore, at in illa, quæ lege consortij accidunt, à vapore nigro
pendet. Quod autem hæc sit optima causa Gal, 2. de caus. symp. cap.
ultimo, exemplo ostendit: si enim tenebræ externa timorem & mœ-
sticiam inducunt, nonne melius id efficient illæ, quæ interna sunt?
Dices non metus, & mœstitia sunt cordis passionēs; cur ergo causas
earum in cerebro collocamus? Respondeo, ex opinione mali ortum
habere prædictas passionēs, spiritum autem denigratum deprauare
imaginationem, ita ut excitet opinionem mali præsentis & futuri,
& hac ratione incutere timorem & tristitiam.

Quintò, reliquas resoluentibus.] Si in melancholia, quæ pro-
prius est cerebri affectus, intemperiem & frigidam & siccam habe-
mus in cerebro, debemus ergo cerebrum humectare, & ex eo humore
euacuare, quod commodè præstat balneum, caput etiam tonsum la- Male an
uabimus decocto ex capite arietino, chamomillo, violis, fœnugræto, ctorem,
& floribus buglossæ. Hinc videbis errorem auctoris, & aliorum præ- & alios
dictorum caput roborantium in hoc affectu confessione per os as- præcticos
sumpta, longa quidem, & ex rebus siccis constituta. Si enim cerebrū in melā-
humectandū est, quæ ratione hi id exsiccant? tum si ex capite debe- cholia
mus euacuare humorem, topicis id præstandū erit, & non internis. explicā-
Debet præterea medicus in melancholia liensem roborare, ut atra- tia pro
hat melancholicū succum, quod præstabit oleo de absinthio & aliis. pinare.

DE CVRAN. MORB.

Lapsus auctoris. Si sit per consensum partium.] Ea quæ dicit auctor de carne accipitris, muribus, & pullis noctua, falsa cum sint omittantur: quia

Curatio melancholia hypocondriaca. hypochondriaca hac affectio ratione cognoscitur, ac proinde remedia ratione inuenta, & nõ experientia admittet. Curabitur ergo victus ratione humectante, secundo humor obstructionem in venis ventriculi efficiens preparabitur syrupis, in prima melancholia ab auctore propositis: ita ut illa, in qua putredinẽ habet humor (quam ex siti colligemus) misceamus syrupum endiuia compositum cum decocto endiuia, borraginis, & aliorum, quæ aliquantulũ refrigerant. Tertiõ, hoc medicamento purgabimus. ℞. pul. hiera picra. ʒ. iiij. aut iiij. cõfectionis hamec ʒ. ij. dissoluatur in decoctione hordei q. s. & fiat potio. Hamec melancholiã educit, at hiera serosos & tenues humores in ventriculo cõtentos, & simul ipsum roborat, ne eos recipiat, poterit-que frequenter uti hoc medicamento. ℞. pul. hiera. ʒ. Gal. ʒ. iiij. rhodomellis. ʒ. j. cum aqua fœniculi q. s. duobus tamẽ aut tribus diebus

Vngueta ad lienẽ. praassumpta decoctione ex hordeorum cortice, & fœniculo parata.

Ad animi deliquium. lien ungatur hoc vnguento, quod corroborat ipsum, & attenuat humorem melancholicũ. ℞. olei absinthij, de capparibus, tamaricis & ireos. ana. ʒ. j. ʒ. ammoniaci dissoluti in aceto ʒ. iiij. brionia ʒ. iiij. massa emplastri de meliloto loco cera q. s. fiat vnguentum. Et cum aliquãdo ex flatu in hac affectione fiat animi deliquiũ utemur hoc medicamento. ℞. cõfectionis Gentilis contra melancholiam ʒ. ij. conserua borraginis ʒ. j. misce: hac cum aqua melissa accipienda est. cui, si vigiliis molestetur ager, adde syrupi papaueris. ʒ. j.

De Incubone. C A P. X.

Descriptio. Incubo, vel incubus, quem Græci ephialtem appellant: sumpta quidem appellatione vel ab eius nominis viro, aut quod magis credibile est, à vocis significatione, cum hoc morbo correpti inuadi se ab alio opinentur: porro & à Themisone pnigamon, aut pnigalion dicitur: quod præfocari ægrotantes videantur. Vt tamen nominetur, malum est, vbi aliquis in somno opprimi se, & incumbente quadam mole, teneri arbitratur. Cæterum oritur is morbus à crapula potissimum, & iugi in ventriculo cruditate, vaporibus nimirum inde in cerebrum ascendentibus, qui & ipsũ obruant, & iter spiritibus animalibus aut facultati animali per nervos occludant. Qui sic affecti sunt, tardẽ admodum difficilẽque mouentur, torpent in somno, cum in corpus cerebri facultas non defluat, suppressam vocem aut frustra conantur rumpere, aut incertã, inarticulatãque reddunt. Ad hæc suffocari se imaginantur; & ab ingruente aliquo detineri, denique ea omnia, quæ vigilantes epileptici perpetiuntur, hæc eadem per quietem perferunt, qui hac molestantur affectione. Cum summa tandem

anxie tate

anxietate tenuiori facto spiritu, & in halitu digesto discussove, & referatis cerebri meatibus subito expergeant. Succurrendum huic malo est incipienti, si enim semel inualuerit, graues sæpe affectiones parit, Epilepsiam scilicet, Maniam, & Apoplexiam, cum horum velut præludium quoddam sit, autore Ætio. Hic tamen si inter somnum, & vigiliam superuenerit, malus est, deterior verò si cum sudore frigido.

Curatio eius similis est curationi morbi comitialis, quamuis mitior, semper tamen æger à somno excitetur violenter, & cum increpatione, sæpe quoque fiat in eo vacuatio per Hieram S. Galeni, & agaricum trochiscatum.

Curatio.

Scholiurn.

Incubo vel incubus.] In incubone cerebrum laesum esse confirmant medici ex actionibus eius laesis, quæ sunt, imaginatio sensus & motus. Imaginationem laesam colligunt, quia qui hoc malo detinentur, existimant quiddam sibi incumbere. Quamuis id Rondoletius & alij ad plenitudinem venarum thoracis referant. Sensus etiam laesus est, quia ut aiunt, is in somno torpidus est, sicut & motus voluntatis difficilis. Ex his aliqua falsa sunt: imprimis, quod ait Rondoletius stare non potest, quia si plenitudo est in thorace, sensum grauitatis inducit in vigilia, non autem in somno, in quo mens aliò letius reintentata est. Adde hanc plethoram non ledere imaginationem. Falsum etiam est, id quod ij dicunt, in incubone scilicet actiones sensus & motus ladi: dicere enim esse sensum in hoc malo affectis, cū dormiunt, torpidum, nonne ridiculum est? quasi in aliis dormientibus qui sit acutus? Quod autem motus laesus non sit, constat ex eo, quod brachia & crura mouent, respirant etiam. Vnde dicendum est, Incubonem esse symptoma, in actione laesa principe. Est enim imaginatio deprauata, quæ contigit ex speciebus rei alicuius suffocantis, & opprimentis, in cerebro motis. Tunc enim existimant se esse oppressos, ita ut, si v. lint loqui, quasi detineantur. Dices cur in vigilia non contingit? Respondeo, non esse necessum, ut quæ in somno, eadē in vigilia afficiant: somniamus enim dormientes, & non vigilantes. Videmus modò, quem morbum sequatur hoc symptoma. Aliqui existimant, morbum esse obstructionē ventriculorum cerebri: & hi differunt, quia multi existimant obstructionem hanc esse, in anterioribus ventriculis, aut in principio spinalis medulla ab humore factā. Alij sequuti Possidonium à vaporibus frigidis & crassis spiritus animales per nervos ferri prohibentibus, eam fieri sentiunt. Qui omnes errant maximè: nam si tanta est obstructio, ut impediatur transitus spirituum, fiet ergo caros epilepsia, aut apoplexia. Tunc si obstructio est incubus, cerebrum afficitur non ut similis pars, sed ut instrumentum,

Sententia aliquorū de incubone.

Rondoletius.

Refutatur.

Quid sit incubo.

Morbus ad quem sequitur.

Refutatur ali.

Vera sententia. menta, ut *Altomarius* ex *Ætio* probat: qua ergo ratione erit laesa imaginatio? Sententia *Possidonij* nulla ratione potest admitti, non enim potest ratio capere modum, quo vapor possit impedire transitum alicuius substantia, cum sit tenuis, & sicut aer facile cedens. His omissis dicimus, in incubo, si cerebrum afficiatur proprio affectu, morbum esse intemperiem frigidam & siccam: si vero per consensum, morbum esse, aut in via: si vapor, ex obstructione venarum ventriculi ascendat: aut tumorem prater naturam, si scyrrum lienis sequatur.

Error multorum. Inde colliges errorem multorum medicorum sentientium hunc affectum fieri à Demone, ducti in hanc sententiam ex eo, quod quidam Demones appellantur à Theologis incubi. Hi enim etiā si hoc nomine appellantur, non quia hunc affectum efficiant: sed à coitu, quia assumptes aërea corpora, sub virorum forma mulieribus incubent sicut & succubi appellantur illi Demones, qui feminam mentientes, viris succumbunt. Et ex horum coitu natos fuisse gigantes multi ex Theologis affirmarunt. Ex supradictis intelligis quam malè omnes causam istius morbi ad crapulam & cruditates referant, cum hac nunquam imaginationem ledant.

Curabitur hic morbus ea ratione, qua melancholia.

De iis qui amore insaniunt. CAP. XI.

Descriptio. **E**X amore posse aliquos insanire argumento est *Antiochus Seleuci* filius, qui *Stratonicam nouercam* miserè deperiuit, atque alij quamplurimi, quorum frequens est in historiis mentio, & in poetarum monumentis non rara, quamvis sub fabularum inuolucro. Est verò (ut *Ouidius* cecinit), amor res plena solliciti timoris: sollicitudo autem, ut ait *Paul. Aegineta*, animi quædā affectio, cum videlicet ratiocinatio in vehementi, ac laborioso quodam motu constituitur. Occasionē huic morbo exhibet res ipsa amata. Deprehenditur malū, quia oculi concaui fiunt, lachrymas nullas ostendunt, sed voluptate quasi perpetua perfusi apparent, agitantur & subsiliunt identidem palpebræ, & aliis omnibus corporis partibus illæsis ac consistentibus, solum hi amantibus concidunt. Pulsus peculiaris huic morbo nullus est, quod medicorum aliqui sunt opinati, sed quales solent esse illorum, qui multis solitudinibus sunt impliciti. *Erasistrati* denique arte oportet uti, ut morbus ex toto detegatur. Præcipua huius morbi curatio tradita est capite de curatione melancholix, præter illa, duo sunt maxima remedia eorum, qui amore insaniunt, primū & firmissimum dare ei, quam diligit. Cum hoc non suppetat, alterum est necessarium, & primò stude, ne fiat melancholicus, per ea quæ dixi

Descriptio sollicitudinis.

Note.

Curatio.

Præservatio.

diximus cap. 9. nam in imaginationem læsam habent, & aliquoties rationem, quare statim fugiat: absentia enim & aliorum rerum occupatio est summum remedium, autore Ouidio libello de remedio amoris.

Auersio

Otia si tollas, periere Cupidinis arcus,

Da vacua menti, quo teneatur opus.

Consule igitur Poëtam eo in libro. Necessariæ ergo sunt venationes, piscationes, ludi, instrumenta musica, ambulatio per loca viridia & iucunda, ubi aues & philomelæ resonant, communicatio, & frequens cum amicis, & consanguineis confabulatio prodest: & tandem opitulatur multum profectio ad lóginas regiones, præcipuè ad insignes vrbes, vt Valentiam & Barchinonam apud Hispanos: Lutetiam Parisiorum apud Gallos, & Romam Christianorum caput, quod si hæc non satis sint cum Ouidio.

Hortor vt & pariter binas habeatis amicas,

Fortior est plures si quis habere potest.

Et post hæc omnia sic finit curationem Ouidius,

Quid moror exemplis, quorum me turba fatigat?

Successore nouo vincitur omnis amor.

Aliquando curatur hæc insania ebrietate, & coitu non immodicis.

Scholium cap. seq.

A Ttonitum morbum Græci.] Malè video ferè omnes medicos apoplexiam definientes, priuationem sensus & motus in toto corpore, hac enim ratione, qui vulneratus usque ad cerebri ventres repente concidit sine sensu, & motu, tum & plegmono de cerebri dispositione affectus apoplexiam habebit. Quod, quàm falsum sit, optima eius definitio ostendet. Est apoplexia sensus, & motus amissio in toto corpore, ob impeditum transitum spirituum animalium facta. Prima parte definitionis, apoplexia cum paralyti conuenit: Secunda verò ab ea distinguitur, cū paralyti non habeat sensus & motus defectū in toto corpore. Vltima verò parte separamus apoplexiā ab ea sensus & motus priuatione, qua etsi in toto corpore fiat, euenit tamē ex dissipatione spirituum animalium: qualis est illa, de qua loquitur Gal. 7. de placitis, qua sequitur cerebri vultus usque ad vetriculos penetrās: ab ea etiā, qua fit ex repletione venarū & arteriarū cerebri, qua cōtingit ex consūptione spirituum animalium cerebri, eueniente ex eo, quod spiritus vitales ex arterijs nō possint ad cerebri vetriculos descēdere. Causa apoplexie est, quicquid replet cerebri vētres, ita vt nō possit animalis spiritus permeare, hac autē repletio, aut si manūs obstructio, fit ab humore crasso pituita scilicet, aut melancholia, aut à phlegmone maxima tenuis

Error

multorū

circa es-

sentiam

apople-

xia.

Apople-

xi defi-

nitio.

Causa

apople-

xie.

DE CVRAND. MORB.

meningis, ita ut eius magnitudo internū cerebri meatum repleat.

Lapsus Qua vera cum sint, non est quod sequaris *Valesij* sententiā lib. 7.
Vallesij. epid.com. 83. scriptam: qua sentis ab omni humore fieri apoplexiā.

Et quod peius est, quāsi dā apoplecticas passiones à crasso flatu ad-
mitti: quia bilis flaua, tenuis cū sit, permeabit per meatū, non

Cur in autē obstruet. Quod autē non obstruat vapor, superiori scholio dixi-
apople- mus. Obstructio (qua morbus est in via) in apoplexia magna est, ac

xiadica- proinde Gal. lib. 3. de loc. affect. in apoplexia corpus cerebri ma-
tur cor- gis ladi, quam ventriculos scribit, quasi dicat, cerebrum, ut est in-

pus cere- strumentum, ladi, quia totus ventriculus est repletus: cum enim to-
bri lasū tus nō repletur, ut in epilepsia euenit, tunc lasos vētriculos appellat

Gal. Et non corpus cerebri lasum. Et quāuis Gal. aliquando per

Lapsus corpus cerebri eius substantiā similarē intelligat, male *Valles.* 5.

Vallesij. epid.com. 47. explicat, quid sit vergere humore ad corpus, aut ad

animā: non enim vergere ad corpus cerebri, est vergere ad eius su-
persiciē externā Et vergere ad animā ad internā: cū pars exter-

na Et interna cerebri, idem habeant temperamentū, in quo animā

Differen constituit Gal. Et nos anima instrumentū. In apoplexia aliquando

tia apo- seruatur respiratio, aliquādo non, Et inde orta sunt differētia apo-

plexia plexia, à Gal. tradita 2. li. aph. com. 42. ex quibus tres sunt apo-

unde o- plexia illius, qua fortis dicitur: quāria debilis est. Prima differē-

riantur. tia ea est, in qua prohibita est respiratio, qua curationē non admittit

sed citō interfecit, tandiu in ea viuentes agros, quādiu illi qui

prafocati moriuntur. Secunda differentia apoplexia est cum vio-

lenter respirant. Tertia in qua nō est violenta respiratio, inequalis

tamen Et inordinata. Vltima (quā debile appellauimus) cum res-

Explica- piratio aliquē seruat ordinē. Et hac, inquit Gal. si debite fiant ne-

tur Gal. cessaria, citō curatur. Quod cū sit contra aphoris. in quo *Hipp.* de-

bile apoplexiā non facile curari scribit, proinde ubi est citō. legē-

dum est, forte, ex græco codice. Vel si seruemus lectionē per citō cu-

rari, intelligemus, statim in paralysem transire. Hic trāsitus euenit

humore penetrante neruorum substantiā, Et hoc nomine impediēte

facultatis alterationē. Quod in epilepsia nō contingit, quia humor

ea generans ita crassus est, ut nō possit peruadere neruos. Obijcies

Gale. 4. li. de ratione victus in acutis com. 27. Epilepsiā in para-

lysim finiri scripsisse. Respōdeo verū hoc esse sed rarō euenire: id au-

tem quod rarū est, cū contemnat Galenus ac si non esset, ideo in li-

br. 4. de locis affect. c. 2. epilepsiā nūquā in paral. finiri existimauit.

Sanguinea apoplexia) Sanguinea apoplexia meminit, cuius ha-

tēnus manifeste saltem nō fecit mētionē. Nos verō ex his qua dixi-

Apople- mus, vario modo curādā apoplexiā intelligemus. Si apoplexia fiat
xia cu- ex phlegmone tenuis meningis, curabimus eā primō sanguinē mit-
ratio. tes, Et applicātes capiti repellētia: Et vs sūmam dicamus ea pra-

labi-

stabilimus, quia de phrenitide diximus, utentes tamen digerentibus in declinatione, quia humor non habet eā tenuitatē, ut possit sine his exhalare. Aduertendum tamē est, practicos in sanguinis missione in qualibet apoplexia facta hunc seruare ordinem. Primo secant venam saphenam aut poplitis, quia amplior est, deinde cephalicam, & tertio venam frontis, vel ut Rondoletius, Hollerius, & alij duntur facere iubent, venam iugularem, ita ut fiat exigua plaga ob hanc morragia metum. Caterum mirandum est de his hominibus, rationem curandi non aduertentibus: si enim est affectus cerebro, nis misquam rectitudinem seruabit cum ipso vena pedis. Præterea quis ausus erit venam iugularem secare, si legat Gal. lib. 3. metho. imaginum venarum sectionem formidantem propter periculum, quod imminet: quia in harum sectione sanguis aut non potest, aut difficile saltem supprimitur: ita ut immineat periculum transuersæ sectionis in vena. Adde in sectione vena semper imperandam esse magnam plagam, ne sanguis tenuis relicto crasso effluat. Vltimò apoplexiā quod de sectione vena frontis & lingua imperant, in angina, dolore capitis diuturno, & similibus locum habet: non autem in apoplexia, in qua ob breuitatem hac remedia carent occasione. Nos sequuti Galeni doctrinam semper secamus cephalicam, & meritò, quia hac ratione ex loco affecto citò, & multū euacuamus.

Pituitosa apoplexia.) Ut plurimū fit apoplexia ex pituita, qua multa solet in cerebro frigido ex natura abundare. In cuius curatione auctor nullam fecit mentionē sanguinis missionis, sentiens cū multis barbaris, hanc inutilem esse, cum abundet pituita, & absit plethora: quasi solū in plethora sit sanguis mittendus. Solent autē cōmuniter medici, apoplexiā hanc curare clysteribus acris, medicamentis vomitū cientibus, & purgatione. Acris utuntur clysteribus, existimantes eos à toto corpore purgari. Quod possunt probare ex 4. lib. acut. com. 20. ubi ait Gal. autorem illius lib. in dicta sententia in Angina clysterem purgatorium exhibere, non ut solū alimenti extrementa, sed & ut passum locum euacuaret. Vomitu utuntur, ut deponant plenitudinē vetriculi: purgatione verò, ut pituita, qua morbi causa est, euacuetur: hac est illorū sententia undequaque peccans. Primò in acris clysteribus, ex valide purgantibus constructis: hi enim solū euacuauit ex intestinis, & primis venis, non ex toto corpore: quod ratione confirmamus, & autoritate. Ratio hac est, medicamentum, purgans ut agat, debet in actum reduci: sed per clysterem iniectum non potest reduci in actum, ergo neque purgare. Maior manifesta est ex eo, quod medicamentū purgans potestate tale est. Minorem confirmamus ex natura acris medicamenti, quod statim irritat intestina, & proinde expellitur. Autoritas, qua hoc ipsum probamus, ex Gal. desumpta est. 4. lib.

Reprehē

duntur

practici

in sāguī

nis mis

sione.

Verasen

tentia de

sanguī

nis mis

sione in

xia.

Reprehē

diturcu

ratio

apople

xia piui

rosa.

Clyste

res non

euacuāt

ex toto

corpore.

DE CVRAND. MORB.

aph. com. 2. ubi propositis medicamentis errhina & apophlegma-
tisma appellatis, qua ex parte nempe cerebro euacuanti: addit, cly-
sterem quoque ex hoc genere facis. Si ergo clyster ex parte euacuat.
intestinis scilicet & primis venis, qua ratione in apoplexia: Hoc
primo videtur medicamentum, quod neque affectum, neque eius causam
respicit. Ad id quod ex 4. acut. adferunt satisfacimus, dicentes Ga-
lenum solum scribere id, quod instituit auctor illius lib. (qui non est
Hippocrates) non autem hoc approbare, potissimum cum sit contra ra-
tionem. Errant secundo supradicti medici in medicamentis vomito-
rijs, quia cum hac solum ventriculū euacuent, non curabunt apople-

In prin-
cipio a-
pople-
xia, non
est pur-
gandum. **xiā, qua est cerebri affectus.** Ultimo statim in principio purgantes
crasse peccare videntur: nam si ager est in accessione apoplexia, non po-
terit purgans medicamentum deglutire. Si post accessionem, iam non apo-
plexia, cum terminata sit in paralysem. Dices purgati tunc humorem
pituitosum: si hoc affirmas, non etiam effugies: nam aut ille humor est in
venis, aut in ventriculis cerebri. Si est solum in venis, iam non curas
affectum urgentem, morbum scilicet, qui est obstructio cerebri. Si vero
humor est in cerebri ventriculis, cum extra venas diffusus sit in par-
te contentus, per proprios meatus partis debet euacuari. Adde hu-
morem esse firmatum in parte, ac proinde post coctionem esse euacuandum.

Apople-
xia ex
humore
crasso fa-
cta vera
curatio. **Qua cum ita sint, inde videbitis quantum erret ille, qui non curans à**
bono praeceptore methodum curandi perdiscere, ad eos libros, quos
practicos vocant, confugit: hic enim praterquam quod decipietur pas-
sim, multos interficiet. Curabitur ergo apoplexia ex humore crasso
facta hoc modo, methodo rationali. Apoplexia est symptoma, actio
scilicet abolita sensus & motus. Morbus, ad quem sequitur, est ob-
structio ventriculorum cerebri, tertij vel quarti. Causa istius mor-
bi est humor pituitosus, ex venis ad ventres cerebri descendens.

Sunt ergo tres affectus complicati in hac apoplexia, symptoma,
morbus, & causa morbi: ex his affectibus actio laesa cum habet
suam essentiam in fieri, & ab alio dependentem, non poterit cu-
rari contrariis. Oportebit ergo urgentiori succurrere, nempe ob-
structioni, & si possimus, non negligentes causam. Hac commodè
praestabit sanguinis missio ex cephalica vena, qua (praterquam
quod potest exerceri in accessione & post accessionem) reuellit &
euacuat ex loco affecto: reuellit enim humorem fluentem ad cere-
brum, euacuat autem ex cerebri ventriculis: vena enim tenuis me-
ningis & cerebri inanita attrahent ex ventriculis humorem. Du-
Dubiū. bitabis, si ventriculus est plenus, nonne à sanguinis missione ab-
stinebis, cum eam impediatur, ne crudus humor feratur ad venas? Res-
pondeo, nos sanguinem mittere propter urgentem affectum, noxa enim illa,
qua ex cruditate sequetur, deinde poterit emendari: quod quamuis
ex Galeni methodo curandi colligamus, habemus tamen Galinariam

aucto-

auctorem ex Arabum familia subscriptorem, qui c. de phrenitide in *Finita* principio (inquit) secunda vena est etiam ventriculo pleno. *Finita* apople-
 accessione apoplexia, quando iam terminata est in paralyfim, consi-
 derabimus, an ager habeat inclinationem ad somnum, quam si ha-
 beat, etiam sanguinem mittemus, non ratione paralyfis, qua morbus sim quia
 longus est, sed ratione apoplexiae, non praesentis, sed eius qua futura facien-
 timetur: oportet enim magis inanire venas cerebri, ne ex ipsis fluat dum,
 pituita, quod simul cucurbitulis & frictionibus praestabimus. Quo
 tempore clysterem parabimus acrem, & euacuentur pituitosa ex-
 crementa ab intestinis & primis venis. ℞. centaurea minoris. m. j.
 fursuris, fœniculi, anethi, seminis lini, ana. pug. j. decoquantur in
 sufficiente quantitate aquae, de colatura sume lib. 2. in quam dissolve,
 biera logodionis ℥. j. benedicta ℥. ss. olei rutacei ℥. iij.

De Apoplexia. CAP. XII.

A Tronitum morbum Græci apoplexiam nominant, est au- *Descri-*
 tem apoplexia animalium functionū in vniuerso corpo- *ptio.*
 re subita cessatio, cum videlicet omnes pariter nerui, tum sen-
 tiendi, tum mouendi vim amiserunt propter noxam communi
 neruorum origini cerebro inquam illatam. Hæc eadem cum
 alterutram tantum partem infestauerit, dextram nempe, aut si-
 nistram, Hemiplexia & paralyfis Græcè, resolutio Latinè dici-
 tur, de qua sequenti capite sumus dicturi. Initium huic morbo *Causa.*
 dare procatarticae causæ sæpenumerò consueuere, cum videli-
 cet caput alicuius, aut casu, aut vehementi aliquo ictu vulnera-
 tum est, aut aliqua alia re percussum. Tunc enim ad eam par-
 tem humores confluunt, vt quæ propter ingentem cerebri con-
 cussionem eos ad se venire permittat. Aëris quoque admodum
 frigidi occurfus eandem solet noxam cerebro inferre. Nam &
 caput, spongiæ instar velut manibus apprehensum constringit:
 & illius humores, atque excrementa in internos cerebri mea-
 tus cumulatim retrudit. Magna tamen ex parte à causis inter-
 nis prouenit, nempe à copiosa pituita, quæ nihil aliud est, quàm
 frigidus quidam, crassus atque viscidus humor, qui cerebri ven-
 triculos confertim & semel impletos ita obturat, vt animalibus
 spiritibus nequaquā peruios esse pariat. Quod si, vnde genera-
 tus sit hic humor, quæsieris, meminisse debes, quæ superius cum
 de cephalalgia agebamus, dicta sunt, & quod nimiae cruditates,
 crebraeque potissimum ebrietates huiusmodi succos peperere.

Porro tam grauis hæc affectio est, vt probè de ea scripse-
 rit veræ medicinæ vetustissimus autor Hippocr. Apoplexiam
 fortem soluere est impossibile, debilem verò non facile, cum
 illa

DE CVRAND. MORB.

illa statim interficiat, hæc verò in paralyfim tranſiens non niſi longo tempore curetur. Interficit autem propter reſpirationis læſionem, à qua etiam hoc habet, vt vel fortis, vel debilis dicatur. Nam ſi prohibita ſit penitus tranſpiration, maxima eſt & acutiſſima apoplexia, ſicut omnium maximè debilis, quæ parum habet in anhelitu impedimenti, quæ inter has duas interiacent, pro vt magis ad alterutram accedant, fortiores aut debiliores dicentur. Læditur verò maximè anhelitus, cum priuatur: quando verò reſpiramus, ſed magna cum vi læſus fanè eſt, & tunc anhelitus, ſed minus, minus etiam cum neque intentus, neque violentus eſt: inæqualis tamen atque inordinatus. Præter hæc etiam intermiſſus editur, omnium tamen minimè cum aliquem ſeruat ordinem. Et mirari quidem ſubit, quomodo muſculis omnibus feratis, & motu carentibus in apoplexiis illi, qui reſpirationi inſeruiunt, quamuis difficulter moucantur, tamen plerunque. Videtur autem hoc fieri propter reſpirandi neceſſitatem, quæ neruorum vim excitat ad operationem. Præcedit hunc morbum (autore Paulo) capitis confertus, & acutus dolor, venarum, quæ in iugulo ſunt elatio, vertigo oculorum, incerti & diſcurrentes lucis ſplendores, extremarum partium ſine cauſa refrigerationes, dentium ſtridores, in ſomno lotium emittitur atrum, paucum, & farinaceum habens ſedimentum. Qui iam in hoc malo ſunt ſenſu omnino carentes (vt Ætius ait) mortui viuunt, quapropter clauſis oculis dormientium more decumbunt ſtertentes. Opprimi hoc mali genere ſenes, atque eos maximè qui temperatione ſunt magis pituitoſa: quod ſi iuuenem, & æſtiuo tempore corripuerit, maxima eſt apoplexia, & quæ magnam arguat cauſam, vt ex aphoriſmo 34. ſectionis ſecundæ didicimus.

*Nota
preſentis
morbi.
Signa.*

*Curatio
ſanguinea.
Reuulſio.*

Sanguinea apoplexia tribus remediorum generibus curatur. Primò reuellentibus, vt ſectæ vena baſilica primum, ſi magna eſt plenitudo, aut vtraque cephalica ſimul: quia ſeruata rectitudine in morbo breuiſſimo & fortiſſimo cephalicæ ſectio eſt vtilior. Frictionibus totius corporis, præcipuè partium infernarum, & earundem ligaturis dolorificis, lotionibus calidis, cucurbitulis, ſine ſcarificatione primò, deinde cum ſcarificatione, clyſteribus, & glandibus acribus, minùs tamen potentibus quàm in pituitoſa.

Deriuatio.

Secundò, vacuantibus materiam cerebri, & ventriculorum eius iterum ſectæ vna, aut duabus cephalicis, poſt vena frontis, Deinceps fit vacuatio per hoc, vel ſimile medicamentum. ℞. hieræ picræ. ſ. ʒ. j. pilularum de rhabarbaro ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. aquæ cichoreæ. q. ſ. miſce, & fiat potus.

Tertiò,

Tertiò, alterantibus intemperiem calidam à sanguine reli- *Alteratio.*
ctam: vt oleo & aceto rosatis, & similibus: quæ initio non con-
ducunt (quampuis repellant) propter obstructionem. Electua-
rium diarhodon. abbatis est in hoc genere optimum.

Pituitosa apoplexia, quæ ferè semper fit, curatur quatuor au- *Pituitosa.*
xiliorum generibus, primò, victu tenuissimo, præsertim primis *sa.*
tribus diebus, deinde solo iure pullorum columbi cum ciceri- *Victus.*
bus nigris, & pipere nutriatur, & aqua mellis, & nucleis pineis
saccharo conditis.

Secundò auerrentibus, vt acris clysteribus caput & pi- *Auerfio.*
tuitam vacuantibus, qualis est hic: ℞. vtriusque cyclamini,
centauræ minoris, hellebori albi, colocynthidis in ligatu-
ra positæ an. m. j. fiat decoctum in lib. tribus aquæ ad con-
sumptionem duarum, cuius ℥. vj. in anum mittantur, & si
citò ab ano elabantur, rursus repetantur, & infundantur, donec
humorum copia vnà cum clystere deiciatur, sequens clyster
est optimus, & potens. ℞. saluæ, roris marini, stachados, rutæ,
hyssopi, & pulegij an. p. j. fiat decoctum, de quo accipe libram
vnā, cui adde hieræ logodionis ℥. j. pilularum cochiarum ℥. j.
olei rutæ & de lilio an. ℥. ij. salis gemmæ ℥. j. β. misce, & fiat
clyster. Glandes acres quoque auerunt, & euacuant, & maxime
sunt necessariae præcipuè cum clyster accipi, aut retineri non
potest, quales sunt hæc: ℞. pulueris Hieræ logodionis ℥. v. salis
gemmæ, colocynthidis, & hellebori an. ℥. j. mellis q. s. misce, &
fiant tria suppositoria filo appensa.

Tertiò, vacuantibus pituitam crudam (quia hic morbus est *Purga-*
acutissimus, dependens à materia fixa in membro principe, & *tio sine*
ideò quodammodo turgida, quare moram, & tempus apparandi *prepara-*
non concedit) etiam valentibus, & largioribus medicamentis *tione in*
purgantibus: virtus enim expultrix in iis est sopita, & meatus *moris.*
angusti, vt sanguis & spiritus per ipsos permeare non possint.
Huiusmodi sunt pilulæ cochia, pilulæ foetida, pilulæ de sarco-
colla & euphorbio, dissolutæ ℥. j. β. earum cum ℥. ij. aquæ ste-
chados, & ℥. j. syrupi de hyssopo: aut fiat vacuatio per hunc aut *Potus.*
similem potum: ℞. electuarij indi maioris ℥. iij. agarici tro-
chiscati ℥. j. rhodomellis. ℥. j. aquæ saluæ quod sufficit, misce,
& fiat potus. Deinde fiat vacuatio per loca propinqua gargariza-
tu, vulgò gargarisma dicitur, & errhinis (quæ dicuntur à medicis *Deriva-*
& pharmacopolis barbaris nasalia, aut caputpurgia) & sternuta- *tio.*
mentis & apophlegmatismis, quæ à nostris dicuntur mastica-
toria. Hæc, quia magnam agitationem propè affectam partem *Auerte.*
efficiunt, nocent ante vacuationem vniuersalem, aut totius cor-
poris, nisi in maxima necessitate, vbi timetur subito mors.

Errhina,

DE CVRAND. MORB.

Errhina, seu caputpurgia medicamenta, quæ sternutamenta efficiunt, aut sunt.

Mitiora, vt { Aquæ capitales distillatæ, anagallidis vtriufque succus, ceparum succus, cyclamini succus, brassicæ succus, succus sielæ, succus foliorum enulæ campanæ. Aut,

Valentiora, vt { Ireos succus, marrubij succus, radicis nigellæ succus, hellebori succus, radicis agrestis, cucumeris succus, castoreum, piper, helleborum album, euphorbium.

Apophle Apophlegmatismi (vocant nostri masticatoria) aut sunt,

gmatis- Mitiores, vt { Hyssopus, origanum, thymus, pulegium, cap-
mi. pares:

Valentiores, vt { Synapi, mastix, radix acori, zinziber, piper, pyrethrum.

Hoc schemate continetur cognitio medicamentorum à capite purgantium per proxima loca, tam habentium facultatem mitem. & clementem, quàm eorum, quæ sunt valent facultate prædita: quorum formas tyronibus in hunc modum describemus. Gargarizatus clementis formula: ℞. maioranæ, origani, saluiæ, roris marini, stæchados an. p. j. fiat decoctum in lib. ij. aquæ donec tertia pars absumatur, cuius collaturæ adde rhodomellis, oxymellis compositi an. ʒ. iiij. misce, & fiat gargarizatus. Valentioris formula est: ℞. aquarum saluiæ, stæchados, betonicæ, roris marini an. ʒ. iiij. aquæ vitæ ʒ. j. hieræ S. ʒ. j. mithridati, & theriacæ magnæ an. ʒ. ij. oxymellis scillitici ʒ. ij. syrupi acetosi S. & rhodomellis an. ʒ. iiij. misce, & fiat gargaryzatus, quo sæpe os & palatum abluatur. Formula errhini solidi mitioris est hæc: ℞. pulueris maioranæ, saluiæ, piperis, caryphyllorum & nucis muscatæ an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ, quod s. misce, & fiant errhina, seu nasalia effigiem pyramidis referentia. Valentioris errhini formula hæc est: ℞. pulueris pyrethri, piperis lōgi, hellebori, castorei an. ʒ. j. terebinthinæ & ceræ an. q. s. misce, & fiant errhina, seu nasalia formâ pyramidis, quæ naribus imponantur.

Formule
le om-
nium.

Forma errhini liquidi, seu caputpurgij mitioris: ℞. succi betæ, brassicæ, & ciclamyni an. ʒ. iiij. misce. Valentioris formula hæc est: ℞. succi ireos, marrubij & cucumeris sylvestris an. ʒ. ij. pulueris nigellæ, & piperis an. ʒ. j. pulueris hellebori & euphorbij an. ʒ. s. misce, & huius parum naribus instilletur. Forma pulueris hæc medicamenta naribus immissa sternutamenta efficiunt, & caput purgant.

For-

Eorma apophlegatismi, seu masticatorij minoris hæc est. ℥. pulueris piperis, mastichis, zinziberis & galægæ an. 3. ℥. origani, thymi, pulegij an. 3. j. cum oxymelle S. & pauca cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum. Valentioris formula hæc est. ℥. pulueris sinapis, stasifagriæ, piperis, & pyrethri an. 3. j. ℥. hellebori 3. j. cum oxymelle scillitico & cera, fiant formulæ ad magnitudinem lupinorum, quorum vnus in ore detineatur semper & manducetur.

Post hæc capiti raso admoueatur hoc vnguentum, seu sinapismum. ℥. olei costini, castorei, & de euphorbio an 3. j. pulueris sinapis, euphorbij, & serapini an. 3. j. aceti cochlearium vnum, ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Demum frixorium ferreum, seu candentem sartaginem tantopere oportet capiti adioueri, vt capilli ægri comburi videantur. *Topica.*

Et quia ab hac apoplexia, quæ debilis vocatur, multi euadunt, non omnes (Galeno teste) quibus signa lethalia sunt, moriuntur: multi etiam citra expectationem vllam sanantur, quia accidunt monstrum rerum natura: ad cognoscendum viuat ne, an mortuus sit æger, cum sit simillimus mortuis. obseruanda erunt hæc signa, quæ à respiratione colliguntur, priusquam operi manum admoueamus, ne vsu veniat nobis quod aliquibus medicis, qui in mortui aluum clysterem infuderunt, & venam cadaueris iusserunt secari. Si lana carpta, aut gossipium carptum naribus, aut ori admota, vel candela accensa, aut cyathus aquæ plenus pectori etiam appositus moueantur, vitæ certissimum est indicium. Speculum quoque tersissimum ori & naribus admotum, si maculetur, respirationem & vitam testatur: & quamuis nulla indicia vitæ appareant, si fuerit æger imbecillus, aut suapte natura frigidus, non est sepeliendus nisi post tres dies. Illo enim spatio mouentur omnes corporis humores, & extra illud, aut mortis aut vitæ euidens demonstrabit signum: & ideo Euangelium secundum de Lazaro inquit, fœtet, quia quatrduanus est: primis tribus diebus aliqui corde frigidi visi sunt reuixisse. *Obseruatio. Mortis, aut vitæ exploratio. Tempus sepeliendi.*

De paralyfi, quam Latini resolutionem dicunt. Cap. XIII.

Dictum superiori capite iam est paralyfim tunc fieri, cum alterius lateris nerui dextri scilicet, aut sinistri motu pariter ac sensu priuantur, quibus si pauca quedam adiecerimus, nihil (vt reor) quod ad naturam morbi *Descriptio.*

DE CVRAND. MORB.

ris mollificatio cum priuatione sensus & motus. Animadu-
 uertere tamen oportet, quod non semper integrum latus re-
 soluitur: nam, & tota manus, & totum crus interdum (vt in-
 quit Galenus) resoluitur, atque solus in crure pes, & quæ sub
 genu sunt, & vt verbo rem complectar, sæpenumero vnius
 tantum membri sensus deperditur, ac motus, vt linguæ, oris,
 vesicæ, & aliarum corporis partium. Porro cum in paralyfi nunc
 motus, nunc sensus, sæpe verò vterque simul pereat, resolu-
 tio potissimum tunc dicitur (aurore Gal.) cum motus amissus
 est. Nam cum sensus tantum eripitur, expertem sensus parti-
 culam magis dicimus, quam resolutam, quamuis id etiam in
 usu sit, vt resolutam appellemus. Vnde tamen id accadat, vt
 perduto sensu particulæ seruetur motus, & contra: & quare
 etiam ambo simul intereant, consulere quintum caput oportet
 quarti libri de morbo & symptomate: nunc illud nouisse satis
 erit, propter horum amissionem paralyfim fieri. Sequitur hic
 morbus frequenter apoplexiam, & (Galeno autore quarto de
 victu acutorum, cōmentario vigesimo octauo) paraplexia pri-
 uatum dicitur. Quare generalius nomen erit paralyfis, omnē re-
 solutionem cōplectens, siue ea apoplexiam sequatur, siue aliū-
 de proueniat. A quacunque verò fiat occasione, humorem fri-
 gidum, crassum, & lentum causam habet, qui nervos obstruens,
 spiritibus motū ac sensum deferentibus viam præcludit. Mor-
 bus cuius ex amisso sensu, ac motu facile patet: monere tamen
 interim conuenit imperitiores huius artis in faciei resolutione,
 quando alterius parti nervi resoluti sunt, vt in ea affectione
 (quam Græci caninam conuulsionem appellant, vulgus Me-
 dicorum oris torturam dicit) malum non in ea parte consiste-
 re, in quam altera inclinata est, sed in illa, quæ seipsam decli-
 nat, & in contrarium trahitur: cui etiam medicamenta sunt ad-
 mouenda, quod ad curationem non paruum affert momentum.
 Sed quando oris tortura fit à conuulsione, ægra pars trahit ad se
 sanam, vt docet Gal. lib. 2. de causis morborum, cap. 7. & lib. 3.
 & 4. de locis affectis. Errant ergo Auicenna, & Gentilis calum-
 niantes Galenum optimum veritatis indagatorem. Cognosces
 torturam fieri à conuulsione, dolore, tensione, & duritie qua-
 dam. Contraria sunt, quando fit à resolutione.

Causa.

Nota.

*Pars de-
lapsa la-
borat.*

*In quo
differat
paraly-
sis &
stupor.*

Differt verò hic morbus ab stupore, quamuis sub eodem ge-
 nere vterque contineatur, magnitudine: cum enim incipit affe-
 ctio, stupor fit: postquam verò consummata fuerit, resolutio:
 vnde Galenus libro 2. de locis affectis cap. 1. mediam quan-
 dam dispositionem stuporem facit inter resolutionem, & inte-
 gram valetudinem.

Cur

Curatio Curatio resolutionis quinque remediorum generibus constat: *Curatio* primò, victu calefaciente, siccante, & pituitæ generationem prohibente, vt aëre arte parato, suffitu rerum calefacientium, si opus fuerit: initio tamen, dum fluit materia, & ante euacuatio- *Victus.* nem, calefactio fiat remissa, ne si maior fiat, humores calefiant, & augeatur fluxus. Panis sit bis coctus, & aniso inspersus, vel semine melanthij, vt est mos Agarenorum, ab illis dicitur xenuz. Carnes sint auium montanarum, quales sunt perdices, turtures, columbi syluestres, & similes iis. Bibat aquam cinnamomi, aut aquam mellis, quia vinum nocet nervis, tum quòd in acetum in iis conuertitur, tum etiam quòd ad ipsos demittit humores: quamuis in medicamentis cum melle, aut saccharo non noceat acetum, vt in oxymelle S. & similibus.

Secundò concoquentibus pituitam incidendo, tenuando & *Præpa-* tergendo eam clementioribus, primò per v. aut vj. dies: vt *ratio.* rhodomellis ℥. x. Item ℥. aquarum saluix & fœniculi an. ℥. iij. misce. Secundò, valentioribus, vt sunt syrapi de hyssopo, de stæchade cum oxymelle. S. & comp. Terriò, valentissimis, vt sunt syrapi de v. radicibus, oxymel compos. & scilliticum, & syrupus de stæchade. His omnibus simul, aut aliquibus cum dupla quantitate aquarum, aut decocti rerum capitalium paratur pituita, perpetuò tamen sit quantitas maior syruporum sine aceto, quia, vt dixi, maximè nervis nocet.

Tertiò, vacuantibus pituitam primò clementioribus, vt *Purga-* sunt Hiera. S. agaricus trochiscatus, pilulæ elephanginæ & *tio.* assaiaret. Secundò & terriò valentioribus, vt sunt pilulæ de agarico, pilulæ cochix, fœtidæ, de sarcocolla, de euphorbio, & similes, electuarium indum vtrunque, post ergo primam concoctionem clementem fiat vacuatio sic. ℥. pilularum de Hiera. S. & agarici trochiscati an. ℥. ij. fiant pilulæ vij. aut ℥. diacatholicon. ℥. ℥. agarici trochiscati ℥. j. electuarij indi maioris ℥. iij. ℥. rhodomellis ℥. j. aqua fœniculi q. s. misce, & fiat potus. Post secundam concoctionem fiat per hoc, aut simile medicamentum vacuatio. ℥. pilularum de agarico, & cochiarum an. ℥. ℥. cum aqua saluix, fiant pilulæ vij. aut ℥. agarici trochiscati, & turbit electi an. ℥. ℥. electuarij indi maioris ℥. iij. rhodomellis ℥. j. aquæ saluix quod s. misce, & fiat potus. Terriò, & quartò, si opus fuerit, fiat vacuatio per pilulas fœtidas, aut de sarcocolla, quamuis inusitatae sint hæ de sarcocolla, vel ℥. ℥. electuarij indi maioris, vel diachartami facto potu cum aqua, aut decocto capitali addendo ℥. j. rhodomellis: quia pilulæ diutius in ventriculo detinentur in iis & similibus morbis, qui à ventre longo intervallo distant.

DE CVRAND. MORB.

laudantur magis, fitque per eas melior & maior euacuatio.

Auersio.

Quartò, auertentibus materiam in partem contrariam, ne fluat ad spinalem medullam: quod fiet per medicamenta purgantia: de quibus tertio genere diximus, per clysteres & suppositoria dicta cap. præcedenti. Auerti etiam potest materia errhinis, sternutatoriis, apophlegmatismis, & gargarismatis, de quibus in extremo cap. superiori abundè diximus. Huic tamen mitiora, & illi valentiora conueniunt, quia apoplexia maximus & acutissimus est morbus.

Resolutio, & corroboratio.

Observatio.

Confectio

Topica.

Vnguentum.

Historia

Quintò, dissipantibus & resoluentibus materiam partium affectarum, & cerebrum, & ipsas roborantibus, perpetuò tamen est diligenter animaduertenda sententia Gale. acut. 1. locorum affectorum illius, cui ex casu è curru digiti resoluti erant, quem sanauerat admoto emplastro spinali medullæ: qua parte affecta nervi ab ea ad digitos progrediētes obstructi erant: ab aliis imperitis medicis medicamenta tantum digitis imponebantur. ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mitridati cum aqua, aut syrupo calido capitali multis diebus sumpta hæc omnia efficit. ʒ. ij. diamusci dulcis eandem habent vim, si multis diebus deuorentur, radix acori condita, aut eryngij est optima. Hæc confectio habet quoque eandem, aut similem facultatem. ʒ. diamusci dulcis ʒ. ij. acori conditi ʒ. j. conseruæ anthos, & stæchados, an. ʒ. iiij. theriacæ magnæ, & mithridati an. ʒ. ij. pulueris galangæ, piperis, cassiæ signæ, calami aromatici an. ʒ. j. syrupi de stæchade, quòd satis est, misce, & fiat confectio: Dosis. ʒ. ij. cum ʒ. ij. aquæ, aut decocti, aut syrupi capitalis. Partem resolutam, & spinalem medullam, iuxta vertebrae, per quas oriuntur nervi, quibus sensus & motus illi parti datur, unge bis in die hoc vnguento. ʒ. olei euphorbij, castorei, rutæ, & de lilio an. ʒ. j. vnguenti aragon & dialtheæ compositæ an. ʒ. ʒ. cera quòd satis est, misce, & fiat vnguentum. Aliquando præsertim præcedenti hac vnctione, & existente humore in profundo cucurbitulæ admotæ parti resolutæ materiam dissoluunt. Balnea potentia calida & sicca naturalia, & artificiosa, sunt optima, vt sunt sulphurea, & quæ fiunt ex decocto roris marini, camomillæ, saluiæ, rutæ, origani, & similium. Quidam affectus diuturna resolutione post consentaneas vacuationes curatus fuit hoc medicamento: Accipe lapidem molarem ignitum quem sparge vino maluatico, cuius suffitu & euaporatione pars resoluta calefiat bis in die, post vaporem vagatur hoc vnguento. ʒ. olei de euphorbio ʒ. iiij. olei rutæ ʒ. j. castorei, pyrethri, triopiperon an. ʒ. j. pulueris rosarum ʒ. ʒ. cera. q. s. misce, & fiat vnguet.

Hæ

Hæ pilulæ sunt maximè efficaces in hoc genere. ℞. castorei, assæ foetidæ, an. ℥. j. ligni aloës electi ℥. j. cum mithridato, pilulæ xij. fiant: quarum dosis sunt tres tertio quoque die dandæ ante solis ortum per horam. Si multis diebus bibat ℥. iij. aquæ roris marini cum granis tribus pyrethri, erit ad hæc optimum remedium.

In resolutione, quæ fit cerebro primo affecto, cauterium *Aqua* actuale in initio colli iuxta nucam, vulgò ita dictam, est effi- *roris ma-* cax remedium, & alterum post vltimam vertebra, sed eorum *rini.* penetratio debet esse non magna. Si verò sit particularis, cau- *In para-* terium fiat in parte affecta, sed prouidendum est, ne his, aliis- *lysi per* que remediis calidis pars resoluta inflammetur, vt sæpè fieri so- *prima-* let ab imperitis medicis. *riã affe-*

Si resolutione laboret aliquis, propterea quòd ex alto ceci- *ctionem* derit, aut propter inflictum vulnus, desperatus est ille æger, *observa-* præsertim si tumor induruerit, à quo obstruantur nerui, & *tio.* tandem resoluantur. Si verò ab aliquarum vertebrarum luxa- *In para-* tione resolutio genita sit, per reductionem vertebrarum in *lysi ex* suum locum curabitur. Post reductionem ad dissoluendum *casu, aut* humorem, si sit in neruis, hoc medicamentum affectæ parti *ictu, &c.* semel in die admoueatur. ℞. farinæ fœnugræci, bdellij, ar- *Empla-* moniaci an. ℥. j. piperis albi, seminis been an. ℥. β. axungia *stru re-* anatis ℥. iij. olei de lilio ℥. j. semis, misce & fiat ex his secun- *stituto* dum artem cataplasma, seu emplastrum, quod parti resolutæ *membro* & origini neruorum admoueatur. *admo-* *uendum.*

Scholium.

Dictum superiori capite.] Paralysis aut est exquisita, in *Diuidi-* qua sensus & motus deficiunt, aut non exquisita, quando al- *tur pa-* terum eorum seruatur: quacunque sit, aut est in medio corpore, *ralysis.* aut in vna tantum parte. Si medium occupat corpus, morbus erit in cerebro, aut in principio spinalis medullæ: quod distingues ex dimidia capitis parte affecta, aut non affecta. Si paralysis vnius *Paraly-* tantum partis sit, tunc in neruo illius partis quarendus est morbus, *sis quid* ac proinde exortus neruorum sunt intelligendi, lege lib. 2. de caus. *sit.* symp. cap. 5. Paralysis est symptoma, actio scilicet abolita. Morbus, *Morbus* ad quem sequitur, est obstructio ab humore crasso, aut tumore fa- *in para-* cta. Dices, si nerui non sunt caui, quomodo obstruentur? Respondeo *lysi.* Gal. obstructionem appellare 2. libro de caus. symp. Omne illud, *Obiectio.* quod impedit transitum humoris, aut alterationis. Quamuis ta- men hac sententia probabilis appareat, existimo tamen in paraly- si morbum esse in numero addito, est enim additus humor impe-

DE CVRAND. MORB.

Practici taxantur, *Obiectio,* *Sanguinis missio in paralyti.* *diens actionem: neque poterit dici humor ille obstructio, si propriè loquamur: quia nervus caret cavitate, & hac ratione suffusio etiam diceretur obstructio. In curatione paralytis reucllunt practici humorem ab spinali medulla purgatione, omittentes sanguinis missionem, malè tamen, cum hac sola reucllat humorem à parte affecta, quod non poterit rectè præstare purgatio carens in principio occasione, humore existente crudo, & non sequace. Si obiicias humorem esse frigidum in paralyti, & ideò non esse mittendum sanguinem: Respondebo, aut humorem frigidum esse multum & secretum à sanguine, aut habere satis insignem quantitatem sanguinis admixtam. Si multus est, & secretus à sanguine, tunc non mittemus sanguinem, quia non constant vires: si verò multum sanguinem habeat permixtum, sanguinis missio exercenda erit. 6. epy. par. com. 43. non ratione morbi, quia cum fiat ex pituita, purgationem postulat: sed ratione affectus venarum, hoc est sanguinis vitiosi. Sanguine ut decet, misso & humore purgato, discutiemus in parte inclusum topicis medicamentis, ita ut in principio sint leuia, ut totum euacuent humorem, aliter enim euacuata parte tenui reliquum indurabunt, & incurabilem efficient affectum. Deinde hoc uteris unguento. ℞. olei laurini & vulpini an. ʒ. ij. ʒ. axungia ursi ʒ. j. ʒ. sagapeni, opoponacis ana. ʒ. iiij. unguenti marciaton ʒ. j. ʒ. cera parum, & fiat unguentum, quo caput, aut principium spinalis medullæ, aut principium nervi, si sit paralytis particularis, inunges.*

De conuulsione. CAP. XIV.

Descriptio.

COnuulsio, quam Græci spasmon appellant (auctore Gal. vj. aph. com. 39.) affectio est inuoluntaria ad similem venientibus nervosis partibus dispositionem, quam etiam in moribus voluntariis assumunt. Vnde & ab eodem rectè dictum est libr. 5. de morbo & symptomate, conuulsionem esse, quæ nervos musculósque ad eundem cogit affectum, in quem ipsi ab animali facultate, cum habitum naturalem seruarent, ducebantur. Quæ si ita sunt, constabit sanè conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali differre, quòd præter voluntatem nostram conuulsio fiat, cum in ea non ab arbitrio, sed à morbi imperio nervi in suam originem conuellantur: qua sola in parte dissimiles sunt, naturalis motus, quem voluntarium dicimus, & is qui in conuulsionibus reperitur, cæterò similes sunt ferè. Quod rem ipsam consideranti, & Galeni insuper librum tertium de locis affectis, & quintum de morbo, & symptomate legenti, facile constabit.

Eodem

Eodem enim modo fiunt: nam voluntarius motus interim intentus versus principium musculis, interim ab irruente spiritu impletis perficitur, ita conuulsio eodem modo accidere solet. Nam & spiritus intra ipsos generantur, qui eos inflare possint, & complures etiam affectus, qui illos intendere queant: *Diuisio.* cuiusmodi est phlegmone: quos omnes Galenus ex Hippocrate in duo capita reuocauit, plenitudinem, & inanitionem. Phlegmone plenitudinem parit, ardentissimæ & aridissimæ febres inanitionem. Porro quod neruosa corpora omnia tendi possunt, siue oppleta ea sint, siue inanita, argumento sunt musica instrumenta: etenim rumpuntur eorum chordæ, siue in humido, vaporosoque, siue in arido & squalenti cubiculo intentis etiamnum chordis collocentur. Quod cum intel- *Species.* ligant huius rei haud ignari artifices, eas antequam reponant, laxare solent. Conuulsionis in vniuersum tres species traduntur Græcis appellatæ nominibus, quarum prima emprosthotonus dicitur, id est, tensio ad anteriora, & fit quoties caput, ceruix, reliquumque corpus in pectus contrahitur. Secunda opisthotonus, id est, tensio ad posteriora, acciditque cum caput in dorsum conuellitur, scapulisque velut annectitur. Tertia ex vtraque composita, tetanus appellatur, Latinis tensio, Celso rigor: qua affectione qui laborant, recta ceruice velut frigore concreti rigent, ita vt neque in hanc neque in illam partem flecti possint: sed quasi ab vtraque impediuntur, in neutram inclinant. Quæ sanè species aut differentia conuulsionis reliquis periculosior est autore Hippocr. Quicunque tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos *5. lib. aphor. 6.* effugerint, salui fiunt: peracutus enim morbus est: vnde & iudicationem fieri oportet in primo circuitu dierum criticorum, non toleranti natura longiori tempore tensionis laborem. Et contingit sanè per has differentias interdum vniuersum corpus conuulsione tentari, interdum vnā partem, proinde ac in paralyti quoque fieri diximus. Conuulsio verò *Simile.* vniuerso corpore (vt omnes quidem autumant) ralem quampiam partem affici necesse est: quæ vt in arbore caudex ramorum, sic ipsa sit omnium neruorum communis origo aut quoties vel crus, vel altera tantum manus conuellitur, illius membri conuulsio neruorum, qui ad ipsum perueniunt, originem affectam fuisse declarat rami cuiuspiam exemplo in arbore. Atque huius quidem conuulsionis, quæ scilicet particulare aliquod membrum afficit; multæ sunt differentix: quippe si quis violenti aliquo dentium stridore vexetur, maxillares musculi conuulsione laborant, per inuersiones verò

DE CVRAND. MORB.

& strabismus conuelluntur oculorum muscoli. Iam & gonorthæa conuulsionis species censetur, verum distinctione adhibita: si enim rigido pene semen effluat, veluti conuulsio quædam est: si non rigeat penis, ad retentricis facultatis imbecillitatem referri debet. Sed longum esset omnes differentias re-

Causa.

censere. Causas huius morbi, tametsi superius obiter eas attigimus, clarioris tamen & vberioris institutionis causa accuratius repetemus. Duæ ab Hippocrate in vniuersum ponuntur plenitudo, & inanitio: oppletis siquidem, aut vehementer exinanitis nervosis partibus conuulsionem accidunt, quemadmodum euenire in lyricis fidibus antea dictum est: & in tergoribus quoque ac loris acridere Gal. ait: verum tertium eis adiacere conuenit, nempe consensum aliarum partium, à quibus conuulsio non raro excitatur, quam conuulsionis differentiam, qui Arabum sequuntur placita, spasmus non proportionatum ad materiam appellant, quod scilicet non contingat propter materiæ multitudinem nervos implentis, neque propter eiusdem inopiam eos inanientis, atque exsiccantis: sit autem quoties aliquid à parte primò affecta ad cerebrum ascendit, quod ut excutiat, vehementer & inquietè concutitur. Solet autem per consensum infestare nervorum originem, ita ut ad ipsam aliquid ascendat, quod hanc conuulsionem inuehat, vel impactus nervosis partibus erodens aliquis humor, ut in eo qui propter æruginem in ventriculo contentam conuulsionem patiebatur, ut videre est v.aph. com. j. aut venefica aliqua qualitas, aut spiritalis substantia in cerebrum elata, ut de puero refert Gal. qui quotidie in epylepsiam incidebat, propter nescio quid, quod à crure in cerebrum ascendebat simile illi, quod ab scorpione, & ab aliis venenatis feris in icta parte relinquitur, quod cum mole minimū sit, facultatē maximum est. Iam & nervorum punctura hoc ipsum efficere potest (quod Galen. confirmavit tertia parte artis medicinalis) quoniam ea pars cerebro continuatur, promptaque est ad conuulsionem excitandam: & vniuersim, id omne quod propter illatum partinocumentum cerebrum ita afficit, ut ipsum ad expulsionem rei noxiæ per huiusmodi motus exciter, hoc genus conuulsionis efficere potest.

Nota.

Notis quibus morbus dignoscatur, non est opus: satis enim per se patet, à qua tamen fiat causa, sic deprehenditur. Conuulsio, quæ à plenitudine fit, sanum corripit subito eueniens, aut saltem non multò post morbi initia: quæ verò propter inanitionem accidit, non similiter euenit, sed post arduas febres, plurimásque euacuationes, siue per sudores, vomitum, deiectionem

deiectiones infernas, sanguinis profusionem, siue aliquo alio modo factæ fuerint. Hæc enim omnia, atque alia his similia cum corpus exhauriant, conuulsionem inaniendo inducunt. Tertiam illam differentiam quæ per consensum est, ab ægro- tantis, aut assidentium sermonibus oportet exquirere.

Conuulsio ex repletionem pituitosa (à qua frequentius fit) curatur sex remediorum generibus. Primò calfaciente, & sic- cante victu simili resolutorum victui, de quo præced. cap.

Secundò, pituitam conquoquentibus, primò clementibus, *Curatio* secundò valentioribus, tertio valentissimis, de quibus cap. su- *pituito-* periori abundè diximus, nisi doloris vehementia, & magni- *sa.* tudo ordinem peruerteret, tunc oportet vacuare materiam, etiã *Victus.* si non sit turgida, ne pereat æger. Ante concoctionem etiam *Purga-* per medicamenta valenter purgantia, quorum formas capite *tio sine* superiori docuimus, & sequenti etiam genere trade- *præpa-* mus. *ratione.*

Tertio, purgantibus materiam paratam, si intermissione *Purga-* fecerit dolor, aut crudam, si vehemens & magnus fuerit. Qua- *tio.* les sunt pilulæ de agarico, de hiera composita, cochix, foeti- dæ, de sarcocolla, & de serapino, & opopanace: quamuis tres vltimæ non sint deuorandæ, nisi ægri vires validæ sint, & morbus magnus, & alia minus valenter purgantia medica- menta non satis idonea sint, Electuarium etiam indum pur- gat pituitam, & alia de quibus i. cap. & capitibus de cepha- lalgia pituitosa, de apoplexia, & de resolutione satis copiosè diximus. Primum ergo propter tyrones post primam initio- rem concoctionem, sequentibus pilulis fiat vacuatio. ℞. pilu- *Vacua-* larum cochiarum, & agarici trochiscati an. ʒ. ʒ. cum aqua *tio se-* saluix fiant pilulæ viij. aut hoc: ℞. diacatholicon. ʒ. ʒ. ele- *cunda* ctuarij indi maioris ʒ. iiij. ʒ. agarici trochiscati. ʒ. j. rhodo- *validior* mellis ʒ. j. aquæ pæoniæ q. s. misce, & fiat potus. Secundò, post *Tertia.* secundam valentem concoctionem his pilulis euacua. ℞. pi- lularum cochiarum, de agarico foetidarum an. ʒ. j. diagridij ʒ. iiij. cum aqua saluix, fiant viij. pilulæ: aut ℞. electuarij indi maioris ʒ. iiij. ʒ. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ʒ. salis ʒ. ʒ. Rhodomellis. ʒ. j. ʒ. aquæ stæchadis q. s. misce, & fiat potus. Tertio, post tertiã valentio- rem concoctionem fiat his pilulis vacuatio: ℞. pilularum foetidarum ʒ. ij. pilularum cochiarum ʒ. j. diagridij ʒ. iiij. cum aqua roris marini fiant pilulæ viij. Aut. ℞. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ʒ. diachartami, & electuarij indi maioris an. ʒ. iiij. rhodomellis ʒ. ʒ. aquæ roris marini, quod satis est, misce, & fiat potus. Quarto, auertentibus ad inferiora materiam, vt clysteribus *Auersio.*

DE CVRAND. MORB.

acribus, & glandibus, frictionibus, & vinculis dolorificis in parte contraria, errhinis, apophlegmatismis, gargarizatu, & similibus, quorum copiosam tractationem vide cap. xij. de euacuatione apoplexiæ.

Discussio

Quinto, digerentibus, seu resoluentibus materiam nervis affixam internis, & externis, ut usu longo diamusci utriusque, mithridati, aut theriacæ magnæ, confectionis anacardinæ, & similibus. Acorus conditus est etiam in hoc utilis

Confectio.

cum aqua, aut decocto, aut syrupo capitali. Hæc mixtura confert multum in hoc genere: ℞. diamusci dulcis ℥. j. diagalangæ ℥. ss. pulueris diacymini, & aromatici rosati an. ʒ. ij. pulueris calami aromatici, galangæ, & radices pæoniæ an. ʒ. j. ss. radices acori conditæ ʒ. iij. syrupi de stæchade. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis est cochlearium vnum cum

Topica.

aqua roris marini, aut alia simili. Vnctio ex oleo de lilio, vulpino, de semine lini, rutaceo, de castoreo, & de euphorbio, & similibus est optima. Admouere etiam parti conuulsæ pulmones arietum, aut animalia parua bruta recens per dorsum incisa, est quoque optimum remedium ad resoluendum, ut sunt pulli gallinacei, columborum, parui canes, & catuli. Confert quoque manum, aut partem conuulsam in bouem, aut aliud animal recens cæsum immittere, & ibi, dum caleseat, tenere. In vinum nouum feruens immittere manum est uti-

Balnea.

le. Probatissima sunt in hoc morbo balnea, præsertim naturalia, ut sulphurea, aluminosa, & falsa, aut à nobis parentur ex sulphure, sale, alumine, & herbis, & floribus capitalibus incoctis. Suffitus, & vapor prædicti decocti per lapides ignitos in cacabum iniectos, si toto corpore, aut parte resoluta (si totum non fuerit) sub conopæo, ne expiret vapor exceptus maximè conducit: post quem, aut balnea, vnctio melior erit,

Vnguentum.

& validior oleis iam dictis, & hoc vnguento: ℞. olei rutæ, & de lilio an. ʒ. j. ss. olei de euphorbio & laurini an. ʒ. j. dialthæ compos. & vnguenti aragon. an. ʒ. ss. pulueris castorei, & diacymini an. ʒ. j. ss. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguentum.

Lenimētum.

Præstantissimum quoque est remedium partes conuulsas oblinere adipe anseris pinguis, exenterati, & cati parui minutatim concisi, & lardo veteri, myrrha, thymno, terebinthina abietis, farti, & confuti, & tosti. Accipiaturs adeps non primus, sed secundus decidens, & distillans in vas fere plenum aceto. Post perfectam tosturam anser in paruas partes diuisus eodem aceto percoquatur, à quo fuit adeps extractus, & alio, si non sufficiat primum vsque ad separationem ossium, & iterum colligatur adeps supernatans, qui mixtus cum priori

valeat

valentiori referuetur ad idem hoc, quod supra diximus, efficiendum. Sequēs, quoque vnguentum est optimum: ℥. olei rutæ, lumbricorum, & de lilio an. ʒ. j. β. olei castorei, & colti-
 ni an. ʒ. j. agrippæ, dialthæ, & marciaton an. vnciam β. ceræ
 quod satis est, misce, & fiat vnguentum: quo pars conuulsa
 vngatur, & vertebræ, per quas nerui oriuntur illi parti sensum
 & motum tribuentes, aut ceruix, & tota spina, si fuerit vni-
 uersalis conuulsio.

Sexto, corrigentibus symptomata, præcipuè dolorem, qui
 aliquando solet esse tam intensus, & intolerabilis, vt vix
 æger possit illum ferre. Balneum olei communis est bonum
 mediocriter calidum, melius si sit cum decocto seminis lini,
 fœnugræci, lumbricorum, foliorum, maluæ, violarum, & ca-
 momillæ: optimum erit balneum ex oleo vulpino, sed hoc
 maiori pretio emitur. Dolorem hunc lenit oleum rosaceum
 cum ouorum vitellis aliquot. Eiusdem, aut maioris etiam
 facultatis panis calidus est, cum è forno educitur, cum lacte
 caprino. Oleorum camomillæ, lumbricorum, & terebinthi-
 næ mixtura pari facultate pollet, aut maiori sæpè. Aliquan-
 do præcipuè in maximo dolore, & aliis iam expertis est ne-
 cessarium hoc, aut simile medicamentum narcoticum. ℥. olei
 rosati ʒ. iiij. thebaici ʒ. β. iusquiami, papaueris albi. ana. ʒ.
 ij. corticum mandragoræ ʒ. j. aceti. ʒ. ij. misce, & fiat instar
 vnguenti, aut. ℥. medullæ panis tritici. p. ij. lactis q. s. vitel-
 la ouorum numero iij. opij. ʒ. β. misce, & fiat cataplasma, ad-
 de croci in puluerem reducti ʒ. β.

Si ex sanguine sit conuulsio, à quo rarò dependet, vena se-
 canda est contraria, vt si brachium dextrum conuellatur, ba-
 sica sinistra, & vicissim: si verò tibia, basilica eiusdem partis:
 si totum, basilica dextra, aut vtraque simul, si sit magna ple-
 nitudo. In omni parcè sanguis extrahatur, ne vires disso-
 luantur, quod docet Ætius serm. vj. c. 18. agens de sangui-
 nis missione in resolutione, quæ parem exposcit curationem.
 Oportet autè moderatè detrahère sanguinè, ne refrigeretur.

Si sit conuulsio à bile flaua, aut ab atra bile, vacuetur sta-
 tim, præcedenti tamen iusta concoctione, præcipuè quæ gi-
 gnitur ab atra bile, per propria medicamenta, de quibus c. ix.

Si est ab inanitione & siccitate, curatur humectantibus a-
 limentis, & medicamentis, vt cap. de hectica, lib. 2. longius
 demonstrabitur, videlicet iure gallinarum pinguium, capo-
 num, perdicum, vituli, arietis, suis teneri & similium animã-
 tium cum herbis, aut rebus humectantibus, vt est cremor
 hordei. Ius etiam aut aqua testudinum, limacum, & ranarū

*Sympto-
matum
correctio
per topi-
ca.*

*Sanguini-
nea.
Sectio ve-
na.*

*Biliofa
& atra-
biliaris.
Eiusque
est à sic-
citate.*

*Victus
hume-
dans.*

DE CVRAND. MORB.

in salubribus aquis degentium confert, lac humanum primò, secundò asininum, tertio caprinum alimentum salutare est in hac conuulsione. Vinum generosum, dilutum potenter humectat. Balneum ex foliis maluarum, violarum, radicum altheæ, caricarum, passularum enucleatarum, capitum & pedum arietinorum est optimum ad humectandum. Partes conuulsæ, & tota spina ungatur hoc vnguento, ℞. oleorum sesamini, amygdalarum dulcium & violarum an. ʒ. ij. mucilaginis, seminis lini, & fœnugræci an. ʒ. j. β. axungia gallinæ ʒ. ij. ceræ, quod satis est, misce, & fiat vnguentum.

Vnguentum.

*Eius
qua est
ab ictu
venena-
torum.
Venenu
educen-
tia.*

Si conuulsio est ab ictu animalium venenatorum, extrahe venenum admoto parti affectæ ano galli gallinacei, aut gallinæ glabro, scabiosa pertrita, & cū vitello oui instar cataplas-
matis apposita venenu educit, ideoque carbunculis pestiferis imponitur. Cæpe crudum, vel coctum, admotū parti læsæ, eius-
deque succus venenum expellit. Idem efficit theriaca magna applicata (quanquam vtilior est interius assumpta) cucurbitula cum scarificatione parti punctæ affixa est adiuumento.

*Eius
qua est
à casu
& per-
cussione.*

Si à casu, aut percussione aliqua conuulsio sequatur, post victum tenuem, & sanguinis missionem, & euacuationem per clysteres, parti affectæ, quæ parum emolliant, dolorem sedent, & moderatè resoluant, sunt admouenda, vt est hoc: ℞. hordei decorticati, camomillæ, farinæ fœnugræci, foliorum maluarum, an. p. ij. omnia decoquantur, & cum oleo camomillæ, rosarum, & terebinthinæ fiat cataplasma.

*Eius
qua fit
ex pun-
ctura
neruo-
rum.*

Si ex punctura non penetrante nerui est, scindatur neruus, aut perforetur: melius enim est viuere parte vna priuata sensu, & motu, quàm mori. Deinde apponantur quæ resoluant, & exsiccent humorem in neruis inculcatum, & aperiatur vul-
neris os, vt possit optimè & liberè pus effundi, & ideò oleum pypericum, sulphur, euphorbium cum oleis lumbricorum & rosarum, & pauca terebinthina erit optima mixtura in hac conuulsione.

Scholium.

*Conuul-
sio quid.
Pars
neruosa.
Pratiū
neruosa-*

Conuulsio quæ Græci.] Cōuulsio est motus deprauatus par-
tiū neruosarum, quo versus suum principium retrahuntur.
Prima parte huius definitionis cōmunicat cōuulsio cū palpitatio-
ne, tremore, & alijs motibus deprauatis: reliqua parte ab illis di-
stinguitur. Per partes neruosas cū Gal. 5. libr. aphor. com. 1. intelli-
gimus neruos, ligamenta, fibras musculorū, & tendones. Principiū
harū partium varium est nā principium nerui est cerebrum, aut
spi-

spinalis medulla, ligamenti, os: tendonis, finis muscoli: fibrarum musculi, eius caput. Harum partium omnium, aut unius retractio concipium. uulsio appellatur. Quod si Gal. aliquando Conuulsionem appellat retractionem musculorum versus suum principium, id facit, quia musculus est instrumentum motus voluntarii. Aduerte tamen hanc definitionem esse conuulsionis, cum fit, nam conuulsio facta motus est abolitus. Causa conuulsionis sunt, omnia quae praedictorum corporum longitudinem abbreviare possunt, quae ad duo capita reuocat. Hipp. catur lib. 6. aphor. sent. 29. repletionem, videlicet, & inanitionem, exemplo cor- Gal. darum usus. Quod si aliquando frigiditatem causam conuulsionis scri- Causa bat, de causa externa loquitur, Auctor tertiam causam conuulsionis conuul- addit consensum aliarum partium, decipitur tamen, quia per aliarum sionis. partium consensum non fit conuulsio, sed motus conuulsiuus, qui ce- Auctoris rebri est affectus, aut principij spinalis medulla, & non nervorum. lapsus. Neque etiam sequendus est, cum dicit nervos in conuulsione ab spiritu posse contrahi, nam haec contractio non perdurat, ut ostendit ea affectio, quam vulgo rampa appellamus: tum Galenus 2. de caus. symp. ex sententia pneumaticorum loquitur. Differentias conuulsio- Obie- nis lege apud auctorem. Difficile tamen alicui videbitur, conuulsio- ctio. nem ex repletionem nervi fieri sine sensus & motus laesione, quia si nervus repletur, non poterit alteratio facultatis permeare. Respon- deo in conuulsione repleri nervum inaequaliter, ita ut quadam nervi partes liberae sint, & per ipsas alterationem descendere.

Conuulsio ex repletionem.] In curatione conuulsionis eius causas aduerte, quia ea pro varia causa variatur. Si fiat ab humore pituitoso (ex eo enim ut plurimum euenire solet) auctor purgat, auertit, & topica adhibet medicamenta, recte quidem: Omittit tamen unum remedium maxime necessarium, quod reuellit & euacuat humorem, quod est sanguinis missio. Hac in principio imperanda est, ita tamen Sanguis exerceatur, ut non euacuet quantum postulat morbus, quia aliquid nis mis- omittendum est propter symptoma, nempe dolorem qui ob vigilias & sio. sudorem vires deiecit: aduerte etiam sanguinem solum esse mittendum in hoc affectu cum pituita satis insignem quantitatem sanguinis habuerit admixtam. Si a sanguine fiat conuulsio, etiam venam Lapsus secabis. Conuulsio nunquam a bile ortum habet, quia, ut diximus, auctoris. tenuis est, & proinde non potest replere corpora nervosa, ac ideo ne sequaris auctorem. Cum conuulsio fiat ab humoribus frigidis, & An in crassis, aliqui, inter quos est Vega, sequuti Cornelium Celsum con- conuul- tendunt, ad eius curationem nobis licere excitare febrem, ut humo- sione li- res attenuati euacuentur, & eorum frigiditas corrigatur. Quam ceat no- sententiam possumus auctoritatibus corroborare: prima est Hipp. bis exci- qui 4. aph. sen. 37. sic scribit. Qui a conuulsione, id est, epitona, tare fe- & emprostotono, aut distensione nervorum, hoc est tetano tenetur, brem. febre

DE CVRAND. MORB.

febre superueniente liberantur, ubi Gal. in commentario, duas (inquit) habet medicamentum intentiones, in conuulsione, superfluum soluere humiditatem, & calfacere frigiditatem, quas duas febris complet. Præterea 2. aphor. sent. 26. Febrem (ait) conuulsioni superuenire melius est, quàm contra. Tertio Hippocrates 6. epid. par. 6. sen. 7. Si prius (inquit) epilepsia capiantur aliqui, & quartana superueniat liberantur: & quamvis hac loca videantur ostendere licere nobis in hoc affectu febrem excitare: multò clariùs idem Hippocr. 2. epy. sec. 5. statim post principium, id visus fuit docere, si puerperis (inquit) conuulsio fiat, ignem excitato: ex quo loco multi colligunt non solum posse nos excitare febrem, sed & putridam, cum Hip. semper per ignem intelligat magnam febrem. Caterùm existimo nò licere ad curandam conuulsionem febrem excitare, quia in ea, non possumus deliberare, de quantitate, occasione, & modo utendi quæ sunt remedij conditores. Rationes propositæ ex auctoritate desumptæ nihil persuadent: nam omnes, quæ in aphorismis & lib. 6. epy. habentur, tantum docent, febrem, quæ conuulsionem & epilepsiam sequitur, eas sanare, aut meliùs esse febrem sequi conuulsionem quàm contra: quia si febris sequitur conuulsionem ex repletionem ornam, calore iuuabit. Maiorẽ vim videtur habere locus qui habetur lib. 2. epy. ex quo aliqui ex nomine ignis persuasi, colligunt debere nos magnam febrem, hoc est putrem excitare, nam diaria non est magna febris. Hi maximè decipiuntur, non enim est in nostra manu febrem mouere putrem, imò si Hippocratis animus fuit, excitandam esse febrem, nomine ignis diariam intelligit, si aduertamus dictionem, excitato, quia nos calefacientibus medicamentis & alimentis, solam hanc generare possumus. Et quamvis hoc ita sit, censeo, Hippocratem non voluisse excitare febrem, sed nobis præcepisse, ut medicamentis calidis, ex quibus illa oriri potest, utamur, quibus curare solemus conuulsionem: vel dicere possumus, Hippocratem in epydimiis particularia exempla scribere, non tamen artem uniuersalem constituere: quam cum in aphorismis præposuerit, proinde in ipsis aliter, ac in epydimiis in febre in conuulsione loqui.

De Tremore. CAP. XV.

Descri-
ptio.

TRemor (vt auctor est Gal. v. de morbo & symptomate) contrarius quidam motus est ex contrariorum in se motuum successione proueniens. Cum enim facultas imbecillior reddita membrum in sublime tollit, ipsa verò grauitas deorsum trahit, pugna quædam fit inter facultatem, & membri grauitatem non permittente facultate deorsum ferri membrum, vt in resolutione membrorum solet, neque grauitate concedente, vt facultas ipsum sublime seruet, vt confluuerat, dum valebat. Itaque

vicissim

vicissim facultas nunc vincitur, nunc vincit, atque hinc nascitur tremor ex duobus scilicet morbis contrariis compositus motus, altero, dum membrum sursum à facultate fertur, altero, dum ob gravitatem, & morbum deorsum premitur. Fit autem in vniuersum tremor ex imbecillitate neruorum, quod palam senectus ipsa (vt Paulus ait) testatur, in qua est incurabilis tremor, specialiter verò id omne quod motricem facultatem imbecilliore reddit, huiusmodi solet symptomata inducere: cuiusmodi est frigidius naturæ temperamentum, frigida aquæ potus non in tempore sumptus, pituitosi humoris abundantia, vini multi, præsertim meracioris immoderatio vsus, senectus, & animi affectiones, vt timor. Vnde his, qui per prærupta ingrediuntur, erura tremunt, & qui incurrentem in se feram videntes fugiunt, tremuli euadunt, neque non toto corpore tremunt, quibus coram terribili aliquo magistratu negotium est, quippe loqui iussi ne vocem quidem citra tremorem reddere poterunt. Signa ex ægri temperamento, & sermonibus patebunt: si iis enim animum aduertas, proculdubiò non solùm notas, sed & causas quoque intelliges. *Causa.*

Tremor curatur abscissa causa eius: sed quia fermè semper fit à pituita, vt resolutio, & conuulsio ex plenitudine, supernaculum esset in præsentia eandem rem iterum tractare postquam satis abundè c. duobus præcedentibus de ea dictum est, mitioribus tamen remediis indiget hic affectus, quàm resolutio, & conuulsio ex repletionem pituitosa, quia à minori fit causa. *Curatio. per remedia mitiora.*

De Ophthalmia. CAP. XVI.

Ophthalmiam medici aliqui duplicem faciunt, veram & non veram: non veram conturbationem oculi, seu vacillationem appellant, & ab externa aliqua occasione fit, verbi gratia: sole, igne, fumo, puluere, ictu aliisque id genus, & à Græcis taraxis dicitur, hoc est, lucis perturbatio, vt apud Paulum videre est, qui sic eam nominat, & velut genus quoddam facit eius (quæ vera dicitur) ophthalmia. Porro tam facilis curatu hæc est, vt vel cognita tantùm causa, ac separata discutiatur, modò id in principio fiat, alioqui neglecta in veram sæpe ophthalmiam transit. Est autem vera appellata ophthalmia, quam Latini lippitudinem nominant, adnatæ membranæ, seu (vt barbari dicunt) coniunctiue inflammatio. Fit hoc genus morbi (de vltima, quæ dicitur vera, loquor) aut ob plenitudinem vniuersi corporis, ob quam adnata quoque humoribus plena distenditur, vel propter *Diuisio*
Definitio
Causa.
acm

DE CVRAND. MORB.

acrimoniam humoris in oculum influentis, vel propter crassorum humorum, aut flatuenti spiritus tensionem.

Nota.

Notæ sunt adnatæ, rubor, ex oculis lachrymæ manantes, & in maioribus oculi angulis, qui ad nasum sunt, sordes quædā acernatæ, & vniuersim omnia, quæ in inflammationibus reperiuntur externis: quia perpetuò interna sequitur febris, symptoma necessarium: ab hac tamen febris non procreatur, nisi sit dolor ingens, & corpus paratissimum ad eam.

Curatio.

Curatur verò ophthalmia sex remediorum generibus, primò victu refrigerante, vt aëre natura frigido, vel industria nostra sparsa area aqua, floribus & foliis refrigerantibus: & aëre ob-

Victus.

scuro, quia lumen resoluit spiritus, humoresque commouet: & victu tenui, quo partes inanitæ retineant tenaciùs humores ne ad oculum confluant. Carnes, oua, vinum, quæ sanguinem augent interdicta sunt: somnus, & quies laudantur: his enim oculus quiescit, & humores.

**Remul-
sio.**

Secundò, auertentibus sanguinem fluentem, vt sectione cephalicæ eiusdem partis, si non fuerit magna plenitudo: tunc enim media, aut iecorata est secanda. Si verò in vtroque oculo fuerit ophthalmia, vtraque cephalica est secanda, aut vtraque

**Seçtio.
vena.**

media. Sanguinis copia, & numerus sectionis venarum respondeat plenitudini, magnitudini morbi, & viribus ægri. Sed si hæc, aut alia quæuis inflammatio à mensibus, aut hemorrhoi-

**Aduer-
te.**

dibus detentis proficiscatur, vena tibiæ, aut pedum est secanda. Fit quoque auersio in hoc morbo per clysteres parum

Auersio.

acres ex cassia præparata, diacatholicon, & similibus: per frictiones partium extremarum, per ligaturas dolorificas, per cucurbitulas sine scarificatione, & cum scarificatione in scapulis, & per fotum ex aqua calida partium extremarum, & per purgationem hanc, aut similem factam medicamentis benignis, & salubribus: vt ℥. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. β. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. j. β. syr. rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ quod sufficit, misce, & fiat potus.

**Repellē-
tia topi-
ca.**

Tertiò, repellentibus materiam fluentem fronti admotis, si fluxio sit per venas, & arterias extra cranium, vt sæpe accidit: quia hæc tunica à pericranio producitur, qualia sunt aquæ rosarum, plantaginis, portulacæ, solani, albumen oui, acetum, cortices granatorum, balaustia, & bolus Armenus præparatus aqua frigida maceratus. Si verò per venas, & arterias intra cranium materia fluat, nocent hæc repellentia capiti, & fronti admota, cum materiam versus nervos opticos impingant: tunc enim naribus & oculis sunt repellentia ad-

**Topica
oculis
apta.**

mouen

mouenda. Ipsi oculo, aut oculis immittimus sæpe aquam rosa-
ceam albumini oui permixtam, aut lac cum è mamma emul-
gemus, aut hanc mixturam. ℞. aquæ rosarū ℥. iij. collyrij albi
rhafis sine opio ℥. ij. tuthiæ præparatæ ℥. j. sarcocollæ nutritæ
℥. ss. misce, & fiat collyrium, adde corallij rubri præparati ℥. j.
mica panis lacte caprino cocta & oculis admota est etiã opti-
ma ad repellendum, & dolorem sedandū. Sed si his dolor non
vincatur, adde emulsionem seminis papaueris, & mucaginem
psyllij, & in summo dolore fit collyriū album rhafis cum opio:
hoc tamen medicamentū, & simile narcoticum non est ocu-
lis admouendum, nisi in vehementissimis doloribus, & quādo
alia mitiora, & securiora non sufficiunt, quia spiritus crassos
reddunt, & videndi facultatē infirmāt lege com. 3 1. 6. lib. aph.
in maximis tamen doloribus, & vigiliis, vbi etiam mors time-
tur, necessaria sunt hæc medicamenta narcotica. Vide histo-
riam de quadam nobili, cap. de ophthalmia doctoris Gatinaris.

*Admo-
nitio.*

Quando dolor est remissior, alia priora absque narcoti-
cis satis sunt, vt in non vera, quæ sæpe curatur sola absen-
te causa externa, seu primitiua, & aliis leuioribus, quæ supe-
rius diximus: vel decocto seminis fœnugræci, & seminis
psyllij, aqua rosarum, & oculis calens admotum, optimum
remedium est.

Quartò apparantibus bilem non naturalem, & crassam sy-
rupo acetoso S. & rhodomelle, aut syrupo malorum granato-
rum, & endiuie comp. cum syrupo rosarum, cum aquis fœ-
niculi rosarum, & plantaginis, & similibus.

*Præpa-
ratio.*

Quintò, materiam concoctam euacuantibus, vt rhabarba-
ro, myrobalanis citreis, agarico trochiscato & pilulis de rha-
barbaro, aut aggregatiuis, & aliis pari facultate præditis,
vt hoc est: ℞. diacatholicon. ℥. v. rhabarbari electi infusi per
noctem in aqua endiuie ℥. j. ss. electuarij de succo rosarum
℥. iij. diaphænicon ℥. j. ss. syrupi rosarum ℥. j. decocti florum
cordialium q. s. misce, & fiat potus. Sanguinis missio ex ce-
phalica eiusdem partis euacuat omnes humores, à parte affe-
cta, & ab aliis proximis.

*Purga-
tio.*

Sextò, reliquias materiæ ex oculo vacuantibus, & resol-
uentibus: vt admoto decocto seminis fœnugræci, seminis fœ-
niculi, & camomillæ, spongia, aut molli lintheo. Balneum &

*Resolu-
tio.*

vinum potus cum Hippocr. 6. Aphor. potenter resoluunt. Idem

Topica.

efficit ouum, ita coctum, vt concretum & induratum sit, ocu-
lis impositum. Pari vi pollebit drachma. j. aloës cum vncia j.

*Corrobo-
ratio, &*

aquæ fœniculi, si oculo applicentur. Hoc medicamentum

alteratio.

oculos roborat, reliquias ficeat, & absomit. Idem præ-

stat

DE CVRAND. MORB.

stat sarcocolla, aqua rosarum, vel potius lacte muliebri nutrita, & soluta.

Ophthalmia antiqua cura ratio. Si antiqua fuerit ophthalmia, & intermittens præcedenti debita victus ratione, & humoris concoctione syrupo rosarum & rhodomelle, cum aqua, aut decocto seminis fœniculi, purgabis 3.j. pilularum lucis ma. aut sine quibus esse nolo, aut de agarico semel in heptomada. Iterum purgabis 3.j. prædictarum, aut similium pilularum: & oculis non sunt admo- uenda repellentia intensè frigida, imò iis semper adde parū

Cautio. aquæ fœniculi, aut rutæ, ne fiat albugo, aut suffusio oculorū: hanc tamen & vlcera oculorum gigni prohibet filiū colo tra- iectū per tres digitos sub nuca, prius tamen apprehende for- cipi cutem, donec sensus tactus abeat, post acui incerto filo

Cervix, filo traj- citur. crasso facto ex pilis caudæ equinæ, vel (ne tantus dolor ex- citetur) seta, vel lino perforamus, vt in vulnere, acu ablata filum maneat, quod vlcus diu apertum seruet, vt per id puris multitudo euacuetur. Diuitibus aureum annulum immittunt, loco fili acui ablata. Quotidie remouent dictum filum vel an- nulum, & manè, vespèrique tergunt terram. Hoc auxilio re- uellente & vacuante multis oculi acies fermè amissa fuit in

Historia pristinam sanitatem restituta, vt ego sæpe expertus sum in plerisque, & in filio meo nato octo menses.

Instru- menta

Scholium.

anima- lia com-

munica-

faculta-

tem.

Vna pars

similaris

agit in

instru-

mento.

Visionis

instru-

mentū.

Ophthalmiam medici.) *Instrumenta animalia* i. de loc. af- fect. c. vlt. aliunde, hoc est à principio (quod cerebrum est) medio nervo, facultatem accipiunt, proinde euenit, in his aliquā- tū habēt do ladi actionē morbo non in ipsis, sed in principio, aut parte, qua defert facultatem, existente. Præterea in his instrumentis una pars similis est qua operatur, reliqua verò ei præbent vsum, Vna pars & ideo in actione corū laesa, morbus aut erit in parte, qua opera- similis tur, aut in alijs. Quod in oculo verū esse deprehendes, hic enim à agit in cerebro per neruū opticū facultatē accipit, pars autē qua in ipso videt, est tunica aracnoides, vna cum humore crystallino, reliqua oculi partes ei præbent vsum. Dices nonne Gal. humorē, Crystalli- Visionis nū, visionis instrumentū appellat? Respōdeo, nomine humoris cry- instru- stallini Galenū, etiā mēbranam intelligere, vt latè in libris de mentū. symptomate & morbo explicatū habeo. Oculi actio (qua visio est) Ophthalmia inter alios morbos solet ladi ab ophthalmia, quā Latini lippitudi- mia quid nem appellant. Hæc nihil aliud est quā inflammatio adnata mē- Causa brana: nomine inflammationis intelligentes tumorem præter na- ophthal- turam, qui in hac membrana, ob multas, quas habet venas, so- let accidere. Causa ophthalmia aut est externa, aut interna. Ex- ter

terna sol, fumus, & alia quæ dolorem, aut calorem in oculo excitando fluxionem mouent. Interna causa est fluxio sanguinis, quæ fit à plenitudine corporis, aut venarum capitis, aut ab humoris acris fluxione. Quæ in parte nobis non placet sententia Montani & Iacoti, existimantium ophthalmiam fieri etiã per essentiã sensim collecto excremento in membrana adnata: nam ex Galeno, ex his excrementis sensim collectis fit apostema & non tumor, qui ex eius sententia sæper fluxionẽ sequitur. Malè etiam multi ophthalmiã à flatu fieri sentiunt, hic enim bene poterit ob tensionem dolorẽ generare, non autem ophthalmiam, quæ est inflammatio. Præterea sententia auctoris, quæ diuidit ophthalmiam in veram, & non veram, sequenda non est: quia à quacumque causa fiat ophthalmia, est dicta membrana inflammatio. Altomarius ophthalmiã morbum compositum ex intemperie, tumore, & soluta continuitate, appellare solet. Decipitur tamen quia tumor, si non ledit actionẽ, non erit morbus, sed symptoma, sicut & soluta unitas. Est ergo ophthalmia intemperies membrana adnata, cū fluxione humoris, quæ si actionem vitiat affectũ generando in humore crystallino, erit causa morbi, aliter verò morbus. Tumor & soluta unita symptomata sunt, quæ ad intemperie cū affluxu sequuntur, sicut & dolor, qui in hac parte membranosa, ac proinde multũ sensibili ita maximus aliquando esse solet, vt ad securationem attrahat, cū fiat causa augens affectũ, nempe tumorem.

Secundò aduertentibus sanguinem fluentem.] Auctor & alij practici in ophthalmia, si plethora sit in corpore, secant basilicam: si verò suppressio mensiũ, secant venam pedis. Qui quantũ errent intelliget, qui ex Galen. didicit, reuulsionem faciendã esse ex parte, ad quã fluit humor, & ex vena, quæ cū loco affecto se aperit. Secanda ergo erit ob dictas causas in hoc affectu cephalica eiusdem partibus, quæ citò & multũ euacuat ex oculo affecto. Purgatione etiam auctor in principio reuellit, sequutus fortasse Gal. qui 13. metho. cap. 11. phlegmonẽ oculi incipientẽ sola purgatione vno die secuisse scribit. Hoc poterimus refellere, eò quòd humor in ophthalmia non turgeat, quia in principio inflammationis, non solũ reuellere, sed ex parte affecta debemus euacuare, quod non poterit præstare medicamentũ purgans. Aliqui respondent verum esse in ophthalmia solũ in principio sanguinẽ esse mittendum, aliquando tamen, cū vires non sufficiunt ad eam euacuationem, posse nos purgare, cū purgatio minores postulet vires, quã sanguinis missio, atque hoc considerando Gal. 13. method. faciendo id, quod potuit purgasse. Alij satisfaciunt, contendentes etiã in principio ophthalmia semper esse secandã venã, nãque id violasse Gal. 13. method. nã ibi non purgauit in tumore præter naturam, sed in phlegmone oculi, hoc est ardore, id enim existimant intelligere Galenũ per phlegmonem.

Montanus & Iacotius errant.

Auctoris lapsus. Altomarius decipitur.

Practicorum error circa missionẽ sanguinis.

An in principio ophthalmia li-
ceat purgare.

DE CVRAND. MORB.

Horum sententia nobis non placet, quia non semper in principio ophthalmia debemus sanguinē mittere, licet enim aliquando purgare, ut si fiat ophthalmia à bile, de qua loquitur Gal. 13. method. tunc enim purgatione utemur, qua ex venis euacuantes bilem re-

Obiectio uellimus à loco affecto. Dices est inflāmatio, debemus ergo ex parte euacuare. Respondeo, hanc inflāmationem esse rxiguam, & ex humore tenui factam qui citò exhalat, ac proinde non egere euacuatione, qua fit per sanguinis missionem, verum est posse sanguinem mittere, si sanguis sit prauus. Obijcies iterum, humor est firmatus, debet ergo prius concoqui, & postea euacuari. Respondeo, hoc intelligendum esse in morbis venarum, & non in aliis.

Repellē- Tertiò repellentibus.] In principio ophthalmia cū humor extra
tia in venas fluxerit, opus est ipsū ex ea parte euacuare, non calidis, quia
principio attrahent humorē, sed repellentibus, qua adstringentia sunt. Deli-
ophthal- berare autē debemus de his inter alia naturā partis considerātes:
mia. hac enim cū sit membrana, ac proinde multū sensilis, non fere
medicamenta multum frigida, & adstringentia: quia ipsam con-
trahent, & exasperabunt. Applicabimus ergo oculis, & non nari-
bus, ut malè vult auctor, ea qua moderatè reperiunt, qualia
sunt rosa, & albumen oui confractum. Supra frontem tamen bene
possumus validè repellentibus uti, albumine oui cum aceto, bolo

Extergē- armeno, aut sanguine draconis. Præterea cum inflāmatio sit in
tia sem- parte, qua non tegitur cute dura & crassa, semper ex ipsa aliqua
per in humoris portio resudat, & ideo cum repellentibus digerentia sem-
ephtal- per miscere oportebit: huiusmodi sunt, collyrium album, Rhasis
mia sunt sine opio cum aqua rosacea, aut plantaginis. Applica autem medi-
utilia. camenta oculis instillando ipsa, aut pannum lineum, vel tenuem

Quomo- stupā madefac, & sic utere, dumodò non permittas ea exsiccari, aut
do appli- calefieri: instillamus, aut lineo panno utimur, quia pars non potest
candum ferre grauiā & ponderosa medicamenta in quare auctor errat si-
medica- mul cum aliis, micā panis, aut pomū applicans: non sinimus ea ex-
mentum. siccari, quia adhaerebit, & deinde extrahitur cum dolore, à quo au-

Dolor in gebitur affectus: non sinimus calefieri, ne attrahant. Dolor in hoc
ophthal- affectu ob vehementiā, aliquando ad se attrahit curationē, quo tē-
mia. pore utere optatis medicamentis, collyrio albo rhasis, cum opio, aut
oui albumine agitato cum decocto papaueris albi. Rarissimè tamen

contingit, ut ad hac veniamus medicamenta, qua visū hebetant,
quia rarò talis contingit dolor. In augmento morbi repellentia cū
digerentibus misce his, ita tamen ut repellentiū facultas vincat,
quia fluxio augetur. Coque ergo myrtos, aut rosas cū semine lini:
aut fœnugræ cū aqua plantaginis, aut (quod est elegantissimū re-
medium) albumen oui, & aquam rosaceā cū paucō vino miscebis.

In statu. In statu equaliter miscenda sunt digerentia & repellentia.

Quartò

Quartò, apparantibus bilem.] Bilem preparat, & purgat, quasi ophthalmia à sola bile oriatur, & non à sanguine optimo, melancholico etiam, aut pituitoso. Dices, est ne purgandum in hoc affectu? Respondeo, purgandum esse sine aliqua preparatione in principio, si ophthalmia à bile fiat: at si humore crasso eueniat, apparentibus signis concoctionis purgabimus ipsum.

Sextò reliquias materiæ.] In declinatione cum nil fluat ad oculos, digerentibus solis euacuanda est materia. In declinatione.

Si antiqua fuerit ophthalmia.] In antiqua ophthalmia filo per collum traiecto sub nuca utitur, de quo remedio hoc modo deliberabis. In antiqua ophthalmia fluxio perseverat, hac reuelli debet euacuatione aliqua: & cum sanguinis missio, purgatio, inedia, cucurbitula, & alia similes non prosint: deueniendū ergo erit ad duo remedia, quorum unum est cauterium, & alterum filum per collum traiectum: & cum cauterium multum dolorem inferat, & vlcus ex ipso relictum non ita facile possit apertum seruari, proinde ad filum deuenimus: atque hac est qualitatē deliberatio. Quantitatē colligimus ex ulcere, quod magnum nō debet fieri: occasionem ex euacuationibus totius corporis precedentibus: modū utendi ex loco affecto, qui cum sit oculus, ut ab eo reuellamus, & euacuemus parti contraria, & proxima remedium applicamus, qualis est ceruici superior pars. Remedia in ophthalmia supradicta nobis significare visus fuit Hip. 6. aph. sent, 31. ubi sic scribit: dolores oculorum, meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut vena sectio, aut medicamentum epotū soluit. Si non sit plethora, & dolor fiat à sanguine crasso venas adnata membrana replente, à vini potione soluitur: quia vinum fundit humorem, & suo motu ipsum educit, quod idem 7. aphor. com. 48. habet Gal. Si dolor à bile acri oriatur, dummodo absit plethora, balneum utile est, quia ab eo bilis acrimonia temperatur, si ophthalmia sit in declinatione, cum ad partem affectam nil influat, fomento calido, quod humorem dissipat, uti oportebit, sicut vena sectione in principio, & purgatione in principio, aut postea, ut supra docuimus. Antiqua ophthalmia. Deliberatio remedij.

Explicatur aph. 31. lib. 6.

De imbecillo aspectu. CAP. XIX.

Oculorum visus, ut aliarum partium operatio, tripliciter læditur (autore Gal. cap. 80. artis medicinalis) aut quia vix, aut quia vitiosè, aut quia nullo modo cernimus: de ultimis duobus in præsentia non agimus, cum de iis in sequentibus capitibus, & aliis locis verba facturi simus. De prima igitur læsione hoc loco sermonem instituimus, quæ est affectio oculorum, p̄tio causa minus æger videt. Cuius variae sunt causæ externæ, & internæ iuxta illud capmen: Descriptio causæ.

DE CVRAND. MORB.

Allia, vina, venus, puluis, ventus, faba, fumus.

Ista nocent oculis, sed vigilare magis.

Nota. Ex his, aut aliis fit hic affectus, aut per consensum totius, ut in hectica, aut aliarum partium, de quibus suis locis, vel oculis primario affectis. Quorum omnium causæ, & notæ satis ex ægri dictis, & per se patebunt.

**Cura-
tio.** Quando vitium proprium est in oculo ab humore largiori, curatur quinque generibus remediorum. Primo, victu tenui ex-

Victus. siccante, dummodò sit cibus facilis concoctu, obserueturque ordo traditus à Gal. in lib. de alimentorum facultatibus, & de sanitate tuenda, circa ordinem, horam, quantitatem, & qualita-

**Vis va-
parum.** tem ciborum. A cibo, comedenda sunt, quæ vaporem prohibent ad caput ferri, ut panis tostus, coriander tostus, aut conditus, caro cydoniorum, vel ipsa cydonia tosta, aut pira, addendo pa-

**Noxia
oculis.** rum sacchari, & seminis fœniculi, hoc enim oculos roborat, ut in serpentibus, & buffonibus experientia demonstrat. Rapæ si bene concoquantur, sua proprietate visum roborant. Viperarum

**Præpa-
ratio.** carnes bene apparatus similiter aciem oculorum confirmant. Eius præparatio cap. de elephantiasi demonstratur. Avis pica, & hepar hirci tota substantia corroborant aspectum. Similiter & lentium frequens vsus, si ab humiditate nascatur imbecillitas. Quæ verò huic affectui maximè nocent, sunt cruditas, coitus immodicus, & somnus diurnus.

**Purga-
tio.** Secundò apparantibus materiam, primò melle rosato colato, & oximelite S. cum aquis, aut decocto fœniculi, hyssopi, saluæ, & similibus. Secundò syrupo de hyssopo, de stæchade, oximelle compos. cum decocto, aut aquis superius dictis, & similibus. Tertiò, materiam concoctam vacuantibus, primùm pilulis ex Hiera S. elephanginis, mastichinis, agarico trochiscato, aut Hiera S. Secundò pilulis de agarico, sine quibus esse nolo, & lucis. m. Vltimò si opus fuerit valentibus pilulis cochiis, aut foetidis. Dosis omnium horum medicamentorum ex dictis primo capite, & ex doctrina Mes. & Nicolai in eorum antidota-

Auersio. riis est satis cognita. Quartò auertentibus ad infernas partes, aut posteriores, ut clysteribus, glandibus, ligaturis brachiorum, & crurum frictio-

**Robora-
tio, & re-
solutio.** nibus, fomento, & lotionem ex decocto rerum capitalium, multo pexu versus occipitium reuersi capitis, apophlegmatismis, ex-rhinis, cauterio post aures aut in coronali commissura, vel filo collo affixo, de quo dictum est in fine 6. cap. Quintò, roborantibus partem affectam, & resoluentibus reliquias materiæ: ut nuce muscata quotidie sumpta visus

recupe

recuperatur : myrobalani quoque cepulæ, si duæ bis in hebdomada, aut ter sumantur, visum reficiunt. Idem præstant acorus conditus, theriaca magna, mithridatum, diamusculus, & pliris arcticon, si multis diebus in quantitate 3. j. usque ad 3. ij. sumat æger. Hoc quoque auxilium validè visum corroborat: ℞. succi *Acuentia visum.* fœniculi depurati 3. vj. succi rutæ depurati 3. iij. mellis 3. j. facchari 3. 8. foliorum auri num. iij. misce, per duos, aut tres dies æstatis insolentur omnia, facta sæpe permutatione ab vno vase in aliud, vt omne excrementum abiiciatur. Eandem, & maiorem habet vim hæc aqua oculis sæpe admota: ℞. chelidoniæ, fœniculi, rutæ, fileris montani, euphragiæ, verbenæ, rosarum rubrarum an. libr. 8. 3. pulueris caryophyllorum, & piperis an. 3. ij. ex his fiat aqua per distillationem instrumento vitreo & igne paucoco. Puluis aqua picæ, si oculis admoueat, ipsos vehementer iuuat. Idem præstat succus, aut puluis hepatis hircini assi: cui si addas parum pulueris caryophyllorum, & piperis erit efficacior. Hoc medicamentum visum maximè confirmat: ℞. tuthiæ Alexandrinæ quinquies incensæ, & extinctæ aqua rosarum 3. 8. balsami optimi 3. iij. vini albi odoriferi 3. j. misce. Serpentes nemorales abscissis capitibus & caudis, si coquantur vino albo & fœniculo, donec caro ab ossibus separetur, visum mirum in modum tuentur. Hoc medicamentum est omnium in hac re nobile. nobilissimum: ℞. fileris montani, maioranæ, euphragiæ, rutæ, chelidoniæ, fœniculi. an. 3. iij. zinziberis, spicæ, piperis longi, caryophyllorum, tuthiæ incensæ & post restinctæ, vt diximus sarcocollæ nutritæ lacte asinæ, ligni aloës an. 3. j. fellis vnius anguillæ, & vnius accipitris, & vnius hirci montani, si possimus nancisci, balsami 3. 8. mellis rosati colati 3. iij. Omnia simul mixta, & redacta in puluerem, quæ possunt redigi, vase vitreo, bene obturato insolentur in æstate per xl. dies, & in hyeme sub stercore quolibet die bis, vel ter agitetur illud vas, postea conseruetur liquor vase vitreo, qui oculis adnotus sæpe visum corroborat, & auget etiam. In senibus tantam vim habet hoc medicamentum, vt aliquibus visum sit nullum medicamentum huic simile, aut par hactenus extitisse, quorum summam veritatem ego felicissimo successu sæpè expertus sum.

Scholium.

Oculorum visus.] Confusè certè procedit auctor in hoc cap. Practico quod intelliges, si legas cap. 2. de cau. symp. vbi inquit Galen. causas lasæ visionis. Si ergo rectè voluerimus curare, hoc modo error procedendū erit: Imbecillus affectus est symptoma morbus ad quem

DE CVRAND. MORB.

sequitur, aut est intemperies, aut morbus instrumentarius, aut communis, qui soluta unitas dicitur: morbo intellecto contrariis ipsum curabimus. Præterea quæ multi ex practicis scribunt de medicamentis tota substantia corroborantibus aspectum, qualia sunt avis pica, hepar hirci, rapa, & similia, falsa sunt, & fictitia: quia morbi actionem videndi hebetantes manifesti sunt, ac proinde contrariis medicamentis, etiam auferendi. Neque obiciat fœniculum. Hoc enim caliditate sua digerendo humiditatem confert: qua eadem ratione opus erit curare affectum, de quo loquitur auctor in hoc capite, & simul omittere aurum, hirci hepar, tuthiam incensam & extinctam in urina pueri, & alias compositiones ab ipso propositas, cum aliqua inutilia, & multa simplicia vnius facultatis contineant, quod maximum vitium est.

De curatione albuginis oculorum.

CAP. XVIII.

Diuisio. **A**lbuginum oculorum duæ sunt differentiæ, quædam enim in summa corneæ superficie consistunt, & Græcis nephe-
lia, atque vlæ, Latinis verò nubeculæ, caliginēsque & tenues albugines nominantur: quæ verò in interiori parte sunt, & ut Paulus ait, alterius radices egerunt, hæleucomata Græcis, Latinis albugines crassæ dicuntur.

Descriptio. Vtraque autem, cicatrices sunt, ac maculæ in cornea post vulnerum curationes relictæ: sic autem appellantur, quod ovi albumen referant: omnes enim cicatrices (autore Ætio) in nigro oculo candidæ videntur: densata enim cornea tunica subiectus cæruleus color non amplius pellucet. Eminentes præcipuè albescunt, planè minùs candicant, cauiiores parti nigræ oculorum quodammodo assimilantur. Hæc Ætius. Morbus intuenti patet, non est igitur opus signis.

Causa. Albugo in senibus est incurabilis, præsertim antiqua, in iuuenibus difficilis curatu, in pueris & infantibus, facilior, semper tamen est similis curatio præcedenti, in victus ratione, vacuatione auertentibus, præsertim per filum, de quo cap.

Fotus. 16. His omnibus iam factis, & admotis oculis medicamentis dictis in quinto genere auxiliorum præcedentis capituli, præter illa, frequens fotus ex decocto seminis fœniculi, fœnugræci, camomillæ, rutæ & raparum est utilis, & necessarius: post quem potentiùs medicamenta poterunt albuginem dissipare, & omnino abstergere. Mel, & eius aqua bene eam tollit, similiter & aqua distillationis ex rhodomelle. Puluis sacchari candi habet eandem vim, & maiorem, si addas pa-
rum

**Abster-
gentia.**

rum pulueris ossis sepiæ. Sequens aqua optima est in hoc, & à me in meo filio probata, qui natus erat octo menses: ℥. fœniculi m. ij. rutæ chelidonix an. m. j. mellis optimi ℥. iij. sacchari candi, & rhodomellis an. ℥. tuthiæ Alexandrinæ, & sarcocol-
læ nutritæ an. ℥. ij. vini albi optimi cochlearia duo, misce, & fiat *Aqua probata.*
ex his aqua per distillationem igne pauco.

De suffusione. CAP. XIX.

QUod Latinis suffusio sonat, hoc Græcis hypochima, & hypochylis, barbaris verò cataracta dicitur, & nihil aliud est, quam frigidi, crassi, & lenti humoris, & glaciei instar congelati inter ceratoidem tunicam, id est, corneam & crystalloidem, seu mauiis humorem tenuem effusio. Causæ iam dictæ sunt nempe humores crassi per nimias cruditates iuxta pupillam inter corneam, & crystalloidem aceruati: præter hæc etiam violentus vomitus, & ictus, & ventriculi affectiones. Notæ ab *Definitio.*
Ætio hæc referuntur. Inchoante suffusione pusilli culices, & caliginosa quædam corpuscula assidue oculis occurfare solent quibusdam veluti lanarum filamenta, & telæ araneorum quibusdam circa lucernas circuli offeruntur: quæ cum apparere incipiunt, pupilla minus accurate spectantibus interdum pura videtur, interdum colorem pelagi præ se ferre. Sed incrementægritudine accidentia quoque increbescunt, quæ ubi ad summum peruenerint ægri excæcantur, & pupilla ad candidum colorem sine vilo penitus splendore mutatur. Quamuis in variis suffusionibus varij colores conspici soleant: quædam enim æris colorem, quædam vitri imitatur, quædam subalbescit, quædam ad cæruleum vergit, quædam glaucescit, quædam insanabilis est: hæc *Ætius*. Porro tunc cognoscitur, num sanabilis sit suffusio, quoties altero oculo clauso pupilla eius oculi, in quo est suffusio, & clarior apparet, & dilatatur, vt docet Galen. 4. de morbo & symptomate, cap. 2. Si culpâ neutrius oculi accadat *Curatio*
suffusio, in utroque oculo, & non in altero tantum, id fit, & per intervalla quoque, & prius aliquid in ventriculo præsentitur.

Suffusio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum imbecilla visio, & albugo, sed valentioribus. Quæ absoluta est, & confirmata, accusatur: eget tamen viro docto & probato: si verò absoluta nondum fuerit, curatur primò victu calido, & sicco (quia materia est vaporosa, & aquosa) de quo diximus cap. 16. Sed si aer conueniens desit, vt in hyeme, arte oportet moliri, igne, scilicet, & suffitu. Abstinencia quoque

DE CVRAND. MORB.

quoque, & ieiunium huic morbo diuturno plurimum est salubre. Cœna sit levis, si semel comedisse his non sufficit, vino, iusculis, & pituitosis alimentis minimè vtendum est: semper enim sunt eligenda calida & sicca.

Præparatio & vacuatio. Secundò & tertio concoquentibus materiam aquosam, & vacuantibus per ea, quæ diximus cap. 10. & alia similia, sed toties est coquenda materia, & vacuanda, donec in totum sit affectus curatus, non solum semel, sed bis, ter, quater.

Auersio. Quarto auertentibus, vt acribus clysteribus, balanis, frictionibus fortibus partium extremarum, & aliis omnibus, de quibus dictum est satis cap. 16.

Resolutio. Quintò, resoluentibus, & dissipantibus reliquias materiæ primò interiùs sumptis, vt ʒ. j. theriacæ magnæ, aut mithridati, aut. ij. ʒ. diamusci dulcis multis diebus cum syrupo, aut aqua capitali sumptis tempore capiendi somni, vt cum cibi vapore eorum vis rapiatur in cerebrum. Si sæpe accipiantur ʒ. ij. confectionis Ham. Mesp. cap. de imbecillitate visus valenter & optimè dissipabitur materia. Admouenda sunt oculis aliqua præter dicta duobus superioribus capitibus, quæ possint resolvere, & tergere maculam, albuginem, & suffusionem non confirmatam, semper tamen optima præcedat corporis euacuatio,

Tergentia. aliàs fieret attractio vaporis, & aquæ ad oculos. Inter ea quæ potenter omnem albuginem, & suffusionem non confirmatam tergant, est sagapennum mixtum aqua fœniculi, & aqua mellis, & saccharo concreto. Idem præstat puluis capitum hirundinum, si cum aqua distillationis vrinæ puerorum, & fœniculi oculis sæpe admoueatur, post hæc valentiora conferunt, vt sunt genera fellis: sed priùs oportet experiri antè dicta, & aqua distillationis corticum fabarum. Hæc quoque aqua est optima,

Aqua efficacissima. & efficacissima, ℥. vini albi ʒ. iij. succi fœniculi sine sedimento ʒ. ij. camphoræ ʒ. j. tuthiæ Alexandrinæ ʒ. j. ʒ. zinziberis ʒ. ʒ. mellis ʒ. iij. omnia simul in vase æneo ix. diebus in vmbra conseruentur, postea per filtrum fiat distillatio, cuius aquæ duæ guttæ manè & serò oculis instillantur: vltimò verò, & cum alia non sufficiant, sunt admouenda fella, priùs mitiora, videlicet piscium, suum, agnorum, gallinarum, & perdicum: deinde acriora, vt accipitris, falconum, & aquilæ. Vltimæ verò est admouendum fel viperæ: sed quia est venenosum eo non esse vtendum cenfeo, sed in eius vsu oportet os plenum esse aqua, & theriaca magna, ne aliquid venenosum in ventriculum, aut thoracem descendat: fel tamen tauri, & apri est viperæ tutius & satis potens.

Scholium.

Quod Latinis suffusio.] Suffusio non est morbus in via, ut *Quid suffusio.*
voluit Vega: quia nullam obstruit cavitatem. Sed ex Galeno
 est morbus in numero addito: est enim in oculo additus humor ad
 eius actionem non necessarius, imò eam impediens. Hic humor con-
 cretus in humore aqueo continetur, prohibens quominus species re-
 rum visarum ad humorem crystallinum perveniant. Vel quod ve-
 rius apparet, est ipsemet humor aqueus concretus ex alimento cras-
 so, à quo nutritur. Causa istius morbi, est affluxus crassi humoris, *Causa*
 qui vel à capite provenit, præsertim si imbecillitatem habuerit na- *suffusio-*
 tiuà à frigiditate sola, aut cū humiditate coniuncta, pendentē, vel *nis.*
 à toto corpore, cū ob prauā victus rationem humor crassus au-
 getur. Solet curari suffusio, si incipiat (quia inueterata solū acū
 postulat) considerantes fluxionis causam si à capite fluat humor,
 eius intemperiem corrigemus, euacuato prius humore purganti me-
 dicamento: si à toto corpore fluat, sanguinem mittemus, ob sangui-
 nem prauum, & deinde purgabimus, & ultimò ad Topica deue-
 niemus, quæ sensim digerāt humorē in oculo cōcretum: qualia sunt *Curatio*
 decoctum fœniculi in vino albo, aqua etiam chelidoni, aut fœ-
 niculi, aut ruta, cum tuthia & similia. Hæc curatio cōmuniter so-
 let exerceri. Si tamen voluerimus rem penitiùs considerare, intelli-
 gemus, hanc non esse optimā curationem, quia suffusio incipiens (ut
 experientia longa docere tibi poterit) nunquam dictis medicamen-
 tis curatur, quia humor sub membranis inclusus ea contemnit.
 Meliùs ergo erit omittere supradictam curationē: quæ impedit per- *Refuta-*
 fectam humoris concretionem, & hoc nomine verā curationē: quæ *tur præ-*
 exercebitur, si statim utamur, extremitatibus animalium, eorundē *dicta*
 cerebris, & alio victu incrassante, ut humor concreascit, & durior *curatio.*
 fiat: & hac ratione possit acū, à pupilla regione in oculi angulū mu-
 tari, atque hæc est curatio eius suffusionis, quæ proprius est affectus.

De dolore aurium. CAP. XX.

Aures perinde, ac aliæ quoque partes nostri corporis *Dolor*
 dolore infestantur, & vehementi: plurimo enim sensu *quid sit*
 pollem. Dolent autem nonnunquam propter causas ex- *ex lib.*
 ternas, cuiusmodi sunt refrigeratio in peregrinatione à *de sym-*
 ventis frigidis proveniens: interdum propter intromissum *pro. cau-*
 humorem in balneis aquarum frigidarum, aut insigni ali- *sis.*
 qua qualitate præditarum. Oritur etiam & ex causa calida,
 à quacunque occasione accidat, ut sole, igne, vento, bal- *Causa.*
 neis, atque aliis id genus. Præterea & ex ictu, vulnere, con-
 fusione, acri aliquo medicamento, aut vermi in aurem in-

DE CVRAND. MORB.

Nota.

gressio. Internæ quoque causæ multæ sunt, vt intemperies aliqua, aut nuda, aut cum humoris affluxio, inflammatio, flatulentus spiritus, vlcus, ac vermes intra aures geniti. Signa causarum externarum ex ægri sermonibus colligi possunt.

Internarum verò notas si exquires: si nuda fuerit intemperies, nulla adest grauitas, sed si calida fuerit, ardor, & maius acumen doloris: si frigida, obtusior quodammodo dolor est, & frigus sentitur. Idem de reliquis est iudicandum. Si verò præter qualitatem humor quoque infestat, præter iam dicta grauitas inest, ac pondus quoddam. Omni autem intemperiei, seu nuda fuerit, seu cum humore, hoc est commune, vt à similibus lædatur, iuuetur autem moderato contrariorum vsu. Si sit inflammatio, adest febris, grauitas, pulsatio, & dolor intolerabilis: si flatulentus spiritus, tentio, & tinnitus in aure sentiuntur: si vermes, interiorum motum quendam æger sentit, & in splendido, aliquo loco cerni possunt, vel ex iis aliquis foras prodit. Si vlcus, pus inde promanat.

**Curatio
si ab in-
temperie
calida.**

Curatur quinque remediorum generibus, primò, victu tenui, & refrigerante: quare à carnibus & vino abstinendum est. Sit eorum cibus lac amygdalarum, cremor hordei, lentes, cichorea, lactuca, pyra, & mala cydonia assa, & potus aquæ hordei.

Reuulsio

Secundò, auertentibus secta vena humerali eiusdem partis, si non fuerit plenitudo: vel media, existente plenitudine. Mittatur sanguis respondens dolori, & plenitudini semel, bis, & ter si opus fuerit. Si ætas, & vires non ferant sanguinis missionem per sectionem venæ, per cucurbitulas, & scarificationes inter scapulas sanguis extrahatur, fiatque debita reuulsio.

Auersio.

Clysteres refrigerantes, & parum acres, cucurbitulæ, ligaturæ, & frictiones partium extremarum, & fots quoque auertunt & maximè conferunt. Vacuatio per medicamenta benigna similiter auertit, & est necessaria, vt per hoc, aut simile. ℞. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia. ʒ. j. ꝑ. medullæ cassiæ fistularis recent. extractæ ʒ. vj. syrupi violarum ʒ. j. aquæ buglossæ q. s. misce, & fiat potus. Si magis amat pilulas (quamuis vtilior sit potus) ʒ. j. pilularum de rhabbaro fieri potest euacuatio, aut aliis pilulis, quæ bilem purgant.

Purgatio.

**Topica
repellē-
tia.**

Tertiò repellentibus, vt in oxyrhodino, aut lacte humano, vel caprino vel ouino. Hæc, & similia parum calida sunt auribus instillanda. Aut oleo de portulaca aut violato, aut de nenuphare, aut de papauere. Oleum rosaceum & terebinthina simul mixta dolorem aurium tollunt, & repellunt, si
oleum

oleum rosaceum sit in magna quantitate, & terebinthina in parua. Sed si dolor fuerit vehemens qui autore Galeno cora. 38. *Symptoma* primi præfagiorum facultates destruit, ad se trahit curationem, *matris* egētque narcoticis medicamentis, quæ nō abscissa causa ipsum *curatio.* dolorem curant. De his Galenus 3. de compositione medicamentorum secundum locos satis abundè: inter alia tamen laudat mixturam ex lacte humano cum albumine oui, & pauco opio: laudat quoque Galenus castoreum cum opio æquo pondere vtrumque, aut si dupla portio castorei: vel vicissim, si maior & vehementior fuerit dolor. Hæc mixtura est etiam optima in hoc genere: ℞. micæ panis, aut farinæ hordei lib. β. sapæ, quod sufficit, misce, & fiat cataplasma: adde castorei ʒ. β. opij & croci an. ʒ. ij. Hæc tamen narcotica non sunt admouenda, nisi cum alia non possunt curare, aut in maximis doloribus aliis non conferentibus.

Quartò, dissipantibus, & resoluentibus reliquias materiæ, vt *Curatio.* oleo lumbricorum, camomillæ, amygdalarum dulcium, sesami- *Resolu-* no, terebinthina sola, & decocto camomillæ, fœnugræci, & se- *tio.* minis lini, althææ, & similibus.

Quintò, frigidis sanantibus intemperiem calidam in auribus *Alteratio.* relictam, qualia sunt oxyrhodinum, & alia dicta tertio genere, *tio.* & oleum rosaceum cum mucagine seminis psyllij.

Si inflammatio in suppurationem terminetur (quod per doloris, & febris remissionem post augmentum cognoscitur) pus per incisionem instrumento ferreo factam extrahendum est, aut vocibus, & sternutamentis, aut medicamentis parum acris, si non appareat pars suppurata: deinde abstergentibus, & mundantibus, & postremò glutinantibus, & exsiccantibus curabitur. In his tamen consule chirurgum doctum.

Dolor ab intemperie frigida, præcedenti debita vacuatione: si *Si à frigore sit.* fuerit cum materia, curabitur oleo camomillæ, nardino, ex lilio, laurino, rutaceo, & costino, cæpe tostum etiam curat illum dolorem. Succus rutæ cum sanguine anguillæ statim mitigat *Topica* omnem aurium dolorem. Succus rosis marini cum oleo rosa- *sedantia* ceo, & sapone Gallico vetustissimos aurium dolores curat: adeps *dolorem.* pulmonis vulpis auribus admotus, est optimum præsidium in dolore aurium. Idem præstat spoliū serpentis decoctum oleo, *Pili Na-* aut succo conuenienti calido, aut frigido, habita ratione causæ: *quera.* Pili Naqueræ facultate præditi sunt à tota substantia curandi omnem aurium dolorem.

Scholium.

DE CVRAND. MORB.

Scholium.

**Dolor
auris.**

A Vres perinde.] Dolor auris symptoma est. Morbus ad quem sequitur, est soluta unitas, aut manifesta, qua fit ab ictu, contusione, & aliis: aut occulta, qua ab intemperie calida, vel frigida, aut à re distendente provenit.

Curatur quinque remediorum.] In hoc capite relictis aliis causis solum curat auctor dolorem à phlegmone ortum, ubi significare voluit phlegmonem sola caliditate dolorem generare, cum reuera tensionem in ea considerare debuisset.

**Quæ ve-
na se-
canda.
Purga-
tio.
Topica.**

Secundò auertentibus.] Semper secanda est cephalica, ob causam multoties repetitam. Quòd si in venis sit cacochimia, purgabis etiam non cassia, & rhabarbaro, qua clementer id efficiunt, neque eorum vis multum se diffundit: sed aliis fortioribus, diapruni, electuario de succo rosarum, & similibus.

Tertiò repellentibus.] Cum repellentibus misce acetum, ut penetret, neque acetum ladet, si partem consideremus, qua sicca cum sit, acria medicamenta sustinet. Oleo ergo rosaceo, & paucò aceto uteris. Omitte autem terebinthinam, qua ab autore proponitur, quia præter caliditatem, impedit penetrationem medicamenti. Adverte tamen hæcenus non curasse dolorem, sed eius causam, nempe phlegmonem. Tunc autem eum curabimus, cum neglecto phlegmone, solius symptomatis habebimus rationem. Si ergo dolor urget, stuporem inducenti medicamento uteris, qualis hoc est: ℞. olei rosarum ℥. j. opij. ḡ. iij. aceti parum ut penetret. Qua in parte omitte medicamentum ex mica panis, & sapa constructum, quoniam qua ipsi componunt, opij vim refringent, neque etiam parti affecta cataplasma applicatur, qua in parte interiori condita est. Quæ Rondoletius & scribit de cocleis, de medulla cruris porci saliti, & auctor de pilis Naquera, & alia tota substantia sedantibus dolorem, omittantur, ac si non essent scripta: quia causam doloris cognoscimus, & ideo remediis manifesta qualitate operantibus curabitur.

**Ronde-
letius &
auctor
labun-
tur.**

Quintò frigidis.] Non est, quòd hæc frigida applicemus, quia si intemperies ex humore calido orta fuit, dissipato humore non remanebit.

De sanguinis è naribus profluvio.

C A P V T XXI.

Causa.

Sanguinis è naribus profluvij, quòd Græci hæmorrhagiam appellant, multæ sunt causæ, partim internæ, partim etiam externæ, eas autem omnes brevitatis gratia iuxta Galeni placita s. method. medend. in tria capita reducimus: fluit enim sanguis

sanguis à venis , arteriisve nasi , vel referatis illorum orificiis, vel tunicis ruptis , diuisisque , vel sudoris instar transcolatus. Porro referantur arteriarum venarumque ora , aut propter nimiam sanguinis multitudinem, quæ vel in toto sit corpore, capite, vel hepate, liene, vel vtero : præsertim si non probe fluant menses, vt ex Aph. 33. sectionis 5. deprehenditur: in caput enim tunc fertur , atque inde per nares vi erumpit : nonnunquam & citra plenitudinem propter vasorum imbecillitatem hoc ipsum accidit , aut ob acrem aliquam qualitatem in humoribus repperitam. Diuiditur autem tunica ex vulneratione , contusione, ruptione, & erosione velut sudor transmittitur , aut tunica ipsa rarefacta , aut sanguine tenuiore facto , quod multis de causis contingit : aut quia plus æquo exercitationibus homo sit vsus, aut medicamentis calidis sanguinem tenuantibus , aut victus ratione , qui sanguinem biliosorem reddiderit. Notæ tum ex *Nota.* ægri sermonibus, tum ex eius intemperamento, aut antea acta vita colliguntur, quamobrem omnes eas recensere non erit opus. Hoc tamen animaduertere oportet, cum à capite sanguis per nares profluit, in eo summam adesse grauitatem: cum ab hepate, in hypochondrio dextro: cum ab splene, in sinistro : cum à matrice , circa vmbilicum dolores , ac tensiones quasdam sentiri: cum per crisem sanguinis profluuium sit , ea signa accidunt, quæ ab Hippocr. numerantur 3. Prognosticorum 33. prognostico, & à Galeno in libris de crisibus, atque alibi frequenter.

Sanguinis profluuium, à quacunque fuerit parte ortum si vires non deficient, non est sistendum, quia eo multis liberamur morbis , vt in libris de iudiciis Galenus testatur. Non criticum verò , quatuor remediorum generibus sistent. Primò , victu refrigerante , & astringente meatus, per quos sanguis fertur , vt aëre arte parato per acetum , aqua rosarum , lactucæ, plantaginis , folia salicis, myrti , lactucæ , nymphææ , & similia. Cibis ex succo acidulcium granatorum, limonum, aranciorum , acetosæ , & similia paratis, qui, si glutinosi fuerint, magis laudantur , quales sunt pedes , & capita vituli , arietis, hœdi, & aliorum animalium, amygdum, farina orizæ, caseus recens pinguis, oua dura, quia paucum & crassum sanguinem gignunt , præsertim albumina. Initio cum facultas non est imbecilla, abstine à vino , carnibus, & ouis sorbilibus & tremulis, largiorem , & liquidiorum sanguinem generantibus. Potus sit aqua calybeata , tandem animi & corporis quies est necessaria illis, & silentium.

Secundò , auertentibus , in quibus præcipua spes curationis versatur , vt crurum , & brachiorum dolorificis ligaturis, frictio

Aduer-
te.
Curatio

Victus.

Auersio.

DE CVRAND. MORB.

*Seçtio
vena re-
uellit.*

frictionibus, foribus ex aqua actu & potestate calente, cucurbitulis sine scarificatione hypochondrio appositis è regione naris, à qua sanguis effluit, & inter scapulas cum scarificatione, vbi vena scindi non possit ad virium defectum, aut ætatem puerilem, quamuis sanguinis missio per venæ sectionem sit remedium efficacissimum ad reuocandum impetum floris in contrarium: secunda est vena media eiusdem partis, si sit totius plenitudo, vel humeralis, si non sit plenitudo: quòd si ab vtraque nare fluat sanguis vtraque media, aut humeralis simul scindantur. Post primam sanguinis missionem, si secunda fuerit necessaria, & tertia, semper secunda est humeralis eiusdem partis: aliquando tamen prius est facienda sanguinis missio, per sectionem venæ pedum, aut tibiarum, videlicet cum ex detentis mensibus, aut hæmorrhoidibus nascitur hoc profluvium, præsertim si natura tentaueris per infernas partes sanguinem vacuare, & hæc sit vniuersalis regula Hippocr. Gal. rationi & experientiæ accommodata. Duo quoque sunt, quæ maximè auertunt subito reuocando sanguinem, calorem, & spiritum, timor incussus, & aqua frigida iniecta in faciem ægri incogitantis: sed videndum ne sit æger maximè imbecillus, aut morbo comitiali obnoxius, quia hæc duo epilepsiam efficerent, aut subito interficerent. Ligatura arcta testium, vel eorum ablutio aqua frigida, si subito fiat, potenter auertit.

*Admo-
nitio.*

*Consi-
lium.*

*Sumēda
& ad-
mouen-
da.*

*Repellē-
tia.*

Tertiò, sistentibus, & cohibentibus sanguinem, & glutinantibus sumptis, vel admotis, vt lactuca, portulaca, & aliis alimentis dictis initio huius cap. syrupo rosarum, cydoniorum, malorum granatorum, de acetositate limonum, & citri, præcipuè vbi sanguis est biliosus, & nimis tenuis, & conserva rosarum, acetosæ & nenupharis ℞. ij. aut ʒ. j. trochiscorum de terra figillata, aut de carabe cum ʒ. ij. aquæ plantaginis, aut portulacæ, aut similium cohibent sanguinem. Naribus, collo, & fronti sunt adnouenda quæ refrigerant, & impellunt inchoando à mitioribus ad valentiora. Prima mixtura bona est ex aqua rosarum, albumine oui, & aceto, cui si addas puluerem astringentem, vnientem, & obstruentem, erit efficacissima: qualis est ex rosis, balauistiis, gallis sumac, farina moletrinarum, mastiche, aloë, & mirrha, thure & pilis leporis, & similibus.

Ex his omnibus, aut aliquibus accipe ij. ʒ. cum aqua, aut succo astringente, naribus impone, & collo, & fronti: sed si supra venas ruptas apponatur medicamentum, citius sistet sanguinem. Gypsum cum albumine oui, aut aqua, aut aceto
nari

naribus admotum videmus potenter sanguinem sistere.

Puluis limacum cum crusta tostorum sistit sanguinem, & *Sistentia*
 puluis ranarum combustarum. Aliqua sanguinem sistunt sta- *sanguini-*
 tim à tota substantia, seu proprietate, vt stercus asinum, vr- *nem à*
 tica, porrum, ocimum, seu basilicon. Hæc enim recentia, tri- *tota sub-*
 ta, & in nares immissa, aut illorum succus possunt sanguinem *stantia.*
 inhibere. Acetum potens cum gossypio, aut panno lineo sæpe
 fronti, aut collo applicitum illico sanguinem sistit. Quædam *Verula*
 vetula Monspeffulana sola mēta naribus imposita curauit san- *curatrix*
 guinis profluuium è naribus trium dierum. Cinis panni linei
 prius atramento tincti aceto mixtus, & cum gossypio naribus
 immissus consilio cuiusdam viri sapientis curauit hoc proflu-
 uium. Medicamentum ex puluere corticum quorum, & gypsi
 cum albumine oui, naribus & fronti adiunctum cito, repri-
 mit sanguinem. Idem fit, mixtura luti reperti in mola fabro-
 rum, & bolo armeno cum albumine oui. Cauteria actu, &
 medicamenta scarotica, quæ vtendo scharas, & crustam gignunt
 potentissimè sanguinem, & subito inhibent, sed si schara deci-
 derit, maior & periculosior hæmorrhogia esset. Quare eis non *De Nar-*
 est vtendum, nisi cum alia iam scripta, similia non suffece- *coticis.*
 rint. Quando salus deplorata est, & victa à morbo facultas om-
 nium prædictorum, narcoticis curatur, quæ sanguinem gla-
 ciant, & membra stupefaciunt, vt athanasia recenti, & requie
 magna à scrupulis duobus vsque ad scrupulos quatuor, & phi-
 lonio antiquo Persico, aut Romano à drachma semis vsque
 ad 3. j. Hæc somnum conciliant, & hoc etiam modo fluorem
 sedant, sed hæc & similia narcotica partibus externis adnota,
 tutiora sunt, vt cap. 5 de curatione phrenitidis docuimus.

Quartò, auferentibus causam hæmorrhagiæ, vt medica- *Purga-*
 mentis cholagogis, si biliosus fuerit sanguis, qualia sunt rha- *tio.*
 barbarum, myrobalani citrinæ, & tamarindus, & hæc mixtu-
 ra vel similis. ℞. medullæ tamarindorum 3. vj. rhabarbari electi
 & corticum myrobalanorum citrinarum an. 3. j. syrupi ro-
 sarum 3. j. aquæ buglossæ, quod s. misce, & fiat potus. Si verò *Cōcoctio*
 sanguis fuerit pituitosus, præcedenti coctione per rhodomel, & *pituita.*
 aquam basiliconis, plegmagogis curatur, vt diacatholicon. 3. *Potio.*
 vj. corticum myrobalanorum. Kebulorum & agarici trochisca-
 ti an. 3. syr. de menta. 3. j. syr. de menta. 3. j. aquæ buglossæ,
 quod s. misce, & fiat potus.

Scholium.

Qua sã-
guinis
excretio
sit toto
genere
prater
naturã.

Causa
fluxio-
nis san-
guinis.
Causa
interna
tres.

Libera-
tur Ga-
lenus à
cõtradi-
ctiõne.
An dia-
pedesis
sit pro-
fluuium
sangu-
inis.

Criti-
cum pro-
fluuium
sangu-
inis.

Sanguinis è naribus.] Sanguinis excretio ferè sèper est toto ge-
nere prater naturã. Addit Galenus illã dictiõnẽ ferè, propter
eã sanguinis euacuationẽ, quã singulis mensibus mulieribus per u-
terũ contingit: hac enim, cũ non sequatur affectum morbosũ, toto
genere prater naturã non est. Aliarum partium sanguinis euacua-
tiones toto genere prater naturã dicũtur, quia sèper sequũtur ali-
quẽ morbũ, unde malè Eucsius, & alij existimant, sanguinis eua-
cuationẽ dici toto genere prater naturã, quia id quod euacuatur,
est sanguis nobis familiaris, inde enim sequeretur euacuationẽ eã
sanguinis, quã per vterũ singulis mensibus accidit, esse toto genere
prater naturã, in ea enim optimus sanguis excerni solet. Sanguinis
profluuiũ fit à causis externis, & internis: externũ sum duã lib. 3.
de caus. symp. c. 2. vulnus, & ruptio: vulnus à re vulnerãte, ruptio
verò à tensione fit. Conuulsio additur ab aliquibus, malè tamen,
cũ hac media rptione, aut medio vulnere sanguinis profluuiũ ef-
ficiat. Causa interna sunt tres ex eodẽ Gal. Prima in facultate cõ-
sistit, cũ scilicet retentrix vasorum fuerit imbecilla, aut expul-
trix immodicè irritata. Secunda est sanguinis vitium, cũ peccat quã-
titate, aut qualitate. Tertia causa est vasorũ noxa: quã tripliciter
cõtingit, primò, cũ vas est tenue, secundò, cũ molle: & tertio cũ du-
rũ, ab his enim tribus facile rũpuntur vasa. Obijcies Gal. lib. 5.
methodi, alias causas, nempe rptionẽ, erosionẽ, & apertionem pro-
posuisse. Respondeo has causas sanguinis profluuij 5. lib. method. pro-
positas, à superioribus non distingui, quia ruptio à plethora erosio
à sãguine biblioso, apertio verò à vitio facultatis, aut à plethora.
Quid de diapedesi? Respondeo, nõ esse profluuiũ sanguinis, sed cruẽ-
ti seri, vt 3. de caus. sympt. docet Galenus, vel si cõcedamus, diape-
desime esse sãguinis euacuationẽ, ad anastomosim erit reducẽda, quia
ex lib. 5. method. cap. 2. diapedesis duobus modis fit, primò attenua-
to sanguine, & tunica vasorum rarefacta, secundò apertis orificiis
exiguorum vasorũ. Ex dictis habemus causas profluuij sanguinis
in genere, ac proinde eius, quod per nares sit, de quo presenti capite.
Sanguinis profluuium.] Sanguinis per nares profluuiũ aut est
criticum, aut symptomaticũ. Criticũ prauideri potest signis traditis
ab Hippocr. 3. prog. sent. 33. Primũ est dolor capitis, nõ quilibet, sed
gravis, pulsans, & calidus, potissimũ si perseueret circa frontẽ, & tẽ-
pora com. 11. eiusdẽ lib. Secundũ visio hebes à copia sanguinis im-
pedito transitu spiritu animalis ad oculos. Tertiũ fulgoris motus
circa oculos, ex splendore sanguinis proueniẽs. Quartũ tẽsio in hypo-
chondrio sine dolore. Quintũ. colli dolor, & tẽporum grauitas. Sextũ
rubor oculorũ, maxillarũ, & narium: Septimum lachryma oculorũ
quo

quorum signorū rationem lib. 3. criseon habemus explicatam. Symptomaticum profluvium cognoscetur ex eo, quod non soluit morbū, matius & precedente cruditate eveniat. Criticum profluvium non est sistendum, quia in eo inutile expellitur, & fit proinde cum commodo animalium: symptomaticum verò sistere oportet, quod fit à natura irritata, & cum incommodo.

Secundò auertentibus.] Symptoma hoc, quod in excretis toto Symptogenere præter naturam consistit, cum urgeat, ad se trahit curam curatione: quod prestabimus, à naribus auertentes sanguinē: primò sarratur. guinis missione, qua ex cephalica, basilica, aut si magis volumus reuellere, ex vena pedis fieri potest: cū enim nullus sit affectus particularis euacuationē postulans, non seruamus rectitudinē, sed loci distantiam. Inde colliges, non rectē auctore in solo sanguinis profluvio, quod sit ex retentis mensibus, aut hemorrhoidibus, secare venā auctoris. pedis. Neque hoc etiā in loco animaduersionis Hollierij, & Rondeletij Animadlocum habet, qua precipiunt in profluvio sanguinis in vena exiuerfio. guā sectionē faciendā esse, tunc enim tenuiori sanguinis portione Rondo- euacuata exigua fieret reuulsio, qua in sectione magna cōmodè letij & præstabitur tota massa euacuata: nunquā enim fiet optima reuulsio Hollierij sine sanguinis motu. Sanguine misso cucurbitulis utemur affixis non adhypochondrio, quod rectitudinē seruet cū nare, à qua fluit sanguis, mitti- ita ut si ex nare dextra fluat, supra iecur, si ex sinistra supra lie- tur. nem apponantur. Causam huius rei intelligemus ex duplici recti- Cucur- tudine: una enim est natura, seu loci, quam partes dextra cū dex- bitula tris, & sinistra cū sinistris admittunt, qua natura dicitur, quia supra eā semper cū commodo animalis videmus naturā seruare, ita ut si hypocon- affecta sit pars dextra per dextrā, & si sinistra, per sinistrā rē mo- drium, lestā euacuet. Altera rectitudo vasorū, est, qua nō ex parte eo modo & cura quo diximus, sed ex vena, qua cum loco affecto se aperit, desumitur: qua ratione utramque basilicā cum iecore rectitudinē habere dici- mus. Ex his facile causā habebis, ob quā in profluvio sanguinis per nares, hypochondrio supradictō cucurbitula applicāda sit, causa enim est duplex, rectitudo, qua tunc seruatur. Avertit etiam auctor san- Aduerte guinem frigida aqua inspersa in faciem agri incogitantis, tu etiā de medi- agroto sciente poteris uti hoc remedio, quia aqua sua frigide camen- operatur, & non propter animi pathema. tis toto

Tertiò sistentibus.] Qua de medicamentis toto tēperamento tēpera- sanguinem sistentibus scribit, non laudo, quia morbus, ex quo pro- mento fluit sanguis, ratione cognoscitur, & proinde curabitur remediis cientibus ratione etiam inuestigatis. Si obiicias Gal. qui l. 9. simpl. c. 8. scribit sangui- lapidē reperiri contactu solo sanguinē cohibentē: respondeo illū lapi- nem. dē sistere solū illud sanguinis profluvium, quod à causa nobis oc- culta excitatū fuit, quale est illud, quod hemorrhoids serpens inducit.

DE CVRAND. MORB.

*Historia.
Aduer-
te.*

maculas eruit, faciēque formosam efficit. Idem præstat aqua ex floribus fabarum, stercus columborum cum acetosi, in forma vnguenti factum fuerit, faciem emaculat, quo nobilis quædam scēmina septem diebus, curata fuit. Hæc aqua est optima, & fermē diuina ad maculas faciei: imò etiam ad vestigia exanthematum & papularum remouenda. ℞. florum fabarum p. iij. stercoreis columborum ℥. j. aceti ℥. iij. aquæ vitæ ℥. iij. sanguinis leporis ad pondus omnium, misce, ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Hæc aqua similiter omnes maculas faciei tergit, etiam illas, quæ dicuntur panis, & barro vulgo. ℞. florum fabarum ℔. ss. terebinthinæ optimæ decies lotæ ℥. j. aloës ℥. j. lactis caprarum ℔. j. misce, & fiat aqua igne paruo, & instrumento vitreo: adde in fine extra ignem chrysocolle ℥. ij. camphoræ ℥. j. sed postea sæpe moue vas.

Ad tergendos tumores paruos faciei, qui dicuntur Latinis vari, nobis barros, manē & vesperē laua faciem mixtura ex albumine oui, & aqua rosarum benē mixtis, & post ad cutem defendendam unge eam adipe hœdi parato more Valentino.

Habet similem facultatem hæc aqua. ℞. centupedes, animalcula sunt, quæ dicuntur porcelletes à Valentinis nu. 12. sacchari candi ℥. ij. succi limonum ℔. j. ex his fiat aqua, quæ est optima in hoc. Hæc aqua similiter multam efficientiam habet, & experta est quemadmodum & aliæ. ℞. cucurbitulam vnā absque cortice diuisam in partes minimas, xij. oua sine vitellis, & cum corticibus, boracis, sacchari candi an. ℥. j. lactis capræ ℔. ss. terebinthinæ abietis decies lotæ. ℥. ij. ex his fiat aqua instrumento vitreo, & igne paruo. Inter alia maximē laudata medicamenta hanc aquam probabis in hac re. Oleum myrrhæ est optimum & expertum ad omnes faciei maculas abstergendas, sit hoc modo: Accipe myrrham in puluerem redactam positam in vase terreo, & sæpe iuxta ignem moue illud vas, & à myrrha egredietur oleum compressa panno lineo, quemadmodum fit oleum amygdalarum, aut sesaminum. Hæc aqua faciem candidissimam, & pulcherrimam efficit sine detrimento vllo, & ea sæpe nobiles scēminæ Valentinæ suas abluunt facies. ℞. sublimati pellucidi puluerizati ℥. ss. aquæ fluuiatilis ℔. iij. in vase vitreo, & diu violento motu misce, & postea adde tria albumina ouorum benē prius agitata, ita vt ab eis spuma separetur, & deinde omnia sæpe moue, sicque post tres dies hac aqua vtare.

De dolore dentium, & de ipsis denigratis, &
mobilibus. CAP. XXIII.

De

Dentium dolores partim à causis externis excitantur, par- *Causa.*
 tum ab internis. Externæ causæ sunt casus, percussio, &
 vsus rerum immoderatè calidarum, vel frigidarum. Res etiam
 duras & contumaces vel mandisse, vel dentibus diuississe, & in
 vniuersum, id omne, quod eos, aut alterare potest, aut com-
 mouere. Internæ autem causæ erunt intemperies aliqua, vel nu-
 da, vel cum humore, aut frigido, aut calido: abscessus porro
 existens vel in ipsismet dentibus, vel in neruo, qui illorum ra-
 dici inseritur: vel in gingiuis, propter quas etiam contingit
 dentes dolere. Sæpe ab stomacho malum ascendit propter su-
 blatos vapores: frequentissimè tamen prouenit propter hu-
 morum defluxum (quem rheuma appellant.) Imbibitus enim
 ille humor calidus nonnunquam, nonnunquam frigidus, sæpe
 etiam salus, vel in gingiuis, vel in neruo, vel in ipsis dentibus
 dolores, & vehementes parit. Signa causarum externarum ex *Nota.*
 sermonibus ægri sunt petenda. Internarum verò hæc sunt, si
 intemperies fuerit nuda, quæ in capite fit, & per consensum
 dentes afficiant, non est dolor aggrauans, quemadmodum esse
 solet, vbi humor quoque infestat. Quod si fuerit calida in-
 temperies, acutior est dolor, quàm si frigida. Si abscessus fue-
 rit, in dente ipso dolor sentitur, quo etiam auulso sedatur do-
 lor. Si in neruo, in intimis partibus dolor discruciat. Si in gin-
 giuis, circa ipsas erit, & præter id, tumor quoque in ipsis cer-
 nitur. Si fuerit fluxus humoris à capite per frontem, & tempo-
 ra sentiente ægroto, in mandibulas, & dentes humor descendit,
 qui si sanguis fuerit pulsatio quædam adest, tumor ac calor. Si
 bilis, acutus est dolor, ac pungens, ac vix tolerabilis. Si pituita,
 dolor est remissus, & candicant in ore partes omnes, & multa
 insuper est saliuæ copia. Si melancholia, liuent & gingiuæ, &
 dentes: nec dolor tantum infestat, & aliquando duræ apparent
 gingiuæ. Porro si à ventriculo dolor hic nascatur, quod fieri
 posse diximus, prius in ipso & dolor, & quædam conturbatio
 sentiuntur.

Dentium dolor, si sit à sola intemperie profectus, alteranti- *Curatio.*
 bus contrariis absque euacuatione curatur, de quibus dicemus
 vbi de curatione doloris, qui fit à materia post illius euacua-
 tionem agendum erit. Cum est à sanguine, curatur. Primò vi- *Victus.*
 ctu refrigerante, & abstinencia vini, carniū, & ouorum, &
 omnium quæ nocent dentibus in omni fermè causa, vt potus
 actu frigidus, præsertim à cibo, vel potu actu calido, lac, da-
 ctyli, & ventriculi cruditas.

Secundò, sanguinis missione per sectionem mediæ venæ *Remedi-*
 eiusdem partis, si sit plenitudo in toto corpore, & dolor in *sio.*

DE CVRAND. MORB.

altera parte dentium: si verò in omnibus, scindatur media dextra: cum verò non est plenitudo, humeralis est secanda ita ut sanguinis copia respondeat ex æquo naturæ ægroti, & morbi.

Præparatio.

Tertiò, parantibus bilem, ut syrupo rosarum, endiviæ S. granatorum, & similibus cum aquis, aut decocto cichoreæ, endiviæ, lactucæ & portulacæ.

Purgatio.

Quartò, purgantibus bilem per medicamenta cholagoga, ut sunt rhabarbarum, myrobalani citræ, cassiæ fistullæ, electuarius diaprunis solutiui, & de succo rosarum, pilulæ de rhabarbaro, & similia, quorum formulæ notæ sunt ex dictis præcipuè c. i.

Quintò refrigerantibus moderatè, quia frigidum omne inimicum est ossibus, ex Hippocr. v. aph. ut decocto hordei, lacte humano, aut ouino, aut caprino parum calidis, aut lacte amygdalarum dulcium, aut aqua rosarum, aut mirtyllorum, & similibus.

Alteratio.

Si sit à bile dolor dentium, similis est fermè facienda medicina ei, quæ cephalalgia biliosæ adhibebatur. Si verò à pituita, curatio fermè talis erit, qualis pituitosæ cephalalgia, non secus fiet, si sit ab atra bile.

Si verò dolor dentium fuerit ab inflammatione gingivarum curatur ut phrenitis, aut angina.

A calore.

Cùm est dolor dentium à distillatione humoris à capite, observa quæ dicenda sunt cap. xxv. quia hæc curatio similis est illi: in omni tamen quæ fit à causa calida per distillationem post vacationem, & corroborationem partis primò affectæ, à qua fuit humor, est optimum hoc auxilium: ℞. balaustrarum, rosarum, mirtyllorum, sanguinis draconis, mastichis, sandaracæ Arabum, hypocistidos, spodij an. ʒ. iij. fiat decoctum in lib. ij. aquæ ad dimidium, de quo percolato accipe ʒ. ix. cui adde syrupi rosarum ʒ. iij. rhodomellis & oxysaccharæ S. an. ʒ. j. misce, & fiat mixtura, qua sæpè abluantur os, & dentes.

A vermibus.

Quando dolor est à vermibus, curatur rebus amaris, & acris quæ habent facultatem interficiendi ipsos, qualia sunt absinthium, myrrha, aloë, lupini, colocynthis, & tithymalus.

Vermes necantia.

Ex his fiat decoctum, quo laua sæpè os. Suffitus ex semine porri, & iusquiami ipsos enecat, & etiam sensum omnem eripiendo dolorem curat: hoc tamen & alia narcotica (ut philonium) non sunt admouenda, nisi in maximis doloribus, & cum alia non iuuerint. Si dolor fiat à corruptione dentium, ipsorum extractio est necessaria, & sufficiens cura, quæ ab experto viro fiet instrumentis ad hoc necessariis, & sine magno dolore. Aliqui eos medicamentis euellunt, sed cum maiori dolore, quam

quamuis tithymali lac cum farina mixtum dentes (vt quorundam est opinio) sine dolore extrahit. Quando dolor dentium est ab vlceribus prauis & corrodentibus, cōsule chirurgum doctum, & interim vttere hoc liquore sæpè: ℞. aquarum plantaginis, & foliorum oleastri an. ʒ. iiij. syr. acetosi S. ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. aceti scillitici ʒ. ʒ. pulueris aluminis vsti ʒ. ij. misce. Vlcerata tamen oris parua, & superficiem carnis tantum, occupantia (quibus pueri & infantes laborant, dicuntur à Græcis aphthæ, & ab Arabibus alcola) curantur hoc auxilio: ℞. aquæ plantaginis ʒ. iiij. aquarum lactucæ, & portulacæ an. ʒ. j. ʒ. rhodomellis, & syr. rosarum an. ʒ. ij. syr. acetosi S. ʒ. j. misce.

Vnum hoc est maximè animaduertendum, exuuias, seu senectam serpentis omnem dentium dolorem curare à tota substantia, siue per suffitum, siue alio modo. Quare in dolore dentium infantium, cum oriuntur, solent multi fieri tunc morbi, autore Hippocrat. 1. Aphorism. videlicet febris, ventris profluvium, & conuulsio: hæc enim curantur aut prohibentur fieri, si gingiua theriaca magna perfricetur, aut lacte canis, aut puluere cerebri leporis. Suffitus spoliij serpentis est in hoc optimus & lotio facta illius decocto: hæc enim facilem efficiunt exitum dentium, & sine magno dolore. Si dentes liueant, aut nigrescant, corpore euacuato sæpè perfricentur hoc puluere: ℞. salis ʒ. j. pulueris ossis sapiæ & punicis an. ʒ. ʒ. misce, & fiat puluis, adde pulueris aluminis ʒ. ij. Aqua vitæ dentes candidos reddit si sæpè ea os abluatur, excrementa pituitosa purgat, & gingiuas corroborat. Rhodomel etiam tergit dentes, & decoctum lupinorum, myrrhæ & mastichis cum melle ad modum mulsæ est optimum. Puluis hic est optimum dentifricium ad mobiles dentes fulciendos, gingiuarum carnem augendam: ℞. mastichis, sanguinis draconis, thuris, sandaracæ Arabum, ossium omnium myrobalanorum, nucum cupressi an. ʒ. iiij. santalorum omnium, succi liquiritiæ an. ʒ. ij. seminis portulacæ, rosarum, coralli rubri præparati an. ʒ. j. ʒ. foliorum myrti, baccharum myrti, psidii an. ʒ. j. spodij, cinnamomi, caryophyllorum, nucis muscatæ an. ʒ. ʒ. boli Armenici aqua rosarum abluti, amydi, gummi Arabici, dragaganti an. ʒ. j. grani tinctorum ʒ. v. lapidis hæmatitis ʒ. ʒ. misce, & fiat puluis, quo sæpè fricentur dentes. Vinum album decoctionis rerum astringentium, qualia sunt superius dicta, & similia, est præstantissimum dentifricium.

*Cura in
motu dē-
tium.*

*Quando
liuent
& mouē-
tur.*

*Denti-
fricium.*

Scholium.

DEntium dolores.] Dolor dentium symptoma est, quod sequitur solutam unitatem: hæc aut est occulta, aut manifesta: occulta ab intemperie calida, aut frigida, siue sit nuda, siue cum affluxu humoris, manifesta verò à rebus vlcus generantibus, ortum habet. Curabimus ergo hunc dolorem, si urgeat narcoticis medicamentis, si non urgeat, iis quæ causa contraria sunt, omittentes ea medicamenta, quæ ab auctore, & aliis toto temperamento hunc dolorem curantia describuntur, non enim extant.

De Angina. C A P. XXIV.

Descri-
ptio.

Synanche, vel cynanche (quam Latini Anginam vocant) auctore Gal. 4. de locis affectis, nil aliud est, quàm spirandi difficultas, nullo existente vitio, neque in pectore, neque in pulmone: unde omnes affectus, qui gutturi accidunt, quos spirandi difficultas comitatur, Hippocrates, atque alij veteres anginæ nomine appellabant, vt ex 3. Prognosticorum est colligere. Definitur etiam angina à Galeno 4. de ratione vi-

Genera.

ctus in morbis acutis, partium, quæ in gutture sunt, phlegmone. Cuius quatuor traduntur genera ab eodem 4. de locis affectis cap. 5. his verbis: Atque hæc sunt quatuor earum genera, primum vbi fauces inflammantur, fauces voco internum oris locum, ad quem simul conueniunt & gulæ, & gutturis partes extremæ. Alterum, cum neque reliquit oris partes, neque etiam externarum partium vlla inflammata videtur: laborans tamen suffocationis periculum in gutture sentit. Tertium, vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet. Quartum, vbi gutturis partes tum externæ, tum internæ similiter affectæ sunt: hætenus Galen. Quem locum si paulò inferius legas, quintum etiam genus videbis positum ex vertebrarum ceruicis luxatione. Recentiores medici inter quos Aëtius & Paulus nominantur, sic de Anginæ differentiis disputant, vt multum interesse putent inter synanchen, & parasynanchen, & cynanchen, & paracynanchen: sic enim de illis sentit Paulus lib. 3. Inflammatis faucium interioribus musculis ea oris affectio fit quæ Græcis synanche dicitur: exterioribus verò phlegmone infestatis, parasynanche. Pari quoque modo & in gutture, cuius inflammantis interioribus quidem musculis, cynanche, exterioribus verò, paracynanche nascitur. Quæ
sanè

sanè nominum curiosa distinctio, tamen aliàs non videatur esse improbanda, vt 4. aphor. commento 34. apertè tamen à Galeno damnatur. 3. Prognost. comm. 18. & 4. de locis affect. cap. 5. quippe (vt eo loco dicit Galenus) tunc primùm homines res ipsas neglexerunt, cùm nimio studio nomina quærere inciperent. Oritur hic morbus propter nimiam sanguinis aut copiam, aut efferuescentiam, qui in partes iam dictas impetu ruit, & oborta inflammatione respirandi angustiam parit. Omnibus ferme, vt ait Paulus, eadem euenta sunt: verbi gratia non nisi recta ceruice, & difficulter spirant, dolor adest, & aliquando febris, ruborque semper tum vultus, tum colli, atque tumor quoque. Quibusdam os perpetuò hiat diductumque est, & deglutire omninò sic affecti non possunt, atque dolore afficiuntur, idque præcipuè, cum potus eis per nares effluit.

*Causa.**Nota.*

Angina, quia morbus acutissimus est statim initio antequam absoluta fiat, sex generibus remediorum curatur. Primò, victu tenui & refrigerante prohibente phlegmonem augeri: vt aëre frigido, & inedia vnius vel duorum dierum, si vires poterunt ferre, vel saltem sola ptisana hordei, vel amylo lacte amygdalarum parato, aut lacte amygdalarum, aut iulep rosarum, aut succo malorum granatorum, aut cichorea cocta, aut cucurbita saccharo condita, aut cydoneis tostis, aut pyris: liquida tamen faciliùs deglutiuntur. Potus sit aqua hordei: vini enim, ouorum & carniū abstinencia est summè necessaria: quia hæc sanguinem augent, & calefaciunt.

*Curatio
Victus.*

Secundò, auertentibus impetum sanguinis fluentis ad partem affectam, & prohibentibus augmentum inflammationis: vt sanguinis missione vsque ad animi deliquium, si vires ferunt: eam tamen partiri est tutius. Secatur cephalica statim propter necessitatem subitam euacuationis, etiam magister meus Falco doctor Monspeffulanus, vir magnæ doctrinæ, & experientiæ id faciebat: & hæc aliquando bis, & ter est secanda, dum fluit humor. Si vires, & ætas non ferunt sanguinis missionem per sectionem venæ, auersio fiet per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas: cùm verò sistit fluxio, vena sub lingua scinditur. Auertunt etiam purgationes per clementia medicamenta factæ, cum sanguis est deprauatus qualitate aliqua, aut in alios humores est conuersus vt hoc medicamento, aut simili: ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. iiij. syr violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Auer-

*Reuul-
sio.**Cucur-
bitula.**Deriva-
tio.**Purga-
tio.**Auersio*

timus

DE CVRAND. MORB.

timus quoque clysteribus clementioribus, cum est inflammatio sanguine, aut bile: si verò fuerit à pituita, valentioribus. Reuellunt etiam cucurbitulae scapulis affixae. Frictiones & ligaturae partium extremarum quoque auertunt, & foras earundem ex aqua calida.

*Repellē-
tia sum-
pta &
admotā.*

Tertio, repellentibus materiam & prohibentibus cynanchen augeri, qualia sunt frigida, & astringentia leuiter gargarizata, relictā, donec incalescant in vltimis faucibus: hæc enim partem affectam roborando, & vias per quas materia fluit contrahendo optimè inflammationibus huius incrementum prohibent. Quorum aliqua sunt simplicia, & alia composita, vt aqua, & succi rosarum, plantaginis, & portulacæ, lactucæ, acetosæ, solani, granatorum, nucum viridium, mororum, & acetum. Ex his & similibus fieri possunt multa composita medicamenta: vt ℞. hordei decorticati, & lentium an. p. j. plantaginis, lactucæ, & solani an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe lib. j. dianucum, & diamoron an. ℥. ij. oxysacchara rosarum an. ℥. j. ss. misce, & fiat gargarisma hoc, & simile.

*Indica-
tio à tē-
poribus
morbi
sumēda.*

Absolute repellentibus vti oportet initio, vbi verò habenda ratio etiam est materiae, quæ fluxit simul, & fluentis, miscenda sunt medicamenta dissipantia, & resoluenda, cum repellentibus, eorum tamen vis æqualis, aut inæqualis respondere debet proportioni materiae delapsæ, & fluentis: vbi tamen intentio repellendi excedit dissipandi necessitatem duplo, fiat hic, aut similis gargarismus: ℞. hordei decorticati p. j. lactucæ, & plantaginis an. m. ij. liquiritiæ rasæ ℥. ss. ficus numero x. camomillæ, p. ss. fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ℥. x. diamoron, & dianucum an. ℥. ij. rhodomellis ℥. ij. ss. syrup. de liquiritia, & oxysacchara S. an. ℥. j. misce, & fiat gargarismus.

*Prepa-
ratio.*

Quarto, apparantibus pituitam, aut materiam mixtam, vt melle rosato colato, oxymelle S. syr. de liquiritia, & de hyssopo cum decocto, aut aqua liquiritiæ, absinthij, & similibus,

*Purga-
tio.*

Quinto, vacuantibus materiam hanc per medicamenta mixta, vt est diaphænicon, pilulæ aggregatiuæ, & similia, aut hoc potu: ℞. diacatholicon. ℥. ss. agarici trochiscati ℥. j. diaphænicon. ℥. iij. rhodomellis ℥. j. aquæ buglossæ, quod satis est, misce, & fiat potus.

*Resolū-
tia.*

Sexto, dissipantibus & resoluentibus materiam externis, & internis: vt oleo camomillæ, amygdalarum dulcium, sesamino, de semine lini de lilio, laurino, rutæ, & similibus. Hoc medicamentum, seu cataplasma collo admotum potentissimè, & optimè resoluit: ℞. farinæ fœnugræci, seminis lini, &

*Exter-
na.*

& camomillæ an. p. j. pulueris vnius nidi hirundinum: omnia simul cum sapa decoquantur, & in fine adde olei de lilio, & anethi an. ℥. j. ꝑ. croci puluerizati ℥. j. misce, & fiat cataplasma. Filum laneum purpura tinctum, & quo postea vipera est strangulata, collo appensum curat anginam. Cataplasma ex farina hordei, & de succo apij potenter dissipat, & resoluit materiam anginae: expertum à multis, & à me est. Hic gargarismus dissipat, & resoluit materiam satis: ℥. camomillæ. p. j. dactylorum, vuarum passerarum ana. p. j. ꝑ. foenugræci. p. j. ꝑ. ficus. x. numero, fiat decoctum, de quo colo transfuso accipe ℥. viij. diamorum ex maturis moris, & sapæ an. ℥. j. rhodomellis, & oxymellis comp. an. ℥. j. ꝑ. misce, & fiat gargarismus. Stercus canis album cribratum cum melle mixtum instar lochi, si deglutatur, est præstantissimum remedium ad resoluendum. Eandem, aut similem habet vim puluis hirundinum vstarum solum, aut cum melle. Hæc, & similia in vigore, aut declinatione tantum conferunt. Si verò angina nequeat resolui, quæ curandi ratio aptior est, sed in suppurationem tendit, quod febris & doloris intensio demonstrant, suppurantibus curatur, ut gargarismo, & emplastro ex rebus, quæ pus gignunt: qualia sunt foenugræcum, semen lini, malua, radix althææ, radix lilij, olea ginea & pingua. Facto pure abscessus rumpatur instrumento ferreo, si videri possit, aut manso deglutino pane duriori, vel digito altius immisso, aut candela: caput tamen inclinetur, ne pus descendat in thoracem. Deinde vlcus est abstergendum rhodomelle, & decocto hordei, & similibus: postremò verò est glutinandum mastiche, thure, bolo armeno, sanguine draconis, & similibus.

Internæ.

A rempore.

Curatio

angina

suppu-

randa.

Ruptio

absces-

sus.

Scholium.

Synanche, vel Cynanche.] De nomine, differentiis, & causis Anginae Angina, lege auctorem: aduerte tamen Anginam esse morbum morbus acutum, ex quo imminet periculum, non ob partis, qua leditur, præstantiam, sed ob situm, quia huius partis tumor statim respirationem ledit. Dices, cur in angina maiorem dolorem sentimus deglutientes res liquidas, & paucas, quàm solidas, & maiores? Respondet, id prouenit ex maiori musculorum contractione.

Secundò, auertentibus.] In Angina qua est tumor præter naturam à quocunque humore procedens duplex est morbus: unus intempéries, & alter tumoris magnitudo deglutione, & aëris ingressu impediens. Curabitur ea ratione, qua alij tumores in principio sanguinis missione, ut ruellamus, & ex cephalica, ut simul euacuemus ex parte affecta.

DE CVRAND. MORB.

affecta. Neque hoc in loco rectè præcipit Vega, in Angina ex suppressis mensibus secandam esse venam malleoli: cum enim Angina sit affectus urgens, ab ea incipienda est curatio, & deinde ventriculum est ad menses mouendos, adde reuulsionem non esse faciendam ex loco, à quo fluit humor, sed à loco, ad quem fluit. Qua dicit auctor de purgatione, an vera sint, inferius videbis.

Repellentia.

In Angina usus extergentium.

Tertiò, repellentibus.] Humor extra venas effusus, faciens tumorem præter naturam in faucibus, statim in principio, cum adhuc seruet suam naturam, euacuandus est, non calidis, quia hæc magis attrahunt, sed aliis remediis, quorum vnum fuit sanguinis missio, qua euacuans venas partis, causam dedit, ut humores iterum remigrarent ad venas. Alterum verò est frigidum, & adstringens, interius gargarizatum, quod humores ad venas repellit. Aduerte tamen neque ad morbi declinationem semper esse miscendum extergens aliquod, sicut in omnibus inflammationibus, quæ teguntur cute tenui, per quam semper aliquid resudat. In principio ergo vteris decocto hordei cum cortice, & aceto, & similibus. In augmenti principio, cum extergentibus, & adstringentibus pauca digerentia miscebis, decoquens cum hordeo paucum glycirizæ, addito deinde aceto, aut diamorone. In incrementi secunda parte, quæ primam partem flatus comprehendit, extergentia cum æquali quantitate digerentium, & adstringentium permiscenda sunt. Decoquemus ergo croci & myrrhæ an. ʒ. j. in lb. j. aqua ad medietatis consumptionem, ei addentes diamoroni ʒ. vj. In declinatione verò solis vtere digerentibus, decocto glycirizæ, aut hyssopi, & similibus. Semper tamen aduerte, repellentia maiora, aut minora esse permiscenda pro affectu maiori aut minori.

Purgatio.

Quartò, apparantibus.] In Angina non est, quod utamur medicamento purganti, eius enim nulla est occasio, nisi sit cacochimia, ex qua fluat humor ad partem affectam.

Quæ applicanda parti externe.

Sextò, dissipantibus & resoluentibus.] Parti externe in collo non sunt applicanda repellentia sola, neque cum calidis mixta, ne humor ad interiora recurrens affectum augeat, & ideo medicamentum ex nido hirundinum compositum omitatur, quia etsi in eo sit stercus digerens, est tamen terra repellens: neque tempus conteras in mentum medicamenti collo appensis, quæ tota substantia operari creduntur, ex nido non enim reperiuntur ob causam multoties repetitam: vteris ergo birundi- externis calidis, quæ vim habent leniter digerendi, & attrahendi, nū reii- oleo communi, aut camomelino, & lana succida. Atque hæc est curatio Anginæ, quæ resolutione terminatur: est enim altera illius, quæ coctione finitur suppurato humore, de qua lege auctorem.

De coriza, catarrho, raucedine, & tussi.

CAPVT XXV.

COrizæ, catarrhi, raucedinis, ac tussis eadem propè est natura: omnes enim hæ affectiones fiunt ab humore excrementoso à capite in subiectas partes descendente: qui quidem humor, si in nares fuerit distillatus, atque eas aggrauet, coriza Græcis malum dicitur, Latinis grauedo. Si verò humor fluat in os, palatum, & fauces, catarrhus simpliciter appellatur: quæ sanè vox Latinis distillationem sonat. Si verò idem humor descendens, in fauces, & guttur, & asperam arteriam cadat, & interiorem eius membranam asperiores, atque inæqualem reddat, rancam tunc vocem fieri necesse est, & morbus nascitur branchus Græcorum idiomate, dictus, raucedo verò Latine. Ex his etiam colligere possumus, raucedinem esse catarrhum, non tamen grauedinem, quod Galenus 3. de symptomatum causis cap. 11. & 2. Prognosticorum commentario 49. docet. Idem Paulus confirmat 2. lib. cap. 28. & Aëtius serm. 8. cap. 5; . Quare decipitur doctissimus Brassauolus, credens catarrhum esse vocabulum commune ad omnes defluxus humorum, quod barbari medici rheumati tribuunt, iuxta illud.

Descriptio.

Divisio.
Grauedo
ad nares.

Catharrus
ad fauces

Raucedo
ad asperam arteriam.

Brassauolus.

Si fluit ad pectus, dicitur rheuma catarrhus.

Ad fauces branchus, ad nares dico corizam.

Porro eius humoris, qui sic à capite descendit, causa est cerebrum, seu quòd à frigore in frigidam intemperiem deductum sit, seu quòd ab æstu calefiat, atque repleatur. Vinum quoque, si vltra modum haustum sit, caput replet, & balnea calidiora, & largior perfusio capitis ex aqua calida, maxime si aliàs calidius caput existat, & cibus sanè, qui in ventre incoctus per inferiorem partem non excernitur, in caput impetum facit: quod sic repletum in partes se inferiores eo modo, quo dictum est, demittit excrementa. Atque hæ sunt generales harum affectionum causæ, particulares verò multæ sunt. Et coriza sanè non ob aliam causam videtur fieri, quàm ob humoris descensum: raucedo verò non ob hanc solam causam, sed à vehementioris quandoque, atque altioris vociferationis conatu, & è gelidi aëris, spiritusve ingressu. Tussis autem multæ sunt causæ, quas Paulus Ægineta lib. 3. sic colligit. Cæterum ex aliis quoque occasionibus tussis fit, sæpius quidem ex distemperantia, quandoque calidiori, ceu in febribus, nonnunquam frigidiori, quemadmodum in tempestatibus Aquilonis, quæ aridior est plerunque. Quin & tussis aliorum sæpenuerò morborum symptoma est, morbi scilicet

DE CVRAND. MORB.

scilicet lateralis, peripneumoniæ, inflammationis iecinoris, phtisis, & aliorum similium.

Nota.

Notæ hæ sunt, quicunque aliqua ex dictis affectionibus laborant, si à calore ea nascatur, hi circum partes affectas caloris non nihil sentiunt, fluxio quædam acrim humorum, ac tenuium cum per nares, tum maxime per os defluit. Rubor partes faciei nariumque inficit. Quibus contra ex frigore, partium circa caput, & frontem fit distentio, meatuumque, quia à percolandi adminiculo isthmoides vocantur, obturatio, ita ut resonare vox deorsum per nares nequeat.

Longiore illis tempore permanent, & accidunt tussis, pituitæque excretiones, nunc quidem crudæ, nunc verò liquidæ, interdum virides. Nonnullis febris oboritur nihil eos iuuans, qui ab æstu inuaduntur: eos autem, qui ab algore, plurimum, cum ad concoctionem promoueat.

Quando tussis aliorum morborum symptoma est, ex aliis capitibus notæ sunt petendæ: omnis tamen distillatio, siue ad nares, siue ad os & eius partes, est à materia calida, aut frigida, aut mixta ex iis, & vtrique cum causa effectrice simili, aut dissimili, ut cum materia est calida, à frigore comprimente distillans, aut frigida materia à calore liquante. Cum ambæ causæ sunt similes, eadem remedia requirunt: si verò causæ sint contrariæ, remedia postulant contraria: sed maior habenda est ratio urgentioris causæ, altera tamen non neglecta.

*Curatio
distilla-
tionis à
causa
frigida.
Præpa-
ratio.
Consi-
lium.*

Distillatio à capite ad nares, aut os à materia frigida, quæ sæpius fit, & aëre frigido facta, sex remediorum generibus curatur: Primò victu calfaciente moderatè: ea tamen, quæ caput offendunt, nocent, ut vinum, sinapis, allia, cæpe, coirus, & somnus diurnus, præsertim à cibo, & similia.

Secundò, materiam frigidam apparantibus, ut rhodomelle, syr. de liquiritia, syr. capillorum veneris, de hyssopo, & ozymelle S. cum aquis, aut decocti liquiritiæ, hyssopi, passularum, fœniculi, & similium: oportet tamen miscere quæ motum, & fluxum humoris impediunt, ut est syrupus rosarum, & decoctum coriandri: quamuis in materia calida frictionibus uti oportet, ut est syrupus de papauere.

*Purga-
tio.*

Tertiò, purgantibus materiam pituitosam, ut agarico, turbit, pilulis de agarico, diaphænicon, electuario indo mai. pilulis cochiis, & similibus. Sed quia morbus hic aliquando est diuturnus, multis egens vacuationibus, post primam his pilulis uti poterit: ℞. Agarici trochiscati 3. j. pilularum assaiaret & cochiarium an. 3. ss. optimi diagridij. ḡ. xij. cum aqua stachados, fiant pilulæ quindecim. Utatur his. Dosis erunt

trēs

res quaque hebdomada.

Quartò, auertentibus, vt ligaturis, frictionibus extremorum, & fotibus, cucurbitulis in naribus, & scapulis, & clysteribus acribus, vacuatione per loca propinqua, videlicet per nares, si humor ad partes oris fluat, errhinis & sternutamentis clementioribus; de quibus capite de apoplexia. Si verò ad nares distillat humor per palatum, & os, facienda est vacuatio reuulsoria, vt mastiche, aqua mellis cum puluere hyssopi, & aliis clementioribus apophlegmatismis. In diuturna & assueta distillatione, præcipuè à materia calida, filum ceruici traiectum est optimum remedium ad auertendum: de quo auxilio cap. 16. & 17, dictum est. Multi vtuntur, & benè, ad reuellendum, cauterio in sutura coronali, aut post aures; per vlcus enim à cauterio factum materia diu, & salubriter euacuatur.

Auersio.

Derivatio.

Quintò, sistentibus fluxum, vt mastiche de glutina, & thure, spica, gummi iuniperi succo, liquiritiæ, & similibus: hoc tamen genus auxiliorum magis confert distillationi, quæ fit à materia calida mobili: hæc enim indiget incrassatione, vt bolo armeno, saccharo rosato, syrupo rosarum, syr. de papauere, & aliis etiam narcoticis, vt trochiscis de spodido, de carabe, & de terra sigillata, ne fiat vlcus in naribus, aut in partibus oris, & aspera arteria, & tandem in thorace. Vltimò vtendum est pilulis de cynoglossa Mes. cum alia non sufficiunt, & distillatio est maxima.

Sistentia fluxum.

Admonitio.

Sextò, corroborantibus caput, quæ est pars primò affecta, & à qua materia descendit, vt puluere ex coriandro, caryophyllis, mastiche, & similibus: aut hoc sacculo: ℞. coriandri preparati ʒ. iij. rosarum, mastichis, thuris, caryophyllorum anthos, stachados, & macis, an. ʒ. j. fiat ex his saccus ad magnitudinem manus, qui capite raso coronali commissuræ adimoueatur. Capitis lotio ex decocto rerum capitalium laudatur in hoc genere. Diamuscis dulcis, theriaca magna, mithridatum, electuarium aromaticum rosatum, & similia cum aqua, decocto, aut syrupo capitali valenter corroborant caput, & dissipant materiam eius.

Corroboratio, & resolutio.

Externa & topica.

Interna.

Distillatio, quæ fit à materia, & causa omninò calida, sex etiam remediorum generibus curatur contrariis, vltimò tamen genere oportet aliquando curare vlcera narium, & oris, quæ solent succedere: in his tamen curandis consule dictum chirurgum.

A causa calida.

Tussis, multas habet causas, vt diximus, aut fit à sola intemperie, aut ab vlcere, vt in trachea, aut à tumore ventris, vt in hydrope, aut à morbo laterali, aut inflammatione iecoris, aut à mate

Tussis causa.

DE CVRAND. MORB.

à materia frigida , quæ à capite distillat, à qua sæpè fieri solet. Quare de curatione huius in præsentia agam. Huic sex remedium generibus mederi possumus: Primò, victu calefaciente, & exsiccante , de quo dictum initio huius capitis : sal , & acetum maximè nocent huic , quia mouent tussim , quamuis cum melle , aut saccharo sit vtile , & necessarium ad purgandum pectus , & attenuandam materiam crassam.

*Curatio
tussis à
causa
frigida.
Victus.*

*Prepara-
ratio.*

Secundò , apparantibus materiam ad fluendum paratam crassam attenuantibus , & lentam incenditibus & tergentibus , vt rhodomelle , oxymelite S. syr. capillorum veneris , de liquiritia , de hyssopo , de prassio , & oxymelite compos. cum decocto pectorali , simul & capitali.

*Purga-
tio.
Pilula.
Confe-
ctio.*

Tertiò , vacuantibus materiam hanc frigidam , pilulis de agarico , cochiis , de benedicta, hiera composita, electuario indo maiori : sed quia hic affectus diuturnus aliquando est , & eget post primam euacuationem aliis , vsus harum pilularum est vtilis & necessarius : ℞. pilularum de hiera simplici, & cochiarum an. ʒ. ʒ. pilularum de Agarico ʒ. j. cum aliqua hyssopi fiant pilulæ duodecim. Tres pro dosi qualibet hebdomada. Si à pilulis alienus est , hoc medicamenro vacuatio facienda est. ℞. diacatholicon. ʒ. j. ʒ. diaphænicon, & electuarij indi maioris an. ʒ. ʒ. agarici trochiscati ʒ. ij. rhodomellis, quod satis misce , & fiat confectio. Dosis singulis hebdomadis à cochleario vno vsque ad duo.

Auersio.

Quartò, auertentibus omnibus dictis superiùs hoc capite, vbi de curatione distillationis ad nares , aut os agebamus quarto genere remedium.

*Eductio
materia.*

Quintò , conceptam pulmonibus materiam facilem ad expuendum reddentibus , in quo pars præcipua curationis consistit, vt eclegmate, seu loch sano & experto , aut de pino, aut de pulmone vulpis , aut electuario Diairis : syrupis pectoralibus, aut hoc loch : ℞. loch sani & experti, loch de caulibus an. ʒ. j. pulueris Diairis ʒ. ʒ. sacchari candi , & penidiarum an. ʒ. j. succi liquiritiæ ʒ. ij. syr. de hyssopo quod satis est, misce , & fiat loch : adde ad corroborandum pulmones , pulueris pulmonis vulpis ʒ. ij. quo & aliis omnibus vtendum est sæpè , & omni hora paulatim deglutiendo , vt ab vna via in aliam medicamentum possit per poros penetrare. In hoc genere confert multum foris admouere emplastrum filij Zachariæ, & de meliloto an. æquales partes super alutam ad formam & magnitudinem thoracis , vel bis in die hoc vnguento illinere , ℞. olei sesamini, & amygdalarum dulcium, & de lilio an. ʒ. j. mucilaginis foenugræci ʒ. ʒ. croci puluerizati ʒ. j. ceræ.

Loch.

Topica.

q. s.

q. s. misce , & fiat vnguentum.

Sextò, materiam reliquam resoluentibus, & digerentibus, vt Resolu-
fuffitu sulphuris, & trochiscorum & aliorum, de quibus cap. se- tio.
quenti de asthmate , & etiam omnibus auxiliis dictis sexto ge-
nere remediorum distillationis, de quo superius.

Scholiũ.

COrizæ catarrhi.] Catarrhos Græcis, fluxio est Latinis, cum à Catar-
capite ad subiecta membra excrementũ descendit. Hac fluxio, rhos.
vt autor est Galen. 3. de caus. symp. cap. 4. aliquando habet proprium
nomen, aliquando eo caret. Proprium habet nomen ea, quæ ad na- Nomina
res, os (quæ nomen generis seruat) fauces, gurgulionem, & ad oris eius.
glandulas fertur. Proprio caret nomine ea quæ sit ad ventriculum,
& asperam arteriam, quæ multorum malorum causa est: quia ex
ventriculi fluxione, vitata eius concoctione, crudi humores generã-
tur, ex quibus obstructiones sine febre, & aliquando cum febre, apo-
plexia, & alij cerebri frigidi morbi oriri solent. Sicut ex ea distilla- Noxa ex
tione, quæ asperam occupat arteriam, aliquando asthma, cum excre- distilla-
mentum crassum est, & aliquando phthisis, si tenue & calidum sit. tione ad
Distillatio symptoma est in excretis. Morbus ad quem sequitur, aut ventri-
est similis aut instrumentarius. Similis intemperies calida, aut culum,
frigida cerebri, diuerso tamen modo hæ distillationem generant: nã & aspe-
calida intemperies attrahendo, aut fundendo humorem eam effi- ram ar-
cit. Frigida verò refrigerando cerebrum, & hac ratione multa coa- teriam.
ceruando excrementa, aut ipsum comprimendo, eo modo, quo nos ma- Distilla-
nibus spongiam. Morbus instrumentarius est repletio venarum, & tio quis
ventriculorum cerebri, quæ solet etiam fieri à toto corpore: hac ta- affectus
men repletio, exigua cum sit, neque carum, neque apoplexiam, ne- sit.
que epilepsiam efficere potest. Signa pete ex auctore.

Tussis, etiam si in vniuersum fiat ab his, quæ intercipiunt respira-
tionẽ, hac tamen omnia ad quinque causas reducere possumus cum
Galeno. Prima est humor distillans à capite. Secunda humor colle-
ctus in aspera arteria, in pleuritide, & peripneumonia. Tertia com-
pressio septi transversæ. Quarta magna asperitas faucium. Quinta
intemperies frigida inæqualis partium respirationi seruientium.

Secundò, materiam frigidam apparantibus.] Hinc discas quam Tussis
male curant hi, qui tempora; hoc est doctrinam Auicennæ conse- causa.
quuti sunt: auctor enim iam secundo preparat humorem ad pur-
gandum, non sollicitus de symptomate. Proinde eius curatione omis- Curatio
sa, hac ratione curabis. Si distillatio, hoc est fluxio excrementi ur- distilla-
geat, (quod continget, si ad ventriculum, asperam arteriam, aut par- tionis.
tem principem firmetur) tunc relicto morbo, ei prospiciendum est:

DE CVRAND. MORB.

primò sanguinē mittentes, secundo medicamentis per os assumptis, & capiti applicatis, fluxionem sedantes, & ea sedata morbo prospicientes, qua omnia ea ratione, qua dicemus, prestabis.

Sanguinis mis-
sio.

Quartò auertentibus.] In distillatione facta ab intemperie frigida cerebri non audent practici venam secare, opus autem est, ut molles fiant, potissimū in remedio adeò utili. Mittendus ergo sanguis est, ut reuellamus humorem ad partem fluentem, & simul ex cerebro aliquid excrementi euacuemus: quod commodè prestabimus secta communi vena in brachio, qua caput, & partes inferiores respicit. Auertes etiā modis ab auctore propositis: quod si diuturna sit distillatio, duo cauteria, vnum in singulo brachio utiliter experieris.

Sisten-
tia flu-
xum.

Quintò, sistentibus fluxum.] Sive humor à cerebro distillans à causa calida proueniat, sive à frigida, sistendus est statim si urgeat. Quod prestabimus ore tenentes medicamentum, quod incrasset humorem, & eum ineptum ad fluxionem reddat, quale est hoc.

Cerati
ex tha-
psia
dua for-
ma.

℞. mastichis ʒ. ij. pirethri ʒ. j. cum mucilagine tragacanthi, fiāt trochisci ad magnitudinem lupini quorum vnum teneat in ore. Eo etiam tempore, quo ager dormire voluerit, assumat ʒ. iij. electuarij de papauere cum paucis syrupo papaueris. Capiti etiam, ut dolore attrahatur humor ad cutim, ceratum ex thapsia utilissimè apponetur, siue fiat in forma solida, siue in liquida. In formā solida paratur hoc modo. ℞. cera ʒ. viij. terebenthina q. s. misce ad ignem, donec ad emplastri substantiā perueniant, in fine misce pulueris radicis thapsia si recens sit ʒ. iij. si inueterata ʒ. iiij. cuius cerati sufficientem accipe quantitatem, & super alutam extende ad formam media cucufa, quam bregmati raso appone. Liquidū fiet ceratum in forma unguenti, liquantes ʒ. v. cera cum oleo, quoad formam unguenti accipiant, & deinde miscentes ʒ. ij. pulueris ex thapsia. Quo unguēto unges bregma, quo utendum est, quia melius, & citius vesiculas in cute excitat, quā ceratū solidū, quò multoties usus sum cum magno usu. Aduerte tamen, apparentibus vesiculis in cute, cessandū esse ab unctione, ne ob dolorem fiat attractio sanguinis, phlegmon. Quod si ceratum non potes efficere, sinapismum construes ea ratione, qua docent Paulus, & Aetius.

Saccu-
lus bre-
gmati
appli-
candus.

Sextò, corroborantibus caput.] In hac distillatione sedato symptomate ad morbum deueniendum est, nempe ad intemperiem frigidam cerebri, quam auferre debemus, & simul excrementa cerebri frigida digerere, bregmati, ubi multa sunt sutura, hoc medicamentum applicantes. ℞. pul. rosarum & coriandri preparati ana. ʒ. j. gummi iuniperi. ʒ. iij. salis tostī ʒ. ij. gariophyllorum ʒ. j. ʒ. fiat omnium puluis, ex quo fiat sacculus ad trianguli figuram. Et si in corpore sit pituitosa cacoehymia, ea preparata purganda erit.

Distillatio, quæ fit à materia.] Si à causa calida distillatio proueniat,

ueniat, sanguinem mittes, fluxionem inhibebis, assumptis per os: non enim applicare oportet ceratū ex thapsia, ne ardeamus intemperie. Deinde curabis morbum, nempe intemperiem calidam, lauās caput aqua tepida, permiscens cum ea parum aceti, ut penetret: & postea unge bregma oleo omphacino, rosaceo, aut alio quod frigidum sit.

Tussis multas habet causas.] Tussis symptoma est in motu de- Curatio
prauato facultatis expultricis: hæc à diuersis morbis ortum habet, tussis.
ac proinde non uno modo, sed variis curanda erit. Si à distillatione
oriatur, curabitur ea ratione, qua docuimus. Si à secunda causa
eueniat, medicamentis attenuantibus, & inscindentibus. Si à ter-
tia curare oportebit schirrum, aut iecoris inflammationem, aut hy-
dropem, si ex ea pendeat. Si tandem à quinta procedat causa, cobi-
bita respiratione sedabitur.

De Orthopnæa, Asthmate, Dyspnæa.

C A P V T XXVI.

TRia sunt nomina apud Græcos, quæ eandem rem ferre
significare videntur, videlicet dyspnæa, asthma, & ortho-
pnæa, quæ omnia suspiriosos, & anhelosos significant, de quibus
Celsus lib. 4. cap. 4. abundè egit. Propriè à Græcis dicitur dy-
spnæa difficultas anhelitus modica, quamuis Paulus. 3. lib. cap.
26. velit esse difficultatem spiritus & animæ, & commune acci-
dens alia plurima præter hæc comitans. Asthma Græcis est dif-
ficultas anhelitus vehementior, & cum æger non potest spira-
re sine anhelatione. Orthopnæa verò est, cum respirare non
potest, nisi recta ceruice spiritus trahatur: fiunt hæ affectiones
(vt inquit Ætius) cum aut crassiorum & tenuium humorum
multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispiam
abscessui similis in ipso consistit. Similiter autem difficulter Causa.
spirant, quibus aspera arteria multa distillatione mader, re-
pletâque est. Ab aliis quoque fit causis, vt ab vlcere pulmo-
num: quæ omnia sic docet distinguere Æt. Distillatio etiam Nota.
sanis ex manifesta causa repetente accidit, in totum verò citra
febrem comitantibus etiam propriis distillationis signis. Si
verò tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris
sequitur, neque ita post inflammationem, in pus conuersa,
pus reiicitur cum tussi. Qui autem propriè orthopnoici, & dif- Cura-
ficulter spirantes appellantur, in totum febrem non ferunt, tio.
grauitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam puru-
lentum per sputum reiectant. Cum igitur asthma fieri possit à
sanguine extra venas, eius curatio cap. 28. de sanguinis sputo
describetur, aut ab inflammatione pulmonum, de qua cap. 17.
de peripneumonia: aut ab vlcere pulmonum, de qua cap. 29.

DE CVRAND. MORB.

de phtisi, aut à luxatis vertebrae spinæ, cuius ratio in reductione eius in proprium situm consistit: aut fit à materia crassa pituitosa pulmones obstruente, & ab hac vltima causa ferè semper pendet. Quare in præsentia de curatione eius agendum est;

Curatio à pituita in accessione per reuellentia. prius tamen oportet scire, an æger sit in ipsa accessione, an in quiete. Quia morbus hic, quemadmodum comitialis, & articularis, habet accessiones aliquando ordinatas, aliquando inordinatas. In ipsa accessione curatio fit per solas frictiones, ligaturas & cucurbitulas extremorum ad reuellendum, ne subito suffocetur æger, qui ceruice erecta vigilet, & dormiat parum, & non in die, quies summè necessaria. Quare tunc

Sectio vena, & purgatio nocent nisi longa sit accessio. vacuatio per medicamenta purgantia, & per sanguinis missionem maximè nocet, mouens humores, & augens fluxum ad pulmones & trachæas arterias. Si tamen ipsa accessio fuerit magna & longa, subitam suffocationem indicans, indiget vacuatione per clysteres acres, & per sanguinis missionem secta vena, aut per cucurbitulas inter scapulas. In tempore

Curatio extra accessionem. quietis curatur asthma pituitosum sex remediorum generibus: Primò victu calido & sicco, vt aëre æstatis, aut arte parato, rore marino, saluia, stæchade, & aliis calidis medicamentis, vt cibo, pane scilicet furfuraceo, & salito, & bene

Victus. fermentato: carnibus auium montanarum, & animalium concoctu facili, & non humidorum, assis, aut tostis, non nervosis, nec pinguibus: vt potu parco in pastu, & post pastum nullo, qui sit aqua cinnamomi, vel decoctionis anisi, vel seminis fœniculi: eorum tamen sitis vehemens est ob calorem cordis refrigeratum minùs quam res exigit: tunc enim laua os ægri lacte caprino, vel ex amygdalis dulcibus expresso sine saccharo, aut aqua frigida, aut mucagine seminis psyllij, vel cydoniorum. Sed quia potus comprimit septum transversum ventriculo distento & difficultatem respirandi auget, quoniam ventriculus concoquit cibum, donec ab eo egressus sit potus, maximè nocet.

Præparatio. Secundò apparantibus materiam collectam in cerebro, pulmone, vel aliis partibus transmittentibus, qualia sunt calefacientia, incidentia, tenuantia, & tergentia: initio clementiora, ne resoluta tenui crassum ineptum expuitioni relinquantur.

Syrupi clementes. Conueniunt primò syrupus de liquiritia, syr. capillorum Vene. oxymel. S. cum decocto pectorali, aut aquis capillorum Ve. & liquiritiæ. Secundò post primam vacuationem concedunt

Syrupi vehementiores. syrupus de hyssopo, de prassio, & oxymel compositum cum aquis, aut decocto hyssopi, prasilij, fœniculi, dactylorum, & vuarum passarum. Tertiò post secundam vacuationem profunt

ad

ad concoquendum syr. de quinque radicibus cum oxymelle compos. & scillitico cum decocto aut aquis prasij, hyssopi, ra- *Vehementi-*
 dicis lilij sicca: quia succus eius valenter purgat in parua *tissimi*
 quantitate: inter has tamen coctiones & purgationes inter- *syr.*
 iaceant dies aliquot, vt natura quiescat. Et quia hic affectus
 chronicus est, necessaria medicamentorum omnium ferme fre-
 quens permutatio, ne natura longa consuetudine iis similis
 fiat, ac proinde reluctetur, aut ab eis nihil patiatur. Præterea *Consi-*
 ob occultam quandam proprietatem, seu familiarem quasi ami- *lium.*
 citiam quædam magis amat nostrum corpus, & alia refugit
 propter inimicitiam, quod sola experientia demonstrare
 potest.

Tertiò, purgantibus materiam, si multa est in pulmonibus *Purga-*
 aut etiam non multa in toto. Nam si pauca fuerit in pulmo- *tio.*
 nibus vt per sputa expelli possit, non opus est purgatione. Pri- *Prima.*
 ma ergo purgatio fiet per ʒ. j. pilularum de agarico, aut per
 potum ʒ. j. diacatholiconis, & ʒ. j. agarici trochiscati cum de-
 cocto pectorali, aut aqua capillorum Veneris. Secunda pur- *Secunda.*
 gatio fiet per has pilulas. ℞. pilularum cochiarum, & de aga-
 rico an. ʒ. ʒ. diagridij ʒ. iij. cum aqua hyssopi. fiant pilulæ
 viij. & aurentur si opus fuerit: vel fiat per hunc potum. ℞.
 diaphæniconis ʒ. iij. electuarij indi maioris ʒ. ij. agarici, tro-
 chiscati. ʒ. j. diacatholiconis ʒ. v. rhodomellis. ʒ. j. decocti
 pectoralis. q. s. misce, & fiat potus. Tertiò, si opus fuerit, fiat *Tertia.*
 purgatio per ʒ. j. pilularum cochiarum, aut foetidarum, aut
 de sarcocolla, vel per hunc potum: ℞. electuarij indi maioris
 ʒ. iij. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ʒ. rhodomel.
 ʒ. j. aquæ hyssopi. q. s. misce, & fiat potus. Si opus fuerit, quia
 morbus est chronicus, vtatur his pilulis semel vel bis in men- *Pilula*
 se: ℞. pilularum de hiera compos. & de agarico an. ʒ. j. ʒ. *landan-*
 agarici optimi, & turbit electi an. ʒ. j. salis gemmæ ʒ. j. zin- *tur in*
 zib. ʒ. ʒ. cum aqua hyssopi. fiat massa, cuius dosis quinque *hoc mor-*
 pilulæ ponderis ʒ. ij. Si verò non possit pilulas transglutire, *bo.*
 quæ magis huic morbo conueniunt, quàm purgantia liquida,
 quia priora diutius in ventriculo detinentur, ideoque magis &
 à partibus longinquiorebus, melius purgant: hac mixtura fiet
 purgatio ad vsum: ℞. diacatholiconis ʒ. ij. electuarij indi ma-
 ioris ʒ. j. agarici trochiscati ʒ. ij. turbit gummosi ʒ. j. syrupi
 capillorum ve. q. s. misce. & fiat confectio. Dosìs cochlea-
 rium vnum.

Quartò auertentibus auxiliis, vt iis quæ per nares & pa- *Deriu-*
 latum purgant, errhinis scilicet apophlegmatismis, & aliis *tio.*
 multis, de quibus cap. 25. præcedenti, quales sunt clysteres,

DE CVRAND. MORB.

& glandes acres, & cauteria in capite.

- Promo-
uentia
sputi &
roboran-
tia pul-
mones.
Syrupi.
Loch.
Electua-
ria.* Quinto, promouentibus sputa, hoc est, incidentibus, dila-
tantibus asperam arteriam, & roborantibus pulmones: ho-
rum quædam sunt simplicia, vt capillus ve. liquiritia, vna
passæ, crocus, ficus, iniubæ, hyssopus, scabiosa, aristolochia,
folia & semen vrticæ, enula campana, pulmo omnis, præcipue
tamen vulpis, dulcia omnia, salsa, amara, & acria simul. Ex
his sunt decocta, syrapi, loch, & electuarium, vt syrapi
capillorum Vè. de liquiritia, oxymel S. syrapius de hyssopo,
de prassio, oximel compos. oximel scilliticum, loch sanum &
expertum, loch caulium, loch de pulmone vulpis, loch de pi-
no, electuarium Diairis, hæc & similia detineantur in ore, &
sensim transglutiantur, vt à gula in asperam arteriam per po-
ros penetrare possint, aut saltem eorum vis. Hæc mixtura,
seu confectio est optima in hoc genere quinto: ℞. succi li-
quiritiæ, hyssopi, scillæ radicis lilij an. ʒ. viij. capillorum Ve.
siccorum ʒ. vij. seminis vrticæ, cardamoni, piperis, aristolo-
chiæ rotundæ, nasturtij, borac, carui, amygdalarum amara-
rum an. ʒ. v. fiat ex his cum melle sufficienti confectio, cuius
sumat cochlearium vnum, dosis sit manè & vesperi, cum vncijs,
tribus sequentis liquoris: ℞. caricarum, dactylorum an. num. x.
radicis liquiritiæ, hyssopi, calamenti, prassij, capillorum Ve.
an. ʒ. j. radicis apij, fœniculi, & seminis eorum, seminis vrti-
cæ, & fœnugræci an. ʒ. ʒ. fiat decoctum in ℥. xij. aquæ donec
tertia pars consumatur, percoletur, & cum ℥. duabus mel-
lis fiat instar mulsæ. Hæc aqua in hoc genere remediorum
est vtilissima: ℞. pulmonum hirci castrati in paruas partes
diuisi num. iij. pulmonem vnum vulpis, si nancisci possumus,
capilli Ve. m. vj. hyssopi, m. ij. radicis ari, seu serpentariæ
conculsæ ʒ. ij. liquiritiæ recentis, si licet aliunde parari ʒ. iij.
fiat ex his aqua instrumento vitreo, & igne paucò: eius dosis
ʒ. iij. cum paucò saccharo cando, aut saccharo comuni.
- Aqua
stillati-
ua.* Aqua ligni guaiaci, seu indi cum medicamentis pectoralibus
facta, est etiam optima, & experta à me in hoc genere re-
mediorum. Ius galli gallinacei veteris, medicamentis pe-
ctoralibus factum, est ab omnibus laudatum, & expertum.
- Aqua
ligni sã-
eti.* Thoraci sunt ad mouenda medicamenta, quæ in hoc genere
conferunt, vt facilius & citius medicamenta pectoralia spu-
tum promoucant, vt ℞. olei amygdalarum dulcium, & sesa-
mini an. ʒ. j. olei de lilio ʒ. ʒ. croci puluerisati ʒ. j. axungię
gallinæ ʒ. ij. ceræ, quòd satis est, misce, & fiat vnguentum, vel:
℞. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto an. æquas partes, ex-
tendantur super alutam ad formam & magnitudinem pectoris.
- Ius gal-
li vete-
ris.*
- Topica.*

Sexto,

Sexto, reliquias materiæ siccantibus, & dissipantibus, ut
 mitridato, theriaca magna, diamusco dulci, & amaro, pliris ar- *Resolu-*
 coticon, & suffitu cum thure, & sulphure: quamuis sulphur in- *tio.*
 terius cum melle, aut ouo, aut syrupo pectorali conferat huic
 morbo. Ab aliquibus laudatur suffitus ex arsenico, ego tamen
 non laudo, etsi sit aquis cardiacis castigatum. Nonnulli in vl- *Aduer-*
 timo genere præbent pilulas ex myrra, costo, aristolochia, cas- *te,*
 sia lignea, croco & arsenico: ego semper damno hæc medica-
 menta, & his similia, quanquam arsenici sit parum. Cauterium *Cauterij*
 in furcula superiori thoracis in hoc genere remediorum à *laus.*
 multis doctissimis medicis maximè laudatur.

Scholium.

TRia sunt nomina apud Græcos.] *Dispnea* nomen Græcum *Dispnea*
 Latine sonat vitium in respiratione, aut læsio respirationis: *nomē cō-*
 qua ratione sub se comprehendit respirationem frequentem, celerem, *mune.*
 interceptam, anhelosam, & rectam. In hac cōmuni significatione lo-
 quitur Gal. de diff. respi. c. 2. Et cum varia sunt læsiones respira-
 tionis, illæ quæ exiguae sunt, appellantur aliquando à Gal. nomine
 generis, difficiles respirationes: & cum exigua læsio variè possit com-
 parari, varia etiam habebit nomina. Si enim comparemus quāli-
 bet noxam respirationis cum abolita respiratione, omnes læsiones
 respirationis erunt exiguae, & ideo seruabunt nomen generis, qua
 ratione Gal. 4. de loc. affe. c. 7. *apnea*, hoc est, abolitam res-
 pirationem separauit à *dispnea*: omnes alias respirationū læsiones
 illi, quæ maxima est, opponens. Si verò omittentes ablatam respira-
 tionē, unam læsam, respirationis læsionem cum alia comparemus: il-
 la, quæ exigua est, hoc est densa, dicetur difficilis respiratio, nomen
 generis huic tantū *difficultas* accommodantes, & hac ratione loqui-
 tur Gal. 3. de diff. resp. c. ult. & 6. epid. par. 3. com. 9. Ex quibus
 omnibus hanc ultimā respirationis læsionē assumētes, tanquā unā *Tres dif-*
 differentiā, tres statuemus in vniuerso difficilis respirationis diffe- *ferentia*
 rentias. Prima erit illa paulò ante dicta, quæ seruat nomen generis, *difficilis*
 & nil aliud est, quā densa respiratio. Secunda dicitur *asthma*, & *respira-*
 tertia *orthopnea*. *Asthma* est densa respiratio sine febre, qualis ap- *tionis.*
 paret in his, qui diu accurrerūt, quæ ut colligitur ex septimo de cō. *Asthma*
 pos. secundū locos capite sexto duo habet symptomata cōiuncta, unū *quid.*
 est arctatio thoracis sensibilis, secundū est *orthopnea*, id est recta
 spiratio. Vnde apparet error practicorum separantium ab *asthma-*
 te *orthopneam*. Dices, nonne in hanc tertiam difficilis respirationis *Practi-*
 differentiā ab aliis distinctam statuisti? Respondeo verum hoc es- *corum*
 se, quia aliquando *orthopnea* reperitur sine *astmate* in sup- *error.*
 puratis peripneumoniciis, & aliis, in quibus recta spiratio cum non

DE CVRAND. MORB.

Causa sit sine febre, neque fiat ab obstructione, sed compressione, non difficili-
difficilis tur asthma. Difficilis respiratio causam habet humorem frigidum,
respira- parū obstruentē: asthma tuberculū, & eundem humore, sed obstruē-
tionis. tē magis arterias asperas, quæ in pulmone habentur. Inde intelli-
 ges, deceptū fuisse Iacorium existimantē Monachū collegij de Arras
 asthmate mortuū integris pulmonibus solū abscessu in vena ar-
 teriali existēte. Qua enim ratione ex illo abscessu possit ladi respi-
 ratio, non video. Decipitur etiam idē sentiens ex resiccatione, ut in
 chymistis aurificibus, fabris ferrariis & aliis, fieri asthma: nam cū
 aspera arteria magnum habeant meatū, nunquā in his siccitas po-
 terit asthmatis esse causa. Verum est hos aliquantulū asthmaticos
 apparere ob vaporem crassum obstruentum prædictas arterias. Ex
 vñctione autem morbi gallici, si asthma contingat, proveniet à
 crasso humore, ab argento vino ad asperas arterias expulso. Orthop-
 naa fit ab obstructione in asthmate, aut à cōpressionē asperarū ar-
 teriarum pulmonis in suppuratis peripneumonicis, & his, qui multo
Ani- humore corpus pulmonis habent imbutū. In hoc capite aduerte au-
maduer- ctore solū tradere curationē prædictorū affectuum, qui sine febre
sio. sunt, & sequentur morbum in via, nēpè obstructionem asperarum
 arteriarū ab humore crasso factam. In curatione asthmatis aduer-
 te medicamenta inscindentia, quæ utilia sunt, assumenda esse non
 simplicia, sed cum medicamento aliquo humido permixta, quod est
 Gal. præceptum 5. simpl. cap. 12. in affectibus thoracis, & pulmo-
 nis, ratio est, quia humor in pectore non debet siccari: at cū ama-
 ra sicca sint, ideo cum re liquida & humida permiscenda sunt, ut
 penetrando inscindant humorem, & siccitate non lādant.

De Peripneumonia, & Pleuritide.

C A P. XXIIII

Defini- **Q**uia Peripneumonia, quæ est pulmonum inflammatio
tio. & pleuritis, seu lateralis morbus, quæ est inflammatio
 membranæ costas succingentis, vel musculorum ei propin-
 quorum, (autore Galen. 5. de loc. affect.) iisdem ferme reme-
 diis curantur: hoc capite de his duobus affectibus non im-
Causa. meritò agere statuimus. Fiunt ab iisdem propè causis, quam-
 uis peripneumonia à sanguine magis pituitoso, & pleuritis
 à bilioso, ut docet Galenus commentario. 33. libr. 6. Aphor.
 utriusque tamen affectus causa externa calida per se, &
Pleuri- frigida per accidens comprimendo esse potest. Peripneumo-
tis con- nia quoque fit ab angina, à pleuritide & capitis distillatio-
tagiosa. ne: nonnunquam verò (ut ait Paulus) eius origo est sola inflam-
 matio. Lateralis morbus aliquando est epidimialis, sique
 per

fitque per contagionem, quemadmodum pestis. Peripneumonia (vt vult Gal. 2. de locis affect. cap. 3.) deprehenditur ex tanta respirandi difficultate, & angustia, vt suffocari laborantes videantur, ac recti sedere cogantur, quem affectum orthopnæam nominant: Aërius tamen sexto serm. cap. 66. omnes peripneumonix notas depingit longo satis sermone, nimirum febrem acutam, grauitatem thoracis absque dolore, inflammatis tamen pelliculis thoracis sentitur dolor, faciem rubicundā, præcipuè malas, nasum in summo sinum, appetentiam læsam, linguæ siccitatem, aquæ frigidæ maiusque etiam aëris desiderium, tussim siccam, vel si expuant, spumofum id est.

Accidentia inseparabilia pleuritidis (si Galeno & veritati credimus) sunt febris acuta, dolor perinde ac si locus vel intendatur, vel pungatur, respiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam duram, & quodammodo tensam indicans, tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquam verò sine his. has incoctas pleuritides appellat Galenus loco superius citato. 5. scilicet de locis affect. cap. 1. quæ vel celeriter hominem rapiunt: vel longo temporis spatio finiuntur, quo in loco multas doloris lateris species proponit.

Curatur vera pleuritis sex generibus remediorum: Primò, ratione victus tenuis vsque ad quartum diem, cum vires ferre possunt, vt lacte amygdalarum dulcium sine pane, præsana hordei colata, vel non colata, à quarto vsque ad septimum pane loto & lacte amygdalarum cum saccharo, & radice buglossæ condita saccharo, post septimum iure pulli refrigerato, cremore hordei, semper tamen ægri natura & consuetudo est consideranda. Bibat aquam hordei, aut saccharatam, aut ex decocto liquiritiæ remissè calidam, vinum nullo modo bibendum est, nisi vires sint admodum imbecillæ: tunc enim vinum dilutum, & ius gallinæ, aut aqua eiusdem per distillationem conuenirent, aut in declinatione. Dormiat supra affectam partem, talis enim incubatio minorem dolorem infert, augeturque calor partis affectæ, & magis resoluit materiam phlegmonis.

Alius sit facilis, vt minimū semel in die. Animi perturbationes, quæ augere possunt inflammationem, tollantur, vt ira, timor, & similes.

Secundò, auertentibus materiam, quæ augere possit inflammationem, vt sectione venæ internæ cubiti, quam vocant hepaticam, eiusdem partis, seruata semper rectitudine, vt duplex scopus propositus sit, alter ad reuellendum: alter ad vacuandū: quod fieri non potest per sectionem venæ partis oppositæ. Si non appareret vena interna cubiti, communis secan-

*Curatio
Pleuriti-
dis.
Victus.*

*Reuulsio
q. va-
cuatio si-
mul.*

DE CVRAND. MORB.

da est, aut humeralis, si duæ aliæ non appareant: semper tamen sanguinis copia respondeat morbi magnitudini, naturæ ægri, viribus, regioni & consuetudini. Si morbus semper augeatur post primam sanguinis missionem fiat secunda, & tertia, si opus fuerit, & vires patiantur: semper tamen ab eadem vena, posteaquam ex diuersis fieri non potest: quemadmodum in inflammationibus & tumoribus aliarum partium, in quibus, cum fluit humor, facienda est sanguinis missio ex parte lóginqua per reuulsionem, cum iam fluxit ex parte eadem, aut propinqua, vt in angina diximus. Si vires deficient, & ætas non sit florida, sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione inter scapulas, si non sit plenitudo, & in natibus, si fuerit plenitudo. In quacunque parte fuerit dolor, etiam si infestet partes, quæ sunt sub septo transuerso, vt docet Galen. comment. 11. secundi de ratione victus in morbis acutis, quamuis vacationem per medicamenta purgantia Hippocrates tum eligat, sequens aphorismum 22. primi libri, quæ ducere oportet: sed ego cum Galeno semper ad reuellendum & euacuandum simul magis laudo eius sententiam, quia inflammationibus internis, & febribus ardentibus medicamenta purgantia, præcipuè Græcorum sunt satis calida, & valenter mouent ideoque timenda. Præterea alui profluuium in pleuritide, & peripneumonia, si adueniat malum, vt Hippocrates 6. libr. Aphorif. 16. scribit. Quare in his duobus morbis benedictis medicamentis & salubribus purgabis suo tempore, quarto videlicet genere remediorum. Auertunt quoque frictiones, ligaturæ partium extremarum, & clysteres.

Auersio.

Præparatio.

Tertiò, materiam apparantibus (quæ si fuerit turgida absque coctione vacuanda est) vt syrupo violarum, syr. endiuicæ S. cum aquis endiuicæ, cichoreæ, & borraginis, aut cum decocto hordei sine cortice, violarum, & liquiritiæ: idque cum materia est biliosa, quæ si fuerit admodum tenuis, syrupo, nenupharis & de papauere est incrassanda: crassa verò aut mixta cum crassa syrupo capillorum Vene. de liquiritia, de hyssopo, cum oxymellite S. & decocto pectorali, est concoquenda.

Purgatio.

Quartò, purgantibus non valentioribus, qualia sunt Græcorum, sed clementioribus, & salubribus, quæ Arabes & nostra ætas cognouerunt, exceptis stipticis, & astringentem substantiam habentibus, vt est rhabarbarum, & mirobalani, præcipuè in tota substantia: eorum tamen infusio est probata, & laudata, & aliquando scammoniaca correctæ, quando salubria non sufficiunt, vt in electuario de succo rosarum, & diaprunis solutiui, & in parua quantitate, & mixta aliis salubribus:

bus : vt ℥. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. viij. medullæ tamarindorum (quum est ardentissima febris) ʒ. iij. (nec timeas acetositatem tamarindorum) infusionis rhabarbari per noctem in aqua endiuivæ factæ ℥. iij. syr. violarum ʒ. j. decocti florū cordialiū. q. s. misce, & fiat potus. Si copia bilis fuerit magna, adde ʒ. ij. diaprunis solutivi: & si crassa & mixta cum pituita, adde ʒ. β. agarici trochiscati vel ℥. ij. aut si amat magis pilulas, quæ minus in hoc morbo cōferūt, has accipiat hora idonea: ℥. pilularū de rhabarbaro, & agarici trochiscati an. ʒ. β. fiāt pilulæ septem cum aqua endiuivæ, & aurentur, si non est pauper.

Quintò, sputum materiæ pleuritidis, quæ in pulmonem & thoracem exodat facilè, & fluidum reddētibus in omni tempore phlegmones, & omni hora diei, aliis atque aliis medicamentis, vt syrupo violaceo, de iuiubis, capillorum vene. de liquiritia, syrupo acetoso S. & oxymelle S. pilulis bechichis, saccharo cando, violato, electuario diatragacanto frigido, & similibus, & hoc eclegmate, seu loch: ℥. penidiarum, sacchari candi, violati an. ʒ. j. pulueris diatragacanti frigidi ʒ. β. succi liquiritiæ, & pulmonis vulpis an. ʒ. ij. gummi crani ʒ. j. syrupi violarum ʒ. ij. β. syrupi acetosi S. ʒ. j. misce, & fiat loch. Hæc omnia quæ sputum promouent, retineantur ore, & sensim deglutiantur. Hic liquor seu sirupus non perfectè decoctus sputum promouet: ℥. capillorum veneris, violarum an. m. ij. iuiabas num. x. vuarum passarum sine granis p. ij. liquiritiæ ʒ. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras duas, post parum ferueant. Foris ad sputum excitandum confert hoc vnguentū: ℥. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ʒ. j. β. emplastri filii Zachariæ loco ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum: vel ℥. emplastri filij Zachariæ q. s. extendatur super alutam ad formam mediij folij papyri. Quidam in hac inflammatione parti affectæ admovent repellentia medicamenta, & malè, quia augent inflammationem.

Sextò, reliquam materiam resoluentibus, & dissipantibus, vt vnguentis, emplastris, cataplasmatibus, & fotu per spongiam ex decocto camomillæ, meliloti, seminis lini, fœnugræci, furfuris, vel per vesicam plenam simili decocto. Saccus ex millio sale, & furfure bene tostis est optimus in hoc genere remedium. Hæc tamen omnia: & similia initio veræ pleuritidis maximè noceāt, & in augmento: valenter enim augent inflammationem. Quare errant multi indocti medici, qui inconsideratè fomentis & calefactoriis vtuntur. Solet enim (Gale- no autore comment. 3. i. sexti lib. Aphor.) in his fomentum aliquantum mollire dolorem, sed alteram fluxionem aduocare: experientiæ tamen gratia ad cognoscendum qualis sit affectio

*Spiritu
inuan-
tia.*

Loch.

Liquor.

Topica.

*Obser-
uatio.*

*Resolu-
tio.*

*Vesica.
Saccu-
lus.*

*Error
inducto-
rum.*

DE CVRAND. MORB.

Curatio affectio Hippocrates & Galen. medici sapientissimi, & prae-
teratina dentissimi iis vfi sunt. In non vera pleuritide ad flatum dissipā-
vulgò dum optima sunt, & iis, vbi dubitat medicus an sit vera, an non
dicta. vti oportet: semper tamen cautè, ne attrahatur humor ad labo-
 rantem locum, & ne ex non vera fiat vera, vel si vera fuerit ne
 augeatur. Si autem pleuritis suppuretur, à qua pauci liberantur,
 natura non est impedienda, sed potius eam ars imitari ferè

Medica- semper conatur, vt hoc medicamento interno: ℞. maluae, bis
mentum maluae an. m. j. ficuum. p. j. seminis lini, & foenugraeci an. p. ss. fiat
internū decoctum, de quo percolato, accipe libras tres, cui adde butyri
pus effi- recentis ℥. j. olei amygdalarum dulcium ℥. iij. misce, & saepe in
ciens. die transglutiat paulatim parum huius medicamenti. Foris
Cata- admoueatut hoc cataplasma, ℞. foliorum maluarum. m. j. radi-
plasma cis althaeae m. j. caricarum, seminis lini. an. p. j. omnia decoquan-
ad idem. tur, & postea cum vnciis duabus farinae foenugraeci, & cum
 ℥. ij. & ss. olei sisamini, & ℥. j. butyri, addendo ℥. ss. axungiae gal-
 linæ ℥. ss. croci, & duos vitellos ouorum, misce, & fiat cataplas-
 ma: quod parti affectae admoueatut.

Qua ab- Confecto pure rumpatur abscessus frequenti tussi, & vocife-
scissum ratione, vomitu, & sternutamentis, & corporis vehementi con-
rumpit cussione. Deinde abstergetur vlcus aqua hordei cum cortice
Abster- saccharata, & si non suffecerit ipsa, cum hydromelle ex deco-
sio. cto furfuris, & cicerum, praesertim si non sit febris. Vltimò verò
Gluti- vlcus glutinabunt terra sigillata, bolus Armenus & alia quae di-
nantia. centur capite de Phtisi, sed in hoc, similibusque vlcerebus con-
 sule doctum chirurgum.

Scholium.

Perip- **Q**uia Peripneumonia.] Peripneumonia est inflammatio pul-
neumo- monis, vbi inflammatio tumorem prater naturam significat,
nia quid. potest enim fieri peripneumonia à quocunque humore, vt plurimum
Causa. tamen contingit ab humore pituitoso, & crasso, quia in substantia
Signa. laxa (qualè habet pulmo) melius moram facit. Signa eius sunt febris
 acuta, dolor grauis, difficilis respiratio, rubedo malarum, & pulsus
 mollis. Febris acuta (qua acutior est, quàm in pleuritide, etsi fiat à
 causa calida, & peripneumonia à frigida) contingit à duabus cau-
 sis, prima à vicinia cordis, secunda à vasorum cum corde comuni-
 catione. Dolor grauis fit, quia pulmo paucos & exiguos habet ner-
 uos, & ideo in eo dolor ratione membrana vsum ambientis sentiri
 debet. Difficilis respiratio cum orthopnea contingit, quia pulmo est
 instrumentum respirationis, ac proinde peripneumonia est affectus
 acutissimus, à quocunque humore fiat: perniciosissimus tamen, si fiat
 à

à sanguine bilioso, quia habet maiorem febrem, ob quam ita auge-
tur usus, ut non possit ei respiratio sufficere. Rubedo malarum non
apparet in hoc affectu statim in principio, sed postea à vaporibus ascē-
dentibus, & in malis detentis, exhalāt enim ab humore crasso, quod
non contingit in pleuritide, qua ut plurimum fit à bile, cui citò dis-
sipari proprium est. Pulsus mollis euenit in hoc affectu, ut autor, est
Gal. lib. de pul. ad Tiro. propter raritatem pulmonis, & irrigationē
arteria à pituita: quamuis enim ratione inflammationis debuerit esse
durus, pituita tamen, & partis natura id impediunt, & occultant
exiguam arteria tensionem. Pleuritis nomen est æquiuocum, nam Pleuri-
primò significat quemlibet lateris dolorem, etsi sit citra inflamma-
tionem: & hunc affectū nominare solemus lateris dolorem, aut pleu-
ritidem spuriam. Secundo propriè significat inflammationem mem-
brana pleura, qua multis donatur venis. Vnde errat Iacotius pleu-
ritidem etiam in periostio collocans: in eo enim pauca & exiles ve-
nae, inflammationi non suppeditabunt materiam. Pleuritis propria Pleuritis
rursus diuiditur in exquisitam, & non exquisitam. Exquisita dici-
tur, cum membrana primū inflammatur. Non exquisita, cum mē-
brana secundariò, hoc est ad inflammationem musculorum inter-
tur.
norum intercostalium afficitur: cum enim pleura his musculis ad-
hareat, & sit veluti tegumentum eorum, proinde fieri non potest, ut
illi muscoli inflammentur, quin pleura quoque inflammetur, &
contra: sicut in tenui meninge: & cerebro euenire c. de phrenitide
diximus. Has duas pleuritides ex Gal. 5. de locis affectis c. 2. distin-
gues ex pulsu, que in exquisita magis durus est. Signa Pathognomo-
nica pleuritidis, sunt febris cōtinua, & acuta: dolor punctorius, pul-
sus serratilis & durus, difficilis & frequens respiratio, & tandem
tussis. Febris hunc affectum comitatur, quia inflammatio propinqua
est ipsi cordi & eius inuolucro. Dolor propter tensionem soluta cōti-
nuitate, punctorius verò, qui est tensio in membrana, que acutū ha-
bet sensum: dicitur autem punctorius, quia agroti habent talē sen-
sum, qualis solet sentiri in acus pūctura. Et cum membrana ex sua
natura sint extensa, & inflammatio tendat membranam, proinde
etiam vicina partes inflammationis etiam tendi solent, & hac ra-
tione dolor ferè per totam membranam extenditur: unde prouenit,
ut dolor aliquando ad iugulū ascendat, & aliquando in hypochon-
driis sentiatur. Pulsus est durus in pleuritide non propriè, sed appa-
rentia, quia tensa est arteria: serratilis verò, quia inaequaliter arte-
ria mouetur, ob eius inaequalitatem in duritie. Fit autem respiratio
frequens, quia magna respiratio, qua calor cordis actus requirit,
exerceri non potest ob dolorem à dilatatione thoracis excitatum, &
ideo frequentia motus defectū distentionis supplet. Tussis à natura
excitatur, ut tumorem, qui ei molestus est, & humorem resudantem

DE CVRAND. MORB.

Lupelij lapsus. ex eo expellat. Præter hæc signa, alia in pleuritide reperiri solent, qua mox apparentia dicuntur. Hæc aliquando contingunt, & aliquando non: inter quæ est aphonia, quam vocis priuationem ait Lupelius euenire per consensum affectis nervis vocalibus. Qui maxime decipitur, nervi enim vocem efficientes in pleuritide non afficiuntur: sed sunt aliquando pleuritici aphony deficiente materia vocis quod in magna pleuritide experimur, in qua ob inflammationis magnitudinem, non potest attrahi aer ad vocem necessarius. Vallesius libro septimo epyd. com. 13. ex Hipp. sententia motus, suscitatur quæstionem, olim à barbaris medicis agitari solitam: qua queritur, cuius lateris pleuritidis sit periculosior. Aliqui pleuritidẽ sinistri lateris periculosiorem esse sentiunt: quia hæc pars nobilior est ob cordis situm. Alij contrariam defendunt sententiã, adducti etiam ex nobilitate dextri lateris, quam colligunt ex caliditate maiori proveniente ex maiori latitudine arteriarum, quæ per ipsam disseminantur: & ad argumentum de situ cordis respondent, cor in medio thoracis pendere, & non in sinistra parte. Vallesius in hanc secundam declinans sententiam sic explicat controuersiam. Pleuritis tres exitus habet: primus est resolutio, in qua sensim euacuatio humore breui intra morbi constitutione liberantur ægri: secundus est corruptio, qua breui moriuntur, humore vincente naturam: tertius est suppuratio, in qua magna ex parte moriuntur etiam ægri sensim tabescentes, aliquando verò liberantur. Ex his optandus est exitus qui resolutione fit, timendus qui corruptione: ille verò, qui suppuratione contingit, timendus etiã sed minus. Iam pleuritis lateris dextri maior erit, & acutior, si partis naturam consideremus, quæ calidior, & sanguinolentior est, & sic parata ad calidas & acutas inflammationes, unde pleuritis huius lateris, erit parata ad citã salutem, aut mortẽ, per resolutionem, aut corruptionem (acutior enim est hoc) sinistra sapius in suppurationem abibit, vide utrum eligas. Facta verò suppuratione (qua in utroque latere fieri potest) deterior est haud dubiẽ dextri lateris, quia non poterit fieri, nisi ea parte multum debilitata: debilitatam autẽ esse partẽ, alioqui fortem, grauius est, quàm debile: accedit, quòd sinistra pars, ut ignobilior opportunior est curationi, quia cū minori periculo secat, & vritur. Hæc Vallesius. Ex quo hæc omnia colligimus: primum est, pleuritim tres habere exitus: secundum dextrum latum esse ad Vallesij sententiam. calidius sinistro, & plus sanguinis continere eo quòd arteriæ per ipsam disseminate sunt maiores, quàm in sinistro: tertium, ex dextri lateris maiori calore sequi in eo maiores inflammationes: Quartum, in parte sinistra sapius fieri suppurationem, in dextra verò sapius resolutionem, & corruptionem. Quintum, suppurationem dextri lateris esse peiorem, eò quòd pars debilitata robustior erat, tũ quia maiori cū periculo vritur & secat. Hæc si examinemus, inueniemus primum

primū verū esse, alia verò omnia esse falsa: inniuntur enim falso supposito, quod est partē dextrā esse calidorem, quia habet arterias maiores, hactenus enim nullus anatomicorū id animaduertit. Imò si diffecans corpus attētē id aspicias, arterias dextra partis aequalis magnitudinis cū arteriis sinistra reperies, hac enim est natura iustitia, quā in duobus oculis & auribus experieris. Imò si arterias spectemus sinistrū latus erit calidius, cū arteria magna versus ipsum declinare videatur, si hoc ita est, non ergo dextrū latus erit calidius sinistro, neque plus sanguinis cōtinebit, & inde sequetur nō esse robustius, neque in eo plures & maiores fieri inflammationes, neque plures resolutiones, & corruptiones, neque erit peior suppuratio in eo, quā in sinistro, neque sectio, & vltio sinistri lateris minori cū periculo fiet, sed cū aequali, cū aequales partes, & praeſtātes aequē vulnerētur. Sedabitur ergo cōtrouersia breuiter hoc modo. Si cetera sint

Sedatio
contro-
uersia.

Curatur vera pleuritis.] Ratio victus in pleuritide, & aliis internis inflammationibus, distincta est ab ea, quam tradit Gal. 11. meth. in febribus in quibus cum tota materia ad vnā expulsiōnem seruetur, in principio crassiori (ut perdurent vires) in flatu verò tenuiori victu (ne impediamus naturā) utendum est. Contrā in pleuritide & aliis internis inflammationibus, in principio tenuem adhibere oportet victū, ut fluxionem minuamus, at in flatu fluxioni, quando coctio apparet, crassum, ut vires roborentur ad sputum educendum: quod ex Hippocrate primò acut. sen. 23. colliges: si os, inquit, madescat, & quae expuuntur ex pulmone talia sint, qualia esse oportet, sorbitionis quantitate auge.

Ratio
victus.

Aquam bibant cum liquiritia, aut capitl. veneris, aut pauco cinnamomo decoctam, & sit tepida, ut humor inscidatur, & attenuetur, qui ab aqua frigida solet incrassari. Vinum paucum solemus concedere ob consuetudinem.

Potus.

Secundò auertentibus.] Cū pleuritis sit tumor praeter naturā, in principio postulat reuulsiōnem, & euacuationē simul seruata rectitudine, non solius natura ut voluit Rondeletius, sed natura simul & vasorū. Secabis ergo basilicā eiusdē partis: quae ex parte affe-cta magis & citius euacuat, quā alterius partis: & hoc propter illā venā, quae ex axillari orta, & sub osse pectoris delata. cōmuni- cationē cum vena azigos ramis habet. Dices non semper esse venā secandam in principio pleuritidis, quia ex Hippo. 2. de ratione vi-

Curatio

Vena
sectio.

ctus

DE CVRAND. MORB.

Obiectio *Etus in acut. sent. 11. in pleuritide, qua habet dolorem vergentem ad hypochondria, purgandum est. Respondeo pleuritidem omnem, etiamsi habeat dolorem vergentem ad hypochondria, in principio postulare sanguinis missionem, quoniam hoc solum remedium potest ex parte affecta reuellere, & euacuare, neque Hippoc. in supra dicta sententia contrarium docuit. Quod si dixit, esse purgandū, id fecit, ut nos doceret, id quod habet proprium illa pleuritis, in qua dolor ad hypochondrium vergit, in qua, cum post sanguinis missionem & coctione apparente videamus inclinare humorem ad venas inferiores, per ipsas purgatione educemus ipsum: hoc autē communem rationem curandi pleuritidem non tollit, qua cum sit inflammatio, sectionem vena statim requirit. Quem locum (ignoscant mihi eius manes) Galenus non rectē explicauit.*

Duo au- *Tertiò, materiam apparantibus.] Bis peccat autor primò in*
floris. *pleuritide turgentia statuens, cum in ea humor in una parte fir-*
lapsus. *matus sit, secundo purgans. Si enim humor peccans in thorace*
continetur, per sputum est educendus, & non purgatione, natura
enim ut in plurimum per hanc partem eum expellit. Addo ut in
Multo- *plurimum, quia aliquando cum exigua est pleuritis, per alium*
rum la- *eum expellere solet. 6. aphor. com. 16. aliquando etiam per urinā,*
psus. *quod rarò etiam contingit, ac proinde in hoc eum non imitamur.*

Quintò, sputu materiæ.] Facta reuulsione, & aliqua hu-
moris euacuatione ex parte affecta, quod ex accidentibus remissis
intelliges, opus erit humorē resudatē ex inflammatione euacuare.
Quod aliqui ut prestare possint, sic distinguūt: si humor in thorace
In pleu- *cōtēntus sit crassus, debet inscindi: si verò tenuis, incrassari, ne aëri*
riti de *cedens in thorace remaneat. Hi tamen decipiuntur, quia etsi illud*
semper *verum sit in humore, qui distillans à capite in asperis pulmonis*
sunt in- *arteriis recipitur, in pleuritide tamen falsū est, in ea enim, cum hu-*
scinden- *mor ex cavitāte pectoris debeat asperas pulmonis arterias ingredi*
tia ex- *per poros, membrana pulmonem ambientis, attenuantia medicamē-*
hibenda *ta sēper desiderantur, quod elegantissimè docet Gal. 13. method.*
Modus *c. 18. Vbi aduerte hac medicamenta attenuantia, lambendo, & su-*
utendi *pino homine, sensim esse deglutienda, ut asperam petant arteriam.*
medica- *Quæ autē medicamenta exteriùs applicanda sint, ex humoris na-*
mento- *tura, & loco colligemus: si enim humor sit tenuis, qualis ut in plu-*
rum. *rimū solet esse in pleuritide, leuiter digerendū est, potissimū si sit in*
Exte- *musculis inflāmatio, hoc cōmodè prestabit emplastrū filij Zachariae.*
rius qua *Si autem humor sit crassus, & in pleura mēbrana, augēda erūt di-*
applicā- *gerentia, qualia sunt emplastrū de meliloto, puluis iridis, & cicla-*
da. *minis. Repellentibus nunquam utaris, ne ex venis exiguis pulsus*
Lapsus *humor augeat affectum, tum ne partes vicina noxam suscipiant.*
auētoris. *Sextò, reliquam materiā.] Pleuritidis signis suprā positis de-*

prehenditur, habet etiam pleura sua signa: unde id quod auctor dicit de curatione pleuritidis tentatiua, non potest constare: reuera enim Hippo. fomenta calida applicat, non ut tentando discat, sed ob vnā ex duabus causis. Prima est, ut curet affectum, aliquando enim inflammatio exigua est, & exigua fluxio, qua ex Gal. 6. epy. part. 3. com. ult. sine sanguinis missione curari possunt, degerentibus medicamentis dissipatis humoribus. Secunda verò causa ob quam fomenta calida applicat, est, ut leuato aliquantulum dolore non fluat sanguis ad affectum locum. Atque hac de pleuritide.

Peripneumonia, cum sit acutissimus morbus, & non possint agri Curatio cum illa laesione respirationis multum perdurare, in principio sanguinis missionem postulat copiosam, non enim semel, sed bis, ter, & quater eadem die sanguinem mittemus, ex basilica cuiusvis brachij, quoad ex remissione accidentium, cognouerimus fluxionē sisti. Et cum propter acutiem hic morbus quarto die veniat ad statum, tenuissimo victu utendum erit, assumentes mulsam cum decocto liquiritia, capil. ven. aut hordei cum cortice, decocto etiam cicerum uti possumus, aut iure pulli gallinacei, in quo cicera, & petroselinum decocta sint. Educemus id, quod resudat in inflammatione, sylliquiritia, capil. ven. & oxymelite simplici, cum decocto rerum attenuantium. Aduertere tamen oportebit, an sputum sit coctum, necne. Si sit coctum, augebis victum, ius gallina exhibens: si sit crudum, thoraci digerentia, & concoque ntia appones, vehementiora tamen, quam in pleuritide, cum profundiori loco contineatur affectus, sic emplastro diachilonis magni, & filij Zacharia, addes puluerem iridis, aut aristolochia, aut ceroto ex thapsia uti poteris: hæc. n. inscindunt humores & eos ad externa attrahunt. Si inflammatio suppuretur, periculum certò crescit.

De sanguinis sputo. CAP. XXVIII.

OMnes sanguinis expulsionēs (autore Gal. lib. 6. cap. 2. de Species. causis symptomatum) toto genere præter naturam censentur, excepto sanguinis profluvio, quod mulieribus ab utero defluit: sanguinis tamen deiectio per os & cruentum sputum aliis est deterius, præsertim quando ex pulmonibus emanat, quia Causa. tabem efficere solet. Hoc accidit nonnunquam à causa exter- Nota na, & aliquando ab interna, quas omnes cap. 21. de sanguinis è omnium naribus fluxu scripsimus: eas tamen ex Gal. sensu longius cruentarum, ditè colligit Aëtius serm. 8. cap. 59. Causæ externæ ex sermo- & par- nibus agri, aut assistentium cognoscuntur: internæ verò per tium à hæc indicia, quæ omnia ferè Aëtius loco superius adnotato quibus demonstrat. Si enim ob sanguinis plenitudinem accidat, ante sanguis reiectionem sentitur grauitas & post melius, leuiusque habet. fluit.

DE CVRAND. MORB.

Si propter oris , venarumque apertionem , calidus victus , & morbus calidus præcessit. Si ob venarum erosionem , cruentum apparet sputum, non subito, sed paulatim sanguis cum tussi expuitur, & semper peius habet. In magna tamen erosione confertim sanguis cum tussi expuitur sine casu, & æterna violèta causa. Quando est ex pulmone, sanguis educitur spumofus, subalbidus, atque ex intervallo cum tussi sine dolore prodit : si verò cum leuiori tussi absque spuma pituitosus sit , ex aspera arteria educitur: si niger, & in grumum concretus sanguis cum tussi, & dolore partis affectæ reiiicitur, ex thorace est ; si verò ex locis, quæ sunt circa fauces, & palatum , ex oréne, an è gingiuis sanguis feratur, ex sensu deprehendes. Nonnunquam propter hircundinem deuoratâ alicui parti inhærentem per palatum sanguis tenuis & serofus educitur, si tamen à capite sanguis deferatur, titillatio palati adest, & frequens excretio: aliquando cum tussi, & præcedenti capitis colore, aut pondere. In colore, sanguis niger, aliquando pituitosus, & aliquando mixtus cum pure. Si ex ventriculo , parua copia sanguinis vomitu educitur. Si ex hepate, aut splene, colore & dolore partis affectæ percipitur.

Curatio.

Victus.

Sputum sanguinis curatur quinque auxiliorum generibus. Primò victu refrigerante, & astringente, vt aëre, in æstate sparsis humi herbis, floribus, & aquis frigidis, & aceto rosato, vt cibo tenui saltem primis diebus, & glutinoso, vt hordei farina, succus agrestæ , aut acetosæ , aut malorum granatorum acidulcium solus, aut cum aliis est, optimum alimentum. Post primos dies præsertim cum est necessaria instauratio maior , succus gallinæ, aut perdicis cum iure pedum arietinorum, aut vitulinorum citò & multum nutrit, & sanguinem crassiores reddit. Farina orizæ cum lacte benè cocta , aut cum iure pedum, est optima. Denique omnia , quæ sanguinem incrassant , & venarum ora obturant, huic morbo vtilia sunt, vt caseus recens, lentes, pyra, mala cydonja, portulaca, & similia. Potus sit aqua chalybeata, nisi ventriculi, aut totius imbecillitas vino egeat : sit tamen id rubrum , & benè aqua chalybeata dilutum, qua omnia alimenta sunt coquenda. Quies animi & corporis, silentium, & somnus fluxus omnes cohibent.

Reuulsio.

Auertentia.

Secundò, auertentibus à rupta vena, vel aperta , vt sectione venæ internæ cubiti frequenter , vt sexta quaque hora, si opus fuerit , pauco tamen misso sanguine , cum multus per sputum reiectus fuerit: si verò paucus & æger sit plethoricus , largiori. In mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis sanguis mittatur per sectionem venarum pedum, aut tibiarum. Auertunt quoque cucurbitulæ coxis, natibus , & inguinibus affixæ, & ligaturæ, & frictio

frictiones dolorificæ, & forus ex aqua calida partium infernarum. Calor enim, & dolor trahunt ad se, & hac ratione auertunt à parte affecta.

Tertiò, æquantibus sanguinem & ipsum reducentibus ad *Renoc-* iustam proportionem quatuor humorum, quibus constitutus *io san-* est sanguis ipse, vt tenui victu parum nutriente, si fuerit lar- *guinis* gior sanguis, si acer, biliosus ac mordax, syrupo rosarum, myr- *ad pro-* tillorum, endiuia S. cydoniorum, & similibus, cum duplo *portionē.* aquarum, aut decocti, aut succi acetosæ, endiuia, rosarum, portulacæ, & plantaginis: vt ℞. syrupi rosarum, & acetosi- tatis citri an. ʒ. iiij. Item ℞. aquarum endiuia, portulacæ, & acetosæ, an. ʒ. iiij. misce: sumptis his, aut similibus tribus die- bus, aut quatuor, vacuanda est bilis non scammoniatis, ne- que aliis valentibus & acris medicamentis purgantibus, sed astringentibus: vt ℞. medullæ cassia fist. recens extractæ ʒ. j. corticum myrobalanorum citrinorum, & rhabarbari electi in- fusi per noctem in aqua endiuia an. ʒ. j. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ portulacæ. q. s. misce, & fiat potus. Si pituita fuerit sangui- ni mixta, rhodomelle, & aqua absinthij fiat concoctio eius, & euacuatio per myrobalanos, cepulas, vel rhabarbarum, vel tur- bit siue zinzibere: vt ℞. corticum myrobalanorum, cepula- rum, & rhabarbari elect. an. ʒ. j. Turbit electi ʒ. ʒ. rhodomellis ʒ. j. aquæ absinthij ʒ. ij. misce, & fiat potus: quod si malit pilulas: ℞. corticum myrobalanorum, cepularum, & agarici trochisca- ti an. ʒ. ʒ. cum aqua foeniculi, fiant pilulæ viij. & aurentur, si non est pauper. Quartò, glutinantibus vlcus, & contrahentibus *Restri-* oris hiatum, & tandem sistentibus sanguinem: hoc tamen ge- *ctio san-* nere auxiliorum semper est vtendum, & statim cum æger visi- *guinis,* tur, ne sanguis immodicè fluat: vt portulaca mansa, & ore *aut ve-* retenta, lapide hæmatite, corallo albo vsto, bolo armeno, *na obtu-* terra lemina, balaustiis, semine myrtillorum, dragaganto, *ratio.* gummi Arabico, mastiche, & similibus simplicibus. Sunt quo- que composita, quæ eadem, aut simili facultate valent, & vasis hiatum opplent, vt trochisci ex terra sigillata, & trochisci de karabe, & de spodio: horum singulorum, siue simplicium, si- ue compositorum ʒ. j. cum aquis, aut syrupus astringentibus ex dictis potenter astringit, & glutinat: asininum stercus re- cens odoratum, vel potum, quodcunque sanguinis proflu- uium sistit. ℞. succi stercoris asinini ʒ. ij. syrupi myrtillorum *Admo-* ʒ. j. aquæ portulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potus: quem bibat *nitio.* actu frigidum, & omnia alia medicamenta, & etiam alimenta omnia, si fieri possit. Narcotica medicamenta huic mor- bo sunt necessaria, etiam in initio, ne subirò pereat æger;

DE CVRAND. MORB.

aut ne fiat tabes, si breui tempore non consolidetur vena: ideoque in hoc sanguinis profluvio Galenus audacter iis vritur, præter tamen trochiscos superius in hoc genere laudatos, qui sunt narcotici, quamvis parum opij sulcipient, præter etiam requiem magnam, & athanasiam, quæ sunt narcotica composita clementia, cum prædicta non sufficiunt, vtendum est philonio Romano, aut Persico, aut Tharsensi ab ℞. j. vsque ad ℞. j. semper tamen his narcoticis, aut similibus non egent, qui calidum innatum imbecillum habent, ne ab iis admodum frigidis omnino extinguatur, vt multis contingit, qui perpetuo dormierunt ex potu narcoticorum: sed trochisci, qui sequuntur, sunt optimi, & à multis experti in hoc morbo.

Narcotica.

Aduerse.

℞. acaciæ, balaustiarum, nucis cupressis, gallarum, hypocystidos, nucleorum vux sylvestris, caudæ equinæ, corrigiolæ, myrti, sumac an. ℞. ij. thuris, mastichis, myrrhæ, lapidis hæmatitis, carabæ, santalorum, coralli rubri, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, boli armenici, aluminis fossi an. ℞. v. stercoris asinini ficci, capræ & leporis, spongiæ combustæ, centaureæ minoris, cornu cerui vsti, spodij, cupullorum rosarum rubrarum, bedeguar, rhabarbari rosti an. ℞. iiii. seminis papaveris albi, seminis iusquiami albi an. ℞. j. corticum mandragoræ, opij castorei, cassiæ lignæ an. ℞. ij. croci, camphoræ an. ℞. j. fiant trochisci cum succis, aut aquâ plantaginis, & portulacæ. Dosis ℞. j. cum ℞. ij. aquæ, aut succi portulacæ, aut plantaginis, aut sanguinariæ: sed iis non est vtendum, nisi post tres menses, vt minimum.

Observa.

In usu tamen horum, & aliorum medicamentorum, quæ sanguinem à pectore fluentem sistunt, semper sunt permiscenda quæ pulmones & thoracem iuuant, vt electuarium diadragantum frigidum, syrupus de liquiritia, & succus eius, & similia. Quare hoc medicamentum est huic affectui summè utile.

℞. conseruæ rosarum antiquæ ℞. ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, & cerasi an. ℞. iij. (dissoluantur in aquis portulacæ, & plantaginis) succi liquiritiæ, boli armenici præparati, terræ sigillatæ, lapidis hæmatitis, coralli præparati, sanguinis draconis, mastichis, thuris an. ℞. j. Karabæ ℞. iij. ꝑ. syrupi papaveris, & myrtillorum an. æquas partes, & quæ satis sint confectioni faciendæ ad modum loch, cuius cochlearium vnum frequenter teneat æger ore, & sensim transglutiat. Thoraci admoveantur medicamenta actu, & potestate frigida, & repellentia, atque astringentia, eaque sæpe, quales sunt succi, aut aqua plantaginis, portulacæ, rosarum, solatri, & similes cum pauco aceto & bolo armeno. Vnguenta frigida, vt cerotum santalatum est bonum.

Topica.

Scholium.

Quintò corrigentibus.] Sanguinem concretum inscindes Sanguis-
posca, hoc est aqua & aceto mixtis, & per os assumptis, mulsam nem cō-
etiam & oxymelite, unde non est, quod viaris coagulatis ab auctore cretum
propositis. inscin-
dentia.

De Empyemate, id est, suppuratione, & tabe.

C A P V T XXIX.

Empyema Græcis, Latinis suppuratio, est affectio pectoris eorum, quibus in succingente costas interiùs membrana abscessus, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acervatim ruptus est, & in vacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Vnde constat ex non curata pleuritide hanc affectionem *Causa.* maiori ex parte nasci, quod Aph. viij. sect. v. verustissimus Hippo

DE CVRAND. MORB.

Nota.

*Descri-
ptio &
causa
phthisis.
Nota.*

Hippocrates docuit. Interdū tamen & ex sanguinis eruptione hoc malum oritur, disrupto scilicet vase aliquo in thorace, & ad cicatricem non perducto. Iam & propter confluxum à capite per mutatam anginam in pulmone sæpè fit iuxta aphorismum decimum sectionis quintæ. Ex causis quoque procatarteticis fieri potest, sed rarò. Suppurati sic deprehenduntur, si inflammatio præcesserit, deinde vehementes febres quieuerint, & ex magna parte quoque dolor, grauitatis autem sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid appareat iuxta multiplices reclinationis permutationes, & maximè cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpè sensibilibus in reclinationibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex prædictis, tum quòd nihil relatu dignum reiecerunt in eo, qui præcesserit vehementi lateris dolore. Sed quoniam vicina admodum affectio huic morbo phthisis est (autore Hippocr. 5. lect. Aphor. 10.) non iniuria de vtraque affectione vno capite ageretur. Dicamus ergo de phthi si aliquid, ut deinceps curationem aggrediamur. Phthisis, pulmonis exulceratio ab omnibus censetur, ex empyemate (ut dictum est) nata, nonnunquam verò & ex defluxu humoris acris, atque erodentis oritur. His autem notis cognoscitur, totius corporis summa adest extenuatio, nares acutæ sunt, tempora collapsa, oculi concaui, scapulæ alarum more prominentes, ad hæc tussunt qui sic affecti sunt, & quod expuitur, foetidum est, & febri corripiuntur hectica, quam insequuntur ea omnia, quæ à Galen. numerantur 1. de differentiis febrium cap. 11. quæ si probè consulas: præter hæc etiam, quæ ab Hippocr. dicuntur Aphor. 11. 12. & 14. sect. 5. plenam habebis signorum cognitionem ad hanc affectionem dignoscendam. Suppuratio hæc diligenter est curanda, ne fiat vlcus in pulmonibus, & tandem insanabilis morbus ob motum perpetuum pulmonum, eorumque substantiam raram, hecticam febrem coniunctam: quæ sola est incurabilis, si fuerit confirmata. Magis etiam insanabilis est, si sit coniuncta cum vlcere pulmonum, quod indiget mundificatione, & exsiccatione: hectica verò instauratione, & humectatione, quamuis quis tabe laborans agnoscat medicamentum, quo curatur.

*Curatio
suppu-
rationis.*

Curatur suppuratio hæc medicamentis purgantibus pus iam dictis capite de pleuritide in fine, cum terminatur per suppurationem post ruptum abcessum: aliquando tamen vbi magna

magna est copia puris , incisio est facienda secundum longitudinem costarum , inter quartam & quintam thoracis mendosas , facta prius experientia fili actu humidi admoti supra locum, si exsiccat. Sed aduerte , ne totum pus, vel illius magna quantitas extrahatur semel , sed multis purgationibus, quamuis citò & cautè in habitione calida propter conseruationem caloris innati & spiritus. Nostris enim temporibus fuit integræ sanitati restitutus hac curatione quidam nomine Lupus, qui ex vulnere magno parris superioris thoracis in supurationem peruenerat magnam cum febre acuta & maxima difficultate respirationis educto pure per nouam incisionem partis inferioris thoracis non vno die , sed multis , ne vires deficerent.

Observatio.

Historia.

Phthisis , si curari possit , quinque generibus remediorum curatur: Primò, victu refrigerante , & humectante habita ratione hecticæ: si verò spectes vlcus , febris causam (quod prius & magis curandum esse volunt autores) calido & sicco victu curabis. Sit ergo in actiuis qualitatibus temperatus victus, sed siccior vlceris gratia . ob id Galen. quinto methodi phthisicos ad Tabias mittebat , vbi erat aer siccior , & sanabantur. Sint cibi faciles concoctu , boni & multi sanguinis : quia calor est imbecillus , & corpus macrum : sint etiam tenues & liquidi ob eorum vias siccitas , & contractas , & causâ febris refrigerent parum , & propter vlcus sint apti ad detergendum. Ab his etiam ad consolidandum & glutinandum , quæ omnia insunt lacti , & saccharo rosato. Lac enim facile concoquitur , ac maximè nutrit butyro & caseo , optimi est succi, liquidum quoque est, & subfrigidum , tergit acrimonia feri , & sapore dulci substantiæ butyrosæ alit , glutinat caseo: facultates tamen variæ lactis augentur , vel minuuntur diuersa ratione victus. Refrigerans facultas augetur lactuca , cichorea , endiuia , portulaca , & similibus. Tergens verò vis augetur hordeo , adianto , fœniculo , & hyssopo. Natura glutinosa crescit rubo , lentisco , salice , & similibus. Humanum lac est omnium præstantissimum , omnium tamen tenuissimum est lac camelorum , deinde equarum , post asinarum. Cprarum lac est temperatum , sed vaccarum lac & ouium magis nutrit: Humano tamen lacte nobiliori omnibus, & magis familiari est nutriendus hoc morbo laborans , fugatque ipsum ab vberibus, dummodo sit sana, & iuuenis lactans, nec candida admodum aut nigra. Bonis quoque nutriatur cibus, fugiat venerem tanquam pestem. Si verò non possit, vt infans lac à mammis sugeret , summo studio ipsum bibat actu

Curatio phthisis. Victus.

Lactis facultas.

Qualia sint omnia fere lactis genera.

DE CVRAND. MORB.

*Modus
sumendi
lactis.
Lac dis-
suaden-
tia.*

calidum, calore naturali, quod fiet ingenio astantium in aë-
re temperatè calido. Primò bibat vnciam vnam, deinde sen-
sim progrediatur ad 3. vj. vel octo, parum sacchari addendo,
ne coalescat in ventriculo, alij addunt parum mellis, aut salis,
sed ego magis laudo saccharum, dummodò non adsit ven-
tris profluuium, quod prohibet lactis vsum, quemadmodum
& alia multa, vt distillatio à capite, dolor capitis, febris pu-
trida, præsertim ardens, suspensa hypochondria & murmu-
rantia, inimicitia & discordia inter ipsum & ægrum: vbi ta-
men illius vi & ope maximè eget ægrotus, quibusdam dissen-
tientibus oportet eum nutriri, præcedenti tamen aliqua cor-
rectione, vt in ventris profluuiò lac fiat acidum per sex ho-
ras, aut per noctem eductis partibus butyrosis, facta eius com-
motione in vase vitreo, aut terreo quibusdam virgulis & spu-
ma sæpè extracta, erit illud lac adstringēs, & refrigerans: quem-
admodum est lac, in quo extinguitur quinquies ferrum igni

*Lege Ga-
lenum
lib. de
facultat.
alim. de
lacte.*

*Lac asi-
ninum.*

*Sumpto
lacte non
est dor-
miendū.*

tum aut calybs, quo nutriatur sine saccharo. Asininum lac
post humanum eligatur tanquam tenuius, & facilè concoctu,
deinde caprinum, præcipuè ad refrigerandum & tergendum,
quia est serosius. Quinum & vaccæ valentiùs glutinat, & ma-
gis (vt diximus) nutrit: quia butyrum & caseum imitatur. Hu-
manum tamen ad omnia est præstantissimum, si esset eius co-
pia. Non est dormiendum ægro hausto lacte, sed quiescen-
dum, ne lac crudum in corpus trahatur. Quare tunc frictio
cutis maximè noceret, saccharum rosarum his omnibus fa-
cultatibus præditum est, quamuis recens magis tergat, anti-
quum verò conglutinet, sed de eo in quarto genere remedio-
rum loquemur. Nutrimentum gallinarum iuuenum, capo-
num, perdicum attaginis, hædi, turturis, coturnicis est opti-
mum, & ius eorum cum hordeo, & ciceribus cum amydo, &
cum lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum fri-
gidorum maiorum, canceri fluuiatiles bene præparati, simi-
liter limaces, saltem eorum aqua, aut ius bene nutriunt, hu-
midumque gignunt nutrimentum, glutinosum, & tardè disso-
lubile. Testudines, & ranæ degentes in aquis salubribus ma-
ximè laudantur ab omnibus, horum tamen mentio fiet capi-
te de curatione hecticæ lib. secundo. Hæc aqua est optima &
omnibus melior, & huic morbo vtilior, omnibùsque facul-
tatibus necessariis prædita est. ℞. foliorum lactucæ. m. iij. ca-
pillorum veneris m. j. hyssopi. m. j. liquiritiæ recentis si fieri
possit 3. iij. pulmones duos hirci, aut vituli, pulmonem vnum
vulpis, si reperiatur, carnis cancrorum secundum artem pa-
rata (quam obseruabis cap. de curatione hecticæ secundo
lib.

*Aqua
prestan-
tissima.*

libro) ℥. iiii. carnis testudinis nemoralis , carnis limacis bene paratæ ana. ℥. ss. carnis ranarum bonarum ℥. iiii. sacchari candi ℥. viij. pulueris diadragati frigidi ℥. iij. boli armenici præparati ℥. ij. fiat ex his omnibus aqua instrumento vitreo, & igne paucis: quolibet die summo manè bibat ℥. iiii. illius cū paucis saccharo. Potus sit aqua hordei , & vinum album tenue bene dilutum authore Rhase , inter Arabes viro multæ experientiae. Quidam laborantes tabe persanati sunt solius lactis potu , & si ferrum , aut chalybs , aut lapilli candentes in eo fuerint extincti, erit præstantius, sed ego non laudo permixtionem lactis cum aliis alimentis.

Secundò, abigentibus causas phthisis, quæ si fuerit distillatio, *Causa* curatur , vt diximus capite 25. Si verò vas ruptum , curetur *remotio.* vt diximus præcedenti capite : si humor in pulmonibus erodens , appareatur & vacuetur , vt diximus capite de catharro.

Tertiò , tergentibus vlcus pulmonis dulcibus & amaris *Deter* vt rhodomelle, syr. de liquiritia , syr. capillorum veneris , de *gētia vl-* hyssopo , de prasio , & decocto pectorali , & cicerum solo *cus.* cum saccharo , aut aliquo ex prædictis syrupis. Dosis vnciæ tres , quamuis frequenter & omni hora sensim transglutiendo sit vtile , & necessarium aliquod ex supradictis medicamentis.

Quartò , implentibus carne vlcus , & glutinantibus , hæc tamen propria sunt opera naturæ præcipuè præcedenti debita terfione , vt bolo Armeno , sanguine draconis , & similibus cum syrupo pectorali. Saccharum tamen rosatum : antiquum potenter glutinat ratione substantiæ rosarum , quamuis recens tergat magis , vtrumque tamen nutrit ratione sacchari , Quare recenti opus est, cū vlcus est sordidum , & vetusto, vbi fuerit tersum : hoc multis iam morti proximis fuit sanitas restituta , præcipuè si semper etiam in prandio & cœna eo nutriantur ægroti. Aliqua sunt quæ totius substantiæ proprietate profunt huic morbo , vt pulmo vulpis , pulmo ericij ficcatus , ex his & aliis fiat loch , vt ℥. pulueris pulmonis vulpis , & ericij. an. ℥. iiii. pulueris diadraganti frigidi ℥. j. sacchari rosati ℥. vj. gummi cerasi, & Arabici an. ℥. ij. syr. de liquiritia. q. s. misce & fiat confectio , ad modum loch. Est etiam herba quædam nobis incognita , qua ouis curatur , ipsamque naturali cognitione inquirat, & amat , vt autoritate Democriti aliqui scribunt.

Sarcotica, vel carnevlcus implentia.

Quintò , corrigentibus symptomata , vt alui profluvium, *Corre* de quo capitibus 36. 37. & 38. dicemus. Fit tamen hoc sym- *ptio sym-* ptom promissu.

ptoma ab imbecillitate facultatis retentricis, & concoctricis ventriculi, & aliarum partium: pulvis diarhodonis Abbatis est optimus, & in vsufrequenti, emaciationem laborantium phthisi corrigunt aqua carnis, iura optima, dicta primo genere remediorum, & alia, quæ dicemus capite de hectica, libro secundo. Si verò fuerit confirmata & antiqua phthisis, insana- bilis est, blandè tamen tractanda, & callus excitandus per sic- cantia. Vixit enim quænam furnaria phthifica viginti octo an-
Historia annota- da. nis, inspirato sæpè aëre sicco furni.

Scholium.

Dua em pyematis signifi- cationes. **E**Mpyema Græcis.] Empyema à Latinis suppuratio dicitur: hac duobus modis sumitur, ex 7. aphor. com. 44. primo pro mutatione in pus, in qualibet contingit parte, quæ ratione Hippocr. libr. prædicto sent. 45. hepar suppuratum appellat, & primo prognost. sent. 36. suppurationes foras urgentes, bonas, contrarias malas scribit. De his etiam suppuratis intelligenda sunt signa, quæ 2. progn. sent. 60. ab Hippocrate traduntur. Secundo modo sumitur suppuratio propriè, pro ea collectione puris, quæ fit in thoracis ca- vitate, & pulmonis asperis arteriis. Altomarius ex Gal. libr. 5. aphor. com. 8. & 2. progn. com. 60. tertiã significationẽ scribit sup- purationis, quæ suppuratio dicitur mutatio in pus earum tantũ in- flamationum, quæ in pectore continetur. Nos tamen rē consideran- tes, ex illis Galeni locis duas tantum suppurationis significationes scripsimus, & sic non est hac in parte sequendus Altomarius. Hac
Altoma- rius re- prehen- ditur. puris collectio solet fieri ex pleuritide, & peripneumonia, cum ad suppurationem veniunt, & rumpitur abscessus: tum ex distilla- tione pituita à cerebro, in qua reuerà pituita non venit ad suppu- rationẽ, cū nec possit nutrire, nisi prius mutetur in sãguinẽ, mutatur tamen in similẽ puri substantiã, ut patet ex Galeno 7. aph. com. 30.

Phthisis unde di- catur. Phthisis (quæ à Græcis Atheniensibus dicitur ptōis à verbo phtheiro, dicitur, quod est corrumpo, aut absumo, & proinde à Latini- nis dicitur Tabes, quæ consumptionem significat. Inde duplex phthisis significatio exorta est, quam scribit Gal primo epid. par. 2. com. 13. una & prima significat quamlibet corporis extenuatio- nem, siue ex defectu alimenti quæ atrophia dicitur) siue ex febre hectica, siue ex pure in thorace contento, aut ex quavis alia causa
ecunda abis si- gifica- ti exsiccante contingat. Secunda propriè tabes significat eam corporis extenuationem, quæ sequitur ad insanabilia ulcera pulmonis. Vn- de mirandum est de Altomario, & aliis, cathechiam Tabis spe- ciem facientibus, cum homines cathectici non sint extenuati, nu-
Quid sit. triuntur etenim, quamvis malè. Quod si Hippocrates in epid. miis

miis aliquos natua tabe laborasse scribit, per tabem nullā ex dictis natua intelligit, sed tantum inclinationem ad ipsam, qua repetitur in his, tabes. qui caput habent languidum, ita ut facile impleatur, & ad pulmonem fluxiones mittat, primo epyd. part. 1. com. 18. tum & in his, qui angusto constant pectore, non quia habent pulmones languidos, & qui facile corrumpuntur, ut male voluit Fernelius: sed quia humores, in loco angusto inclusi non recte diffiantur, & sic facile putret.

Curatur suppuratio hæc.] Empyema morbus est in numero addito, est enim in thorace addita pars toto genere prater naturam, non necessaria ad actionem, imò qua causa est actionis læsa. Debet ergo morbus auferri, hoc est, pus debet euacuari tussi, ut locus, in quo continetur, sit nobis indicat: assumi tamen debent medicamenta, qua ipsum attenuant. Et ideo summo mane assumere poterit ager mel despumatum, aut puluerem iridis cum mulsā, aut sequentia duo medicamentata. Primum ℞. syrupi de hyssopo ℥. iij. syrupi violarum & oxymellis scillitici ℥. ss. misce. Secundum ℞. loch caulium, loch sanum & expertum ana. ℥. j. succi liquiritia ℥. iij. pul. diairis & diappendionis an. ℥. j. ss. conserva capillorum veneris ℥. iij. cum oxymelle scillitico, & syr. violarum, quod sat est, misce, & fiat loch. Quod si pus ex inflammatione rupta sit, quod continetur in thorace, post puris expurgationem cicatricem inducemus exiccantibus, qualia sunt. 3. j. sulphuris cum melle, aut miscebis cum ouo, aut decocto scordij sulphur, aut eiusdem scordij puluerem. Aut bolum armenum cum melle, vel decocto scordij mixtum exhibebis. Suffumigium etiam facere oportet ex sandaraca arabum, thure, & mastiche, aut ex tussilagine, qua est ungula caballina officinarum. Si pus prædictis medicamentis non expurgatur, ad sectionem deuenies: quamuis ferè hi omnes moriantur.

Phthisis si curari possit.] Pulmonis vlcus tunc curari potest, cum non habet inflammationem coniunctam, ea enim præsentem, im- possibile est ipsum curare, ob causam à Gal. propositam s. method. c. 8. in quo etiam capite habes curationem vlcus pulmonis. Fre- quenter autem solet euenire corporis extenuatio ex materia, & tho- race in puris similitudinem mutata, & à capite distillante, quam tabem improprie appellamus. Cognosces autem hanc materiam non esse pus, quia in his hominibus neque inflammatio interna, neque improfluum sanguinis præcessit. Oportet autem hanc diligenter curare quia febrem excitat putrem, in qua moriuntur agri: hac tabe mortuus fuit Antiphonis filius 7. epyd. sent. 27. Curabitur prius distillatione prospiciendo illis, qua c. de catharro diximus: extenuanti etiam victu, & medicamentis, qua inscindunt humorem crassum. Purgabimus etiam pituitosum excrementum pilulis de agarico, & aliis.

De Palpitatione cordis, & syncope.

CAPVT XXX.

*Descri-
ptio.
Causa.*

Palpitatione cordis, seu tremor (quam recentiores medici male cardiacam appellant) motus cordis deprauatus est, nimirum dilatio eius præter naturam. Fit palpitatione propter inclusum vaporem crassum, ac multum. Hæc enim est generalis causa omnium palpitationum, cuiuscunque fuerint loci, ut docet Gal. 5. de symptomatum causis: quamvis quinto de locis affectis scribens causas affectuum præter naturam cordis, & ventriculi de huius affectus causis, porro inquit utriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones aut fortè duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erisipelate, aut inflammatione, aut aliquo præter naturam tumore fieri solent.

*De syn-
cope, eius-
que de-
scriptio-
ne, &
causis.
Nota
palpita-
tionis
cordis.*

Ab iisdem causis, sed maioribus fit syncope: quæ est (autore Galeno lib. 12. method.) præceps virium lapsus, qui sæpè à causis externis accidit, ut à dolore, timore, ira, & terrore, & vacationibus maximis, vigiliis, & inedia, & aliis multis, quæ vires dissolvere valent. Deprehenduntur hæ affectiones, palpitatione quidem, ex aggroto euidenter sentiente hoc malum, & ex pulsu, qui in causa calida velox est, & aliquando cum febre: in frigida, contrarium apparet. Si ab humore intra pericardion collecto palpitatione cordis fuerit, pulsus est mollis, & languidus.

*Nota
Synopes.*

Cognoscemus syncopen ex pulsu maximè languido, & deficienti: ex frigore extremorum, & colore faciei albo, & exanguio, ex sudore frigido, & priuatione sermonis & motus totius. Quando per consensum ventriculi fit syncope, sentitur prius dolor in ipso ventriculo, & grauitas, & sæpè nausea, ac vomitus cum angustia præcedit, de quo capitibus sequentibus agemus.

*Curatio
palpita-
tionis.*

Curatur palpitatione cordis quinque remediorum generibus. Primò, victu, si causa calida est, refrigerante, ut aëre refrigerato rosas, santalis, aceto, violis, nenuphare, myrto, addito vino, & ambra, ut frigida promptius penetrent ad cor. A causa verò frigida, calfaciente, ut aëre commutato, & alterato rore marino, maiorana, basilicone, salvia, moscho, ambra, melissa, & similibus. In his cordis morbis ratio aëris præcipua est habenda. Mox enim penetrat ad cor inspiratus aër. Cibi sint boni succi, & faciles concoctu, refrigerati in calida, acetosa, aceto, agresta, succo malorum medicorum (vulgò naranjas vocant) limonum, & citrorum: & in frigida causa, maiorana calefacti, basilicone, rore marino, fœniculo, & simili

Victus.

similibus. Vinum in hoc est optimum, sed in calida vitetur, præcipue generosum, & vaporosum: dilutum tamen aqua hordei, aut rosarum vel alia refrigerante confert, in omni tamen causa, si ventriculus sit imbecillus, bibat vinum, aut aquam cinnamomi.

Secundò, sanguinis missione, præsertim si fuerit à sanguine, *Renul-*
& æger carnosus, per sectionem iccorariæ dextræ, non vnā *sio.*
tantum, sed plures, si non fuerit senex. Si verò fiat à flaru im-
plente ventriculum sinistrum cordis, secunda est basilica fini-
stra, & parcè sanguis mittendus.

Tertiò, apparantibus materiam crassam tenuantibus, & ca- *Prepa-*
lidam frigidis, eius acrimoniam remittentibus: sed tam cali- *ratio.*
dis, quàm frigidis moderatis: ne offendatur cor pars princeps, *Consi-*
& fons vitæ. Quare in causa calida medicamentis frigidis *lium.*
aliqua aromata calida sunt miscenda, vt eorum frigiditas im-
modica reprimatur: & vix etiam frigida mista calido medi-
camento promptius (vt dixi) ducatur ad cor. Optimè igitur
trochiscis de camphora additur crocus, & alia quædam ca-
lida secundum quosdam: quamuis calida sit officinarum cam-
phora. Calida ergo materia apparatus per duos aut tres dies sy- *Cāpho-*
rupo violato, rosato, endiuizæ simplici & comp. & in magna ca- *ra nostra*
liditate syrupo acetositis limonum, aut citri cum aquis aut de- *calida*
cocto rosarum, endiuizæ, portulacæ, lactucæ, plantaginis, ne- *est.*
nupharis, & similibus. Frigidam verò, & pituitosam incidunt,
& tenuant mel rosatum colatum, syrupus de hyssopo, oxymel
S. & com. syrupus de duabus & de quinque radicibus cum aquis
sceniculi, melissæ, betonice, scabiosæ. Hæc materia eget ma- *Aduer-*
iori concoctione, quæ non fiet tribus tantum diebus, nec for- *te.*
san sex: quamuis ob loci nobilitatem vacuatio sit facienda ali-
quando non expectata concoctione. Materiam melancholi-
cam concoquere valent ea, quæ diximus i. cap. vt sunt syrupus
borraginis, buglossæ, fumaricæ S. de pomis, de epithymo, &
syrupus fumaricæ compos. cum aquis buglossæ borraginis, me-
lissæ, & sero caprino. Sed hæc terrestris materia eget magna
concoctione.

Quartò, vacuantibus materiam calidam medicamentis *Purga-*
cholagogis, de quibus diximus cap. i. sed in hoc affectu sem- *tio.*
per sunt miscenda cordiaca, & rarò conueniunt scammonia-
ta, quia nocent cordi, nisi benè correcta: & quando clemen- *Obser-*
tia non sufficiunt: vt ℞. rhabarbari electi infusi per noctem *ua.*
in aqua endiuizæ ℞. iij. medullæ cassiæ fist. recens extractæ,
aut mannæ electæ ℞. j. syr. borraginis ℞. j. decocti florum cor- *Calida*
dialium. q. s. misce, & fiat potus. Si sit materia pituitosa, hoc *causa.*
aut

DE CVRAND. MORB.

*Melan-
cholia
materia.* aut simili medicamento vacuabitur: ℥. agarici trochiscati ʒ. iiij. corticum myrobalanorum chebulorum 3. j. diacatholiconis 3. vj. rhodomellis 3. j. ʒ. aquæ fœniculi, q. s. misce, & fiat potus. Si verò sit materia melancholica, hoc aut simili medicamento vacuetur: ℥. corticum myrobalanorum indorum 3. j. ʒ. pulueris epithymi 3. j. feri caprini 3. iiij. misce, & fiat potus. Quandoque necessarium est, laborantem cardiaca biliosa vacuare 3. iiij. diaprunis solutiui cum aliis iam dictis, & laborantem pituitosa 3. iiij. electuarij indi maioris: & melancholica cardiaca. 3. iiij. confectionis medicamentis hamec cum cassia aut manna, quando humores redundarint.

Auersio. Quintò, auertentibus materiam à corde ad partes ignobiles. præsertim vrgentibus symptomatis, & in ipsa accessione, vt secta vena malleoli, præsertim in mensibus detentis, aut hæmorrhoidibus, & vinculis dolorificis; & foribus partium extremarum, clysteribus, & cucurbitulis.

*Corro-
boratio,
& alte-
ratio.* Sextò, corroborantibus cor, & ipsius intemperiem corrigentibus, sumptis, vel admotis. In calida sumantur ex simplicibus, spodium rosæ, violæ, nenuphar, acerum, corallus, succus limonum, succus citri. Ex compositis electuarium diarhodonis Abbatis, diatrium santalorum, diamargaritonis frigidi, confectio de hyacintho, confectio Gentilis cordialis contra melancholiam, conseruæ acetosæ rosarum, & violarum. Sæpè enim his & similibus vti debet multis diebus summo mane: accipiat 3. iiij. electuarij diarhodonis Abbatis, aut diamargaritonis frigidi cum 3. iiij. aquæ acetosæ, aut syrupi rosarum, aut alio ex prædictis liquidioribus. Accipiat si diues sit omni hora in hac cardiaca cochlearium vnum huius confectionis cum pauca aqua rosarum aut acetosæ, aut alia simili. ℥. conseruæ rosarum, & acetosæ an. 3. j. confectionis de hyacintho, & Gentilis cordialis contra melancholiam an. 3. ʒ. pulueris diarhodonis Abbatis, & diamargaritonis frigidi an. 3. ij. margaritarum electarum, & ossium de corde cerui an. 3. j. foliorum auri numero ij. syrupi acetositis citri. q. s. misce, & fiat confectio: adde musci & ambræ an. ʒ. iiij. Cordi ad-
*Sumēda
S. & cō-
pos. re-
frigerā-
tia.* moneatur sæpe hoc epithyma, aut simile, in hyeme actu calidum, & in æstate aut frigidum, aut remissè calidum: ℥. aquæ rosarum 3. liij. aquæ acetosæ 3. ij. aquæ melissæ, & vini albi odoriferi an. 3. j. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de camphora an. 3. j. croci puluerizati ʒ. ʒ. misce, & fiat epithyma. Sacculus hic cordi semper adinotus, est
Diuiti. optimus in hac calida cardiaca. ℥. florum nenupharis, rosarum, violarum, & buglossæ an. 3. ij. pulueris diamargaritonis
*Admo-
uenda
refrige-
rantia.* frigi
*Epithy-
ma.*

*Saccu-
lus.*

optimus in hac calida cardiaca. ℥. florum nenupharis, rosarum, violarum, & buglossæ an. 3. ij. pulueris diamargaritonis frigi

frigidi 3. j. ꝑ santalorum omnium an. ʒ. j. musci , & ambræ an. ʒ. v. fiat sacculus ad formam cordis, seu scuti cum sindone coccinea. Si tamen fuerit pauper, epithyma ex sola aqua rosarum *Pauperi.* cum aceto & croco, erit optimum ad corroborandum. Simili- *Odorife-* ter in omni palpitatione cordis odor succi pomorum, aquæ *ra pro-* rosarum, & nymphææ cum paucis vino albo & musco simul *sunt.* cum ambra potenter corroborat cor. In frigida sumantur cali- *Sumen-* da simplicia cardiaca, & composita, vt buglossa, melissa, ze- *da cale-* doaria, doreon, cortex citri, crocus, moscus, ambra, & *faciētia.* similia composita, vt diamoschus dulcis, & amarus, electua- rium de gemmis, diamargaritonis calidi, confectio Alkermes, & similia: multis diebus ventriculo vacuo accipiat 3. iiij. ele- ctuarij diamargaritonis calidi, aut electuarij de gemmis cum ʒ. ij. aquæ melissæ, aut basiliconis, aut alia similia. Omni hora accipiat cochlearium huius aut similis confectionis. ʒ. the- riacæ de citro, & diamusci dulcis an. ʒ. j. confectionis Alker- mes ʒ. iiij. conseruæ buglossæ ʒ. ꝑ. pulueris diamargaritonis calidi, & electuarij de gemmis an. 3. ij. margaritarum electa- rum 3. j. foliorum auri numero iiij. syrupi buglossæ. q. s. misce & fiat confectio. Hoc epithyma in hac frigida cardiaca est optimum: ʒ. aquæ melissæ, & buglossæ an. ʒ. iiij. vini albi odoriferi ʒ. j. pulueris vtriusque diamargaritonis an. 3. croci puluerizati, & coralli rubri præparati an. 3. ꝑ. musci & ambræ an. ʒ. iiij. misce, & fiat epithyma. Hic sacculus, aut similis est optimus in hac cardiaca ʒ. florum buglossæ, citranguli, & co- riandri præparati an. 3. ij. corticis citri, caryophyllorum, cin- namomi, zedoariæ, doreonis, basiliconis an. 3. j. ꝑ. rosarum 3. j. musci, & ambræ ʒ. v. fiat ex his puluerizatis sacculus ad for- mam cordis cum sindone coccinea. Si fuerit hæc palpitatione à vermibus, capite 51. dicemus de ea. Si autem à veneno, oportet scire per proprias notas veneni speciem, & naturam, vt propria medicamenta cardiaca exhibeantur. Sed hæc ab Italis & Romanis tractantur frequentius, cum apud eos multi vene- no pereant. Lege tamen librum de venenis doctoris Santes & Ordenies. Lege etiam Alexipharmaca Nicandri, & eiusdem antiquissimi medici, & poetæ librum quoque de theriaca vti- lissimum, quem noster ciuis & amicus doctor Petrus Iacobus Steue fidelissimè interpretatus est, doctissimisque expositioni- bus illustrauit.

*Confectio
Admo-
uenda.*

*Epithy-
ma.*

*Saccu-
lus.*

*Sifuerit
à vene-
no pal-
pitatio.*

Syncope curatur primò per asperisionem faciei, & aliarum nudarum partium aquæ frigidæ, præsertim rosatæ. Prohibet enim hoc remedium spiritus resolutionem, dummodò non proueniat syncope à causa frigida, vel alui profluuium: tunc

*Curatio
syncopes
Admo-
uenda.
maxi-*

DE CVRAND. MORB.

maximè noceret aquæ frigidaë inspersio, sed cùm est ab æstu, aut febris incendio spiritibus resolutis, saluberrima est aqua frigida, aut rosata sola, aut aceto faciem ægri aspergere, & nutrire spiritus bonis odoribus naribus admoris, nisi sit syncope ab vteri præfocatione: quia tunc odora naribus admota nocerent, vt dicemus capite de vteri præfocatione. Spiritus tamen intus in corde quasi conculcati, quod sæpè contingit in hoc morbo, reuocandi sunt ad partes externas frictionibus, & ligaturis partium extremarum, & cucurbitulis, & euellendo pilos, & naribus auribusque dolorem inferendo, ne fiat subita strangulatio. Si syncope fiat ob spiritus resolutionem post sanguinis vacuationem, aut alui fluorem, aut aliam euacuationem, nocent maximè, quæ dolorem inferunt, & quæ reuocant spiritum ad partes externas: odora tamen omnia sunt optima & necessaria: auctore enim Gal. com. 11. secundi libri Aphor. quæ citò nutriunt, sunt liquida, vinum citiùs, & omnium maximè & celerrimè sunt odores, vt hæc optima mixtura: ℞. aquæ rosatæ ℥.iiij. aquæ florum aranciorum ℥.ij. vini optimi albi, & succi pomorum redolentium an. ℥.j. musci, & ambræ an. ḡ. vij. misce, & sæpè naribus & faciei admoueatur parum huius mixturæ. Nutriatur aqua carnis gallinæ iuuenis, aut capi, & perdicis, & arietis, quàm nostri Valentini Destillat appellant. Hæc enim celeriter nutrit, ac subitò fermè in sanguinem & spiritum transmutatur: ideòque à multis laudatur, tanquam vltimum & maximum alimentum ad cordis & totius corporis imbecillitatem. Quæ cor corroborant, spiritumque vitalem instaurant, vel saltem perfectiorem efficiunt, multa sunt, de quibus dictum est superiùs hoc capite. Curatio syncopes, quæ ab aliis fit causis tradita est à Galen. 12. methodi, & 1. de arte curatiua ad Glauconem, & nos in curatione aliorum morborum eam trademus.

Victus.

Admonitio.

Scholium.

Palpitatio cordis. **P**alpitatione cordis est dilatatio eius, & compressio præter naturã. Hic autẽ motus non fit à facultate, quia pulsus diceretur. Sed à flatu exitum quarente. Vnde est symptoma, quod refertur ad actionem læsam, est enim motus deprauatus. Hinc apparet error Hollerij in suo lib. de curãdis morbis c. 27. & Iacotij Iacotius scholio: existimantium palpitationẽ cordis fieri ab excretice facultate cordis, conantes expellere id, quod molestum est: hac enim ratione palpitatione nõ esset motus à solo morbo factus, quod falsum esse intelli-

intelliget, qui c. 2. de symp. causis perlegerit. Quod motus, pal-
 pitationis, qui violentus est, & partis causa, simul & mollis, fiat ab
 spiritu, celeritas dilationis eius, & compressionis ostendit: cuius hu- Causa
 mor causa esse non potest. Palpitatio cordis fit ab spiritu crasso, in palpi-
 eius sinu contento, & exitum quarente. Hic aut ibi generatur, aut tionis.
 aliunde ascendit. Si ibi generatur, palpitationem (qua est affectus
 proprius) generat. Si aliunde ascendit, ex utero, ventre, aut alia
 parte, fit palpitatio per consensum. Dices, nonne est tertia palpi-
 tatio, qua fit ab humore in pericardio contento, quam Gal. 5. de loc.
 affect. c. 1. palpitationem cum significatione appellat? Respondeo,
 hanc esse palpitationem propriam, cum in ea, ab spiritu genito in
 pericardio (quod à corde non distinguitur) cor dilatetur. Dicitur au-
 tem cum significatione fieri, qui fit cum Typo, hoc est, cum signo ma-
 nifesto, ab humore enim in pericardio incluso cor comprimitur, ita
 ut in principio palpitationis sentiant agri compressionem, quā nos
 etiā ex pulsu deprehendere possumus. Quacunque ergo ratione cō-
 tingat palpitatio cordis, semper fit ab spiritu flatulento, in corde de-
 tento: qui paucus non est, nā in viscere calido statim discuteretur,
 sed multus, ita ut aliquādo suffocationē ferē inducat caloris, & sic
 animi deliquiū, & syncopē, & aliquando omninō, suffocato calore,
 mortē. Quod cū cōsideraret Gal. lib. 5. de loc. affect. Omnes hos ante
 quinquagesimū annū mori scribit. Cū palpitatio omnis ab spiritu
 fiat Gal. 2. de cau. symp. c. 2. omnē partē palpitantem esse refrige-
 ratā colligit. Si enim multū calida est, vaporē excitabit, & discu- Morbus
 tict, si multū frigida non eleuabit vaporē: debet ergo esse frigida, in pal-
 sed parū. Ex his habebis palpitationē cordis sequi morbū similarē, pitatio-
 nepe intēperiem frigidā. Hæc in palpitatione, qua est proprius cor- ne.
 dis affectus, in ipsomet corde consistit, ac in ea, qua est per consensū,
 in parte humorē generante. Aduerte tamen, cor refrigerari, aut in
 propria essentia, aut (quod ut in plurimū contingit) aggrauatione
 caloris, facta à multo humore, tunc enim calor cordis, comparatio-
 ne facta ad illum humorē, dicitur diminutus, ita ut non possit va-
 pores ex eo eleuatos discutere. Flatus autem materia est humor
 potissimū crassus, qualis est melancholicus. Ut syncopes essentia Primū
 intelligatur, aliqua oportebit supponere maxime necessaria. Pri- supposi-
 mū est, vires nostri corporis esse positas in natura partium solidarum tum ad
 carnosarū, & spirituosarum: ita ut partes carnosæ, & solidæ, sint syncopes syncopes
 actionū principia, at spiritus, instrumenta. Secundum est, prædicta- essentiā.
 rum partium naturam postulare quantitatem, seu molem elemen- Secun-
 torum, & debitum qualitatum temperamentum, si vires debent esse dum.
 valide, & actiones firma. Tertium suppositum est, etsi vires in Tertiū.
 natura omnium corporis partium, posita sint potissimū, tamen in tri-
 bus, quæ principes dicuntur (corde, cerebro, & iecore) consistunt: ab his

enim corpus gubernatur. Quod quamvis ita sit, præcipuè vitam in corde collocamus, quia in eo generatur materia (nempe spirituosus sanguis à qua calidum innatum, quod est vita instrumentum in toto corpore conseruatur: & ideo nemo potest mori quin cor cesset agere. Ex his, quod quarimus, facile inuentum erit. Si enim vita in quantitate, & qualitate partium præcipuarum, & maxime cordis sedem habet, tunc labentur vires, cum aliquas ex dictis partibus (& potissimum cor) quantitate deficiet, aut qualitate alterabitur. Animi igitur deliquium, & syncope, nil aliud sunt quàm virium lapsus. Quod si inter hæc est aliquod discrimen, leue tamen positum in ratione maioris & minoris: ita ut animi deliquium via sit ad syn-

Quid pem. In animi enim deliquio sentiunt agrotantes vires deficere (& syncope, hic est eius terminus) non autem in syncope: in ea enim cum maior & animi affectus, nec sentiunt, nec mouetur: quamvis possit esse syncope sine animi deliquio præcedente. Obiiciet quis, si animi deliquium, & syncope, sunt passionēs cordis, qua ratione affectus eos ex actionibus factis animalis distinguimus, in animi deliquio sentiētes defectum sensus, & motus voluntarij, non autem in syncope? Respondeo aliorum sententias emittens, reuera animi deliquium, & syncope, affectiones esse cordis, consentire autē ad eas cerebrum, ex defectu enim spiritus vitalis generari non potest animalis, & hac ratione eā cōcidere, qua cum habeat actiones nobis manifestas, proinde ex illis affectiones cordis colligimus. Qua cum ita sint, eadem ergo erunt syncope, utriusque affectionis (animi deliquij, & syncope) causa, consistentes & animi in illis rebus, qua dissipant substantiam partium, aut spirituum, aut deliquij. earum euertunt temperamentum: toto temperamento operantia, ut venena, aut qualitate manifesta, ut qua calore, frigiditate, humiditate, aut siccitate agunt. Hac ratione in cholera morbo, diarrhæa, dysenteria, lyenteria, muliebri profluvio, sudore, animi pathematis, in quibus sanguis ad externa mouetur magna medicamenti purgantis euacuatione, & similibus, ob substantiæ spiritus dissipationē fit animi deliquium, sicut in marasmo, ob dissipationē substantiæ solidæ. In cruditate ventriculi fit animi deliquium, ab intemperie calida cordis per consensum genita, sicut in bulimo à frigida: in apoplexia verò, antequam præhendat, in principiis accessionum, in magnis inflammationibus viscerum, gangrana, & in illis animi pathematis, qua habent motum ad interna, animi deliquium ab intemperie frigida ex suffocatione caloris orta prouenit. In balneo auctoris, & sole, animi deliquium ex intemperie & dissipatione spiritus & aliorum ortum habet. Atque hæc sunt alterationes manifesta prædictum generum præstantes affectum. Præter quas, in venenum, quod qualitate occulta, alicorū. hoc est toto temperamento alterando animi defectum inducere solet.

Curatur palpitatio cordis.] Nescio quid in mentem venerit auctori,

auctori, & aliis practicis, in curatione palpitationis distinguuntibus, Videtur in an fiat palpitatio à causa calida, an à frigida: quia siue loquatur hoc affectu de causa efficiente, siue materiali, semper est frigida ut diximus. Ac etu. proinde ipsis omissis, perpetuò victus rationem attenuantem hoc affectu administrabis ex aqua humores tenues generantur: & semper fugies alimenta melancholica.

Secundò, sanguinis missione.] Hoc in loco distinguere videtur Labitur auctor palpitationem à flatu ab ea, quæ à phlegmone fit: quasi sit auctor. palpitatio sine flatu. In palpitatione ergo omni sanguinem mittere. Sanguis. Si causa eius sit plethora grauens, ut euacuemus, si cacochimia ob nis misvitium sanguinis, cum quo multa cacochimia portio educi solet, & sio. sic reuelli à loco affecto. Obiicies eam palpitationem, quæ ex humore in pericardio contento ortum habet, in qua non debemus sanguinem mittere, ut euacuemus, quia non fit à plethora: neque ut reuellamus, quia non fit à cacochimia venarum. Respondeo esse sanguinem mittendum in ea, ut euacuemus, nam cum illa aqua exciderit à venis, poterit iterum ad eas remigrare: vel possumus dicere, sanguinem mitti ob reuulsionem, quia vacuato humore ex venis, non descendet ad pericardion. Si fiat sanguinis missio, ut reuellamus, & euacuemus, ex brachio aut saphena. Quod si sint suppressi menses, non est tunc eorum habenda cura, quia palpitatio urget.

Tertiò apparantibus.] Materia palpitationis, cum ut plurimum Syrupi. crassa sit, melancholia scilicet, postulabit attenuantia, qualia sunt syrupus de bizantiis, endiua compositio, oximel, rhodomel, cum decocto melissa, thimi, & similibus. Vnde distinctio auctoris de causa calida aut frigida omittenda est, nunquã enim fit à materia calida.

Quartò vacuantibus materiam.] Malè auctor in palpitatione Aucto- cordis utitur medicamento purgante bilem, cum hac non sit causa ris lap- palpitationis. Purganda ergo erit pituita, aut melancholia. sus.

Sextò, corroborantibus cor.] Cum palpitatio cordis à flatu Dissipã- fiat, ut diximus exterius, & interiùs, ea quæ ipsum dissipare pos- tia fla- sunt, utilia erunt. Exteriùs, thoraci ea parte, quæ respicit cor, ap- tum. plicandi sunt sacculi parati ex rebus calidis, qualia sunt cinna- momum, camemelum, cariophylli, & similia, quæ extenuandi ha- bent vim. Hoc medicamentum optimum est. ℞. foliorum roris mari- ni, thimi. & saturata an. 3. j. melissa. 3. j. ℞. cinnamomi, & cario- phyllorum an. 3. j. rosarum siccarum 3. iij. musci, ambra an. ʒ. iij. fiat ex omnibus pul. tenuissimus, ex quo fiat sacculus. Per os simili- ter confectio Gentilis contra melancholiam, & alia flatum discu- tientia, assumenda sunt. Ex his presenti loco multos auctoris erro- res animaduertes, primum, cum exterius, & interiùs iubet assumi, & applicari medicamenta quæ frigida sunt, sentiens cum multis aliis palpitationem cordis geri ab eius feruore. Secundò construens

DE CVRAND. MORB.

Nota illas cardiacas cofectiones ex margaritis, ossibus, gemmis, pulueribus multos frigidis & aliis, quæ augment materiã flatu, & eiusdem dissolutionem impediunt. Tercium, palpitationẽ quandam à vermibus factã auctoris nobis vendens, cum talis non extet, sicut nec palpitatione à veneno. errores.

Syncope curatur primò.] Syncopem curamus aut in accessione, aut extra accessionem. Cum in accessione eam curamus, tunc solius symptomatis habemus rationem, quo tẽpore cum calor sit in partibus internis inculcatus, modis omnibus nitimur eum exterius euocare leuiter fricãtes, & maxime eam, quæ est in ore ventriculi, quia veram hac iucunda frictione calor natiuus excitatur. Nares etiã compri- curatio- mimus, quia tunc ob usum respirationis excitatur facultas, & calor nem. roboratur. Odorare etiam facimus vinum, ut spiritus reficiantur, propter quam etiam causam inspergimus frigidã aquam supra faciem, hac enim excitat facultates naturales sopitas in syncope. Cum extra accessionẽ syncopem curamus, tunc non symptomati prospici- mus: sed morbo, à quo pendet, quæ ratione prauicimus syncopem. Si ergo syncope omni spiritu dissipato, ipsum reficiemus vini potu, qui celerrimẽ id præstat, si non sit interna inflammatio, delirium, capitis dolor, aut febris cum cruditate ventriculi. Vinum autẽ in regione, etate, & tempore frigidis calidum, in contrariis frigidum exhiben- dum est, remedia etiam adhibenda sunt causa, quæ dissipat spiritus. Si syncope euenit, ex substantia solida euacuatione, alimentis boni succi, & facilis concoctionis impediatur. Si intemperies eius est causa, contraria intemperies, si venenum, alexipharmacum medica- mentum proderit. Quod si intemperies syncopem generans à mul- Quæ me- titudine fiat, sanguinem mittemus. Atque hæc sunt medicamenta dicamẽ- ta car- cardiacæ. cardiacæ verẽ, non illa quæ à barbaris medicis, & eorum sequaci- bus cordialia appellantur, ex auro, argento, gemmis, terra, lapidibus, & ossibus indiscriminatim in omni morbo constructa.

De imbecillitate ventriculi, & de dolore
& inflammatione eiusdem.

CAPVT XXXI.

Q Vanquam quælibet ventriculi læsio imbecillicatem gi- gnit, ea tamen, quæ in coctione est, etiam si valida sit appetentia, dicitur ventriculi imbecillitas. Quo affectu labo- rantes stomachicos appellant medici, quemadmodum & he- paticos Gal. nominat 6. de symptomatum causis eos, qui im- becilla coctione iecinoris infestantur. Hæc coctio, ut quæli- bet alia actio, tripliciter læditur, ut diximus, Gal. autore 3. de symp. diff. cap. 80. artis medicinalis: quia vix, aut quia vi- tiose, aut quia nullo modo: vltimum symptoma dicitur a Græ- cis,

potest:

DE CVRAND. MORB.

potest: præterea tumor, æstus, qui tactu diiudicari queat, febris grauitas, & nausea.

Hæc ventriculi imbecillitas nullam propriam habet curationem, cum à multis causis (vt diximus) fieri possit: sed cessat morbus eius causa profligata.

*Curatio
imbecil-
litas
renales-
centium
per robo-
rantia.*

Sæpè tamen recalescentibus à diuturno, aut magno morbo adest imbecillitas ventriculi, quæ curatur roborantibus qualitate tum manifesta, tum occulta: de quibus in vltimo genere remediorum dicemus: neque verò in ventriculo imbecillo sunt vtilia calida, sicca, & astringentia: præsertim cum est ab intemperie calida, vt docet Galen. 7. method. contra suos præceptores: imò in frigida causa calida medicamenta prudenter sunt admouenda, & exhibenda, ne ex accidenti resoluatur naturalis calor. Sed quia frequentius fit hoc symptoma à morbo frigido, cum materia, illius curationem in præsentia ponimus & describimus.

*Curatio
intempe-
riæ fri-
gidæ cum
humore.
Victus.*

Curatur ergo hæc quinque generibus remediorum: primò, victu calfaciente, & exciccante, & cibis facilibus concoctu, vt sunt perdices, coturnices, turtures, & similes. Ius arietis cum menta aut fœniculo, aut saluia, aut petroselino est vtile. Exercitatio moderata ante cibum confert. Coitus maximè nocet, & animi perturbationes. Bibat vinum rubrum Saguntinum, aut simile benè dilutum, aut aquam cinnamomi, aut decoctum seminis fœn. vel anisi. Omnia pituitosa alimenta nocent, vt pisces, legumina, & herbæ frigida.

*Præpa-
ratio.*

Secundò, curantur apparantibus pituitam, vt rhodomelle, syrupo de absinthio, syrupo de menta, oxymelle S: & compos. cum decocto, aut aquis fœniculi, seminis anisi, mentæ, absinthij, maioranæ, & similibus. Concocta pituita per sex, aut octo dies.

*Tempus
coctio-
nis.*

Tertiò, vacuantibus ipsam pituitam myrobalanis, chebulis, qui simul purgant & corroborant ventriculū, eorum enim vsus continuus est optimus, & expertus aloë, agarico, turbit, pilulis

*Purga-
tio.*

de Hiera S. quæ magis purgat, quam sicca, autore Gal. 7. metho- di. Errant ergo Arabes dicētes ipsam cum melle minori vi præ-

*Error A-
rabum.*

ditam esse. Pilulis elephanginis, pilulis stomachicis, electuario diaphænicon, & similibus, quæ non attrahunt ab aliis partibus

*Hiera
commē-
datio.*

longinquis ad ventriculum. Hiera tamen S. obtinet principatū in morbis ventriculi curandis. Quare ʒ. j. eius cum rhodomelle, & decocto fœniculi purgat elementer ventriculum, si semel in

*Elatius
discutiē-
tia &
alteran-
tia.*

hebdomada capiatur, vel ʒ. iiij. pilularum hieræ S. aut elephan- ginarum erit foelix in huius morbi curatione successus.

Quartò, dissipantibus flatum, & intemperiem frigidam corrigentibus, vt puluere diarhodon Abbatis, & rosatæ nouellæ simul, aut aromatico rosato, si maiori calore indige- mus,

mus, aut diacymino, aut diagalanga, aut diatriompiperon 3. j. aut duæ. Ex his cum aqua absinthij, aut mentæ, aut fœniculi pondere vnciarum duarum quolibet die ventriculo vacuo valdè dissipant flatum, & curant intemperiem frigidam, aut grana sex, septem, vel octo piperis integri deuorata hora ante cibum, aut drachma vna theriacæ magnæ, aut mithridati manè sumpta in septimana. Vinum ex absinthio est optimum in hoc genere. Hoc medicamentum est optimum, si æger fuerit senex, & morbus antiquus: ℞. pulueris diagalangæ, pulueris diatriompiperon an. 3. iiij. pulueris aromatici rosati, & rosatæ nouellæ an. 3. iiij. pulueris diacymini 3. j. conferuæ anthos 3. ss. diamusci dulcis 3. j. mellis myrobalanorum chebulorum, aut communis. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis cochleariū vnū, aut duo cū vino optimo, aut aqua fœniculi, aut melissæ. Supra ventriculū pellis vulturis est optima in hoc genere. similiter vnguentū hoc: ℞. olei absinthij, anethi & de lilio an. 3. j. pulueris mentæ, caryophyllorū, & cinnamomi an. 3. j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentū, quod bis in die actu calidum ventriculo admoueatur tam parti posteriori, quàm anteriori: quia posterior pars est propinquior ventriculo: vel ℞. emplastri stomatici. q. s. extendatur super alutam ad formā scuti, seu ventriculi: fiat duplicatū vt tā pars anterior, quā posterior defendantur ab externis, & melius dissipetur flatus, & intemperies frigida corrigatur: vel fiant duo sacculi ex absinthio sicco, menta camomilla, aniso, semine fœniculi, carui, cymino, cinnamomo, gariophyllo, cortice citri, & similibus.

Quintò corroborantibus, ventriculum internis, & externis qualitate tam manifesta, quàm à proprietate, seu tota substantia: quales sunt ventriculorum gallinarum pelliculæ interiores. Syluius tamen cum Gal. has pelliculas, & mergi, & struthiocameli damnat. Gal. 3: de aliment. facultatibus cap. de differentia, quæ est in partibus animalium volatiliū, ventriculum mergi, & struthiocameli tantū damnat: at 1. de facultatibus simplicium medicamentorum improbat gallinæ & mergi pelliculam internam ventriculi, contra quosdam antiquos. Dioscorides tamen lib. 2. cap. 41. ventriculi inquit, galli pelliculam internam siccata, & trita cum vino in potu conferre stomachicis. Puluis hic ante cibum sumptus quantitate vnus cochlearij cum vino, aut iure corroborat ventriculum: ℞. coriandri præparati 3. ij. seminis anisi fœniculi, cinnamomi electi an. 3. iiij. pellicularum internarum ventriculorum gallinarum secundum artem præparatorum 3. ij. corticis citri, ligni aloës an. 3. j. ss. coralli rubri præparati

*Topica.
Lege cō-
siliū
vndeci-
mum
Ioannis
Baptiste
Monta-
ni Vere-
nensis.*

*Corrobo-
ratio per
sumen-
da &
admonē-
da,
Sumēda*

Puluis.

DE CVRAND. MORB.

Admo- uenda. 3. j. laccari optimi 3. vj. misce, & fiat pulvis. In longis mor- bis præsertim calidis pulvis solus diarhodon Abbatis summo manè & ante pastum cum paucis iure ventriculum vehemen- ter corroborat. Corallus si tangat regionem ventriculi diu, cor- roborat ipsum: eandem habet vim lapis smaragdus, pulegium montanum, & betonica quoque corroborat ventriculum. Ma- nus sana, & iuuenis alicuius sæpè detenta supra vētriculum suo naturali calore eum confirmat: eodem modo si aliquod animal viuum, vt canis admoueat ventriculo.

Doloris ab intē- perie nuda curatio. Dolor ventriculi, si sit à sola intempērie, curatur contra- riis ei, vt si à flatu, & frigida intemperie fiat, mederi illi debe- mus per ea, quæ diximus quarto genere remediorum hoc ca- pite, etiam per frequentem fotum, saltem quolibet die bis vacuo ventriculo hoc decocto spongiis madidis, vel philtro: *Ab in- tempe- rie cum affluxu humo- ris.* ℞. absinthij, mentæ, camomillæ, calendulæ, anathos an. m. j. galangæ, corticis citri, spicæ, caryophyllorum, nucis muscatæ, cinnamomi, zingiberis an. 3. ij. feminis fceniculi: anisi carui, & cymini an. 3. iij. rosarum, coriandri præparati an. 3. j. vi- ni optimi rubri ℥. iij. aquæ chalybeatæ ℥. ij. fiat ex his deco- ctum ad consumptionem tertiæ partis. Si à calida intemperie, per frigida curatur: si cum materia, per illius euacuationem, per sanguinis missionem, si ætas, & facultas adsint, & æger sit carnosus: quamuis in omni vehementi dolore, habita ratio- ne ipsius sit necessaria sanguinis missio ex sententia omnium. Si verò alii humores abundauerint, illorum euacuatio per me- dicamenta purgantia est necessaria. Aliquando tamen hoc sym- toma eget curatione coacta per narcotica, & non per causæ ablationem, si fuerit vehemens, & non expectans, propriam cu- rationem, de quibus cap. de colico dolore: quamuis propter ventriculi maximum sensum solet hic sæpè esse fortis. In usu horum semper sunt considerata, & mente tenenda, quæ di- ximus capite de phrenitide, de facultate ægri, & de fermen- tatione medicamenti narcotici, quia ante sex menses non pos- sumus eo vti. In vehementi igitur ventriculi dolore accipiat hunc potum: ℞. philonij Romani 3. ss. syrupi de absinthio, & aquæ melissæ an. 3. j. misce. Tutior est athanasia, & requies magna tutiora etiam sunt externa, in primis temperatè calida, deinde narcotica regioni ventriculi admota, & mica panis cum cortice papaueris, lacte & croco: vel absinthium cum foliis mandragoræ coctum oleo rosarum, vel menta, & absinthium & folia mandragoræ decocta cum oleo papaueris, addendo parum croci.

Sectio vena. Purga- tio.

De usu narcoti- corum. Quæ tu- tiora sint. Topica.

Inflam- matio.

Inflammatiō ventriculi curatur, vt hepatis phlegmone &

& phrenitis, videlicet primò, victu tenui, & refrigerante: *se-* *tionis*
 cundò, sanguinis missione ex basilica ad reuellendum, hanc *curatio.*
 quoque reuulsionem faciunt clysteres, frictiones, ligaturæ, & *Victus.*
 foci extremorum. Tertiò: repellentibus externis, de quibus *Reuul-*
 capite de cura phrenitidis, & internis, vt syrupo rosarum, myr- *sio.*
 tillorum & cydoniorum cum aquis plantaginis, portulacæ, la- *Repellē-*
 ctucæ, & similium sæpè sumptis, & omni hora, in æstate, & *tia ex-*
 iuuene, actu frigidis, in hyeme, & senibus, tepidis. Quartò, in *terna*
 augmento repellentibus, & digerentibus, seu resoluentibus, vt *interna.*
 syrupo rosarum, & de absinthio simul, aut rhodomelle cum *Indica-*
 decocto hordei, & camomillæ: in statu resoluentibus solis, vt *tio à tē-*
 syrupo de absinthio, rhodomelle, & decocto camomillæ. *Quin-* *poribus*
 tò, intemperiem calidam relictam alterantibus, & corroborā- *morbi.*
 tibus partem affectam, vt syrupo rosarum, & decocto semi- *Alter-*
 nis psyllij, & cidoniorum, & similibus. Si verò in suppuratio- *tio, &*
 nē terminetur, curatur per ea, quæ diximus in fine cap. 27. de *corrobo-*
 de curatione pleuritis. *ratio.*

Scholium.

Q Vanquam quælibet.] *En qua auctor docet in hoc capite, Aucto-*
vera sunt: solum advertere oportet eum, & alios errare, ris & a-
cum scribunt esse medicamenta toto temperamento roborantia liorum
ventriculum. Solum enim corroboratur cum languidus est medi- *error.*
camentis intemperiem eius oppugnantibus, adstringentibus etiam,
qua densantia ipsam virtutem uniunt, & substantia dissipatio-
nem impediunt.

De singultu. CAP. XXXII.

Singultus velut quædam ventriculi conuulsio est, non ta- *Descri-*
 men vera censetur, cum in musculis non fiat, quod ad *prio.*
 conuulsionis essentiam requiritur. Ventriculi verò mus-
 culus non est, neque eius hostiolum, vt apertè Galenus de-
 monstrat lib. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Vt cumque
 tamen res habear, motus est ventriculi, quo ad expulsionem
 rerum molestiarum, aut quantitate, aut qualitate mouetur. In
 hoc differt à vomitione, quòd (vt ait Galenus) per vomitio- *Causa.*
 nes ea, quæ in spatio continentur, eiiciantur: per singultum
 verò ea, quæ ventriculi corpus impleuerunt. Fit generaliter
 (vt autor est Hippocrates 6. sect. Aphor. 39.) aut à plenitudi-
 ne, aut inanitione: & præter has causas etiam ab humoribus

DE CVRAND. MORB.

Nota.

Curatio

Si ab in-

temperie

nuda,

per alte-

rantia

contra-

ria.

Si ab af-

fluxu

humoris

pituitosi

per ea-

qua di-

cta sunt.

Laus.

Rhasa.

Si ab

acrimo-

nia, &

morda-

citare.

Vacua-

tio.

Ante-

cedat

præpa-

ratio.

Vomi-

tus uti-

litas.

Alter-

atio.

Sedan-

zia sin-

gultum.

vellicantibus, & rebus acri facultate præditis: item quoties quispiam affatim deuorauerit calidum aliquod medicamentum, deinde calidam potionem biberit, & ex cruditate, etiam præsertim in pueris. Morbus per se patet, causæ partim ex ægri dictis, partim ex his quæ supra cap. de conuulsione dicta sunt percipi poterunt.

Singultus, qui ab inanitione fit, rarò curationem suscipit, similis tamen est curationi conuulsionis ex inanitione, de qua cap. 14. dictum est, & hæcticæ diurnæ capite octauo, secundi libri dicemus. Si à sola intemperie fit, per alterantia contraria curatur, plerunque tamen fit à plenitudine humoris pituitosi, cuius curatio similis omninò est curationi imbecillitatis ventriculi, quæ fit ab humore frigido pituitoso, de qua capite præcedenti abundè diximus. Si vis tamen hunc & alios affectus præter naturam ventriculi rectè curare, lege octauum lib. Galeni de compos. medicamentorum secundum locos, & quintum continentis Rhasis, qui inter Arabes primas tenet: fuit enim vir magnæ experientiæ, & in omnibus Galenum magis, quàm alij omnes Arabes amplectitur. Si fiat à rebus acris, & mordacibus, ut à piperibus, præsertim sumpro vino, & aqua calida, super id, ut Galen. docet octauo de compositione secundum locos & comment. 40. sexti Aphorismorum: tunc necessaria est vacuatio per rhabarbarum & myrobalanos citrinos, cum manna electa, aut cassia fistulari: & si opus fuerit, ubi materia est fixa nimis, multa, adde drachmas tres, aut quatuor electuarij diaphænicon, præcedenti leui præparatione per syrupum rosarum & acetosum S. cum decocto hordei. In omni tamen materiali singultu est utilis vomitus, præsertim si materia non fuerit fixa, & non penetrauit tunicas ventriculi. In hac, quæ fit à causa calida, post vacationem electuarium diarhodon Abbatis est optimum, & potus solius aquæ frigidæ: quæ omnem ferè singultum curat, aliquem per se, & aliquem per accidens, quemadmodum & animi perturbationes, ut ira, tristitia, timor, & gaudium, si subito acciderint, sternutatio, cohibitus anhelitus, frictiones, & vincula extremorum, cucurbitula magna, & similia singultum curant. Si verò fiat ab inflammatione, ipsa curata curabitur & singultus. In antiquo tamen singultu, qui fit à materia frigida, præter ea quæ dicta sunt capite præcedenti, hoc medicamentum est optimum & expertum: ℞. squinantij, calami aromatici, anisi, marathri foliorum metæ, & absinthij, costi an. 3. j. croci, ligni aloës, ambræ, caryophyllorum, aloës Alexandrinæ an. 3. ij. apij, corian-

dri præparati, seminis papaueris albi, cassiæ lignæ an. ʒ. j. conferuæ aranciorum ʒ. ij. sacchari. q. s. misce, & fiat confectio, vel in hyeme cum melle, cuius vncia semis cum decocto fœniculi, aut alio simili huic summo manè per aliquot dies curat singultum indubitato. Similiter post vacuationem curatur singultus, si ventriculo admoueatur castoreum cum oleo rosato, aut si accipiat æger ʒ. ij. seminis rutæ cum paucō vino, aut decocto fœniculi in singultu magno: & vbi alia non contulerint, præsertim cū sit à maximo ventriculi sensu, ʒ. ʒ. vsque ad ʒ. j. philonij Romani cum syrupo papaucris, & aqua absinthij, aut mentæ, est vltimum, & probatum remedium.

De appetentia immodica, quam caninam appellant.

C A P V T XXXIII.

Appetentia immodica, quam caninam appellant, tunc fit, cum ventriculus ea comedendi rabie vexatur, ut satiari, qui sic affecti sunt, non possint, nec post ingestos ad nauseam vsque cibos: quos cū citra noxam ferre nequeant, eorum plenitudine velut intolerabili quadam sarcina grauati ad vomitum, quod vltimum est remedium, confugiunt, ut per eum à tam graui pondere liberentur. Verū cū inexplibilis sit eorum appetitus, denuò ad cibos famelici conuertuntur, & in similem priori necessitatem detrusi, iterum vomere coguntur: quod eo vsque perseuerat, donec velut canes (vnde etiam morbo nomen inditum est) in edendo, atque euomendo toti: quo fit, ut quæ dum inchoabat, vomendi erat necessitas, consuetudo inualecente morbo efficiatur. Causæ à Galeno sic breuiter explicantur quarto de morbo & symptomate, cap. 7. Caninæ igitur appetentiæ causa vna est acidorum humorum vitium, altera verò (ut dictum est) plurima totius corporis inanitio, siue ipsa caloris vim, siue retentricis facultatis imbecillitatem sequatur. Porro acidorum humorum vitium erosionem, quæ suctioni proportionē respondet, inducit, appetentiāque (ut inquit Gal.) haud aliter quàm naturale pathema excitat. Cognoscitur eorum, quæ ingesta fuerunt, deiectione si multa simul & liquida fuerit, & ructu insuper acorem referente, corporis verò inanitio, quæ (ut inquit Aëtius) ob plurimi caloris vehementiam fit, qui instar ignis cibos consumit, cutem rarefacit, & exhalationem mouet, sic deprehenditur, ventris

Descriptio.

Causa.

Nota.

DE CVRAND. MORB.

ventris egestionem longè pauciores prædunt, quàm pro eorum, quæ ingeruntur, modo, & proportionem: & stercus insuper quod egeritur, siccus est. Quod si propter retentricis facultatis imbecillitatem, quæ cibis dominari non potest, corporis facta sit dissipatio: tunc multus est deiectionum proventus.

Curatio. Si fiat hæc immodica appetentia ab inanitione, ut in convalescentibus, curatur cibo boni succi, facili concoctu, & sæpè sumpto, non tamen multo. Alimenta pingua semper laxant ventriculum, excitant nauseam, & appetitum deiciunt, quamvis sint difficilia concoctu, si fiat à ventriculi imbecillitate, illa semota cessabit affectus. Si à iecoris calore, similiter sublata causa tollitur & effectus. Si à vermibus, ipsis eductis sanabitur, ut cuidam puellæ contingit quæ fame canina laborans à verme duodecim cubitorum, sanitati restituta fuit, verme illo magno purgato. Si ob succum melancholicum à liene ad ventriculi os largius transmissum fiat, ut Arabibus placet, quod non repugnat Galeno volenti retentricem facultatem corroborari melancholia, cum per accidens ipsa contrahendo, & comprimendo inanitionem faciat, & appetitum augeat: ideoque melancholica alimenta augent appetitum præcipue sale condita, horum tamen omnium curatio suis locis referenda. Si à pituita immodica, frigida, acida, os ventriculi infestante, à qua sæpius fit, curatur quinque remediorum generibus, primò, victu calido, &

Ab imbecillitate.

A calore hepatis.

A vermibus.

Historia.

A succo melancholico.

A pituita acida.

Victus.

Præparatio.

Observatio.

Purgatio.

Diaphanicon quale sit.

Secundò, apparantibus materiam hanc medicamentis iam sæpè dictis, præsertim primo capite, & 3. de curatione imbecillitatis ventriculi: vnum tamen iterum scire oportet, syrupum acidum non convenire huic affectui, ut est oxymel S. & compositum, & similia: ne excitent appetentiam, nisi pauca quantitas ipsorum sumatur, & sint aliis mixta.

Tertiò, vacuantibus materiam pituitosam, medicamentis frequenter dictis præsertim 1. cap. & 3. huius libri. Inter composita tamen diaphanicon est utile, & quantitate 3. iij. usque ad 3. vj. quia eius vis non transit hepar, & purgat materiam mixtam ventriculi.

Quartò,

Quartò, resoluentibus reliquias materiei medicamen- *Resolu-*
tis sæpe descriptis, maximè cap. 31. quarto genere remedio- *tio.*
rum: vt theriaca magna, mithridato, diagalanga, electuario
rosatæ nouellæ, & aromatico rosato, cum aqua aut deco- *Sumen-*
cto fœniculi, anisi, aut petroselini, & similium. Vinum quo- *da.*
que generosum post cibos pingues, & oleaginosos statim *Vini ge-*
famem caninam sedat, autore Gal. comment. 21. secundi *nerosi*
aphor. non tamen eam, quæ fit ex longa inedia, vel alui pro- *facul-*
fluio aut fluxu sanguinis, aut aliqua alia vacuatione. Nam qui *tas.*
huiusmodi aliqua causa esuriunt, plurimum offenduntur, vi-
ni potu in eo comment. Galenus distinguit bulimon à fame
canina.

Quintò, prosternentibus appetitum, & laxantibus ventricu- *Appeti-*
lum: qualia sunt cibaria & iura omnia pingua, vt oriza cocta cū *tus ab-*
pinguibus rebus, & hoc medicamentum, aut huic simile: ℞. de- *latio.*
cocti maluarum, & seminis lini. an. ℥. iij. olei sesamini, & butyri *Ab in-*
recentis an. ℥. j. misce, & fiat potus. Si ab intemperie calida ven- *tēperie*
triculi fames canina oriatur, quæ autore Galeno. 4. de sympto- *calida.*
matum causis appetentiam prosternit per accidens, meo qui-
dem iudicio quemadmodum & fames augetur à frigore per ac- *Victus.*
cidens, curatur alimentis coctu difficilibus, vt sunt castanæ, ca-
ro bubula, suilla, panis azimus, & similia.

Scholium.

Appetentia immodica.] *Calidum innatum perpetuò dissipat Nutri-*
substantiam triplicem corporis, solidam, humidam, & spiri- *tionis ne-*
tuosam, insensibiliter tamen per occulta cutis spiramenta, indeque cessitas,
orta est nutritionis necessitas, nisi enim loco substantia dissipata,
altera substitueretur similis, breui animalia perirent: propterea
natura indidit animalibus appetitum alimenti, aut sua conserva-
tionis, quod idem est, qui appetitus fames dicitur, hac duplex est, una Fames
naturalis, omnibus corporis partibus communis, quæ alimentum duplex.
appetunt nullo precedenti sensu rei deficientis, eo enim non egerunt,
quia alimento coniuncta sunt, sicut & planta cum quibus hoc ap- Fames
petitu communicat. Est fames altera, quæ dicitur animalis, eò quòd anima-
fiat cum sensu, est enim appetentia alimenti, quæ suctionis sensum lis.
sequitur, hanc solùm in orificio ventriculi sentimus, ob multos & Vallesij.
magnos nervos ibi disseminatos. Quæ fit eo modo, quo docet Gal. lib. Vallerio-
2. de causis symp. partibus circa cutem attrahentibus ex vicinis, la, & a-
& his ex aliis, quo ad usque suctione perveniat ad orificium ventri- liorum
culi, & in eo molestiam inducat. Inde colliges errorem Vallesij error.
Valleriola, & aliorum sentientium melancholiam ex liene ad ven-
irem

DE CVRAND. MORB.

Fames ex melancholia non est naturalis. trem expurgari, ut excitare famem. Hac enim non erit secundum naturam cum à partium suctione non fiat, imò erit canina, cum melancholia perpetuò in illis venis contenta sensum suctionis faceret. Appetentia animalis necessaria est animalibus, ut excitet ipsa ad quarendum alimentum, quoniam ipsis non est coniunctum. Neque hac appetentia est facultas, ut malè aliqui existimarunt, sed fit naturalium facultatum mouens eas ad agendum, & potissimum attractricem, & proinde ad ipsam refertur, quia ita ei adhaeret, ut pro modo appetentia attrahat ventriculus. In hac appetentia non tria sunt symptomata, cum non fit, cum imbecilliter fit, & cum male fit. Rursus appetentia, qua malè fit, quam deprauatam appellamus, duplex est: una ratione motus, qua canina dicitur, in qua immodicè appetimus alimenta. Altera in qua alimenta praua qualitatatis appetuntur, per prauam qualitatem aliena alimenta, & ea, qua non sunt alimenta (qualia sunt testæ, & carbones) intelligētes. *Symptomata in appetitu.* Hoc capite auctor solùm agit de canina appetentia. Hac à duabus Canina appetentia causis ortum habet. Prima est frigiditas orificij ventriculi, qua vel est nuda, cuius meminit Gal. 2. aph. com. 21. vel cum humore acido, de qua loquitur eodem loco, & 2. de causis symp. Secunda est immotica corporis dissipatio. Curationem lege apud auctorem. Solùm Duo aduertende duo, primum est, famem caninam ab intemperie frigida nudè factam, curari calidis, ut potu vini, dummodò non sit austerum. Secundum, famem caninam curari pinguibus, quoniam hac dissoluendo ventriculum auferunt sensum suctioni similem.

De cibi fastidio. CAP. XXXIV.

Cur appetentia est necessaria. **A**ppetentiam nobis omnibus prouida natura indidit, ne eius, sine quo constare animantium vita non potest, per negligentiam obliuisceremur, ea in hunc modum fit. Cum quodlibet animal in ambientem aërem per cutem dissipetur, principio partes cui subditæ inanes redduntur, hæ verò, quia talis est natura earum facultas, à vicinis partibus ad se alliciunt alimentum, ut id quod fuit exinanitum, repleatur: mox illæ rursus ex sibi vicinis, atque eodem modo aliæ ex aliis sibi proximis, donec ad ventriculum deuentum sit: & ab ipso suction fiat, reliquis omnibus partibus ante ipsum per eam suctionem iam euacuatis. Quam quidem suctionem cum venter ferre non possit, sed inde veluti deuellatur, huiusmodi molestiæ remedium cibum exquirat: atque inde tum fames, tum appetentia nascuntur. Est enim fames suctionis sensus, appetentia verò implendi desiderium, ut copiosius Galenus docet lib. 4. de causis symp. cap. 7. Porro cum trifariam appetentia lædatur, perinde ac omnes corporis

poris functiones vnus læsionis eius modus est, cùm animal nihil appetit: contraria sanè canino appetitui affectato, norexia Græcis, Latinis appetentiæ amissio, aut abolita appetentia, nobis verò cibi fastidium appellata. Hæc fit (vt loco citato ait Galenus) vel quia suctionis sensus perit, vel quia suction non fit, vel quia corpus non inanitur. Præter has causas etiam alias recenset Aëtius lib. 9. cap. 21. in hunc modum. Contingit autem sæpè ob immoderatam ventris, & intestinorum fluxionem, & ob biliosum humorem in ventrem delatum, tenacis & acris, ac porri speciem referentem, & ob pharmaci portionem, & sanguinis immoderatam detractionem, & in continuis ac vehementibus febribus, stomachi, ac ventris inflammationem, item hepatis, vesicæ, ac vuluæ. Contingit etiam in cholica & voluulosa affectione. Maxima autem, quod quis non esuriat, causa, caliditas existit: quæ solidat corpora laxando dissoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque ampliùs extendit. A pluribus etiam aliis causis appetitus perit, quas faciliè quiuus inueniet. Notæ, cùm à fluxu ventris hæc passio fit, manifestæ sunt. Si à biliosis humoribus, ventriculi morsus adest, nausæaque, & sitis vehemens: si ab humoribus putridis, etiam interdum febris adest: at quibus crassi, lentique humores fastidium cibi pariunt, ij nec rosionem ventriculi, nec sitim patiuntur. Communiter autem omnibus superuenit nausæa. Indicia verò, quibus calida intemperies dignoscatur, quæ huic morbo occasionem præbuit, sæpè in aliis capitibus dicta sunt.

*Causa.**Note.*

In omni tamen cibi fastidio nocent pinguia, & oleaginea, & crocus, cùm ipsis augent appetitum, odorifera omnia alimēta, præsertim si habuerint naturam contrariam causæ, acria etiam, vt cæpe, allia, porrum, piper, sinapi, cinnamomum gariophyllus, nux muscata, & similia: pari modo stiptica omnia vt menta, absynthium, pyra, cidonia. Acida quoque omnia, vt acetosa, agresta, acetum, succi granatorum, citri, limonum, & aranciorum. Salita omnia, quoque mouent appetitum, vt caseus, oliuæ, capparis, caro suilla, & similia. Seruetur tamen modus præscriptus 9. cap. huius lib. obseruata semper natura infirmi. Nam sunt inimicitia quædam inter nonnulla alimenta, & singularem hominem: quemadmodum & esse potest amicitia magna, & familiaris, quæ solo experimento cognoscenda est. Deinde materia est præparanda, si calida fuerit & biliosa per syrupum acetosum S. & rosarum, cum decocto hordei: si frigida per rhodomel, & oxymel S. per syr. de absinthio, de menta, cum de cocto fœniculi, & si-

*Curatio**Victus.**Appetē-**tiā au-**gentia.**Præpa-**ratio**materia**calide**& frigi-**mili*

DE CVRAND. MORB.

*Purga-
tio cali-
da.*

*Purga-
tio fri-
gida.*

*Materia
mysta.*

*Resolu-
tio, &
corrobo-
ratio.*

*Empla-
strum.*

*Vnguen-
tum.*

milibus, de quibus 1. cap. Deinde vacuanda est materia cali-
da, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, hiera S. & non medi-
camentis, quæ attrahunt ab aliis partibus ad ventriculum:
vt ℞. rhabarbari optimi intusi per noctem in aqua endiuivæ
cum paucis vino albo, & corticibus myrobalanorum citrino-
rum an. ʒ. j. pulueris hieræ S. ʒ. ij. syr. violarum ʒ. j. aquæ
buglossæ q. s. misce, & fiat potus aut ℞. pilularum de hiera
S. & rhabarbari electi an. ʒ. ʒ. cum syr. rosarum Alexandri-
narum fiant pilulæ viij. & aurentur, si non est pauper. Si ma-
teria fuerit pituitosa, vacuanda est agarico trochiscato cum
hierâ simplici, & myrobalanis chebulis: vt ℞. agarici tro-
chiscati, & corticibus myrobalanorum chebulorum an. ʒ. j.
pulueris hieræ S. ʒ. j. ʒ. rhodomellis ʒ. aquæ fœniculi ʒ. ij.
misce, & fiat potus. Si materia mixtam habuerit pituitam, &
bilem ʒ. iiij. diaphænicon vacuanda est, aut. ʒ. j. pilularum ag-
gregatiuarum. Postremo, curatur resoluentibus, & corrobo-
rantibus ventriculum, vt in causa calida pulvere diarhodon
Abbatis quolibet desumpto quantitate ʒ. ʒ. vsque ad ʒ. j. cum
ʒ. j. syr. rosarum. In frigida, syrupo de absinthio cum aqua
hordei cum cortice, mastiche, interiùs & exteriùs, & simi-
libus, vt carne cydoniorum in calida cum saccharo condita, &
in frigida cum melle, in aqua electuarium rosatæ nouellæ, &
magis pulvis conducit, & aromaticum rosatûm cum aqua aut
decocto absinthij, mentæ, alia similia. Theriaca magna, mi-
thridatum, aut diamusculus dulcis, aut diambra resoluunt, &
corroborant ventriculum, si sæpè magnitudine drachmæ
vnius capiantur cum liquore aliquo calido, vt est decoctum
cinamomi, corticis citri, coriandri, fœniculi, anisi, & simi-
lium. Hoc ventriculo admodum tam posteriori parte, quàm
anteriori resoluit, & corroborat: ℞. emplastri stomatichonis
partes, mastichis partem vnam, extendatur super alutam
ad formam scuti: aut ℞. olei nardini, absinthij & de lilio
an. ʒ. j. pulueris rosatæ nouellæ, cinnamomi, gariophyllorum,
mentæ & corticis citri an. ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguen-
tum, quod manè, & vespere ante cœnam actu calidum ven-
triculo admoveatur.

Scholium.

*Auctoris
lappus.*

Appetentiam nobis.] In hoc capite solùm aduerte, non rectè
auctorem in appetentiam à causa frigida fieri scripsisse, hæc
enim potius appetitum inducit, comprimendo orificium ventricu-
li, & hac ratione sensum suctioni similem efficiendo.

De

De Cholera. CAP. XXXV.

Quam barbari cholicam, & cholicam passionem ap-
pallant, hanc tum Græci, tum etiam Latini choleram
dicunt, quæ (autore Paulo lib. 3. cap. 39.) immoderata est vē-
tris perturbatio, quæ multo bilis fluxu, & supernè per vomitum,
& infernè per alui deiectiones fit. Contingit ob multam
cruditatem, quæ nonnunquam prauorum admodum alimen-
torum (vt docet Gal. 2. de alimentorum facultatibus, capite
de peponibus, & libello de cibis boni & mali succi, vbi, ex
boletis, inquit, non benè coctis cholera excitatur) interdum
verò vitiosorum succorum culpâ oritur. Malum sic deprehen-
ditur, per superiora, & inferiora excretio fit. Vtroque enim
ostio ad expulsionem ventriculus vtitur, & eò quòd ad gu-
lam superius, & eò, quòd ad pylorum, id est, ianitorem, vt
testatur Gal. 6. de morbo & symptomate, cap. 2. Sitiunt præ-
terea qui hoc morbo laborant, & copioso sudore madent, pul-
sumque habent concisum, & in musculis manuum ac pedum,
maximèque surarum contractionem, ac tensionem quandam
sentiunt. Quæ per vomitum redduntur, aut acescunt, aut ama-
ra planè sunt. Deiectiones vel pituitosæ, vel melancholicæ, vel
biliosæ, nonnunquam etiam carniū recenter cæsarum lotioni
simillimæ excernuntur. Facies sæpenumerò, qualem, Hippo. de-
scribit 1. Prognostic. conspicitur, & color non dissimilis ei,
qui in iam morituris cernitur, nec immeritò. Frequenter
enim hanc affectionem mors insequitur, nisi celeriter medi-
cus opem tulerit: denique & in ventriculo, & intestinis sum-
mus adest dolor, angustia, & vellicatio.

Descri-
ptio.

Causa.

Nota.

Primò, victus debita ratio instituenda est, parum frigida.
Calor enim humores mouet, & frigus si immodicum sit (quam-
uis immobiles ipsos efficiat, spiritum & colorem natium re-
solui prohibeat) nocet, humores ipsos subito ad intestina re-
uocans. Alimenta sint boni succi, & facilia concoctu, parum
& sæpè sumpta, præsertim deficientibus viribus. Nam sæpius
utilis est abstinentia, vt reddantur cæteræ partes quasi auaræ.
Ius ergo ex gallina tenera, & perdicibus, ex animalium, quæ
bonum succum gignunt, extremitatibus est bonum, melior
succus eorum, & optima aqua per distillationem expressa,
præsertim si parum aquæ rosarum, aut florum myrtyllorum,
aut malorum cydoniorum misceatur cum cinnamomo, ante-
quàm fiat aqua. Si fuerit ciborum magnum fastidium, vva
pensilis erit utilis, oua sorbilia, testiculi gallorum, & sedata
gallina

Curatio
Victus.In causa
frigida.

DE CVRAND. MORB.

- gallarum sunt salutaria, & alia dicta cap. superiori. Potus in causa frigida sit vinum generosum aqua dilutum, seruta consuetudine ægri, aut aqua cinnamomi, aut seminis fœniculi. In calida verò aqua hordei, aut aqua decoctionis coriandri præparati, aut vinum granatorum. Animi perturbationes maxime nocent, præsertim quæ ad interiora redocant, vt timor & tristitia.
- In calida.**
- Vomit.** Secundò, si materia & causa fuerit in ventriculo, vomitu curatur aqua tepida cum pauco aceto & saccharo, aut decocto seminis raphani cum syrupo acetofo S. Si verò fuerit multa materia, & aliunde venerit ad ventriculum & intestina, apparatus syr. rosarum, syrupo de agresta, oxysacchara S. syrupo de endiuia S. & similibus, cum aquis rosarum, plantaginis, portulacæ, & aliis eiusdem naturæ.
- Preparatio.**
- Purgatio materia pituitosa.** Tertiò, vacuantibus cum corroboratione, vt rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & chebulis, si fuerit materia pituitosa: vt ℞. rhabarbari electi parum tosti ꝑ. j. corticum myrobalanorum citrinorum parum tostorum ꝑ. iiij. syr. rosarum. 3. j. aquæ portulacæ 3. ij. misce, & fiat potus. In repletionem tamen ex cruditate sola hiera S. bene purgat, aut 3. j. pilularum stomachicarum, aut 3. j. agarici trochiscati, aut 3. iiij. diaphæ-nicon.
- Si repletio sit ex cruditate.**
- Error iuniorum medicorum super assatione rhabarbari.** Amatus Lusitanus centuria 2. curatione 44. & alij iuniores ante ipsum malè rhabarbarum assatum, & myrobalanos in hoc, & in aliis ventris profluuiis damnant, cum hæc duplicem habeant substantiam, vnâ tenuem, igneam, & aëream, alteram verò terrestrem, crassam, & astringentem. Prima purgans, mundificans, & abstergens per modicam assationem, & torrefactionem amittitur, crassa verò & astringens sola summe necessaria est quando materiam & causam profluuij cum corroboratione & astrictione, & absque acrimonia clementissimè educere volumus. Credunt iuniores medici idem esse assationem, adustionem, incinerationem, & calcinationem, quod falsum est.
- Reuulsio & resolutio.**
- Corroboratio.** Quartò, reuellentibus, & trahentibus ad cutem: vt balneo, quo rarò est vtendum propter facultatis imbecillitatem, frictionibus, & ligaturis extremorum, & cucurbitulis.
- Sumenda.**
- Potus aqua tepida.** Quintò, roborantibus ventriculum, & intestina, & prohibentibus motum humorum, & symptomata quædam, vt potu solius aquæ rosatæ tepidæ, quantitate vnciarum quatuor, maxime cum sit à sola bile: est à me expertum remedium, & laudatum à grauissimis medicis ℞: 3. j. pulueris diarhodon Abbatis, cum 3. j. syr. de agresta, aut alio simili, est in hoc genere

genere optimum remedium. Similiter rob de agreſta, de cydoniis, miua cydoniorum non aromatizata, niſi cauſa cholerae eſſet cruditas, tunc etiam aromarizata eſſe debet: & ſyrupus de menta, de abſinthio puluis roſatae nouellae, & electuarium eiufdem, puluis ſeu electuarium aromaticum roſarum Gabrie-
lis, & ſimilia calida medicamenta ſtomachica interna, & ex-
terna, de quibus cap. 31. de imbecillitate ventriculi abundè di-
ctum eſt. Hæc quoque mixtura eſt optima in hoc genere, in
calida cauſa & venenofa. ℞. conſervae roſarum antiquae ℥. iij.
conſervae acetofae ℥. j. coralli rubri præparati, & boli Armeni-
ci præparati an. ℥. j. margaritarum electarum, pulueris cryſtal-
li præparati an. ℥. j. ꝑ. ſacchari optimi. q. ſ. miſce, & fiat con-
ditum auro coopertum. Doſis eſt cochlearium vnum manè, &
quacunque hora cum aqua acetofae, aut portulacae, aut calybeata
aqua. Ventriculo, & toti etiam ventri admouenda ſunt adſtrin-
gentia, & corroborantia, vt oleum maſtichinum, roſarum,
myrtillorum, cydoniorum, nardinum, de abſinthio cum pulue-
ribus aſtringentibus: vnguenta ex iis fieri poſſunt: vt ℞. olei
de abſinthio, myrtillorum, & cydoniorum an. ℥. j. pulueris ma-
ſtichis, thuris, trochiſcorum de ſpodio an. ℥. j. ceræ. q. ſ. miſce, &
fiat vnguentum: aut ℞. farinae hordei lib. j. pulueris ſpodij ℥. iij.
albuminum ouorum numero iij. ſucci plantaginis, aut burſae
paſtoris, aut caudæ equinae quod ſ. miſce, & fiat cataplaſma: adde
parum aceti calybeati, & ſemel in die ventri admoueatur actu
frigidum, vel parum calidum: aut ℞. micæ panis toſti. ꝑ. j. carnis
cydoniorum melle conditæ ℥. ij. mentæ, abſinthij an. m. j. vini ru-
bri, aut aceti calybeati, ſi eſt cauſa vehementer calida, quod ſ.
miſce, & fiat cataplaſma: adde pulueris caryophyllorum, cinna-
momi, ligni aloës, maſtichis, ſpicæ an. ℥. ij. Magna cucurbitula
ventriculo & vmbilico admota detinet vomitum, & deiectionem.
Multi in hoc genere remediorum laudant aquæ frigidae & deiectionem
ſubitam irrorationem ſupra crura, & pedes, & teſtes: ſed hoc fa-
ciendum in ægro robuſto. Aliquando neceſſaria ſunt narcotica,
vt requies magna, micleta, athanaſia, & alia valentiora, vbi alia
non profunt, ſeruatis iis, quæ diximus ſuperiùs capite de phreni-
tide, & capite de ſanguinis profluuiò e naribus, & quæ dicentur
capite de ventris profluuiò ſequenti. Si adſit initium vlceratio-
num inteſtinorum, curabitur per ea, quæ dicemus cap. 38. de cu-
ratione diſſenteria.

Condi-
tum.Admo-
uenda.Vnguen-
tum.Cata-
plaſma.Cucur-
bitula

vomitum

deie-
ctionem

cohibet.

Scholium.

Quam barbari cholericam.] Cholera eſt ventris perturbatio, Cholera
quæ rem n. oleſtantem ſuperne per os, & inferne per anum ex-
pellit. morbus.

DE CVRAND. MORB.

pellit. Vnde pars affecta erit ventriculus, ut ex 3. de caus. symp. c. 2. colligimus: ita ut in eo facultas expultrix irritata immodicè moveatur. Neque video qua ratione adductus Vall. 5. lib. epy. com. 10. hoc symptoma etiam ad retentricem ventriculi referat, cum fiat ab irritatione, & veteres in eius definitione solius excretriciis facultatibus meminerint. Praterèa ex definitione prædicta colliges, de essentia cholera esse utramque euacuationem, sic Eutychides l. 5. epy. sent. 75. cuatio sit in principio morbi vomitu affectus, & non deiectione, cholera non laborabat: nisi in quarto die, in quo non solum vomuit, sed & per aluum deiecit. Quod si antè deiectionem choleram vocatum morbum habuisse scriptum sit, in illa sententia, dicendum est, librum non esse Hippocr. Et quamvis utraque euacuatio propriè cholera conveniat, aliquando tamen post dictas euacuationes solet vomitus cessare ob imbecillitatem facultatis expultriciis, quo tempore hunc affectum choleram esse non possumus negare, sicut neque quando declinante affectu, vomitus cessat. Causa cholera in genere est quicquid totum ventriculū molestat: hoc autem ex omnium medicorum sententia vel ex aliis. est alimentum corruptum, vel bilis acris à venis expulsa ad ventriculum. Ego tamen existimo choleram morbum semper fieri ab una causa, nempe à fluxione humoris biliosi, & acris à toto corpore ad ventrem: quod confirmo, primum ex nomine, nam idè hic affectus cholera dicitur, quia in eo cholera, id est, bilis euacuatur: secundo ex Gal. 3. de nat. fac. c. 13. ubi in choleris per venas, quæ ad intestinum, & ventrem pertinent, totum corpus euacuari scribit. Tertio ex imbecillitate, quæ in choleris in toto corpore sentitur, quæ non sequetur ad solam humoris corrupti in ventriculo euacuationem. Dices, nonne Gal. li. 2. de alim. fac. cap. de peponibus, ex vitioso succo ex peponibus genito choleram morbum fieri dicit? Respondeo, eo loco Gal. vitiosum succum non in ventriculo, sed in venis coaceruatum cholera efficiere nos docuisse: quod si aliquando corruptum cibum cholera causam statuatur, intelligendum est, illum irritando id efficere, quod manifestè colliges ex lib. 4. de rat. vic. in morbis acutis com. 103. ubi sic habet. Nempe ea choleraceorum eduliorum communis est malitia, cum & humida & acris fuerint. Talia siquidè similiter corrumpunt, suæque acrimonia vasorum eorum, quæ ad ventrem decumbunt, ora remordet, atque fluxionum earum, quæ ex toto corpore in eum fiunt, causa efficiuntur. Hac Gal. Ex quibus videat Valles. qua ratione possit fieri cholera ex redundantiâ immodica, ut ipse scribit: hoc in loco aduerte, ea quæ superius diximus de cholera simpliciter dicta, intelligi, nam est altera, cuius meminit Hip. 4. de ratio. vict. in acut. sent. 109. quæ cholera sicca appellatur, quam Valles. 7. epyd. com. 81. siccam appellari sentit, quia in ea non excernitur humor, sed quia habet solam irritationem ad euacuationes, quæ per os, & aluum fiunt: existimat enim

enim choleram siccam & humidam nasci eisdem causis ea ratione, qua nausea & vomitus. Cuius viri sententia quàm falsa sit, intelliges ex com. supradicta sententia, in quo Galenus choleram siccam appellat eam, in qua non humor, sed flatus acrimoniam habens per os, & aluum emittitur, qua ratione Hippoc. hydropem tympanitem, hydropem siccam appellare solet, quia ab spiritu fit. Ex supradictis intelliges etiam, quàm male auctor inter signa cholera simpliciter dicta deiectiones pituitosas, aut melancholicas enumeret.

Primò, victus debita ratio.] Qui in choleris statim in principio victum adstringentem imperant detento humore acri, mortis sunt auctores. Oportet ergo in principio istius affectus victu refrigerante uti, quia, ut diximus, cholera à causa calida ortum habet, & ita multoties curavi choleram potu solo aqua niue refrigerata. Quòd si alimentis utamur tēperatis, erunt alteranda rebus frigidis. Ces-
sante autem vomitu & remissa molestia, aut quando iam alimen-
tum incipit detineri, tunc adstringentibus, qua roborare possunt vē-
triculū, utemur: aut si his nolumus uti (quod melius erit) sufficiet so-
la victus ratio cōueniens. Ea alimenta qua in causa frigida ab au-
ctore cōceduntur, omittēda sunt, quia cholera à frigida causa nō sit.

Tertiò vacuantibus.] Si natura rectē humorem ex ventre eua-
cuet, nil oportet nos mouere. Si euacuet, sed aliquantulū diminutē in
(quod ex molestia colliges) tūc vomitoriis ab auctore paulō superius cholera
descriptis utere poteris tamen uti eo, quod paratur ex aqua tepida
decoctionis hordei cum cortice, aceto, & pauco saccharo, hoc enim vo-
mitum mouet, & simul extergit, & retundit acrimoniam humoris.
Quòd si natura ita diminutē irritantem humorem expellat, ut ex
eius copia anxietas, & excrementorum frigiditas sequantur, tunc
cum hoc medicamento educemus: ℞. cassia preparata ʒ. vj. pulueris
hiera picra ʒ. iij. decocti hordei cum cortice, q. s. misce, & fiat potio:
quam qualibet hora diei assumere poterit. Qua in parte errat au-
ctor, & cum eo Vallesius, purgantes humorem, & simul corroboran-
tes ventrem: cū solum intendamus illum tam molestum educere
humorem, post cuius purgationem, si euacuatio remittat, opportunē
roborantibus utemur.

Quintò roborantibus ventrem.] Hoc in loco remedia tan-
tū sunt ea qua frigida cū sint, constringendo roborant ven-
trem. Id, quod auctor dicit de medicamentis calidis choleram ex ventre
cruditate curantibus, falsum est, cū ex humore semicocto non fiat
cholera. Conditum etiam auro coopertum omittatur, quia prater
expensam, non est gratum. Prater ea omnia, qua docet facienda, Autho-
r ut vomitum compeſcamus, inutilia sunt: quia si vomitus multus ris lap-
est, & nos humorem ita prauum violenter detineamus, certā in-
ducemus mortem.

*Descri-
ptio.*

Diuisio.

Criticū

*quod nō
est cōhi-
bendum.*

Diarrhæam Barbari corrupto vocabulo diarriam appellant. Est autē ac si diceret simpliciter alui profluuium, cum si-
ne exulceratione & inflammatione fit. Cuius variae sunt spe-
cies ac differentiae, quas sigillatim recensebimus causas simul
ac notas cuiusque breui perstringentes. Alui ergo profluuium,
seu à toto corpore, seu ab aliqua eius parte oriatur, aliquan-
do quidem fit natura per indicationes (quas crises appel-
lant) humores inutiles expellente : aliquando verò vi sym-
ptomatum. Magnoperè tamen diiudicare oportet, an hoc vel
illo modo alui fluor contingat. Si enim crisis naturæ fiat, cu-
ratione non indiget iuxta Hippocratis præceptum aphorismo
vigesimo sectionis primæ, quæ iudicantur, & iudicata sunt
integrè, neque nouare aliquid siue medicamentis, siue aliter
irritando, sed sinere oportet. Porro num per naturæ crises se-
quutus sit alui fluor, consulere oportet ea, quæ ab Hippocr.
dicta sunt libr. 2. prognosticorum prognostico 14. & à Galen.
ibidem in cōmentario, & libr. 3. de crisis: maximū tamen si-
gnū est, si confert, & ægri tolerant. Quod si symptomaticū fue-
rit, & non à natura vincente factū, curationē requirit, & de hu-
iusmodi alui profluuii hoc loco agitur : cuius vna differentia
est, quoties ab hepate nascitur ob multitudinē bilis ad aluum
defluentis, quæ irritat ad excretionē, vnde ventriculus & inte-
stina, non expectata in totū concoctione, chylosā substantiam
expellunt, & huius alui profluuii meminit Galen. aphor. 20. se-
ctionis secundæ. Deprehenditur, quia in deiectionibus cōmix-
tus bilioso humori chylus apparet, & quia iuuenibus tempera-
mēto biliosis accidit & aestiuo tēpore, & noctu magis, & citissi-
mè in dysenteria degenerat. Prouenit etiam nonnunquam ob-
turatis mesenterij uenis, quibus hepar velut manibus vititur, dū
alimentū ad se trahit. Notæ sunt, quòd in deiectionibus nihil
præter chylū cernitur, & in dextro hypochondrio grauitas quæ-
dā sentitur, & antea vita, quæ humores crassos generaret, ex-
stitit: verū animaduerrere oportet, sæpè prædictas venas ob-
turari propter abcessum aliquem in ipsis existentem : quod
cognoscitur, quia febris adest, calor, ac dolor dextri hypo-
chondrij : lienis quoque vitio accidit, quod sic dignoscitur,
egestiones nigrae sunt, sinistrum hypochondrium dolet, id est
in eo grauitas & cætera melancholix signa cernuntur, iam &
ventriculus huius mali origo est, vel quia eius expultrix fa-
cultas fortior est, vel quia retentrix imbecillior, vel quia in-
tempe

*Chylosū
& bilio-
sum si-
mul.*

Nota.

*Chylosū
tantū.*

Lienosū.

*Ex vitia
to ven-
triculo.*

temperie aliqua laborat, & concoquere cibos non potest. Consideranda verò sunt ad id deprehendendum, quæ supra de vetriculi affectionibus sunt dicta, & quod cibus semicoctus protruditur, & in ventriculo dolor, & grauitas sentiuntur. Multis à *Ex capite* capite alui profluuium prouenit: cognoscitur verò, quia distillatione aliqua laborant, & dolor, & grauitas capitis præcesserunt: quòd ea quæ deiciuntur, spumosa sunt iuxta Hippocr. septima sectione, aphor. 29. sunt & aliæ differentiæ, quæ à nobis prætermittuntur, quod illorum in aliis capitibus mentio fiat.

Diarrhæa curatur, primò: victu refrigerante, & astringente, vt *Curatio* aëre arte parato, aceto, aqua rosarum, & similibus, quem, si e- *Victus.* pidemalis fuerit (vt anno 1450. Ferrariæ omnibus fermè omnibus accidit) omninò oportet relinquere, & saluberrimum quærere, si fieri tamen non possit, considera quæ dicuntur cap. 9. secundi libri, semper tamen necessaria sunt, quæ simul restringunt, & veneno resistunt.

Cibus, sit paucus, & parum nutriens, præsertim initio, & *Cibus.* facilis concoctu, vt reliquæ corporis partes quasi auaræ redantur, propriumque retineant alimentum. Tunc enim pyra, & cydonea tosta satis nutrent, aut ius pulli gallinacei aqua calybeata factum, & eius caro tosta. Vbi diuturna fuerit diarrhæa, aut facultas imbecilla, nutriatur hepate gallinæ, ouis sorbilibus, testibus pullorum gallinaceorum, succo carnis gallinæ, aut perdicis, aut arietis, iure pedum arietinorum, *In diuturna.* suillorum, & similium, amido, aut oriza assata, aut pane biscocto, & cum iure optimi nutrimenti & aqua calybeata facto: perdix tam assata, quàm elixa restringit. Si facultas fuerit admodum imbecilla, nutriatur aqua carniū gallinæ, perdicis, & arietis quæ sit per distillationem, vase vitreo apposito suppra aliud vas semiplenum aqua efferuescente, miscendo ante illius distillationem aquam malorum cydoneorum, aut *Noxia* myrtillorum, semper tamen ante cibum comedat offam *& uti-* parum assatam immersam miua cydoneorum, aut rob cydoneorum, aut de agresta. Acria omnia nocent, quemadmodum *Admo-* glutinosa, & astringentia iuant. Toties & tantum cibi sumendum, quoties, & quantum consueuerat capere, licet parum & sæpè sint alendi, qui facultatem habent imbecillam. *nitio.* Potus sit aqua chalybeata, aut pluuialis, si tamen fuerit ventriculo imbecillo, aut si solitus vinum bibere, sit rubrum & *Potus.* astringens, quale est Saguntinū, benè aqua chalybeata dilutum. *Si sit ab* Tandem quiete animi & corporis vtatur, & somno magis, *hyperca-* quàm vigilia. Quando ventris profluuium sit à medicamento *tharsi.* immodicè purgante, acrimonia obtunditur quatuor aut *sex*

DE CVRAND. MORB.

sex vnciis aquæ calidæ , aut decocti hordei cum ℥. j. sacchari, vel hoc potu. ℥. mucaginis feminis psyllij , & cydoneorum an. 3. ij. decocti hordei ℥. iij. misce. Hæc tamen inmodica purgatio multis curatur modis , causis eius abscissis , primo per ea , quæ vim medicamento purgantis frangunt , incrassant, & à corpore expellunt compingendo , vt sunt mucagines supradictæ , aut per ea quæ canales , & partes seruientes expulsionis roborant , & constringunt, vt est mastix , & similia : aut per ea, quæ ad contrarium vacuant , & trahunt, qualia sunt vomitus, balneum , frictiones & cucurbitulæ : aut per ea , quæ laboriosum motum sedant per quietem scilicet , & somnum, & per ea , quæ cor corroborant, & animum oblectant. Si quis ramen hanc rem perfectè cognoscere cupit , legat caput Medusæ de medicamento inmodicè vacuante Theoremate tertio, Canone primo. Sanguinea diarrhæa , si sit ab hæmorrhoidibus , curabitur cap. 52. huius libri. Si à mensibus suppressis nascatur , cap. 56. Si citrica , vt in synocha , nulla eget curatione , nisi modum excedat : tunc curatur sanguinis missione, per sectionem venæ cubiti internæ , extracto paucò sanguine: maior tamen copia sanguinis est educenda, cum diarrhæa sanguinea est à mutilatione membri. In vtraque tamen præcedenti sanguinis missione vtile , & necessarium est hoc , aut simile medicamentum: ℥. conseruæ rosarum antiquæ ℥. ij. miscletæ ℥. j. lapidis hæmatitis , coralli rubri præparati , Karabæ, mastichis , boli Armenici præparati an. 3. ij. syrupi myrtillorum , quod satis est misce , fiat confectio. Dosis manè , & omni hora cochlearium vnum cum aqua caudæ equinæ , aut sanguinariæ. Diarrhæa biliosa , præcedenti victu prædicto initio huius capitis , curatur vacuatione bilis per medicamenta stiptica : vt ℥. rhabarbari parum assati & corticum myrobalanorum parum assatorum an. 3. j. syrupi rosarum ex infusione siccarum ℥. j. aquæ portulacæ ℥. ij. misce, & fiat potus. Aliquando initio , vbi materia fuerit multa , ante purgationem necessarius est , vsus syruporum de agresta , cydoneorum, rosarum ex infusione siccarum , & similium , cum dupla quantitate aquarum , aut decocti portulacæ , plantaginis & similium : tunc fiet vacuatio per rhabarbarum non tostum , & per mirobalanos non tostos. Diarrhæa pituitosa curatur. si materia fuerit multa , per vacuationem factam myrobalanis chebulis eodem modo paratis , & aliquando addendo scrupulum vnum agarici trochiscati , præcedenti concoctione facta per rhodomel , per decoctum , & syrupum de absinthio. Melæcho Diarrhæa melancholico curatur per vacuationem factam myro

myrobalanis indis, & epithymo, præcedenti concoctione per
 syrupos, & medicamenta dicta capite primo: quamuis ali-
 quando si fuerit ob obstructionem lienis, hæc diarrhæa egeat
 propria curatione, de qua capite 45. huius libri loquemur
 copiosè. Deinde auertentibus curatur. vt vomitu, autore Hip-
 lib. de locis in homine, quo libro docet vomitum curari vo-
 mitu, & ventris profluuium ventris profluuium. Sanguinis mis-
 sione, si sint signa sanguinis & robur virium. Mouentibus
 sudorem & vrinam cientibus, præsertim si simul ventrem re-
 stringant, & vrinam prouocent: vt cydonea, frictione ex-
 terna totius corporis, demptis infernis partibus. Postea cura-
 tur per ea, quæ intestina lauant, & simul corroborant, do-
 lorémque sedant, ac defendunt illæ ab vlcere, vt clystere hoc
 pauca quantitatatis. ℥. decocti hordei ʒ. vj. sacchari ʒ. ij.
 misce, adde lutea duo ouorum. Ex solis vnciis octo lactis
 quo lapides marini extincti fuerint, aut chalybs ignitus) cly-
 ster est optimus, & vltissimus huic profluuium ventris: in dy-
 senteria tamen sunt maioris momenti clysteres, & magis ad
 multa necessarij. Deinde curatur incrassantibus, meatus con-
 stipantibus & corroborantibus retentricem facultatem, vt thu-
 re, cymino assato, & aceto infuso, aniso tosto, semine na-
 sturtij assato: hæc tamen calida magis prosunt, si sit profectus
 morbus à causa frigida, quamuis in calida sint vtilia, præci-
 puè si misceantur his syrupi aut aquæ astringentes frigida,
 vt syrupus myrtillorum, rosarum ex infusione siccarum, sy-
 rupus de agresta, cydoneorum & similium. Simplicia tamen
 & composita medicamenta huic profluuium necessaria sunt,
 omnia fermè frigida, quamuis mastix calida obtineat prin-
 cipatum in omni profluuium, quare ea perpetuò vtendum est
 etiam loco salis in cibis. Oriza etiam assata est optima, adeps
 quoque caprinus, quo multi diarrhæa laborantes, etiam inue-
 terata sanati sunt, mixta cum pane facto in modum dictum
 ab Hispanis migas. Drachma vna casei antiqui in aqua ca-
 lybeata per diem infusi, deinde decies, eadem aut simili
 aqua loti, si sæpè cum cibis, aut syrupo, aut liquore aliquo
 astringente comedatur, curat omne ventris profluuium. Simi-
 liter ʒ. j. virgæ cerui in puluerem redactæ. Coagulum hædi
 ab scrupulo vno vsque ad ʒ. j. cum ʒ. ij. aut iij. aquæ planta-
 ginis, aut portulacæ, aut alia simili adstringente, potissimè
 curatur hoc profluuium, incrassantur eo humores, ac coales-
 cunt. Sed hoc auxilio & antiquo caseo non est vtendum, nisi
 post alia remedia clementiora, vt sunt omnia simplicia astring-
 gentia, vt balaustia, spodium, hypocystis, sanguinis dra-

lica cu-
ratio.Præpa-
ratio &
euacua-
tio.Reuul-
sio.Sectio
vena.Sudoris
& uri-na pro-
uocatio.Clyster
lauans.Consti-
patio, &corrobo-
ratio.Aduerte
Masti-ches cõ-
menda-

tio.

Adeps
capri-

nus. i. capra,

aut ca-
pri ca-

strati.

Virga
cerui,coagu-
lum hæ-

di.

Tempus
vtendi.Simpli-
cia.

DE CVRAND. MORB.

- Composita astringētia.* conis, thus, sandaraca Arabum, nux cupressi, myrtillorum bacæ, & similia. Composita etiam vtilia sunt multa huic profluvio, ut syrupus rosarum ex infusione siccarum, syrupus cydoneorum, syrupus myrtillorum, syrupus de Ribes, syrupus de agresta, miua cydoneorum, rob de agresta, aut cydoneorum, conferva rosarum vetus, conferva cydoneorum, caro cydoneorum saccharo condita. Hæc composita summe mane sumpta sola, vel cum aqua calybeata conferunt, & etiam tempore sitis. In prandio tamen, & cœna semper in fine nocent, quia impellunt cibum, ideoque initio mensæ ossa tosta & madefacta aliquo ex supradictis syrupis, aut rob sumenda est. Micleta omne ventris profluvium curat, siue per os, siue per clysterem iniecta, est ab omnibus, & à me probata diligenter. Sunt multa alia medicamenta composita à variis doctoribus scripta, & longa experientia probata, lege Antidotarium Mesuæ, Nicolai, & Arnaldi de Vilanova, in quibus medicamenta omnia composita inuenire licet: quamuis nostris temporibus extet opus diuinum Nicolai Mirepsij, à Leonardo Fuchsi Latinitate donatum. Hoc medicamentum est à me, & à multis expertum in hoc profluvio, præcipue à causa calida: ℞. granorum myrti, spodij, sumach, santalorum omnium, gummi Arabici an. 3. j. β. ossium myrobalanorum omnium assatorum 3. vij. coriandri præparati tosti 3. iiij. seminis acetosæ, seminis plantaginis, seminis rosarum an. 3. omnia in puluerem reducta infunduntur cum succis plantaginis, agrestæ, & acetosæ, per diem, deinde exsiccata, & cum sufficienti quantitate miuæ cydoneorum fiat confectio ad modum opiatæ. Dosis 3. iiij. cum aqua, aut succo aliquo astringente.
- Causa frigida.* In causa frigida hoc medicamentum est expertum: ℞. ligni aloës, spicæ, galliæ muscatæ, cyperi, calami aromatici an. 3. j. cymini infusi per diem in aceto, deinde tosti seminis porri tosti an. 3. ij. β. seminis nasturtij tosti 3. iiij. granorum myrti 3. viij. balaustiarum, conchularum tostarum, thuris, fructus lëtisci an. 3. j. ameos. 3. j. β. omnia benè puluerizata infundantur in vinum rubrum Saguntinum, aut simile per diem, deinde exsiccantur, & iterum infundantur in aquam cydoneorum, aut aliam similem, & cum siccata fuerint omnia cum sufficienti quantitate miuæ aromaticæ fiat confectio. Dosis 3. iiij. cum 3. ij. aquæ, aut succi, aut syrupi ex superius dictis alicuius. Quando laborans ventris profluvio afficitur animi deliquio à materia venenosa, hoc remedium est optimum: ℞. censuræ rosarum antiquæ, & micleæ ana. 3. j. confectio-
- nis

nis de hiacintho , & confectionis Gentilis cordialis contra *proma*
melancoliam ana. ʒ. ʒ. coralli rubri præparati , margarita- *est.*
rum electarum , feminis portulacæ an. ʒ. ij. lapidis smaragdi *Confe-*
ʒ. j. syrupi cydoneorum , quod satis est, misce , & fiat confe- *ctio.*
ctio cordialis. Dosis cochlearium vnum omni hora cum aqua *Aqua*
cydoneorum. Lapis smaragdus curat profluvium ventris ve- *smarag-*
nenosum auctore sene Auenzoar. Nostri enim temporibus *di fa-*
curatus fuit hoc lapide illustris Ioannes de Mendoça post *cultas.*
multa alia auxilia. Quare hac in re non est audiendus Aloï- *Histo-*
sius Mundella , qui sua prima epistola damnat vsum lapidis *ria Ara-*
smaragdi contra Arabes , à quibus certè aliqua scripta sunt *bum,*
partim à Græcia prætermissa , partim ignorata , vt docet An- *defensio*
dreas Turinus nostræ ætatis doctissimus medicus. Postea, imò *contra*
semper vacuata causa ventri sunt admouenda vnguenta , em- *Aloisii*
plastra , cataplasmata astringentia , præcipuè si præcedat fo- *Mundel-*
tus hoc , aut simili liquore factus : ʒ. aceti calybeati partem *lam.*
vnam , aquæ calybeatæ (præsertim si fuerit in qua extinguan- *Turinus*
tur enses , pugiones , & gladij igniti) partes duas , foliorum *Arabii*
& fructuum myrti , cydoneorum , mespillorum , sorborum *Topica.*
an. m. ij. nucum cupressi num. x. fiat ex his decoctum ad *Fotus.*
medietatem , & reseruetur ad fotum. Bis in die admoueatur
ventri hæc mixtura : ʒ. mastichis , & emplastri stomaticho- *Empla-*
nis ana. æquas partes , extendatur super alutam ad formam *strum.*
scuti , & magnitudinem ventris. Hoc quoque vnguentum, *Vnguen-*
si bis , aut ter , in die admoueatur, est optimum : ʒ. olei ma- *tum.*
stichis , cydoneorum , & myrtillorum an. ʒ. j. pulueris san- *Cata-*
guinis draconis , thuris , & gummi draganti ana. ʒ. j. ceræ *plasma*
quod s. misce , & fiat vnguentum. Hoc cataplasma , aut si- *optimū.*
mile, si quolibet die semel ventri admoueatur, ventris hoc pro-
fluvium curabit : ʒ. micæ panis tostæ & infusæ in acetum
calybeatum , carnis cydoneorum cum melle condita ana. par-
tes æquas , decoquantur cum oleo mastichino , & vino rubro
addendo pulueris mastichis , thuris , sanguinis draconis an.
ʒ. ij. misce, & fiat cataplasma. Emplastrum diaphanicon Me- *Empla-*
sæ ex Alexandro Tralliano, & est secundæ descriptionis (Syl- *strum*
uius non credit esse Alexandri) omne ventris profluvium sine *diaphe-*
dubio curat , ventriculumque corroborat, est à me sæpè pro- *nicon.*
batum. Fotus rerum astringentium (vt sunt folia & fructus di-
cta) per annum confert non parum huic morbo. Similis est *Fotus.*
& expertus fotus pini habentis nodos igniti , & postea extin-
cti vino rubro.

Postremò curatur hoc profluvium quemadmodum a- *Narco-*
lia omnia immodica profluvia narcoticis medicamentis: *tica*
quia

DE CVRAND. MORB.

Somni vis. quia somnus omnes vacuationes detinet præter sudorem, iis tamen non est vtendum, nisi cùm alia non contulerint, & præsentis aliqua constantia viriam: multi namque his medicamentis perierunt extincto calore nativo. Quare doctus & prudens medicus primò iis externis adiutis vtatur, minùs enim hæc no-
Quidca- nendum sit docto medico. cent, & à medico, & ab assistantibus amoueri possunt & debent somno iam incepto: ne nobis contingat quod multis medicis eruditis Italis, præcipientibus famulis, vt statim ab incepto somno amouerent narcotica fronti, aut ægrorum capiti adnota, quibus præceptis oblitis, multi perierunt perpetuò dormientes. Se-
Suppositoria, aut clysteres. cundò, si hæc externa non suffecerint, parti inferiori sunt ad- mouenda narcotica in forma suppositorij, aut clysteris. Tertiò, & in maxima fermè necessitate opiatìs interiùs deuoratis vten- dum est.

Topica efficacissima ad somnum inducendum. Primò igitur fronti & naribus admoueatür parũ huius mix- turæ: ℥. vnguenti populeonis, & olei papaueris an. ʒ. j. Thebaici grana v. misce, solum tamen vnguentum populeon aliquan- do somnum inducit. Hoc etiam medicamentum laudatur in hoc genere: ℥. lactis fœminei. ʒ. ij. Thebaici ḡ. v. misce, vel ℥. olei violarum & papaueris an. ʒ. j. Thebaici ḡ. v. misce.

Clyster ad somnum. Secundò, si externa non suffecerint, hic clyster, aut similis somnum affert: ℥. lactis caprini, aut ouini ʒ. viij. olei papau- eris ʒ. ij. philonij Romani ʒ. β. misce, & fiat clyster: vel ℥. phi- lonij Romani, & micletæ an. ʒ. j. pinguedinis caprinæ, aut ceræ. q. s. misce, & fiant duo suppositoria cum philo magno bombi- cis, aut lini.

Narcotica sumenda. Tertiò, & vltimò, laudantur interna narcotica, quoque ata- nasia, & requies magna sunt tutiora. Dosis horum duorum à drachma semis vsque ad ʒ. j.

Potentiora. Postea potentiora, vt sunt trochisci de Karabe, de spodio, de terra sigillata, Dosis est ab scrupulo vno vsque ad ℥. ij. aut drachmam vnam. Pilulæ Nicolai contra fluxum sunt probatæ in hoc numero. Dosis est quarta pars vnius drachmæ, fiant ad magnitudinem grani Orobi. Valentiora sunt philonium Ro-
Pilula Nicolai. manum, Tarsense, & Persicum ad scrupulos semis vsque ad drachmam semis, vel drachmam vnam. Histamen narcoticis non est vtendum, nisi post sex menses, & quantò vetustiora sunt, tantò tutiora, vt sæpè diximus cum Gal. 12. method. The-
Narcotica vetustiora laudan- tur. riaca recens à drachma semis vsque ad drachmam vnam inter narcotica adnumeratur. Hoc quoque medicamentum in gene- re remediorum narcoticorum recensetur: ℥. micletæ ʒ. j. con- seruæ rosarum antiquæ ʒ. β. trochiscorum de karabe, de spo- dio, & de terra sigillata an. ʒ. ij. pilularum. Nicolai contra flu-
xiii.

xum. 3. j. requiei magnæ. 3. ij. ss. syrup. myttillorum. q. s. misce, & fiat confectio, Dosis semel in die drachmæ duæ cum aqua, aut syrupo astringente venterculo vacuo. Pilula hæc sumpta hora vndecima noctis omne ventris profluuium curat, experta à me, & à multis medicis. Valentinis, eius author, fuit doctor Tortella: ℞. opij ḡ. j. parci ponderis, cinnamomi, cassiæ lignæ, Pilula croci an. ḡ. iij. cum glutine, dragagati fiat pilula vna. Composita doctoris tamen narcotica post sex menses, & post annum sunt tutiora, Tortella vt diximus cum Gal. quia vis opij, & forma corrupta est sal- Quando tem maiori ex parte, quod in theriaca fermentata demonstra- sunt tu- tut, quæ calida est in fine secundi ordinis.

tiora
narcoti-
ca.

Scholium.

Diarrhæam barbari.] Diarrhæa, quam Latini alui profluuiū Diar- appellat, est immodica per aluum excretio alicuius humoris, r hæa. siue hic sit pituita, siue bilis, siue melancholia, siue corruptus humor in ventriculo, cuius excretionem diarrhæam ventralem appellare solent, siue etiam fiat cum crisi, siue sine crisi, siue cum febre, siue sine febre: quamvis diarrhæa rarò fiat ex toto corpore sine febre. Humor hic, qui in diarrhæa euacuatur, aut generatur in ventriculo, aut aliunde fluit. Si in ventriculo, aut generatur culpa ventriculi, quando intemperatus est, aut prauum humorem in cauitate continet, aut culpa alimenti cum peccat quantitate, aut qualitate. Si humor aliunde ad ventriculum confluat, aut id contingit ex toto corpore, vt in febribus, cholera, morbo, & super purgationibus: aut ex vnica tantum parte, hepate, liene, capite aut alia, quam ex signis eius partis affectu cognosces.

Si diarrhæa ventriculi culpa contingat, curabitur eius intempe- Error riem corrigendo: si sit humor in eius cauitate, ipsum euacuando. Si auctoris. verò alimentum eius sit causa, diminuemus eius quantitatem, aut aliud mutabimus.

Diarrhæa curatur primò.] Diarrhæa benè potest esse epyde- Alius mialis, & sine veneno, & proinde non est, quod semper cum adstrin- error. gentibus censeamus, quæ veneno resistunt.

Sanguinea diarrhæa.] Excretio sanguinis per aluum non dici- tur diarrhæa, sed dysenteria, & ideo non erat, quod hoc in loco eius faceret mentionem.

Diarrhæa biliosa.] Biliosa diarrhæa, quæ frequenter molestare Curatio solet, aut est critica, aut symptomatrica. Critica in febribus post co- diar- ctionem apparet, quæ non est sistenda, quia in ea solus humor pec- rhæa. cans excernitur, sed solum intestinorum habenda est ratio, ne exulcerentur ex acrimonia humoris, lac tepidum infundentes. Sympto- marica

DE CVRAND. MORB.

Diarrhaea symptomatica. *matica verò, quæ in principiis februm accidit, fit à natura irritata ab acrimonia humoris, aut à calore, quod idem est, quæ, velit nolit Vallesius, semper est mala, quia cum utilis humor cum inutili mixtus in ea euacuetur, fit cū incōmodo animalis. Neque ratio eius aliquis probat, quia etiamsi videamus aliquos homines robustos ferre hanc euacuationem, non proinde colligemus eam esse bonam, reuerà enim debilitauit agrum, qui ob robur eam potuit ferre noxā, & ex accidenti iuuari multo humore inutili euacuato. Hæc ergo euacuatione in principiis morborum factā sistemus, nō sanguinis missione, quia ex Hipp. fluente aluo sanguinem non detrahes, sed temperabimus bilis acrimoniam syrupo rosarū, acetositis, citri, & similibus, cum decocto endiuia & borraginis: deinde purgabimus bilē ea ratione, qua purgat auctor. Vbi aduerte nos parū torrefacere mirobalanos, & rhabarbarum, ut minuatur in eis vis purgans, & augeatur vis corroborans, ut ea ventriculus roboratus non ita facile recipiat humorem. Cibus & potus debet refrigerare, & adstringere: & ita ante assumptionem alimentimiua cidoniorum cū pauco pane torrefacto utilis erit. Quod si perseueret affectus, manè per aliquot dies cochlearium unum micleta conueniet, vel pilulas ex ea construemus hoc modo, ℞. specierum confectionis micleta ʒ. j. cum syrupo rosarū siccarū, fiant pilule nouem, quas una vice accipiat ager. Quæ si non sumēda prosint, ad pilulas Nicolai contra fluxum deueniendum est. Ex ʒ. j. facientes pilulas xxx. & assumentes ix. hora decima, aut undecima noctis, quam quantitatem, poteris pro robore, & imbecillitate agrotantis augere, aut minuere. Ha enim pilula ratione medicamentorū adstringentium roborant ventrem, & incrassant humorem, propter opium verò somnum conciliant, & sic sistere faciunt diarrhæā, quia*

Per aluū *somnus omnes euacuationes cohibet, quæ egent ope facultatis animalis. Infernè per aluū infundes lac, in quo lapides igniti extincti sint. Regionē hepatis illines unguento refrigerante, quale est rosarū, sandalatum, mixtum (ut penetret) cū pauco aceto aut cerato refrigerante Gal. ex 10. meth. Quamuis enim ex uniuerso corpore bilis fluat, in iecore tamen focus est putredinis, & per ipsum transit bilis, antequam ad intestina proueniat. Si in februm accessionibus bile deliquiū descendente ad ventriculū fiat cardialgia, tunc propina vinū aquā in accrescente dilutum, aqua enim refrigerat vētrem, & vinū etiam facit humore distributionem. Precauebis autem in sequenti accessione animi deliquiū, si antequamprehendat, panem vino madefactum, aut syrupum adstringentem assumat. Si biliosa hæc diarrhæa citra febrem accidat, prædicta curatione aluum firmato: si ex toto corpore fluit bilis, eam purgabis: si ex una parte, eam corroborabis, & causā generationis bilis submouebis. Roborabimus etiam ventriculū, qui est pars recipiens, medicamentis exterius applicatis quæ adstringentia*

fit

sint, quale est emplastrum factum ex malo cotoneo, in vino austero decocto, puluerizato cum cinnamomo, mastiche, & myrtillis. Quod si biliosa hac alui fluxio ex acri medicamento euenerit, curabitur medicamentis acrimoniā temperantibus, succo aggesta, aut granatorū, sorbitione ex alica (pro qua nostra similagine utemur.) Enematis etiā emplasticis ex lacte calybeato, & amylo paratis ut c. i. diximus.

Diarrhæa ex acri medicamento.

Diarrhæa pituitosa curatur.] Si in hac diarrhæa pituitosa in vētriculo generatur copiosa, aut vētricus multas generet cruditates inedia, & abstinencia, potu (ut coquatur humor) utemur, purgabimus & roborabimus ventrē, & optima imperabimus alimenta. Si à capite descendat pituita, ipsi prospiciemus ea ratione, qua capite de distillatione diximus. Purgabimus pituitā ex ventre, & ultimo corroborantibus utemur, capite de imbecillitate vētriculi descriptis.

Curatio diarrhæa pituitosa.

Diarrhæa melancholica. Si diarrhæa sit ab humore melancholico, & critica, sinenda erit, si symptomatrica, sistenda, purgantes humore corticibus myrobalanorum indorum parum correfactis & deinde adstringentibus, & aliis superius propositis utentes. Si sit ex atrabile, & critica præcedentibus signis coctionis, optima erit. Si symptomatrica, lethalis, nihilominus tamen in ea idem prestabimus, ac in superiori ex melancholico humore orta.

Melancholica curatio.

De lyenteria, id est, læuitate intestinorum.

C A P. XXXVII.

Lyenteriam, quam Latini læuitatem intestinorum narrant, Galen. aphor. sect. 6. tum carentiam concoctionis dicit esse, cum scilicet neque secundum consistentiam, neque colorem, vel odorem in ventriculo facta fuerit mutatio ciborum: tum velocem exitum eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deiiciuntur, qualia fuerant deuorata. Veteres medici, qui primi lyenteria nomen huic affectioni indiderunt, id voluere significare, tale quippiam per hanc affectionem intestinis euenire, quale extrinsecus in corporis cuticula ex cicatricibus contingere solet: existimant enim fieri ipsam propter internæ superficiei intestinorum læuitatem, ob quam cibos in eis contentos non amplius retinent, ut cum suam, & sibi à natura inditam asperitatem seruarent, retinebant. Si quidem graui aliqua dysenteria præcedente, intestina ab erodentibus humoribus altè exulcerantur, deinde cicatricibus densis & læuibus succedentibus ipsa tum densa, tum læuia redduntur: vnde propter densitatem ciborum per corpus distributio fieri non potest, cum ora vasorum sint velut obturata, vasorum inquam, quæ ali-

Descriptio.

men

DE CVRAND. MORB.

mentum ex intestinis ad se attrahunt : propter læuitatem verò, cibus antequam plenè concoquatur, nullo retinente delabitur, atque sic de lyenteria sentiunt : quos Galenus non probat.

*Diuisio
ex Pau-
lo.*

Quam rem (vt puto) animaduertens Paulus Ægineta lib. 3. cap. 40. duplex lyenteria genus facit , alterum quidem quod ex intestinorum exulcerationibus , & eorum cicatricibus ori-
tur, quod mali genus intestinorum tormina plerumque sequi-
tur. Aut ex aliis distillationibus rheumatísque inducitur. Alte-
rum verò, quod ex infirmitate languoréque facultatis, quæ ali-
mentum in stomacho retinet, prouenit : hac enim languente
ac imbecilla , cibi neque concoquuntur , concoctiue distri-
buuntur, sed crudi, humidi , & nihil immutati excernuntur

Causa.

continuo fluxu tentata aluo. Ex his quæ dicta sunt , constare
potest à quibus causis hoc malum proueniat : fit enim vel ab
exulcerationibus , & cicatricibus intestinorum , vel à faculta-
tis imbecillitate.

Signa.

Interdum & post voluulosa tormina, & post
alui ingens profluuium sequitur. Aliquando etiam & aqua in-
ter cutem per ventrem euacuata contingit. Signa sic ab Aëtio
adnotantur libr. 6. cap. 51. Ex quacunque igitur causa lyente-
ria orta sit ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habi-
tum acquirunt, quod vtrumque malum inemendabile est: suc-
cedit enim ægri assidua excretio cruda, colore subalbida , inæ-
qualis , & aquosissima citra sanguinis ac bilis complexum.
Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem
cibi fastidium comitatur. Videtur autem bonum & amicum
signum in eis ructus acidus esse , indicat enim iucundi quip-
piam factum esse , & ventrem ac intestina non velut inania
cibum sinere pertransire : hætenus Aëtius. Verùm hoc vlti-
mum confirmat etiam aphorismus suprà citatus primus sectio-
nis sextæ in longis læuitatibus intestinorum , si acidus ructus

*Curatio
lyente-
ria ex
acrimo-
nia.*

fiat, qui prius non erat, signum bonum, & quæ à Galeno in
commento dicuntur. Præcedenti cap. multa scripsimus non
solum diarrhææ utilia , & necessaria , sed lyenteria & omni
ventris profluuiio : ideóque paucis curationem hanc expedie-
mus.

Victus.

Si intestinorum & ventriculi læuitas fuerit à re acri irri-
tante expultricem facultatem , & retentricem imbecillam
efficiente , curatur primò ratione victus conueniente , de qua

*Deroga-
tio.*

superiori capite. Secundò , vacuatione materiae calidæ per
rhabarbarum tostum facta , & per myrobalanos, citrinas simi-

*Corrobo-
ratio.*

liter tostas. Deinde per frigida stipica corroborantia, vt sunt

*Curatio
ex vlee-
ribus.*

electuarium diarhodon Abbatis, syrupus de agresta , syrupus
rosarum ex infusione siccarum , & similia. Si fuerit ab vlceri-
bus

bus ventriculi & intestionum (quod per excrementa cognoscas, & per dolorem, quo tempore sumendus est cibus, praesertim acer, & expellenda excrementa) curatur per abstergentia, mundificantia, & consolidantia, de quibus cap. de pleuritide & suppuratione dictum est. Si fiat à materia multa ventriculo affixa (à qua saepius fit) curatur. Primò, victu tenuante, incidente, tergente, vt rebus salis parum amaris, & parum acris. Secundò paretur pituita rhodomelle, syrupo de absinthio & oxymellite. Si, cum decocto, aut aquis absinthij, foeniculi, mentae, & similibus. Tertiò vacuetur vomitu aut deiectione facta per vnciam seminis diaphanicon, aut per 3. j. pilularum elephanginarum, aut stomachicarum, aut per 3. j. agarici trochiscati. Postremò corroboracione facultatis concoctricis, & retentricis medicari poterimus per ea, quae diximus cap. 31. de curatione imbecillitatis ventriculi. Hoc cataplasma est in hoc genere bonum. ℞. mentae siccae, balaustiae, myrti, corticis mali granati, anterae, florum roris marini an. 3. j. myrrhae, mastice, gummi Arabici an. 3. ij. vini rubri & succi cydoneorum an. aequas partes & sufficientes pro cataplasmate. Hoc medicamentum est in hoc expertum. ℞. pulueris caudae equinae, balaustiae, mentae, mastichis an. 3. ss. foliorum myrti, seminis lini tosti an. 3. iij. syrapi myrtillorum. q. s. misce, & fiat confectio, Dosis drachmae duae sunt mane & vespere cum syrupo, & aqua aliqua adstringente. Hoc cataplasma ventriculo & ventri saepe admotum est optimum in hoc genere. ℞. acaciae, psidiae, gypsi, granorum vuarum, boli Armenici, hypocistidos, balaustiae, galbani, myrti, mastichis an. 3. ss. cariophyllorum, cincamomi an. 3. ij. vini rubri optimi, & succi cydoneorum an. aequas partes, & sufficientes pro cataplasmate. Semper ante cibum comedat aeger duo, vel tria cochlearia miuae aromaticae, aut duas offas tostas & madefactas praedicta miua, de super addendo parum coriandri praeparati, & cinnamomi. vel parum pulueris scripti capite 31. Ius carnis perdicis elixae aqua calybeata, & prius plenae cera noua, pinguedine hirci castrati & cydoneis, mespilisque curat hoc, & quodcunque aliud ventris profluium.

Curatio
lyente

ria ma-

teria af-

fixa vē-

triculo

Victus.

Prepa-

ratio.

Vacua-

tio.

Corrobo-

ratio.

Topica.

Cata-

plasma.

Confe-

ctio su-

menda.

Cata-

plasma.

optimū.

Ius per-

dicis.

Scholium.

LYENTERIAM, quam Latini.] *Lyenteria est affectus praeter naturam, in quo celeriter ea, quae comeduntur talia deijciuntur, qualia deuorata fuerunt. 4. aph. com. 12. vel ex 6. aph. com. 10. breuius, est coctionis carētia. Qua in parte errat Hieremias existimans*

mans in ea tenuem alimenti partem concoqui, si enim non retine-
tur, quomodo cōcoquitur? Hic affectus est symptoma in his qua im-
modicè exernuntur, sequens etiā aliquando aliud symptoma, nēpe
debilē actionem facultatis retentricis. Præterea hic affectus solet
sequi morbos instrumentorum omnium, qua ad aluum pertinent,
qualia sunt ventriculus & intestina. 4. aph. com. 12. sic Hippocr.

Obiectio. prædicti commentarii sententia sic habet. Quorum alui leuitate in-
testinorum laborant, &c. Vnde cum Galenus lib. 6. aph. com. 1.
agens de Lyenteria solius ventriculi meminit, adde intestina, aut
ea nomine ventriculi intellige. Dicet quis, si ventriculus est in-
strumentum concoctionis, & in lyenteria alimentum crudum ma-
net, qua ratione lyenteriam etiam in intestinis collocamus? Respo-
des intestina etiam cōcoquere, etsi leuiter, cum habeant cōmunē tu-
nicā cum ventriculo, ac proinde si alimentū in ipsis morā faceret,
concoqueretur: in lyenteria verò cum crudū omnino excernatur si-
gnum est ipsum neque in ventriculo, neque in intestinis detineri,
& lyenteria esse affectionem ventriculi & intestinorum. Morbi
ad quos sequitur lyenteria, duo sunt. Vnus est intemperies quali-
bet imbecillam reddens retentricem facultatem, & potissimū fri-
gida, & humida, quia hac molles reddit fibras, qua robur postu-
lant ad retentionem. Rursus hac intemperies frigida & humida.
Secundus. aut est nuda, aut (quod ut in plurimū contingit ortū habet ab hu-
more pituitoso in ventriculo generato, aut aliunde fluente. Atque
hac est lyenteria, qua non sequitur immediatè morbum, sed aliud
symptoma, quod est actio abolita facultatis retentricis. Secundus
morbus lyenteria efficiens est soluta continuitas partis interna vē-
triculi, & intestinorum, qua fit ab acri humore: in hac enim parte
aliquādo contingunt exulcerationes multa proportionem habentes
cum aphitis, qua ratione, existimo in variolis, & morbillis lyenteria
fieri: & ideo esse lethale, & postulare eā curationem, qua roborā-
tis partibus internis humores ad externas expelluntur, ut libro
secundo videbimus. Fit ergo in hoc secundo morbo lyenteria, eò quod
alimentū in vlcusculis dolore excitās expellitur à facultate, & sic
noxa refertur ad irritatā expultricē. Præctici sequenti Paulum
& Corneliū Celsū tertium morbū in lyenteria addunt, quod est le-
uitas ventriculi à magna cicatrice inducta. Quorū sententiā non
Reprehēduntur probo, non enim potest tanta viuēte animali soluta continuitas in
præctici vētriculo incidere, ut eā cicatricē inducat, ex qua sequatur lynte-
tertium ria, ab exigua enim non fiet. Lyenteria acutissimus est affectus,
morbum cum enim partes non nutriantur, atrophia patientur. Neque pu-
addētes. gnāt, quod Hippocr. dicit 6. aphor. In longis leuitatibus intestino-
rum, quia cum hæ sequantur diarrhæas, potissimum ventrales, si
tempus deiectionis consideremus longa erunt.

Si intestinorum & ventriculi.] Si causas lyenteria, hoc est mor- Error
 bos ad quos sequitur, consideres, intelliges malè auctorem curare auctoris.
 lyenteriam à re acri irritante factam, cum talis non detur: sicut Curatio
 neque illa, quam à multo alimento oriri scribit. Curabitur ergo lyente-
 hac ratione: si ortum habeat ab intemperie nuda, contraria alte-
 rantia conuenient: si cum affluxu pituita, si affluxus multus est,
 corticibus myrobalanorum chebulorum torrefactis cum hiera, aut
 decocto eorum cum hiera & agarico, ut ventriculus purgetur si-
 mul, & roboretur. Si autem humor contentus in ventriculi cavi-
 tate multus sit, fluxusque non sit magnus, tunc abstergentem in-
 tendemus facultatem, miscentes aloë cum hiera, idque non unica
 vice prestabimus, hac enim neque totum humorem euacuabit, ne-
 que ventriculi facultatem (qua multum laesa est) corroborare pote-
 rit. Possumus etiam his peractis exterius applicatis ventriculo ro-
 bur addere. Hoc unguentum id commodè prestabit. ℞. olei cotoneo-
 rum, mastichini, & myrtillorum an. 3. j. pul. sanguinis draconis,
 mastichis, gummi dragaganti an. 3. j. cera. q. s. misce, & fiat unguen-
 tum. Vtemur etiam emplastro stomaticho confortatiuo, per os: syru-
 pus de absinthio roborabit ventrem. Si post euacuationem ventricu-
 li & eius corroborationem, ructus acidus apparuerit, bonum est,
 quia melius est coctionem esse immunitam.

De Dysenteria. CAP. XXXVIII.

CVM quatuor sint dysenteriae differentiae, ut apud Galenum Descri-
 videre est sexto de morbo & symptomate cap. 2. ad finem, ptio.
 de vltima nobis agendum est, quam describentes, & solam dy-
 senteriae nomine dignantes dicimus, esse vlcus intestinorum:
 Galenus verò citato loco suprà eius notas simul enumerans de
 hac, hunc in modum loquitur. Per quartam verò, scilicet dysen- Notae
 teriae differentiam, paulatim, & breuib. interuallis deiectio
 fieri solet, nonnunquam grumosi, cum quo interdum puris quo-
 que nonnihil excerni conspicitur, itidem & ramenta (Græci vo-
 cant ephelcidas) & partes quædam intestinorum membranis
 similes, sæpenuerò densum quoque stercus excernitur cruen- Causa
 tis guttis respersum. Porro Latini hanc affectionem tormina
 appellant, ob id conlicere licet, quòd intestina ulcerationis
 dolore admodum torqueantur: vnde hoc malo affecti tormi-
 nosi perinde ac Græcè dysenterici dicuntur. Prouenit autem
 Aëtio capit. 43. lib. 9. ab externis causis veluti frigiditate, ar-
 dore, perniciosorum medicamentorum potu, ut scammoni
 & colocynthidis. Item à cruditatibus, & ciborum acrimum sum-
 ptione: Galenus verò libr. 1. de loc. affect. mordax humor
 dysente

DE CVRAND. MORB.

dysenteriae causa statuitur, ut qui ab initio & abstergat, & abra-
dat: deinde temporis interuallo ulceret intestinum. Nonnun-
quam à tenesmo incipit hoc malum, sæpè etiam per se. Si à
causis exterioribus accidat, interrogandus æger erit, sin minùs
per traditas sæpè methodos internæ causæ sunt inuestigandæ.

*Nota
preser-
tim in-
testino
rum af-
fectoru.*

Signa verò quibus morbus cognoscitur, iam suprà à Gal. tacta
sunt, quibus alia quoque addit Aëtius, sed dicta satis sunt. At cum
aliquando contingat tenuia, aliquando verò crassa intestina in
hoc morbo ulcerari, breuiter Paulus in hunc modum docet di-
stinguere. Si cum stercore mixta exulcerationis signa cum la-
bore, & circa vmbilicum torminibus excernantur, in gracilibus
intestinis exulcerationem esse cognoscēs. Si verò absque vllius
rei communiōe immixtum stercus egeratur, in crassioribus,

*Dysen-
teria cu-
ratu dif-
ficilis.*

Hæc multò fusiùs ab Aëtio, & à Gal. 5. de loc. affec. c. 5. tractan-
tur. Cæterum tam grauis est hæc ægritudo, & curatu difficilis, ut
quamuis eius curatio nunquam sit expectanda, maiori tamen
ex parte desperatur, maximè in iis, de quibus Aphor. 3. sect. 6.
scriptum est in longis difficultatibus intestinorum, cibi fasti-
dium malum est, & cum febre peius: & 23. sect. 7. à deiectione
syncera difficultas intestinorū malum: & Aphorismo 24. sect. 4.
difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, lethalis est, cui
aphorismo consonare videntur, quæ dicuntur sectionis 6. aph. 43.
Quicumque lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, iis su-
peruenientem longam difficultatem intestinorum aqua inter-
cutem, aut læuitas intestinorum excipit, & moriuntur.

*Cura-
tio.
Victus.*

Quatuor itaque remediorum generibus mederi dysenteriae
possumus: Primò, victu refrigerante, & astringente, si sit cau-
sa calida (à qua sæpiùs fit.) Ut cibis parum acidis ad excitan-
dam appetentiam, paucis & facilibus concoctu, & bonum san-
guinem gignentibus, quales sunt testes gallorum gallinaceo-
rum, oua sorbilia, hepata gallinarum, succus, aut aqua galli-
næ, vel perdicis cum succo agrestæ, aut acetosæ. Vitentur ace-
rum, falsa, acria, quia vlcerebus nocent, mordacia. In hoc
genere, quæ scripta sunt cap. 36. de curatione diarrhææ, con-
ueniunt.

*Qua no-
ceant.*

*Vacua-
tio.*

Secundò, materiam vacuantibus biliosam (à qua fit crebrius)
ut myrobalanis citrinis parum tostis, rhabarbaro etiam tosto: ut

*Potio bi-
liosa.*

℞. corticum myrobalanorum citrinorum, parum assatorum,
rhabarbari parum tosti an. ʒ. ij. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ por-
tulacæ ʒ. ij. misce, & fiat potio. Si à pituita falsa sit dysenteria,
hac porione, vel huic alia simili vacuabitur. ℞. corticum myro-

*Pituito-
sa.*

balanorum citrinorum, & chebulorum parum tostorum an. ʒ. ss.
agarici trochiscati ʒ. j. syrupi rosarum ʒ. j. aquæ plantaginis ʒ.
ij. misce,

ij. misce, & fiat potio. Si fuerit ab atra bile, myrobalanis indis parum tostis vacuabitur.

In fine 3. generis capit. 35. docuimus purgationem in omni ventris profluuiio esse faciendam per medicamenta astringentia, & quæ omni carent acrimonia, & facultate ignea, quale rhabarbarum parum assatum, & myrobalani modicè assati. Quare dicitur Amarus Lusitanus Centuria 2. curatione 44. credens lotionem & infusionem solam in aqua plantaginis, aut alia simili posse acrimoniam, & vim purgatoriam tollere, cum substantia horum sit terrestris, & densa, à qua sola decoctio, aut assatio potest rectè acrem, & purgantem facultatem separare, remanente sola astringente, & parum purgante, & vlcera curante, quæ indigemus in ventris profluuiis, præsertim in dysenteria, cui maxime nocet mel, cum autore Gal. 5. de facultatibus alimentorum cap. 39. mel sit tenuium partium habens acrimoniæ quippiam, quæ præterquam quòd aluum ad excretionem excitat, vlcibus multum nocet. Est quoque calidum, & siccum secundo ordine, vertiturque in bilem in iuuenibus & biliosis, & non potest materiam huius, & alterius profluuij purgare. Neque contrarium sentit Galen. 2. de facultatibus simplicium medicamentorum cap. 12. & 14. docens prius esse educendos humores facientes moriones, & postea, quæ moriones acrimoniam tollunt datæ per os, & per inferiora in aluum infundere. Purgat Galenus humores facientes moriones melle, quo nunquam Galenus in dysenteria vsus fuit, nisi iniecto per clysterem ad lauanda, & tergenda vlcera, vel per os sumpto ad purgationem mixto cum aqua plantaginis, aut alia, & paucò decocto. Pari modo lac siue asininum, siue caprinum iniectum per inferna vtilissimum est, præsertim si in eo lapides igniti extincti fuerint: per os verò sumptum nocet huic morbo, maxime, si æger fuerit biliosus laboratque febre putrida.

Tertiò, sanantibus vlcera, primò lotis intestinis à mucò, & à materia mordaci hoc, aut simili clystere. ℞. decocti hordei ℥. j. sacchari rubri ℥. ij. misce. Si vlcera sint in superioribus intestinis, bibat vncias quatuor, aut sex superioris liquoris. Cum maiori egent lotione intestina, hoc aut simili clystere vttere. ℞. decocti hordei cicerum nigrorum, & furfuris ℥. x. oxymellis simp. & rhodomellis an. ℥. j. misce: aut bibat ℥. v. si vlcera sint in intestinis superioribus. Si vlcera fuerint sordida, maiori egent lotione, decocto scilicet lupinorum, myrrhæ & absinthij, & oxymelle simp. & compos. Sed hæc & similia vlcera rarò curantur, etiam si sit in intestinis inferioribus, Lac calybeatum, vel in quo extincti fuerint lapides marini igniti, siue

*Melan-
cholica*

*Deter-
gentia
vltima*

*Lactis
calybe-
ti laus*

DE CVRAND. MORB.

*Sarcoti-
ca.*

*Clyster
fit mi-
nor lb. j.
Anti-
qua cu-
ratio.*

per os , siue per clysterem infundatur , lauat , moderatè re-
frigerat , & dolorem sedat , quare eo sæpè vtendum est:
præcipuè iniectio per clysterem , quando intestina inferiora
affecta sunt vlceribus. Lotis intestinis, & eorum vlceribus mū-
dificatis, necessaria est incarnatio, glutinatio, & consolidatio
addendo quæ internam superficiem tegant & muniant, vt sunt
pinguedines, cera, & similia, quod his clysteribus perfectè fiet:
℞. succi plantaginis , & portulacæ an. iij. albuminis duorum
ouorum, pulueris mastichis, sanguinis draconis, gummi draga-
ganti an. 3 j. β. ceræ, pinguedinis caprinæ an. 3. ij. misce, & fiat
clyster, vel ℞. iuris pedum, in quo sint decocta folia sanguina-
riæ, plantaginis portulacæ, & caudæ equinæ 3. viij. pulueris ma-
stichis, sanguinis draconis, & boli Armenici an. 3. ij. ceræ, pin-
guedinis caprinæ an. 3. β. misce, & fiat clyster: vel ℞. lentium
rostarum, orizæ assatæ , rosarum , balaustiarum , sanguinariæ,
caudæ equinæ an. m. j. fiat decoctum, de quo accipe vncias octo,
micletæ 3. β. trochiscorum de karabe 3. j. vitella ouorum ace-
to elixorum numero duo, misce & fiat clyster. In hoc profluui-
o ventris, & in quocunque alio quantitas clysteris sit minor vna
libra, ne suo pondere noceat. Aliquando in antiqua dysenteria,
vbi alia non sufficiunt, necessaria sunt narcotica, primò externa
secundò iniecta per inferiorem partem , tertio per os sumpta,
obseruando semper, quæ diximus cap. 36. præsertim virium ro-
bur, cū in hoc morbo semper ferè sit facultas imbecilla.

Scholium.

*Dysen-
teria.
Dysen-
teria cō-
ditiones.
Vnde or-
ta fuit
varia
dysente-
ria si-
gnifica-
tio.*

CUm quatuor sint.] Dysenteria propriè à veteribus appella-
tur sanguinis euacuatio per sedem cum torminibus ex vlcere
intestinorum procedens. Vnde tres habet conditiones , prima, vt in
ea sanguis profluat, secunda, vt profluat cum torminibus, tertia ve-
ditio. rō, vt ex vlcere intestinorum. Inde factum est, vt nomen dysenteria
variè accipiatur : nam aliquando euacuatio qualibet per aluum,
dummodò sanguinis sit , dicitur dysenteria , vt in hepatica , &
cruenta videre est. Aliquādo etiam qualibet euacuatio per aluum
cuiuscunque humoris , dummodò dolorem & mordicationem exci-
tet , dysenteria gaudet nomine. Hac ratione 3. de causis sympto-
matum c. 2. sanguinis nigri ex iecore excretio dicitur dysenteria:
de hac etiam loquitur Hippocrates 7. Aphor. sent 5. cū scri-
bit : à furore dysenteriam bonum esse , vbi dysenteria significat
mordicationem in intestinis ab humoris translatione factam. Ea-
dem ratione 6. aph. sent. 43. & 48. intelligendū est, cū in lienosis
dysen

disenteriam, euenientē bonum esse docet, in his enim ab humore melancholico, qui exulcerare non potest, per intestina transeunt, flatu excitantur, à quibus fit dolor. Neque enim est, quod cum Hieremia hūc dolorē à parte humoris putrefacta fieri concedamus: nam hac ratione lienosi habuissent febrē. Dysenteria illa, in qua sanguis excernitur, quā sanguineā appellamus, quatuor habet differentias lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. à Gal. explicatas nomine cruenti excrementi. Prima est cū optimus sanguis ex toto excernitur corpore, ob mutilatum insigne membrum, aut amissum validum aliquod exercitium, aut suppressam consuetā euacuationē, seruato eodem vitia. Cruentorum deiectionum 4. differentia.

Alia, neque sanguine arte euacuato sanguinis missione, aut alia ratione. Secunda, cū excernitur aquosus sanguis, ex imbecilla coctione iecoris proueniens. Tertia, cū per aluum deiicitur sanguis niger, & splendens, qua dicitur, dysenteria hepatica. Vltima est deiectio cruenta ex ulcere intestinorum nata, qua propriē dicitur dysenteria, in qua sanguis paulatim, & breuibus interuallis excernitur: paulatim, quia fluit ex ulcere, & non ex cavitare veni per breuia interualla, ob irritationem. Hac aut est siens, aut facta. Siens (in qua iā est dolor) tunc dicitur, cū pinguis (hoc est mucosus humor tunicis intestinorum hārens, & pinguedo) excernuntur. Facta vero, cum ramenta, aut carunculis similia. Hanc dysenteriam à frigidityate etiam posse fieri scribit Vallesius, adductus ex Hippocrate libr. 2. epy. sec. 3. cōmen. 4. ubi frigiditatem ulcerare sētit. Debit tamen Vallesius considerasse ex placiti absurditate illum librū Vallesius non esse Hippocratis, aut debuit legere unā cum Petro Iacobo Steue taxatur. Laudatarius, non ut frigus ulceraret, sed ut ager frigus attraheret. Quae tur Pelectio contextui magis quadrat, ut ibi videre poteris. Errat etiam tres Iacob hac in parte Vallesius, existimans Hippocratem agere in praedicta bus Steuentia de dysenteria, cū de diarrhaea loquatur. In hac dysenteria (de qua auctor agit in hoc capite) aut est ulcus in intestinis tenuibus, aut in crassis: quod distingues ea ratione, qua contextus doquo intestinet. Si dysenteria in tenuibus intestinis appareat, difficile curatur. sino si

Primò ob situm, quia eò alimenta iā mutata perueniunt. Secundo distinguendū. ex natura propria, quia sunt membranosa, & sicciora, quā crassa. Causa propriē dysenteriae sunt res acres, siue sint humoris biliosi, aut trahiliarii, aut pituitosi, dummodò pituita salsa sit, aut medicamentum acre. Ut in plurimum tamen ab humoribus biliosis oriri solet. dysenteria.

Secundò, materiā vacuantibus biliosā.] Bile purgacimus, ut prohibeamus, ne ulcus maius fiat. Exhibemus verò medicamenta cur purtorrefacta, ut roborentur intestina, ne recipiant fluxionem. Quod si genus considerassent Amatus, Hollerius, & Rödoletius, non prohibuissent bilem, & eorum usum. praesertim cū adducti sint leui ratione torrefactio. n. medicaexigua

mentis exigua non relinquit empirreumā, sed magna, ita ut mutet spe
torrefa- ciem res, ut in bile vitellina, porracea, atrabile, calce, videre pote-
ris. His medicamentis purgantibus pluribus vicibus uti oportet,
Aliquo- quia una eorū exhibitio nō sufficit. Tantūq; est necessitas istius pur-
rum re- gationis (quā fortasse veteres aloē, aut hiera adstringente exerce-
prehen- bāt) ut, nisi timeremus phlegmonē, praeceperet sanguinis missionem.
sio. Qua in parte mirandum est Valles. 2. epy. sec. 6. com. 27. tantū pur-
Valle. gare in maligna dysenteria, qua non potuit adstringentibus & ex-
senten- tergentibus curari. Si enim sit dysenteria ex bile acri, qua ratione
tia non adstringes non euacuata causa? tum cum adstringentibus ute-
proba- ris, aut perseverat fluxio, aut non: si perseverat, augetur vlcus, si nō
zur. perseverat, nōne humor ille sua acrimonia irritans detētus noxis-
Sangui- simi mali, & peioris fortē erit occasio? Si ergo causa agentis affe-
nis mis- ctuū ratio est habenda, in qualibet dysenteria euacuare oportebit.
sio. Tertiō, sanantibus vlcera.] Ante curationē vlcis opus est sē-
per in dysenteria, dūmodō vires constant, sanguinē mittere, ob affe-
ctū postulantē euacuationē, qui est phlegmon: qui futurus timetur
ob dolorē. Et ideo malē Rondolet. existimat, in dysenteria, cū mole-
stia scari venā. Secta vena vlcus curabis, extergens prius, & dein-
de agglutinans, quod rectē prestabis, si distinguas locum affectū, an
Cur lo- scilicet vlcus sit in tenuibus, aut in crassis intestinis, nā si sit in
cus affe- tenuibus, qua iuxta ventriculū sita sunt, remediis per os assumptis
ctus di- utemur, sicut in crassis per clysterē immisissis. Et ideo nescio, qua du-
stinguen- ctus ratone Valles. 2. epy. sec. 3. com. 4. in dysenteria siue malū sit
dus. in superioribus intestinis, siue in humilibus, in cibis, & potibus, &
medicamentis ore assumptis curationis spē collocet, ea. n. qua per os
assumuntur, integris viribus ad intestina crassa nunquā perveniēt,
bene tamen per clysterē infusa. Si ergo vlcus tenuia occupet inte-
stina, ipsū exterges per os assumens decoctū hordei, aut cicerū cum
saccharo, aut ℥. xx. aqua mulsā: quod si lenire etiā velis dolorē, la-
cte cū amylo miteris. Expurgato vlcere ad astringentia descendes,
Conglu- qua vim habent conglutinandi, qualia sunt bolus armenus cū aqua
tinantia plantaginis, syr. etiā de agresta, myrtillorū, & rosarū siccarū, cum
Exterjo decocto rosarum siccarum, & hordei. Vlcus verò crassorū intestino-
vulceris rū extergemus sine acrimonia, clystere infuso ex mulsā, aut ex ℥b.
crasso- j. decocti hordei cū cortice, & mellis rosati ℥. j. poteris etiā saccha-
rum in- rū, aut mel cū praedicto decocto miscere: quod si volueris addere oleū
estino- rosaceū, benè licebit ob dolorē. Si vlcus sordidū fuerit, ad ea, qua
rum. fortius abstergunt, devenies ad decoctum hordei cū melle centaurii
In vlce- aut cum praedicto decocto miscebis ℥. j. unguent. apostolorum,
re sordi- aut ℥. ss. unguenti egyptiaci, aut ℥. j. pulu. Ioannis Vigonis. Quod
do exter si vlcus sit in intestino recto, praedictis unguentis intinges
gentia. flammulam, & immittes. Si his non curetur, deveniendum eris
cū

cum vlcus est putridum, & serpens, ad caustica, quibus crusta inducimus. Assumentes pastillorū Andronis, aut Pasionis. 3. ij. tridū & rū succo plantaginis, aut decocto myrtillorū, ex quibus etiā possu- serpens.
mus vnguentū construere ad iniungendam flammulam in ulcere
intestini recti. Atramentariis etiam mysi, calcantho, sori, & aliis Cicatri-
cum succo plantaginis uti poteris. Expurgato ulcere, quod co- cem in-
gnosces ex paucitate saniei, & ex sanguine puro egrediente, ci- ducentia
atricem induces adstringentibus medicamentis, permiscens cum in dysē-
eis quæ acrimoniam bilis temperent. Præterea cum hac affectio teria.
vigilias, & dolorem inducat, eis prospicere oportet, quia vires Ad vi-
deiciunt. Vigiliis medebimur ea ratione qua cap. de phrenitide giliis,
diximus: hac autem potio in hoc affectu est utilis qua bilem tem- ad dolo-
perat, adstringit, & somnum conciliat: ℞. Syrupi de papauere rem.
3. j. ℞. Syrupi myrtillorum 3. j. diamargaritonis frigidi 3. ℞. boli
3. ℞. aquarum plantaginis, & cauda equina an. 3. ij. capiat
dormiturus aut poteris exhibere pilulas Nicolai contra fluxum.
Dolorem sedabis anodinis propriè, sauo anserino cum rosaceo,
aut decocto capitis arietis, vel gallina cum rosaceo. Quibus si non
sedatur, narcotica proderunt, aut supra partem dolentem un-
guentū comitissa applicabis: in quo grana tria opij sint dissoluta.

De Tenesino. CAP. XXXIX.

Tenesinus vehemens, & inanis est deiiciendi appetitus Molestus
cum paucō sanguine, lenta, & mucosa eiectione. Quæ vterō ge-
definitio placuit Paulo libr. 3. cap. 41. & Aëtio libr. 9. cap. 43. rentibus
Hic affectus quamuis Celso, autore libr. 4. ca. 18. neque acutus hic affe-
neque longus sit, cum faciliè tollatur, ut ipse inquit, & nunquā ctus.
per se iugulet (molestus tamen est omnibus, & vterū gerenti-
bus molestior. Nam (sene & sapientissimo Hip. autore 7. libr.
aph. 27.) mulieri, vterū gerenti si tēsis superuenerit, facit ab-
ortum: qui aphor. licet quinquagesimus in antiqua Constan-
tini translatione cum commen. Galeni reperitur 5. lib. in quo
Philothens exponit sic aphorismum. Tenesmus, inquit, est
continuus, & violentus motus, & secretio pituitosarum, at-
que pinguium materialium, cum paucō stercore, & breui san-
guine astricto, in antiquo tamen, & Aldino contextu hic a-
phorismus non reperitur in 5. libr. & propterea Theodorus,
Leonicens, Musa, Hieremias, Fuchsius, & alij docti scriptores
tantum in 7. libr. collocant hunc aphorismum, qui siue semel
in aphorismis ab Hippocrate scribatur, siue bis, ut multi alij,
nimirum si qualia oportet purgare, &c. & ille vterum geren-
tes, si conuenit purgare à quarto vsque ad septimum, &c.

DE CVRAND. MORB.

Verus est vt Galenus in commentario demonstrat, dicens, ob talem igitur tensionem atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ cæteris, matris, quæ cognata est recto intestino: nihil enim mirum, si propter vehementes, atque crebras exurrectiones fœtus abortitur, quando ex aliis omnibus fortibus motibus, atque doloribus mulieres grauidæ solent abortire. Fit hoc malū aliquando ab vlcere intestini recti, quamuis Gal. initio commentarij dicti, 27. visus sit sentire, ab hac causa sæper fieri Tenesmus, vt in difficultate intestinorū sit vlcus, in intestinis, quæ superius sunt. Neque audiendus est Erasistratus qui (vt ait Gal. com. 16. lib. aph.) tres esse species læuitatis intestinorum voluit, difficultatem videlicet intestinorum, læuitatem propriè dictā, & tenesmus. Nonnunquam fit à frigidityte externa aut ab inflatione recti intestini, aut à falsa pituita, aut ab humoribus serosis, acribus, & biliosis. Aliquando (vt scribit Aëtius loco superius annotato) obstructio sterco ris coacti in intestino cæco efficere potest Tenesmus. Frigidā causam externam ex ægro deprehendes. Humores & excrementa ex iis, quæ cernuntur, dignosces. Vlcus ex pure, & sanāuine minimo sterco ri immixto inflammationem ex dolore grauante, & ex febre significat. Stercoris multitudinem cognosces ex graui sensu, & distentione circa ventrem imum, & ex priuata deiectione. Pro varia causarum ratione variè etiam medicinam facere consueuimus: curatur tamen. Primò, victu iam dicto tribus superioribus capitibus, vel saltem contrario causæ. Deinde si ab vlcere fiat, curabitur, vt diximus cap. præcedenti de dysenteria. Si ab aliis causis per ordinem curabis. Si ab inflammatione fit, sequenti capite curationem demonstrabo. Si corpus bile redundet, vacuabitur per drachmam vnam rhabarbari, aut per drachmam semis corticum myrobalanorum citrinorum, deinde per clysterem lauantes: vt ℥ decocti hordei ℥. v. succi siclæ ℥. ij. sacchari rubri ℥. j. misce, & fiat clyster, adde vitella ouorum numero duo, olei rosati ℥. ij. β. Si causa sit pituita falsa. ℥. decocti furfuris, & cicerum ℥. v. succi siclæ, & rodomellis an ℥. ij. misce, & fiat clyster. Si à fæcibus induratis fiat ℥. foliorum maluarum, violarum, & mercurialis an. m. j. furfuris, passularum sine granis, prunorum damascenorum an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. vij. diacatholicon, & butyri recentis ana. ℥. j. benedictæ ℥. β. olei sesamini ℥. iij. salis ℥. j. misce, & fiat clyster. Si à causa sit frigida, lignum nucis, aut cupressi benè calidum, & ignitum sedi admotum curabit. Saccus ex camomilla anthos, calendula, vino optimo decoctus sedi admotus est remedium salutare huic tenesmo.

Causa.

Nota.

Curatio.

Victus.

Vacuatio bilis, si redundet.

Clyster lauans.

Pituita.

Fæcibus induratis.

Tapſus barbatus diuiſus in partes paruas: in vino optimo decoctus, ſedi admotus ſæpè eſt non mediocriter remedium, & à me feliciter expertum. Si dolor & appetitus deiiciendi fuerit magnus, & ſuperioribus remediis non curatur, neceſſaria ſunt ſuppoſitoria ex athanaſia, aut philonio cum pinguedine, aut cera noua, & ſilo magno: præſertim ſi ægra fuerit vterum gerens, ne abortum patiat, vt Hipocrates timuit.

Scholium.

Tenesmus vehemens & inanis. } Non rectè meo iudicio *Altoma*
tomarius, & alii ſemper in tenesmo ulceratum eſſe inteſti- *rius* &
 num rectum ſentire videntur: ſed vt ex 7. aph. com. 27. colli- *alii re-*
 gemus, tenesmus nil aliud eſt, quàm vehemens & inanis conatus prehen-
 ad egerendum. Vbi aduerte nos pro tenſione legere conatum, reue- *duntur*
 rà enim in tenesmo nulla eſt in inteſtino tenſio, ſed conatus mag- *in eſſen-*
 nus, ob quem frequentiffimè exurgunt: & ideò tenesmus eſt mo- *tia te-*
 leſtiſſimus affectus, ex quo abortus ſolet ſequi ob dolorem, quando fit neſmi.
 ab ulcere, ob compreſſionem vteri à muſculis abdominis factā & *Locus*
 ob frequentè motum, ex quo etiam febris diaria oriri ſolet. Cauſa corripi-
 tenesmi ſunt ea omnia, qua facultatè expultricè inteſtini recti ex- *tur.*
 citant ad vehementem & continuum motum, qualia ſunt qua ir- *Cauſa*
 ritant, & qua grauunt: irritant, pituita ibi impacta & ulceris tenesmi
 dolor: grauunt faeces immodica. Frigiditatem externam exiſtimo *Curatio*
 nunquam facere tenesmum, bene muſculi reſolutionem. Curatur
 tenesmus ea ratione, qua dyſenteria ex inteſtinis craſſis depēdens.

De Colico dolore, & ileo. CAP. XL.

Dolor, qui in inteſtino laxiore, quèd colō Græcè vocatur, *Deſcri-*
 accidit, colica à noſtris medicis dicitur, & aliorum etiam *prio.*
 duorum inteſtinorum craſſorum dolor de quo Paul. lib. 3. c.
 43. dicit. Colon cū pars ſit inteſtini craſſi à dextra illorum
 regione procedens ad ſiniſtram, cincturæ modo pertinet. Et
 Aëtius lib. 6. cap. 29. & Gal. variis locis, præſertim lib. 2. de loc.
 affec. c. 1. vbi ponēs diſcrimen inter dolorē, qui fit ab humore *Colica.*
 acri, & eū, qui fit à multitudine: porro, inquit, mihi ipſi accidiffe
 dolorē vehementiſſimū, vt mihi videtur in initio ventrē tere-
 bro perforari in eo potiſſimū ſpatio, quod à renibus ad veſi-
 cam per vteretres ſcimus extendi. Quo loco docet Gal. hunc
 dolorem ſæpè præcedere dyſenteriam, & aliquas ſcribit huius *Galeni.*
 doloris notas, quamuis lib. 6. cap. 2. quomodò medicus hunc
 affectum

DE CVRAND. MORB.

Causa. affectum à nephritide discernere possit, docet. A variis fit causis hoc symptoma, vt videre est apud Galen. Paulum, & Aetium locis suprâ notatis. Sed à quatuor potissimum nascitur, interdum à crassis ac pituitosis humoribus oritur, vt Galen. contingit, qui laborans hoc symptomate excreuit simul cum dolore grauissimo pituitam vitream. Interdum fit à flatulentis spiritibus, aut propter inflammationem molestantem, ac distendentem crassum intestinum, aut ob acres, & erodentes humores prædictum intestinum vehementer affli-

Nota gentes, fieri solet ab stercore indurato, & aliis. Quando cras-
crassi hu sus & pituitosus humor est causa, per totum abdomen in al-
moris. to, præsertim vbi est coli situs, sentitur dolor perinde, ac si intestinum tunderetur, & perforaretur. Adest nausea, ru-
ctus, vomitus pituitæ, maximè si natura ægri, & victus pi-

Spiritus tuitam ament. Qui dolent ex flatulento spiritu, tensionem
flatu- experiuntur, flatum quoque sentiunt, & emittunt. Qui in-
lenti. flammationis causa dolent, febrium sentiunt feruorem, si-

Inflam- tiunt, circa ventrem pulsationem sentiunt, laboriosè urinam
matio- & stercorea depellunt, bilem etiam aliquando euomunt, &
nis, hæc colica tanquam grauissima in ileum transire solet. Simi-

Acrium les fermè sunt notæ, quando ab acris humoribus: quam-
humo- uis vrina & deiectiones biliosæ apparent, & earum suppressio
rum. fit maior.

Descri- Ileum malum est tenuium intestinorum, grauissimos & le-
ptio Ilei. thales dolores inferens. De quo symptomate Paul. lib. 3. c. 44. di-
cit ileos cum affectus sit maximus, acutus, & dolorificus, sym-
ptoma quoddam habet periculo grauius: & Aetius lib. 6. cap. 28.
dicit, voluulus est affectio intestinorum lethalem dolorem in-
ferens, & Gal. com. 10. lib. septimi aph. in quo innuit, in illis ni-
hil descendere ad inferiora, quod est proprium illis, & insepara-
bile. Sed vomitus iis non semper adest, sed quando exitiales
sunt, etsi vehementius distorqueantur, stercus eis ascendit, at-
que singultiunt, & alia multa scribit de desipientia, & conuul-
Dubita- sione, quæ in hoc morbo exitialia fiunt. An reperiatur ileum si-
tio. ne vomitu, vt vult Galen. Musa dubitat, cum longa satis expe-

Differe- rientia semper vomere iliosos omnes ipse viderit. Huius sym-
rentia. ptomatis duæ differentia ponuntur à Celso lib. 4. c. 14. Prima
est, cum obstructio est in parte superiori gracilioris intestini, in
qua cibus per vomitum exit: altera, quando obstructio est in
parte inferiori, in qua exit stercus per os. Causæ & notæ simi-
les sunt colicæ causis, quamuis Gal. com. 40. lib. 6. aph. huius, qui-
bus dolor ilium fit absque inflammatione, his febris superveniens
morbum soluit, causas omnes fermè huius symptom. scribat,
præter

præter illas tamen est illa de veneno sumpto. Nonnunquam verò intestinum vnà cum stercore descendit in scrotum, quos fermè semper mori vidi sine voce.

Curatur primò, victu contrario causis huius symptomatis, *Curatio* semper tamen molliente, præsertim si ex fœcibus, desiccatis *colici* fiat, vt iure pingui, beta, prunis damascenis, passulis sine granis: *doloris.* butyro recenti, oleo sesamino, & oleo amygdalarum dulcium. *Victus* Cibi bonum sanguinem generent, sint faciles concoctu ob dis- *in fœci-* solutionem facultatis, qualia sunt ius gallinæ, oua sorbilia re- *bus de-* centia, testes gallorum gallinaceorum, hepata gallinarum. In *siccatis.* frigida causa misceri oportet parum cinnamomi, gariophyllo- *In cau-* rum, croci, & zingiberis. Alia sunt optima, laudanturque à *sa frigi-* Gal. 12. methodi, neque sitim efficiunt, vt cæpe. Aliquando indi- *da.* get æger inedia, vt si fiat ab inflammatione ex cruditate, & fla- *In phleg-* tu, præcipuè in principio. In calida causa nutriatur iure pullo- *mone.* rum gallinaceorum, ptisana hordeacea, spinachiis, prunis da- *In cali-* mascenis, & similibus. Potus in frigida sit vinum potens mo- *da.* deratè aqua dilutum, vel aqua cinnamomi, vel seminis fœnici- culi, vel anisi, vel mulsæ. In calida, aqua hordei, aut liquiritiæ, aut aqua sacchari. Deinde curatur abscissione causarum. Sed prius oportet regulas quasdam generales satis obseruare, & eas maximè memoriæ mandare. Prima est quamuis pro- *Regula* pria cuiusque morbi, & symptomatis curatio fiat per causæ *l. dolo-* abscissionem: in vehementi tamen dolore, breui tempore fa- *rem esse* cultatem vitalem, & omnem dissolvente, prius, & subito cu- *sedan-* randus est dolor, per narcotica medicamenta, quæ sensum par- *dum.* tis dolentis potius semouent, quàm causam amoueant. De his nos abundè cap. 4. de cephalalgia, & 36. de diarrhæa, cum *Appen-* Gal. duodecimo methodi diximus, quo lib. Gal. multa satis ne- *dix de* cessaria in vsu narcoticorum scripsit: vbi etiam docuit narco- *vsu nar-* ticorum vsum esse vtiliorem in colico dolore à bile: nam præ- *cotico-* terquàm quòd magna refrigeratio minùs illi nocet, narcotica *rum.* etiam incrassant, & concoquunt bilem, ipsamque immobilem faciunt. Hæc regula desumpta est ex Galen. 12. methodi, quam postea confirmauit Auicennas 4. sen. primi libr. cap. penult. his verbis semibarbaris. Et quandoque est res, in qua fidu- *Auicen-* cia est, quòd dolor ea remoueatur, sed est tardè operans, ita *na opi-* quòd dolor ille vsque ad horam illam tolerari non potest, si- *nio.* cut euacuatio materiæ dolorem facientis colicæ retentæ in villis intestinorum: aut citò operans, sed ex ea timetur finis vehementer malus, sicut stupefactio membri dolentis in colica, cum medicinis, quæ hoc operari solent, & sit medicus in hoc non rarò ambiguus. Oportet ergo vt apud ipsum sit æsti- *matua*

DE CVRAND. MORB.

mativa fortis, vt sciat, quod duorum temporum sit longius, aut tempus fixationis virtutis, aut tempus doloris: & etiam quæ duarum rerum deterior, aut dolor, an malus finis, qui ex stupefactione timetur, vel eligat prætermittere illud, quod magis est conueniens: fortasse enim si dolor remanserit, fortitudine sua & magnitudine interficiet: & stupefactio forsitan non interficiet, licet ex alia parte impediatur, cuius nocumentum fortasse corrigere poteris, & redibit forsitan dolor, & tu curabis medicina conuenienti. Secunda regula, colica, quæ fit à materia pituitosa, & flatu, curatur medicamentis mediocriter calidis, insidentibus, tenuantibus, coquantibus, & per os aperientibus, externis & internis: nam si initio non vacuato humore nimis calidis vteremur, fieret maior attractio ad partem dolentem, dolorque augeretur, & pars dolens posset facillimè laborare inflammatione, aut alio rumore præter naturam. Perpetuò ergo à clementioribus ad valentiora est procedendum, & vltimis vtendum post vacationem.

*Regula
2. de me
diocriter
calidis
initio in
flatu.*

*Regula
3. de
purgan-
tibus.*

*Discri-
men su-
mendi.*

*Regula
4. Cly-
ster mol-
liens.*

*Clyster
aperiēs.*

*Clyster
acrior.*

Tertia regula, vacuatio in dolore intestinorum facienda est per medicamenta clementer purgantia, quæ non attrahant ab aliis partibus, & longinquis, præsertim si humor tantum in intestinis fuerit, qualis est hiera simplex, pilulæ elephanginæ, & de hiera simplici, agaricus trochiscatus & diaphænicon: hæc tamen, & similia per clysterem in colico dolore, & per os in ileo magis conferunt. Quarta regula, in hoc dolore, semper præcedat vacuatio per clysterem mollientem, & clementem, vacationem aliam, siue facienda sit per acres clysteres, siue per potum, aut pilulas aut alia medicamenta, vt per hoc, aut simile. ℞. decocti maluarum, bismalux, seminis lini, fœnugræci, & furfuris ℥b. j. butyri recentis, dialthææ, & benedictæ, an. ʒ. j. olei sesaminis, de semine lini. ana. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, quo sumpto decumbat æger in partem dolentem. Si flatus impediatur ingressum clysteris, instrumentum, quo infunditur liquor clysteris, habeat fistulam biforem, vt vna via materiam clysteris iniicias, altera flatus foras erumpat, sit ita conformatum. His benè consideratis citò curandus est dolor colicus, quia ob vehementiam vires prosternit. Primùm ergo clysteri superiori, aut hoc vacua, vt viam aperias, per quam vacuatio facienda est: ℞. foliorum, maluarum, betæ, bismalux, an. m. j. seminis lini, fœnugræci, ficuum siccarum, furfuris an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe vncias decem, cui adde benedictæ, butyri recentis an. ʒ. j. olei camomillæ, & de semine lini an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. Si verò ob stercora exsiccata, aut aliam causam non fiat

fiat vacuatio, vt sæpè contingit, necessarius erit alter clyster acrior, & aliquando tertius, addendo, cum sit decoctum, drachmas duas carthami, drachmam vnam hellebori, & drachmam semis colocynthidæ in ligatura, ne substantia colocynthidæ intestinis noceret. Aliquando ad facultatem expultricem irritandam, atque mouendam indiget æger his aut similibus suppositoriis. ℞. pulueris benedictæ, & pulueris hieræ longodionis an. ʒ. salis gemmæ ʒ. j. β. mellis q. s. misce, & fiant duo aut tria suppositoria filo appensa. Deinde vacuis intestinis, si materia est in aliis partibus pituitosa (à qua sæpius fit) concoquatur rhodomelle, sir. de absynthio, de duabus radicibus, & similibus, & decocto aut aquis fceniculi, petroselinii, melissæ & aliis eiusdem naturæ. Postea vacuerur drachma vna pilularum de Agarico, aut drachma vna pilularum cochiarum, aut hoc simili potu. ℞. diacatholicon. ʒ. β. agari- ci trochiscati ʒ. j. electuarii indi ma. ʒ. iij. rhodomellis ʒ. j. aquæ fceniculi, q. s. misce, & fiat potus. Si materia fuerit in intestinis fixa, & in partibus propinquis, sola hiera simp. & agarico aut diaphænicon fiat vacuatio. Die sequenti post euacuationem bibat æger hunc, aut similem potum. ℞. decocti camomillæ ʒ. iij. theriacæ magnæ aut mithridati ʒ. j. rhodomellis ʒ. j. misce. Aut hic clyster aut similis iniiciatur: ℞. decocti hordei, & radicis althææ ℥. j. rhodomellis ʒ. olei de semine lini, & camomillæ an. ʒ. ij. misce, & fiat clyster. Deinde curatur dolor clysteribus ex oleo camomillæ, vino primò, & aqua naphæ, aut ex solo oleo rutæ, & camomillæ, aut ex iure intestinorum, & pedum arietinorum (quod dicitur malcozinado) cum oleis camomillæ, de semine lini, & sisamino. Si intestina sunt lupi, maiorem habebunt facultatem, & vim ad corroboranda humana intestina, & eorum dolorem curandum: stercus tamen lupi per superiorem partem sumptum, & per inferiorem iniectum omnem dolorem colicum a proprietate curat, quamuis magis à causa frigida. De quo, & aliis, quæ à proprietate iuuant, in fine huius capitis copiosius dicemus. Si cum colico dolore renalis coniungatur, curatio mixta erit ex hac, quæ nunc traditur, & alia, quæ dicitur capite quadragesimo septimo huius libri, vt est hic clyster: ℞. parietariæ, malux, bismalux, rutæ, an. m. j. camomillæ, seminis lini, fcenugræci, anisi, carui, cymini an. p. β. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℥. j. cui adde benedictæ, diacatholicon. an. vnciam semis, butyri recentis, & dialthææ. an. vnciam vnam, olei camomillæ, & de semine lini. an. vnciam vnam semis, olei scorpionum vnciam semis, salis communis drach

*Substā-
tia colo-
cynthi-
dis nocet
intesti-
nis.*

*Supposi-
toria.*

*Præpa-
ratio.*

*Purga-
tio.*

Decocti.

Clyster.

*Sublata
causa cu-
ratio do-
loris se-
quitur.*

*Intesti-
na lupi
qualia
sint.*

*Stercus
lupi.*

*Curatio
mixta do-
loris coli-
 & renū.*

Clyster

communis

DE CVRAND. MORB.

Fotus. drachmam, misce, & fiat clyster. Ex prædictis, & similibus decoctis in duabus partibus aquæ, & vna vini fotus frequens, parti dolenti est optimus, vel liquor hic ex clepsydra ab alto ventri affusus, vel potius admotus ex magna sponsia expressa, aut in vesica. Aut ex hoc. ℞. foliorum lauri, origani, calamenti, pulegij, saluæ, rutæ, an. m. j. vtriusque stachadis. camomillæ, meliloti. an. p. j. seminis anisi, anethi, carui, dauci. an. ʒ. ʒ. vini, & aquæ, an. æquas partes. Fotus etiam ex solis oleis benè calidis camomillæ, de semine lini, rutæ, & scorpionum curat hunc dolorem à flatu, & causa frigida factum. Filum ex lixiuio cum cineribus coctum, admotum & benè calidum curat hunc dolorem. Inseclus ventris inferioris per semihoram in balneo ex superioribus medicamentis decocto aliquo apparato adiumento est: mora tamen in hoc balneo vires fractas dolore, vigiliis & inedia nimis affigit: quare bono odore, vino & aliis huiusmodi opus est. Stercus vaccarum, præsertim mense Maio collectum, siue recens, siue antiquum sit, est in hoc optimum solum, & cum aliis. Cucurbitula magna ventri adnota curat dolorem ex flatu. Clyster hic ex iure galli gallinacei veteris, & aliis obtinet in curando dolore principatum: ℞. seminis anisi, fœniculi, fœnugræci, an. ʒ. ij. thymi, epithymi an. ʒ. j. agarici, colocynthidæ, salis indi an. ʒ. ʒ. sticados, camomillæ an. m. ʒ. carthami. ʒ. ij. his omnibus semipuluerizatis farciatur, & consuatur gallus gallinaceus vetustissimus, ante mortem verberatus, & post decoquatur, donec ossa separentur à carnibus: deinde ex ℥. vna huius iuris fiat clyster. Cui iuri percolato si adderes benedictæ vnciam vnā, olei camomillæ vncias tres, esset clysteri maior, & acrior vis. Huic etiam clysteri magna vis inest in hoc dolore curando: ℞. vrine pueri ℥. j. olei de lilio, & de semine lini. an. ʒ. ij. theriacæ magnæ ʒ. ij. misce, & fiat clyster. Si dolor colicus sit ab inflammatione, curatur primò victu tenui, & refrigerante. Secundò, auertentibus perfectionem iecorariæ. Tertiò, repellentibus internis per os, cum est in superioribus intestinis, & si in inferioribus sit, per clysterem, vt decocto hordei, & oleo rosato, aut solo lacte caprino, aut ouino, aut solo oleo violaceo, aut de papauere, aut succis plantaginis, portulacæ, solani, & similibus. Quartò, & vltimò, dissipantibus, & resoluentibus, vt decocto camomillæ, fœnugræci, radicis althææ, seminis lini & similium. Si à bile fiat colicus dolor: primò vacuata bile, secundò, moderatè frigidis, vt est lac, & oleum rosarum, & similia, curabitur. Si à veneno fiat hic dolor curatur statim vomitu per totum, syrupi acetosi simplicis

cis, cum decocto seminis raphani, aut per infusionem hellebo-
 ri cū raphano, & postea cum oxymelle simp. Secundo, oleo sesa-
 mino, & de semine lini in quantitate vnciarum quatuor. Non
 dormiat veneno sumpto, quia somnus reuocat venenum ad in-
 teriora. Tertiò, curatur iis, quæ à tota substantia, seu proprie-
 tate veneno sumpto repugnant. Theriaca magna, & mytrida-
 tum omnia fermè venena curant. Si vis scire perfectè naturam
 cuiusque veneni, & facultatem medicamentorum contrario-
 rum venenis, lege sextum librum Dioscoridis, & libros de
 facultatibus simplicium medicamentorum Galeni, & libros de
 alexipharmacis, & de theriaca antiquissimi medici, & poetæ
 Nicandri: lege etiam opus de venenis doctoris Santes de Or-
 donyes. Quæ curant omnem dolorem colicum, & iliacum à
 tota substantia, seu proprietate, omni tempore, sunt stercus lu-
 pi per os cum rhodomelle, aut aliquo liquore. Dosis est drach-
 ma vna per clysterem cum conuenientium aliorum medica-
 mentorum drachmis duabus, aut tribus. Si recens fuerit, ven-
 tri admotum ad modum cataplasmatitis, curabit hunc dolorem.
 Ossa etiam, quæ reperiuntur in stercore lupi parua quantitate
 sumpta curant dubio procul eum, & ne iterum fiat, prohibent.
 Idem os collo suspensum à multis in hoc laudatur. Lupi in-
 testina, si comedantur, curabunt ipsum dolorem. Radix ius-
 quiami ventri admotà colicum dolorem curat, & qui fieri po-
 test, prohibet. Ventriculus anseris assatus, si comedatur, cu-
 rat hunc dolorem. Drachma vna semis cornu cerui tosti libe-
 rat ab hoc symptomate. Vena vmbilisci masculi infantis curat
 colicum dolorem masculi, & foeminæ foeminam sanat Deo
 auspice. Virga cerui puluis laudatur à quibusdam in hac cu-
 ratione. Pes lupi collo suspensus ab aliis laudatur, ius cancro-
 rum hunc dolorem leuat. In vehementi dolore deueniendum
 est ad narcotica medicamēta, sēper tamen sunt maximè con-
 sideranda quæ de horum usu diximus c. 36. de diarrhæa: pri-
 mò parti dolenti admoueaturs hoc cataplasma: ℞. parietariæ,
 foliorum iusquiami an. m. ij. farinæ fœnugræci, seminis lini,
 & camomillæ an. p. fiat decoctum, & ex his benè pistis fiat
 cataplasma, addendo olei de papauere, & de camomilla an. ʒ.
 ij. croci puluerizati drachmam vnā, thebaici scrupulum
 vnum, vitellos ouorum numero iij, aut si fortiori egeat auxilio
 narcotico, & simul purgante: ℞. benedictæ ʒ. ʒ. diaphæ-
 nicon ʒ. iij. philonij, Romani ʒ. j. olei camomillæ, & de
 femine lini an. ʒ. ij. misce, & fiat clyster. Rhazes miscet narco-
 tica cū purgantibus. Aliquādo cogimur in vehementissimo do-
 lore exhibere drachmam vnā athanasia, aut requiei magnæ,

Vomitibus
 Somnus
 vitandus.
 Alexi-
 pharmaca.

Qui li-
 brile-
 gendi.

Vtrum-
 que dolo-
 rem cu-
 rantia
 tota sub-
 stantia.

De nar-
 coticis.

Topica.
 Cata-
 plasma.

Narcoti-
 cum pur-
 gans.

Ilei cu-
ratio
an eade
sit.

aut Philonij Romani cum vncijs tribus decocti camomillæ, vn-
cia vna syrupi papaueris. Ileus dolor curatur iisdem ferme au-
liis, quanquam valentioribus, iisque magis per os sumptis quam
per clysterem iniectis; semper tamen uti oportet clysteribus non
tantum mollientibus, sed acribus, ut per loca apta stercore de-
pellantur.

De colico dolore, & ileo. CAP. XXXIX.

Scholium.

Colicus
dolor.

Dolor, qui in intestino.] Dolor colicus ex symptomate &
parte affecta nomen sumpsit, afficitur enim in eo colon secun-
dum ex crassis intestinis, quod incipiens à sede dextri renis, & con-
scendens ad iecoris cauum, hinc secundum ventriculi fundum ad
lienem sedem, & dextrum renem complicatur. Vnde cum dolor secun-
dum ventris longitudinem extenditur, aut ex parte dextra in sini-
stram locum mutat, ut in eo, qui à flatu fit, sine dubio ex situ par-
tis dolor colicum esse colligimus: cum autem in aliqua parte intestini
fixus manet, tunc opus est alia addere signa, aliter enim decipiemur.

Aliqua-
do ne-
phriticū
dolorem
pro coli-
co assu-
mimus.
Discri-
men do-
loris co-
lici ab
ileo.

Cum enim intestinū hoc attingat duos renes, quando dolet in par-
te reni coniuncta, non est mirū existimare nos dolorē nephriticū esse,
videmus enim hac in re Galen. in seipso deceptum. Neque hic error
est periculosus, cum in principio siue dolor sit nephriticus siue colicus,
eadem remedia applicari oporteat, ea scilicet, quæ seddare possunt
dolorē. Hic dolor colicus distinguitur ab ileo ratione doloris, & ra-
tione situs: ob dolorē, quia dolor ilei maior est. Primò, quia fit à
crassiore substantia magis distendēte, nempe stercore indurato: quod
non euenit in colico dolore, quia cum hoc intestinum sit medium
capax, non potest obstrui, ita ut prohibeatur stercoreis descensus. Se-
cundo, dolor est maior, quia membranosius est ileon intestinum, quā
colon. Ex situ doloris etiā distinguuntur ij affectus, quia dolor ilei ma-
net semper in regione umbilici, hoc enim intestinum suis anfracti-
bus ilia & sedem undique umbilico subiectam atque conterminam
implet. Dolor colicus distat à nephritico, quia etsi in utroque vom-
itus sequatur (ob debilitatem ventriculi ex defectu spirituum, qui à
dolorē attrahuntur) maior tamen sequitur in colico, ob viciniam &
continuitatem maiorem cum ventriculo. Tum quia in colico dolore
excrementa retinentur aliquando, ita ut neque flatum, neque ru-
tum emittere possint. Tertiò quia à sumpto cibo exacerbatur dolor
colicus, non autem nephriticus, cum renes longè à ventriculo absint.
Quartò in nephritide dolor est semper fixus, at in dolore colico
aliquando mutat locum. Quintò in nephritide antecedunt urina
alba,

Discri-
men do-
loris coli-
ci & ne-
phritici.

alba, & perlucida, in quibus deinceps sabulosa subsident, quod in Causa colico dolore non euenit. Dolor colicus aut fit à causis, externis aut colici do internis. Externa sunt, alimenta, aër, aut veneni potio, intemperie loris. frigidam generantes. Interna, intemperies frigida ex vitrea pituita orta, intemperies calida ex acri humore flatus distendens, libro de multitudine cupite. 10. aut inflammatio. Si dolor fiat à pituita, cum hac sit glutinosa, infixus erit, ita ut perforari videatur intestinum, neque in eo est sitis. Si fiat à bile, erit dolor acutus, sitis, oris amaritudo, & præcessit bilis retentio. Si ab inflammatione, febris ostendet. Sicut loci mutatio, distentio eum, qui à flatu ortum habet. Aliqui, imò omnes dolorem colicum ex stercore indurato fieri scribunt: quorum sententia aliquibus non placet considerantibus intestini amplitudinem.

Ileos affectus est ilei intestini, à quo eorum, quæ per aluum excernuntur, euacuatio omnino supprimitur. Hæc suppressio in a- Ileos
liis duobus intestinis tenuibus non contingit propter bilem (qua in quid.
his expurgatur) maxime ea intestina irritatam. In intestino verò
ileo, cum ita conformatum sit, ut in suis anfractibus excrementa Ex faci-
ta crassa possint immorari, hanc videmus affectionem contingere, bus retē
non autem in aliquo ex crassis intestinis, ut ex com. 44. libri sex- tis nen-
ti aph. colligimus. Quod si Gal. 3. epy. par. 2. com. 6. hunc affe- fit dolor
ctum aliquando ad crassa referat intestina, intelligendum, id est in crasso
de crassiori parte intestini tenuis, quæ crasso intestino adhaeret. Ex intestino
hac varia partium in intestino consideratione Celsus lib. 4. cap. ex Gale-
14. Ilei duas differentias scribit. Huius symptomatis causa sunt no.
omnia illa, quæ excrementorum descensum impedire possunt, qua- Ilej dolo-
lia sunt magna inflammatio, stercus induratum, & mutatus si- ris causa
tus intestini, qui herniam intestinale efficit. Aliqui addunt quar- Ileos nō
tam causam, crassum scilicet & viscidum humorem, ab eo enim fit à
etiam potest fieri obstructio. Horum sententia non placet Gal. 6. crasso
aph. com. 44. eò quod (ut existimo) bilis flaua per ipsum descen- humore.
dens humorem exterget. Quæ etiam est causa, ob quam ileos etsi
fiat ab stercore indurato, rarò tamen, & cum contingit, id fit ex
esu rerum adstringentium, ut messilorum, aut ex febre adu-
rente, aut ex venenoso pharmaco exsiccante stercus, ut ex auri pig-
mento in socru mea vidit Ludouicus Collado præceptor. Si obi-
eias, Hippocratem in prædicti comentarij sententia sentire, ileon Obiectio
posse fieri ab humore crasso & glutinoso. Respondet Gal. in com.
dictum aphor esse suspectum. Signum ileos proprium est, nil per in-
ferna excerni, quod si exitialis sit, stercus per os educuntur. Ex do-
lore etiā, & tumore in regione tenuiū intestinorū ipsū deprehēdes.

Curatur primò, victu contrario.] Dolor colicus à causis exter- Curatio
nis ortus facile curatur: non ita ab internis, & ideo breuiter eius colici do
P 2 curationem loris.

DE CVRAND. MORB.

*Curatio curationē proponimus. Si dolor hic fiat à pituita vitrea, & non vr-
si fiat à geat, statim non est, quòd discutientibus utamur: quia etsi illa pi-
pituita tuita sit materia flatus, & hi ex ea eleuati dolorem inducant, ni-
& fla- hilominus tamen, cum discutientia medicamenta humorem infla-
tu. tum mutant, augebunt dolorem, ac proinde ab illis abstinendū erit,
& utendū prius illis, quæ pituitam euacuāt: quale est clyster fa-
ctus ex fœniculo, anetho, camemelo, thymo, pulegio, semine lini, cum
rhodomellis ℥. ij. benedicta & hiera picra ana. ℥. ℞. & olei ruta-
cei ℥. ij. Pituita euacuata, sacculas parabimus discutientes fla-
tus, ex fursure, sale & milio. Fomentabimus etiā locum panno im-
buto in aqua & vino, in quibus fœniculū, polium, aut anethū bul-
lierint. Clystere etiā utemur ex oleo cum prædictis herbis decocto
Si à bi- addita pinguedine gallina, aut anseris. Allia, nisi adsit febris, si edā
le. tur, flatum discutiunt sicut & cucurbitula supra partē affectā ad-
mota, qua ob utilitatis celeritatem incantamenti ritu id videtur
prestare. Debemus tamen post cucurbitulam clystere acri euacuare
humorem, si aliquis continetur in intestinis, aliter enim calfaciētes
partē, aut malo victu statim redibit dolor. Si dolor à bile proce-
dat, & non urgeat, curabitur alimentis frigidis & humidis. Cly-
steribus etiam, dummodò non sint acres, ne humoris acrimoniā
intendant, facultas eorum debet esse abstergens, & refrigerans, cui
rei decoctum hordei, cum rhodomelle permixtum conueniet. Et cum
bilis duplicem præstet indicationē, in quantū in colo præter naturā
detinetur, euacuationem, & in quantū acris, contēperationē, unum
enim diuersis modis cōsideratū variē indicat: proinde syrupis gra-
natorum, cydoniorum, & similibus temperata bile, eam purgabi-
mus, ita, ut si multiā voluerimus educere, utamur hiera parata ex
aloë non lota si paucā, ex aloë lota. Ex his intelliges malè auctore,
& alios lupinum stercus, & alia medicamenta toto temperamento
aut proprietate (ut ipsi dicunt) colicum dolorē curantia, describere:
taliam enim non reperiri ostendit affectus ipse habens manifestam
causam. Si obiicias Galenum libro 1. simplicium Respondeo
multoties eum tanquam superstitiosum omittendū in his remediis.*

*Si dolor colicus fit ab inflammatione.] In dolore colico ab
Si ab in inflammatione secanda est vena, ut reuellamus, & euacuemus.
flāma- Vena autem potest esse ea, quæ est in pede, aut brachij basilica, quia
tione. colon. (sicut & renes) in medio corporis pendet positum intra te-
stes & iecur. Deinde supra locum affectum repellentia imposita
sunt ex usu, sicut & alia omnia, quæ ad curationem inflamma-
Curatio tionis applicari solent. Atque hæc est colici doloris, quando non
doloris urget, curatio. Quòd si urgeat, & ab humore acri oriatur, eum
urgentis sedabimus narcoticis medicamentis, quæ improprie anodina ap-
pellantur à Galeno. Clyster ex decocto hordei, & capitibus pa-
paneris*

paueris parabitur. Per os assumemus philonij maioris 3. j. cum decocto lactuca, & fœniculi: hæc enim medicamenta in hoc affectu ex calida causa orto triplici ratione prosunt: Prmo, quia partis sensum auferunt, & ideo dolorem, dolor enim non fit sine sensu: Secundo, quia retundunt acrimoniam humoris: Tertio, quia incrassant tenuē humorē, ne intra mēbranas intestinorū se insinuet. Si obiciās incōmodum (quod est intēperies frigida) ex stupefacientibus medicamentis sequi solitū, tibi satisfaciet Gal. 12. method. melius esse intēperiem ex illis relictam longo tēpore curare, quā breui viriliter mori. Si dolor urgeat, & fiat à pituita vitrea, cauendum à narcoticis est, quia duplicem inducunt noxam prima est, densando tunicā intestinorum viā praecludere spiritui: Secunda est humorē incrassare. His ergo si utaris medicamentis, statim sedabis dolorē, attamen si deinceps calefacientibus cures, ex spiritu aucto dolorem de nouo excitabis, ita ut ad narcotica deuenire cogaris, quod tertio & quarto efficiēs insanabilis affectus auctor eris. Qua omnia docēt hūc dolorē medicū postulare peritū, qui sensim extenuet, & cōcoquat humorē.

Ileus dolor curatur eisdem fermē.] Ileus si fit ab inflāmatione) quod cognoscemus ex febre, tumore apparēte in regione intestinorū, & pulsu) curatur sanguinis missione propter causam sapius dictam. Exteriūs repellentia, oxirrodinum, & alia, quæ applicantur permiscēda sunt cū digerentibus, decocto camemeli fœnugraci, & similibus, quoniā in hoc affectu principiū breuissimum est. Clystere nil infundatur, sed per os ob intestini ilei viciniā cū ventriculo, & ut iuuent descensum excrementorum assumi debent remedia, quæ idē repellere debent, & non adstringere, imō lubricā reddere aluū. Huiusmodi sunt decoctū maluarū, lactuca, scariola, solani sepe trini syrupus rosarum, & violarū. Ptisana in cibo assumpta aluum lubricat, sedat sitim, repellit, humectat, & statim nutrit. Ileus ex stercore indurato emollientia postulat. Partem exteriorē fouebimus decocto lini, maluaui sci, althæa, fœnugraci cū butyro, & axungis, aut oleo solo dulci, aut oleo, in quo semen lini, fœnugracū, aut aliud simile efferuerit: Ungemus etiam eandem partē unguentis de althæa, de agrippa, & aliis emolliendi vim habentibus, ex feruesfacto etiam semine lini cum radice althæa, & oleo, & pauca cera unguentū construere poteris. Emollito stercore (quod tactu deprehēdes) ad eccoprotica medicamenta accedes, quorū vis non transcendit iecur, ut ad cassiam per euaporationē extractā cū decocto maluarū, lini, & fœnugraci. Si hac non proffit, ad maiora deuenies, diacatholicon, cassiam, diaphanicon, diacarthamū, & diaprunis laxatiuum. Quod si neque ex his utilitatē animaduertas, colocynthide uti poteris: ℞. colocynthidis ʒ. iiij. cassia ʒ. j. cū decocto superiori. In stercore vero indurato à veneno, præter ea, quæ diximus, vomitoria medicamenta,

Narcotica in dolore à pituita vitrea vitanda.

Curatio ilij ab inflāmatione Exteriūs Clyster.

Curatio ilij dolore ris ex stercore indurato

Eccoprotica, Vehemēter purgantia.

DE CVRAND. MORB.

Si fiat à camenta, & quæ toto tēperamento veneno aduersantur, conducent. veneno Quando mutatus situs intestini à casu, aut flatu ileos generat stercus quod sensu deprehendes) periculosus est affectus, quoniā statim so- induran let inflāmari intestinū. Hoc restituetur supino collocato homine, & re. digitis comprimentes intestinū. Aër etiam per folles fabrorum per Si à mu- anum immissus sua violentia intestinū in suū locū reponit, quod tato situ remediū etiā vtile est in ileo à fæcibus induratis orio. In ileo à intestini. quacunque causa procedat, semper opus est, faces deponere ab inte- Nota re- stino recto, ne reliquorum excrementorum euacuatio imped. atur. medium.

De inflammatione hepatis. C A P. XLI.

*Inflam-
matio.
hec &
causa ab
aliis pe-
tenda.
Nota.*

Error

Oribasij

INflammatiō in hepate perinde fit, atque in aliis visceribus & ab iisdem causis. Quare quæ diximus capitibus de phrenitide, de peripneumonia, & de pleuritide iterum inspicere, similiter quæ à Paul. libr. 3. cap. 46. in quo multi alij iccoris affectus demonstrantur. Actius quoque de hoc morbo agit lib. 10. c. 3. & Gal. lib. 5. de locis affect. cap. 6. quo cap. omnes ferme huius affectus notas describit, dolorem scilicet dextri hypochondrij, grauitatēque peruenientem sursum ad iugulum vsque, deorsum verò ad costas spuras: Tumor in eodem dextro hypochondrio est, præsertim si gibba pars fuerit inflammata: Acuta febris adest, tussis sicca, difficultas, spiritus, sitis inexhausta, cibi fastidium. Aliquando hepati inflammato singultus aduenit, vt docet vetustissimus Hippoc. aph. 58. lib. 5. non semper, vt inquit in commentario Gal. sed quando ad maximam attollitur inflammationem. Propter neruorum communicationē singultus hic est per consensū vaporis acris, & etiā Error Oribasij Oribasij cōpressio ventriculi ore: errat ergo Oribasius dicens, hūc singultū esse ex inauitione. Aphorismum hunc confirmat. Celsus Latinus, Hippocr. lib. 2. capite 7. dicens frequens singultus & præter consuetudinem continuus iecur esse inflammatum significat. Philotheus exponens finem huius aphor. quod iecore, inquit inflammato sit, non talis, sed singultus, & maximè si simam partem inflammari contingat, cum in inflammatione caliditas ad se ipsam humiditates, quæ in stomacho sunt, trahit, & consumit, & hinc stomachus exsiccat, & ex siccitate consumitur, ad quam conuulsoriam dispositionem singultus fit. Quo in loco Philotheus visus est sequi Oribasium, sed ipsis repugnat Gal. comm. quoque 17. libr. 7. aph. dicens, per consensum os ventriculi ab hepatis magna inflammatione laborare, atque morderi, & singultire certum est. Scire quando pars sima inflammata est, quando gibba, & quando musculi,

musculi, Gal. aperte, & longo sermone cap. 6. lib. 5. de locis affectis demonstrat.

Curatur septem remediorum generibus: primò, victu refri- *Curatio*
gerante, tenui, reddente sanguinem ineptum motui, vt aëre inflama-
tura frigido, vel arte parato, aquis, herbis, & floribus fri- *tionis in*
gidis, lacte amygdalarum, cremore hordei, succo malorum parte ca-
granatorum, cichorea, & lactuca coctis, pane bene loto, & *ua ieco-*
iure pulli gallinacei, si fuerit imbecilla facultas, abstinentia *ris.*
vini, carniū & ouorum, & cæterarum rerum, quæ sangui-
nem augent, & calfaciunt.

Secundò, auertentibus, vt sanguinis missione per sectionem *Remissio*
iecorariæ dextræ, extrahaturque sanguinis quantitas, & nu-
merus respondens plenitudini, & naturæ infirmi, & magni-
tudini morbi. Vbi ætas & vires prohibent venæ sectionem, fiat
sanguinis missio per cucurbitulas admotas natibus, aut scapu-
lis cum scarificatione. Ligaturæ, frictiones, & forus extremo-
rum satis auertunt.

Tertiò, repellentibus frigidis, & stipticis, internis, & exter- *Repellē-*
nis mitioribus, & semper admixto aliquo corroborante parum *tia.*
calido, ne conuersa phlegmone in scirrhum, aut facta obstru-
ctione inter iecur & vesicam fellis, hydrops, aut mors sequatur,
vt sumpto hoc medicamento, aut simili, tertia quaque hora, quā-
titate duarum vnciarum: ℞. syrupi rosarum ex infusione sic-
carum ℥. iij. syrupi endiuæ compos. ℥. ij. aquæ endiuæ, & ci- *Internæ*
choreæ, an. ℥. iij. aquæ eupatorii, aut absinthij. ℥. ij. misce.
Hepati sæpè admoueat vnguentum santalatum, vel cerotum
santalatum tepidum: aut liquor hic remissè calidus, ℞. aquæ ro- *Externæ*
sarum, & endiuæ an. ℥. iij. aquæ absinthij, & olei rosati an.
℥. ij. aceti sambucini ℥. ss. misce, & fiat epithema, quod sæpè
hepati admoueat. Hoc vnguentum repellit satis benè: ℞.
olei rosarum ℥. ij. olei myrtillorum ℥. j. olei de spica, & de
absinthio an. ℥. ss. santalorum omnium, & trochiscorū de cam-
phora an. ℥. j. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum.

Quartò, concoquentibus materiam mixtam ex pituita, & bile *Prepara-*
additis semper astringentibus, partem principem roboranti- *ratio huius*
bus: vt ℞. rhodomellis vncias iij. syrupi rosarum ℥. ij. misce: *moris*
& decocti hordei sine cortice, endiuæ, & absinthij ℥. v. si ma- *mysti.*
gna fuerit copia pituitæ, syrupo de duabus radicibus, & rho-
domelle concoquenda est. Si verò atrabilis mixta fuerit, syru-
po de fumoterræ, de buglossa, & similibus.

Quintò, vacuantibus materiam mixtam medicamentis, *Purgan-*
habentibus mixtam facultatem purgandi bilem, & pituitam *tio.*
vt ℞. diacatholicon. ℥. v. agarici trochiscati, & rhabarbari

DE CVRAND. MORB.

electi infusi per noctem in aqua endiuiae an. 3. j. diaprunis solutiui 3. iiij. syrupi endiuiae simplicis 3. j. aquae borraginis q. s. misce, & fiat potus: aut ℥. pilularum aggregatarum 3. j. fiant pilulae septē. Ex medicamentis, quae pituitam, & bile purgant poteris componere augendo, vel minuendo, habita ratione humoris dominantis. Si verò atra bilis sit mixta cum pituita, aut flaua bile, quae purgant ipsam, sunt miscenda: semper tamen, quae iecur corroborant, adde, ut sunt omnis endiuia, absinthium & spica.

Observa Sed si materia fuerit in gibba hepatis parte, mouentibus urinam uti oportet, ut syrupo capillorum veneris, de liquiritia, de duabus radicibus, & decocto quatuor seminum frigidorum maiorum, & radicum diureticarum in parua quantitate, quia tam purgantia, quam urinatoria medicamenta clementi, & benigna egent, vi, & natura.

Curatio gibbae partis. Sexto, resoluentibus, & digerentibus reliquias materiae sensim, & mixtis stipticis: ut ℥. florum camomillae, meliloti, anethi, althaeae an. p. j. absinthij, m. ʒ. rosarum p. ʒ. spicae, squinanti, & mastichis an. 3. iiij. fiat decoctum in ℥. iiij. aquae ad medietatem: quo percolato utere ad formam foti. Ex his etiam fiat sacculus hepati admouendus, vel oleum camomillae, rosarum & de spica simul calida hepati admouebantur, vel hoc vnguentum: ℥. olei camomillae 3. ij. olei de lilio, de absinthio, & nardini an. 3. ʒ. pulueris squinanti, rosatae nouellae & absinthij an. 3. j. cere quod sufficit, misce, & fiat vnguentum, quo iniungatur hepar.

Resolutio cum astrictione. Septimo, intemperiem calidam à sanguine, & bile relictam corrigentibus internis, ut electuario diatrium santalorum, diarthodon abbatis, conserua rosata, syrupo rosarum, endiuiae simplici composito, & similibus. Et externis dictis tertio genere remediorum. Si phlegmone suppuratur (quod scies autore Hippocrate aph. 47. lib. 2. ex febris, & doloris intensione) coctio & suppuratio iuuari debent cataplasmate ex decoctis ficibus, maluis, bismalua, semine lini, fœnugræco, uuis passis, oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti, vitellis ouorum, & pauco croco. Deinde abcessum motu violēto rūpes, saltu videlicet, tussi, vocibus, sternutamento. Postea tergebis, hoc, aut simili medicamento, si est

Fotus. in gibba parte vlcus: ℥. furfuris cicerum nigrorum, hordei

Sacculus. an. p. j. liquiritiae, radicis petroselini an. 3. ʒ. fiat decoctum:

Olea. de quo percolato accipe ℥. ij. cui adde mellis, & sacchari, an. ℥. ʒ. aceti. 3. j. misce, & fiat ad modum oxymellis. Si verò fuerit in

Vnguentum Alteratio. sima, tergebis cassia, manna, sero caprino, & succo rosarum in

Interna corrigentia. parua quantitate, & aliis aluum deicientibus. Postremo

Externa. vlcus est glutinandum bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, thure, & similibus. Si hepar obduruit,

Suppurantia. emplastro de meliloto, aut filij Zachariae molliatur, aut hoc vnguento:

Ruptio.

Tertio in parte gibba.

In parte sima.

Glutinantia.

guento: ℞. olei sesamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini. an. ʒ. j. mucilaginis fœnugræci, & de semine lini, aquæ bismalux extractæ, an. ʒ. iij. axungia gallinæ, & medullæ cruris vituli an. ʒ. ij. emplastri de meliloto loco ceræ, quod sufficit, misce, & fiat vnguentum: vel ℞. emplastri filij Zachariæ, & de meliloto, an. æquas partes extendantur super alutam ad formam mediæ lunæ, & hepatis admoueat. Vnguentum ad duritiẽ.

De inflammatione iecoris. CAP. XLI.

Scholium.

INflammatione in hepate. [Per iecoris inflammationem intelligimus tumorem præter naturam, siue fiat à sanguine, siue à bile, siue à melancholia, nam à pituita non potest fieri, ut docet Galen. lib. 4. de præf. ex pul. cap. 3. eo quod hæc à iecore concoquitur, & compactam habet viscus substantiam. Quæ ratione fiat inflammatio, ex libro de inæq. intemperie c. 3. & ex 2. de diff. feb. c. de fluxione intelliges. In huius visceris inflammatione, primò distingue, an sit in parte gibba, an in caua, hoc enim maximè conducit ad curationem. Hæc varia hepatis partes inflammata aliquid habent commune, & aliquid proprium commune, habent grauitatem in iugulo inducere, ipsum enim deorsum ferunt quasi pressum: quod ex Gal. 2. de loc. affect. cap. 7. ob venæ cauæ tensionem, magis quàm ob membranas contingit. Vbi si dictionem illam magis, consideremus, intellectum simul habebimus, Gal. non negare ob membranas etiam fieri. Secundo habent communem pulsum durum, qui proprius est inflammationum, à quibus solent arteria distendi: communis etiam ipsis est febris acuta, lingua nigredo, & sitis, sicut & ichores semper ex ipsis resudare. Oportet etiam in his inflammationibus proprium distinguere tempora fluxionis à temporibus concoctionis. Proprium, quod habet inflammatio gibba partis, est tussicula sicca ob septi compressionem orta, si etiam comprimimus iecoris regionem, dolorem excitatum sentiemus. Distingues autem, an inflammatio sit in musculis necne, ex figura partis. Si inflammatio cauam occupet partem, dolor ad intestina verget, ventriculus vomitu bilioso, & multis ichoribus referto, tentabitur, deiectiones erunt cruenta, & singuliùs aliquando apparebit, quod malum signum est ex Hippocrate, quia inflammationis magnitudinem sequitur. Per inflammationem iecoris quid intelligendum.

Curatur septem remediorum generibus.] **V**ictus in hoc affectu debet esse tenuis, & abstergens, ex cichorea, asparagis, prisa, cremore, & oxymelite, omittentes mulsam, quæ detenta bile scit. Tum alimenta adstringentia, pirum, malum cydonium, & malum punicum, cum in caua parte mutantur in sanguinem in inflammatione Locus inflammatio- nis considerandus.

DE CVRAND. MORB.

*gibba partis conceduntur: quæ in sima partis inflammatione la-
dunt constringendo meatus.*

**Sanguinis mis-
sio.** Secundo, auertentibus.] Sanguinis missio non est exercenda pro-
pter plenitudinem, ut auctor voluit, quia bene potest esse iecur in-
flammatum non existente in corpore plenitudine. Cum ergo in in-
flammatiōe sit aliquid fiens, & aliquid factum, sanguinem mit-
timus, ut reuellamus humorem fluentem ad locum affectum, &
evacuemus contentum in ipso. Et quamvis utraque basilica secari
possit, si solam venarum rectitudinem consideremus: consulo tamen
semper secare basilicam dextram, quia hæc præter dictam rectitudi-
nem, alteram habet, qua natura dicitur.

**Repel-
lencia.** Tertiò, repellentibus frigidis.] Si inflammatio sit in parte gib-
ba iecoris, repellentibus in parte exteriori utemur, dummodo non
sint actu frigida, ne ladant iecur: utemur ergo absinthio cum oleo
rosaceo, aut cum aceto. Si inflammatio sit in caua parte, ab his re-
pellentibus abstinendum erit, quia eorum vis eò non penetrat: &
apparente concoctione (quod in incremento contingit) per alium opor-
tebit purgare ichores resudantes, ex inflammatione, ut mercuriali:
in declinatione verò diacatholicon, & electuario de succo rosarum.
**Purga-
tio.** In inflammatione verò gibba partis, in incremento per urinam be-
nigna purgantia utilia sunt, eupatorium scilicet, urtica, & fœnicu-
lum: In declinatione verò vehementissima, inter quæ est assarum.

**Error
auctoris.** Quartò, concoquentibus.] Hoc loco errat crassissimè auctor pur-
gans in inflammatione iecoris bilem, & pituitam indiscriminatim
quasi inflammatio semper ab his humoribus fiat. Quæ autem ra-
tione sit purgandum, paulò superius explicavi, non enim humorem
à toto corpore educere intendimus in hoc affectu, sed ichores ex in-
flammatione resudantes in cavitates venarum iecoris.

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

**Quæ
partes
laborent.** Iecoris venæ tam simæ partis, quàm gibbæ obstructionem
patiuntur: tamen priores frequenter: quod ansam (ut reor)
Actio dedit, illas tantum memorandi: reuera tamen utraq; in
id vitium incidunt, ut obstruantur. Fit autem, ut prioribus id
magis contingat, quòd alimentum ad cauam iecoris partem
crassum adhuc, atque illaboratum perueniat: quam iniuriam
gibba non sentit, & si aliquando sentiat, obturatur similiter: nec
ob hanc solùm causam, sed propter alias quoque, quas tam gib-
**Causa
externa.** ba, quàm caua iecoris pars habent communes. Hæ sunt pro-
catarteticum nonnunquam, ut ictus, casus, aut duræ alicuius
rei ad dextrum hypochondrium collisio. Præterea singuli, aut
alterius cuiuspiam rei arcta constrictio, frigus exterius,
& quicquid suo compressu hepatis venas potuit arctare, ita ut
quasi

quasi conuincant, aut saltem doloris sensu per compressionem excitato eam sanguinis molem attrahant, qua venæ ultra modum repletæ in obstructionem incidant. Sæpe verò internæ, quas Gal. lib. de loc. affect. 5. c. 6. binario numero comprehendit. *Interna* Obstructiones inquit, iecineris fieri vel propter crassos, & viscidos humores, qui à crasso & pituitoso alimento generantur, vel à flatuoso spiritu, cui exitus non patet. Causæ procatarticæ ab ægrotante sunt petendæ. Internæ sic deprehenduntur, *Nota.* si à crassis, & viscidis humoribus obstructio fiat, grauitas in hypochondrio dextro sentitur, si à flatuoso spiritu præter grauitatē, tensionis quoque sensus adest: obstructos pallor totius corporis sequitur, tussis & difficultas anhelitus, maximè si exercuerint seipsum, vel in altiore locum ascendere tentauerint: trahitur enim ad inferiora propter hepatis grauitatem septum transuersum, vnde difficulter anhelat. Porro cum multa sint signa *Curatio* tam obstructioni hepatis, quàm inflammationi communia, febris inter alia solius inflammationis proprium signum est.

Hepatis obstructio, quæ fit à frigidis, & crassis humoribus, *Victus.* curatur quinque remediorum generibus: primò, victu tenuante, calido, & aperiente, non immodico, præsertim ante purgationem: cum in quarto genere valentioribus sit vtendum, vt asparagis, iure cicerum nigrorum, radicum petroselinæ, foliorum raphani, senationum, vel nasturtij aquatici, Hispanis berros, de quo Dioscorides lib. quarto cap. 82. & similium cum carne, & sine carne. Potus sit vinum album aqua dilutum, vel decoctum capilli Veneris, aut ceterac. *Vitanda.* Vitanda sunt omnia alimenta crassioris succi, balnea, coitus, & exercitationes à cibo.

Secundò, celerrimè quia inueterata obstructio non solum in *Præpa-* iecinore, sed in omni corporis parte putrefactionem parit, febrimque accendit, attenuantibus, & incidētibus materia cōco- *ratio ce-* lerrima. *lerrima.* quatur, vt ℞. rhodomellis ʒ. vj. oxymellis simplicis, & syrupi de absinthio an. ʒ. ij. Item ℞. decocti aut aquarum capillorum Veneris, fœniculi, & absinthij an. ʒ. vj. misce, parato humore pituitoso his vel aliis similibus medicamentis.

Tertiò, vacuantibus materiam crassam: vt ℞. diacatholicon. *Vacua-* ʒ. ʒ. diaphanicon, & electuarij indi maioris an. ʒ. ij, ʒ. rho- *tio.* domellis ʒ. j. aquæ fœniculi q. s. misce, & fiat potus: vel ℞. pilularum de agarico ʒ. j. fiant pilulæ septem. Vacuata pituita, hoc *sectio* aut alio medicamento phlegmagogo, de quibus cap. 1. aliqui *vena.* laudant sectionem basilicæ dextræ, vt per eam partē humores *confert* *si agro-* moti facilius educantur, & viæ melius aperiantur, obstructio- *tus sit sã* que bene curetur. Hoc non damno, sed aliquando laudo, præ- *guineus.* sertim si æger sit sanguineus.

Quartò,

DE CVRAND. MORB.

**Obstru-
ctionem
curan-
tia.**

**Interna
simpli-
cia.**

**Compo-
sita.**

**Confe-
ctio.**

**Syrupus
lauda-
tissimus.**

Topica.

**Corro-
boran-
tia.**

**Confe-
ctio opti-
ma.**

**Vnguen-
tum uti-
lissimū.**

Quartò, curantibus obstructionem hanc internis & externis, ut iecore lupi, fumo terræ, absinthio, eupatorio, nostris agrimonia, camomilla, asaro, radice acori, quinque radicibus diureticis, cassia lignea, spica, capparibus, amygdalis amaris, lupinis. Ex his simplicibus, & aliis similibus fieri solent multa composita. Inter quæ leuant ab hac obstructione præclare citra omnem molestiam syr. de byzantiis, de endiuiâ, comp. de duabus radicibus, & de quinque radicibus, oxymel, comp. diacurcuma, dialaca, trochiscus de eupatorio, de rhabarbaro, de absinthio. His ergo multis diebus sumptis curatur obstructio iecoris, præsertim partis gibbæ hoc medicamento vel simili: ℞. diacurcuma, & dialacca an. ʒ. j. trochiscorum de rhabarbaro, & de absinthio an. ʒ. ʒ. pulueris diarhodon abbatis ʒ. ij. hepatis lupi præp. ʒ. iij. quatuor seminum frig. maiorum mundatorum, an. ʒ. ʒ. syr. de scolopendria. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis quolibet die cochlearium vnum cum ʒ. ij. aquæ capillorum Ven. Curat hanc obstructionem ex multorum experientia syrupus hic: ℞. ceterac, capilli Veneris, lapathij, lentis, & rutæ an. m. ʒ. quinque radicum diureticarum, radice acori gladioli, an. ʒ. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ʒ. ij. seminis apij, fœniculi, petroselinij Macedonici, an. ʒ. ij. camædreos, camæpyteos, vallerianæ, an. m. j. hordei mundi, p. j. infundantur radices, & semina per noctem in aceto, & postea fiat decoctum in vino albo, & aqua sufficienti, cui percolato adde mellis. q. s. m. & fiat syrup. Dosis quolibet die ʒ. iij. Bis in die post duas primas concoctiones vngatur hoc vnguento: ℞. succorum apij, petroselinij, fœniculi, senationum, endiuiæ & cichoreæ, an. ʒ. j. aceti ʒ. ʒ. olei. ʒ. iij. bulliant omnia ad consumptionem vsque succorum & aceti: deinde adde santalorum omnium & spicæ, an. ʒ. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum.

Quintò, corroborantibus iecur: ut theriaca magna, mithridato, & trochiscis de rhabarbaro, puluere diarhodon Abbatis ʒ. j. alicuius medicamenti ex his cum aqua absinthij, & endiuiæ multis diebus sumpta corroborat iecur. Hepar lupi, auellanæ, passulæ, & cichorea, & endiuiâ corroborant iecur. Hæc confectio est optima in hepate corroborando: ℞. trochiscorum de eupatorio ʒ. j. trochiscorum de spondio cum semine acetosæ ʒ. ʒ. seminis endiuiæ, cassiæ lignæ, spicæ, cinnamomi, ameos, hepatis lupi, an. ʒ. j. seminis lentis ʒ. iij. rhabarbari electi puluerizati ʒ. ij. ʒ. sacchari ʒ. ʒ. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. ij. cum aqua absinthij, & endiuiæ. Et hoc vnguentum est maximo auxilio: ℞. ceroti santalini ʒ. j. olei de spica ʒ. ʒ. pulueris absinthij, & rosarum, an. ʒ. j. misce.

De obstructione hepatis. CAP. XLII.

Scholium.

Cur in
iecore

IEcoris venæ tam simæ partis. } Iecur pars est instrumentaria
exercens propriam affectionem nempe sanguificationem ex chy-
lo, tanquam ex materia. Chylus autem non continetur in aliqua
insigni cauitate, quoniam eâ destituitur iecur: sed in venis multis,
à quibus tanquam ex radicibus ortum habet vena porta. Orificia
harum venarum in iecoris extremitate adherent orificiis venarum
gibba partis iecoris, ut sanguis in caua partis venis generatus, &
ab excrementis repurgatus, ad gibbam ascendat partem, & inde
ad venam cauam. Cum ergo anostomosis illa venarum angusta sit,
non est mirum, si inter omnes corporis partes iecur magis sit ob-
structionibus opportunum. Obstructio iecoris, morbus est in via, ha-
bens unicam, tantum causam, nempe humorem crassum fluentem,
ut constat ex 8. de comp. secundum locos cap. 6. & lib. 5. de loc. affec.
cap. 6. unde mirandum est de his, qui practicas ediderunt, alteram
causam iecoris obstructionis ad flatum referentibus, & quod ma-
gis est, Alcomarius id probat ex Gal. supradicto loco, cum nec id
somniauerit, & repugnet rei nature. Quod autem hac non sit sen-
tentia Gal. manifestè patebit eum locum legenti, in quo postquam
scripsit iecur pati morbos in intemperie nuda, & cum fluxione, ut
in erysipellate, schirro, & flatuosa distentione, pati etiam obstru-
ctionem à crassis humoribus addit. Signum obstructionis est graui-
tas in dextro hypocondrio, quod si in eo præter grauitatem sit tensio,
una cum humore erit ibi inclusus flatulentus spiritus. Hæc Gal. Ex
quo loco, si animum aduertis, nunquam colliges ipsum existimare
spiritus esse causam obstructionis, sed si cum obstructione sit fla-
tulentus spiritus tensionem sentiri. Dices, cur in obstructione iecoris
non est semper febris coniuncta, cum obstructio sit causa putredinis?
Respondeo in iecore esse multas venas, & idè humores dissilari,
quod si aliqua est putredo exigua tamen, ita, ut vapores ex ea ele-
uati non sufficiant ad generationem febris. Curationem huius affe-
ctus lege apud auctorem, solum animaduertas velim, ictum, ca-
sum, dura alicuius rei ad dextrum hypochondrium collisionem, &
cinguli constrictionem, quæ inter causas externas connumerantur
ab auctore, non esse causas: quia ictus casus, & constrictio, si violent-
ter fiant, & constringant iecur, sanguinem expriment, non autem
obstruent, cum non habeant vim generandi crassos humores, sicut
nec cingulum. Præterea iecur Lupinum permiscet in compositioni-
bus de obstruentibus iecur, existimans toto temperamento operari, re lupi-
Quod non probatur à Gal. lib. 1. simpl. c. de iecore lupino. Fortasse no-
ad-
adductus fuit ex eodem Galen. qui lib. 8. de comp. secundum locos cap. 7. uerte.
iecur

frecuen
ter fiat
obstru-
ctio.Quis af-
fectus
sit.Error
Alcom.
auctoris,
& alio-
rum.Obie-
ctio.Cura-
tio.Auctor
reprehen-
ditur.De ieco-
re lupi-
ad-

DE CVRAND. MORB.

hec lupinum toto temperamēto hepaticis conuenire scribit, non animaduertens Galenum eo in loco non proponere medicamēta toto temperamento hepaticos iuuantia, sed postquā scripsit multa medicamenta ex Asclepiade ad hepaticos, addit ipsum scripsisse pharmacū ex cochleis tritis cū vino, quod toto temperamento iuuat sicut & lupinum hepar non una aut altera qualitate. Vbi Galenus hac toto temperamento iuuare scribit, quia sunt alimenta, quae eadem ratione paulo supra uas passas visceri secundū totam substantiam familiares esse docuit.

De Ictero. CAP. XLIII.

*Quid
icterus.*

*Error
quorundam.*

*Causa
interna.*

*Icteri
nigri
causa.*

Quotiescunque vniuersi corporis color propter bilis, aut flauæ, aut porraceæ, aut nigrae effusionem immutatur, malum fit, quod Græci icterum appellant, Latini regium, & arquarum, & originem ab iis, quæ tum in morbo, tum in eius curatione accidunt, appellatione sumpta, quod longum esset referre. Porro errant, quicunque vitreo tantum hepatis hanc affectionem putant provenire: sæpè enim nihil patiente iccinore, saltem primaria affectione, icterus oboritur, nonnunquam ex indicio naturæ, quoties in febribus bilis vniuersa ad cutem deferitur. Qui si ante septimum appareat, malum est signum iuxta aph. 62. sect. 6. Si verò post septimum, non perpetuò bonum, præsertim si dextrum hypochondrium obdurescit, vt ex aph. 64. sect. 4. colligitur. Interdum ex venenatorum animalium morfu, vt Imperatoris cuiusdam seruo contigit, qui ex viperæ ictu, quarum viperarum venatio ipsi commissæ erat, ictericus est effectus, nimirum colore totius corporis prasinæ, aut si maioris porraceam bilem referente: vt fusius Gal. ait 5. de locis affect. cap. 7. sæpè tamen hepatis occasione fit, vel quia inflammatum fit, aut intemperie calida laboret, aut obstructione. Accidit quandoque ob imbecillitatem (vt ait Aëtius) vesicæ bilem excipientis, quæ biliosum humorem, veluti consuevit, in sese ex hepate non attrahit, idèoque impurū sanguinem relinquit. Fieri etiam potest, vt ipsa nimium repleatur, & propter repletionem multam non euacuetur. Magna tamen ex parte contingit hic morbus ex obturatione, aut debilitatione venarum, quarum ora ex ipsa ad hepar feruntur, aut illius meatus, qui bilem ad intestina effundit. Sed neque illud tacendum erit, quod lien quoque ictericam affectionem parit, illam inquam, in qua tota cutis nigro colore inficitur, quod accidit: aut quia ab ipso liene hepar non benè purgatur, aut seipsum purgare per solitos canales non potest: vtrunque verò, vel propter imbecillitatem aliquam, aut obstructionem fit.

fit Præter iam dictas causas à procatarctiis quoque generatur, *Externæ*
 vt ab immoderata exercitatione, rerum calidarum vſu, & aëris
 ambientis calida intemperie. Vnde in Sardinia ex aëris corrup-
 tione ſcribunt quidā, ineunte æſtate, aut in autumnō in hanc
 affectionem incidere indigenas ferè omnes exceptis iis, qui
 propter robur tēperamenti, aut alia de cauſa reſiſtere malo
 poſſunt. Cæterum ſi à cauſis procatarctiis icterus contingat, *Nora.*
 aut, ex venenatę ferę morſu, interrogare egrū tantū conuenit,
 aut aeris naturā conſiderare. Aliarum cauſarum ſigna nunc do-
 cuimus. Si igitur ex indicio naturę factus ſit arquatus morbus,
 tam vrina, quā alui excrementa à naturali modo non rece-
 dunt ſi ab inflammatione hepatis, febris adest, & dextri hypo-
 chondrij, grauitas, & deiectiones ſunt bilioſæ. Si ab intemperie,
 citra grauitatem furor in eſt. Si ab obſtructione citra graui-
 tatem vnā cum grauitatis alicuius ſenſu circa dextrum
 hypochondrion alui excrementa alba deiiciuntur. Si ab
 imbecillitate facultatis, vel attractricis, quæ bilem ab hepate
 trahit: vel expultricis, quæ ipſam ad inteſtina expellit citra gra-
 uitatem, & ſtercora alba ſunt, & vrina bilioſiſſima. Denique ſi
 à vitio ſplenis contingat, quod genus icteri atrum appellant: ſit
 enim ab atra bile vnā cū ſanguine ad cutem delata, grauius
 multo afficiuntur, conſequitur enim eos (vt inquit Aetius li.
 x.c. xvij. cuius placet verba referre) triſtitia præter rationem, &
 mordacitas eorum, quæ circa ventrem ſunt, difficultasque ſpi-
 randi. Cibos auerſantur, & nigrum lotium excernunt: Aliquan-
 do autem & per interualla quædam corpora ipſorum repeſcūt,
 ſtercora verò chalcanti colorem referunt, & aluus magis his
 exſiccatur. Cæterum eos, qui ex pallida bile arquatum contra-
 hunt, nulla mordacitas eorum, quæ circa ventrem ſunt, conſe-
 quitur: neque etiam tantum auerſantur cibos, ſed obtuſior ali-
 quando ſit in iis ciborum appetitus. Et ſtercora quidem albida
 egeruntur: vrinæ autem crocei coloris, turbatæ tamen, & te-
 nebras referentes permanent. Signa prætereà omnibus icte- *Signa*
 ricis communia ſic Aetius ſcribit. Communiter autem omni- *commu-*
 bus ictericis pigritia ad motum corporis accidit, & à dulcibus *nia.*
 cibis ſunt animo alieno: amaros verò non admodum auerſan-
 tur: & variis imaginationibus vexantur: Pruritus etiam vniuer-
 ſi corporis comitatur, & difficulter exudant, porro alba oculo-
 rum, & partes faciei temporibus propinquæ, itémque malæ
 pallorem oſtendunt. Venæ etiam ſub lingua repletæ reperiun-
 tur, & abundantem humorem ſignificant.

Curatur icterus criticus quatuor generibus auxiliorum: *Curatio*
 quamuis ſi perfectæ fuerit criſis permutationis, nihilque bilis icteri
 interius remaneat, ſola cutis infectio, & intemperies eget *critici*
 curatione.

DE CVRAND. MORB.

curatione. Sed aliquid intus fit, & hepatis & venarum intemperies calida fuerit. Primò, curatur victu refrigerante, & humectante, vt cremore hordei, endiuiæ, cichorea, lactuca, & similibus. Et aqua hordei, aut vino albo benè aqua diluto.

Præparatio.

Secundò, apparantibus bilem: vt syrupis endiuiæ simp. & compos. granatorum, violarum, nenupharis, acetositis limonum, & citri, cum duplo aquarum, vel decocti cichoreæ, endiuiæ, lactucæ, portulacæ.

Vacuatio.

Tertiò, vacuantibus bilem: vt cassia fistula, manna, tamarindis, rhabarbaro, & aliis cholagogis: vt ℥. medullæ cassiæ fistulæ recens extractæ & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabarbari in aqua endiuiæ per noctem factæ. ʒ. iiij. cum ʒ. iiij. squinanti diaprunis solutiui ʒ. iiij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ borraginis q. s. misce, & fiat potus, vel, si malit pilulas: ℥. pilularum de

De sectione vena.

rhabarbaro ʒ. j. fiant cum aqua endiuiæ vij. pilulæ. Si toti corpori est communis intemperies, aut æger iuuenis, & carnosus venæ iecorariæ dextræ sectio est necessaria, extrahaturque sanguinis copia respondens naturæ ægri & morbi.

Alteratio.

Quartò, tolleatibus intemperiem calidam hepatis internis, & externis medicamentis, dictis tertio, & septimo genere remediorum cap. 41. de curatione inflammationis hepatis.

Curatio icteri ab obstructione crassi humoris.

Si verò icterus est ab obstructione per crassam bilem, aut pituitam, quatuor remediorum generibus curatur. Primò, victu tenuante, aperiente, & calfaciente: minùs si à bile est quàm à pituita, vt alimentis, & aliis iam dictis cap. præced. de hepatis obstructione.

Præparatio.

Secundò, apparantibus materiam, vt syrupis, & aquis, incidentibus, tenuantibus, & aperientibus, primò mitioribus, vt dictum est cap. præced. secundo auxiliorum genere.

Vacuatio.

Tertiò, vacuantibus bilem crassam, & pituitam ei admixtam: vt medicamentis dictis cap. præced. tertio auxiliorum genere.

Section vena.

Vena secatur quoque basilica, vel salua tella media inter anularem, & minimum dextræ manus digitum, si fuerit iuuenis aut bilis, vel pituita sanguini mixta per eam humores hepatis fixi agitantur, faciliùsque obediunt medicamentis leuantibus obstructionem.

Aperientia.

Quartò, aperientibus meatus, vt medicamentis dictis secundo, & quarto genere remediorum capit. præcedent. 42.

Simplificia.

ʒ. iiij. aquæ, vel decocti foliorum raphani, aut eupatorij, aut prafij, aut matris syluæ matutinis quinque, vel septem sumptæ sanant icterum. ʒ. j. pulueris lumbricorum terrestrium tribus matutinis sumpta, vel pluribus cum vino albo, & saccharo saporis boni gratia sanat icterum, vel fiant, pilulæ au-

ro intestæ ex eodem puluere lumbricorum cum syrupo de byzantiis. Idem præstat stercus canis ossibus tantum nutriti, serum capræ nutritæ herbis aperientibus vt fœniculo, apio, petroselino, senationibus & similibus factum cum semine carthami, quantitas carthami ʒ. ʒ. ad lb. iij. lactis. Sanant quoque icterum aperientia hæc, dialacca scilicet diacurcuma à ʒ. ij. ad iij. & trochisci de rhabarbaro, de eupatorio, & de ablinthio ad ʒ. j. cum aquis prædictis aperientibus, sæpè mutata remedij forma, & specie, vt in asthma, & cæteris affectibus diuturnis: ne natura vni assuescat. Decoctum caprifolij, scolopendriæ, hepaticæ, capil. Veneris, & quatuor seminū frigidorum maiorum septem matutinis sumptum curat icterum, præsertim si postea sumatur hic potus tribus matutinis. ℞. feri caprini lb. j. rhabarbari electi ʒ. ij. pulpæ coloquintidæ, spicæ nardi ana. ʒ. j. sacchari rosati, & violati ana. ʒ. ʒ. misce, & fiat potus. Quidam tempore Arnaldi de Villanova multos laborantes ictero sanauit hoc medicamento, vacuatione per sudorem & vrinam. ℞. stercoris asini recentis pugillum semis, vini albi odoriferi ʒ. iij. misce. Color flauus cutis, & oculorum tollitur mouentibus vrinam prædictis medicamentis aperientibus, & balneo ex decocto camomillæ, meliloti, althææ, & similium aut sulphureo aëre calido, & aliis omnibus aperientibus poros. Conferunt oculis sternutamenta, forus camomillæ & parum croci in aceto, quamuis antequàm appareat icterus, oculis aqua rosacea sit admouenda, vt in variolis & morbillis fieri solet. Si alia remedia & omnia fermè scripta à grauissimis doctoribus scire cupis, lege c. 5. ferm. 5. tract. 6. Nicolai Florentini. Si icterus niger est, vt præcedens curatur. sed remediis valentioribus, & melancholiæ debitis, de quibus in affectibus lienis dicemus, c. scilicet 45.

Compo-
sitæ.

Historia

Color
flauus
quibus
tollatur.

Aqua
rosacea
oculis
admo-
uenda.
Icteri
nigri cu-
ratio.

Scholium.

Quotiescunque vniuersi corporis.] Morbus regius (qui plura habet nomina, & vulgò dicitur aliacra) nil aliud est quàm effusio biliosi humoris per vniuersum corpus. Vbi per bilem non solum flauam intelligas, sed & eam, quæ præter naturam est: ex morsu enim animalis solet fieri icteros, bile porracea per corpus effusa, sicut in iudiciis morborum bile vitellina. Morbus regius, icteros à Græcis dictus, symptoma est in affectu corporis, est enim color vitiat, seq. alterum symptoma, nempe vitium exercementi: quod etiam ex altero symptomate dependet, nempe ex actione lesa.

Icteros
quid.

Quis af-
fectus
sit.

DE CVRAND. MORB.

Morbus.
Varia.
icteri
causae.

Qua male separat, aut non separat bilem: vel ex actione corporis deprauata, cum in toto eo multa bilis generatur. Aliquando tamen icteros non sequitur morbum, sed natura robur, quando in crisis apparet. Morbus ad quem hac actio lesa sequitur, varius est: nam aliquando est instrumentarius, aliquando similis. Hoc intelligemus, si varias icteri causas ex Gal. lib. 5. de loc. affic. cap. 7. in hunc locum transferamus. Prima est natura, qua in crisis ad cutem humorem peccantem expellit. Secunda sanguis ita corruptus, ut mutetur in bilem porraceam: quod contingere solet ex veneno in corpore genito, aut exterius inflicto, ut Imperatoris seruo ex vipera morsu accidisse scribit Gal. Tertia intemperies calida iecoris multam bilem generans, qua tota, cum non possit expurgari à vesica bilis, una cum sanguine ad partes delata eas colorat. Quarta est intemperies calida totius corporis bilem ex tenui parte generans. Quinta obstructio iecoris in meatu, qui ex iecore defert bilem ad vesicam, aut illius, qui ex vesica eam ad duodenum intestinum expurgat. Sexta inflammatio iecoris. Septima scirrhus iecoris: quae duae causa media obstructione impediunt, quominus vesica bilis attrahat bilem. Sunt autem haec causa distincta ab obstructione, quia sine his obstructio sola potest morbum regni efficere. Octava imbecillitas vesicae bilis orta ex aliqua forti intemperie, ob quam non recte attrahit bilem. Vltima vero causa est immodica quantitas bilis in vesica coaceruata, impediens quominus (à magna distentione vesica impedita) possit contrahi: quod in vesica lotij lib. 3. de caus. symp. aliquando accidere scribit Gal. Ex his facile intelliges hoc symptoma ictereos appellatum, sequi varios morbos. Quorum unus est intemperies manifesta, à qua icteros ex imbecillitate vesicae, aut iecoris & totius corporis calore contingit. Alter est intemperies occulta à qua icteros ex veneno fit. Tertius est morbus in via, qui icterum ex obstructione, inflammatione, & scirrho generat. Inter hos morbos obstructio, inflammatio & scirrhus mali sunt, non ita intemperies: ac proinde cum ante septimum diem in febribus icteros apparet 4. aph. com. 62. malum significat, hoc est aliquem ex illis tribus affectibus. Quod si post septimum diem ex aliquo praedictorum affectuum appareat, etiam malum est. Si vero sine affectu aliquo in febribus post septimum diem in die decretorio eueniat, bonum est, ex 4. aph. sent. 64. Si critice fiat morbus regius, tunc solam euacuare oportet bilem, qua est in habitu corporis, & intemperiem calidam (et si morboza non sit) in ipso corrigere, quod balneo comode prestabit. Si venenum causa sit, alexipharmacum exhibebis illi veneno contrarium. In ictero ab intemperie calida aut obstructione orto sanguinem mittes, nam reuelles, & una cum

cum sanguine prauo partem humoris euacuabis, & deinde efficies ea, quæ auctor docet. Si icteros ab inflammatione ortum habeat, lege caput de iecoris inflammatione. Si ab scirrho eueniat (quem tactu cognosces) sanguinem mittes, ut sanguinem educas prauum, vteris syrupis inscindentibus, & emollientibus inunctionibus, miscens semper ea quæ robur seruent visceris: quod perpetuò faciendum est in affectibus partium, quæ actionem habent toti corpori necessariam, quales sunt iecur, ventriculus, & lien.

DeHydтопе.

CAP. XLIV.

HYdrops omnis vitiato hepate, & in frigidam intemperiem perducto oritur. Neque enim quod dudum de ictero dictum est: nempe non semper vitiato hepate fieri, id quoque de hydrope dici poterit. Quicumque enim hydrops hepatis vitium causam habet, siue illud per primariam affectionem, siue per consensum aliarum partium nascatur. Negari enim non potest aliarum quoque partium occasione, cum scilicet vehementer fuerint debilitatæ, hydropem oriri: non tamen ob id fateri cogimur intacto hepate tale quippiam contigisse, cum eam affectionem, nisi ipsum in sui consensum illæ vocassent, nunquam potuissent inducere. Sunt autem in vniuersum hydropis, seu aquæ inter cutem tres species, quarum primam Græci Ascitem, secundam Tympanitem, tertiam Anasarcam, hypofarcam, & leucoplegmaticam appellant. Ascites, quam Barbari corrupto vocabulo ascitem nominant, fit ab humore aquoso cum perexiguo spiritu inter peritonæum, & partes sibi subiectas coaceruato: sic dicitur Græcis, quod utrem aqua plenum ea pellicula referre videatur, ascos enim Latinè utrem sonat. Tympanites accidit, quoties in prædictis locis multus spiritus flatulentus modico humori commixtus includitur. Sic affectis venter tympani instar sonitum, si percutiatur, edit, vnde malo nomen inditum est. Hypofarca contingit, cum vniuersa corporis moles prætumida est, & spongiæ instar laxa, & madefacta propter frigidum & pituitosum sanguinem per vniuersum quidem corpus diffusum, non tamen unitum. Omnis hydrops, ut suprà dictum est, vitio contingit hepatis, aut per primariam affectionem, aut per societatem affecti: per primariam affectionem, vel quia inflammatione, scirrho, aut obstructione laboret, quando per has, aut similes affectiones impensè refrigeratur: per societatem autem aliarum partium, ut lie-

*Quid
hydrops*

*Species
hydropis*

*Ascites
vnde.*

Tympanites.

Anasarca.

DE CVRAND. MORB.

his, ventriculi intestinorum maximè gracilium, pulmonis, renū, & septi transversī. Ex immodica præterea hæmorrhoidum euacuatione, aut menstruorum, & eorundem retentione, & ex quocunque alio vteri affectu, si ingens fuerit, hydrops contingit: in omnibus enim his affectionibus ex sola hepatis frigidityte hydrops nascitur non secus, ac solet oriri, quoties ob intempestiuam refrigerationem iecur valde refrigeratur: tunc enim antequam in tumorem scirrhusum attollatur, aqua intercutem sequitur: magna tamen ex parte euenit iis, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, & ictero infestantur, aut dysenteria, aut colica affectione. Generaliter omnibus hydropicis spirandi difficultas adest, & tumor, & grauitas, & vitiatu color ex virore, vt inquit Aëtius, albicantibus ægris. Fastidiunt ad hoc cibum, qui sic affecti sunt, potu autem impleri quàm maximè appetunt, præsertim qui ex ascite laborant. Humor enim, qui intra peritonæum includitur cum & salsus sit, & putris inextinctam sitim excitat, quam febris, vt plurimum sequitur: traditis generibus, his notis distinguere inuicem hydropis species conuenit. Anasarca ab ascite, & tympanite in hoc differt, quod in anasarca tam supernæ, quàm infernæ omnes partes tumidæ apparent. Et si digito comprimitur, cauæ remanent, in tympanite verò, & ascite superiora omnia gracilia sunt, inferiora autem inflata, & vmbilicus eminens. Ascites à tympanite in hoc distinguitur: quòd in ascite venter agitato non alium reddit sonum, quam solet vter, vbi aqua semiplenus agitur, in tympanite verò, qualem supra diximus.

*Com-
munia
signa.*

*Diffe-
rentia.*

*Cura-
tio ana-
sarca.*

Anasarca curatur quatuor remediorum generibus. Primò victu calido, & sicco: vt aëre æstiuo natura vel arte parato, fuga frigidi, & humidī, qualis est pluuiālis, & nebulosus: paucō cibo, & raro, facili concoctu ob facultatis naturalis imbecillitatem: & tenui potius quàm crasso, vt pane biscoto, carnibus auium montanarum, & herbis diureticis: vt fœniculo, asparagis, & senationibus, cinnamomo, zingibere, caryophyllis, pipere, aniso, vino albo, & paucō. Si vires valent, exercitatio, quæ sudorem excitet, est saluberrima. Quare semper tergendum, aut vice eius frictio multa, mollis, & mediocris, vigiliæ, & affectus animi exsiccantes vtilēs sunt, nisi deficient vires.

*Præpa-
ratio.*

Secundò, apparantibus pituitam per totum corpus sparsam: vt rhodomelle simp. syrupo de hyssopo, de duabus radicibus, oxymelle composito, & syrupo de quinque radicibus cum aquis aut decocto herbarum calidarum, & quæ pitui-
tam

tam parent. Tertiò , vacuantibus pituitam per medicamenta phlegmagoga , aliquando tamen , utilis est sanguinis missio, si ex mensibus , aut hæmorrhoidibus suppressis fiat , nunquam alias nisi æger esset maximè sanguineus , & iuuenis , sanguisque pituitæ esset permixtus , sed semper parcè extrahatur sanguis , ne iecur imbecillus reddatur, & cuius imbecillitate fit. In primis duobus affectibus venæ tibiarum, aut pedum sunt secandæ in tertio vena hepatis : sed in hoc affectu cautè sanguis est mittendus. Sint medicamenta purgantia in hac , & omni specie hydropis ; benigna , & quæ hepar non lædant : vt agaricus , hiera simp. diaphænicon : vt ℞. diaphænicon. ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. j. β. rhodomellis ʒ. j. aquæ fœniculi quod s. misce , & fiat potus : vel ℞. pilularum de hiera simplici ʒ. ij. agarici trochiscati. ʒ. j. fiant cum aqua absinthij pilulæ viij. vel ℞. hieræ simplicis ʒ. j. frequens vsus & longus simplicis est utilis & necessarius huic , & omni speciei hydropis. Vacuatur quoque materia hæc diureticis , vt syrupo de duabus , radicibus , de quinque radicibus , aqua vel decocto quinque radicum diureticarum , vel prasij. Cantharides à quibusdam laudantur in hac , & ascite , sed vitandæ sunt, quia potenter vesicam vlcérant , & hepati multum nocent. Materiam hanc resoluunt , sol æstius incidens in nudum corpus , aut arenæ calefactæ sole, aut igne , focus ex vino , & rebus calidis, suffitus per lapides ignitos ex decoctis in vino , foliis lauri, camomillæ , ruta , rore marino , origano, salvia, pulegio, & similibus. Balneum salsum , aluminosum , aut sulphureum, naturale & artificiale mirificè prodest.

Quartò , tollentibus dispositionem hepatis , & causam anasarcae, vt obstructionem hepatis , aut duritiem remediis dictis cap. 24. de obstructione hepatis , & contrariis sanantibus intemperiem frigidam simul , & obstructionem , & corroborantibus : vt dialaccâ , diacurcumâ , trochiscis de absinthio , de rhabarbaro , de eupatorio cum puluere rosatæ nouellæ , aut diarrhodon Abbatis , si calida intemperies timeatur. Tympanites curatur quatuor remediorum generibus. Primò , victu calido , & sicco flatus resolvente , & fame, siti , exercitatione, pane biscocto , & cum aniso , & fuga eorum omnium , quæ flatus gignunt : vt sunt legumina herbæ frigidæ , & crudæ, pisces , & similia.

Secundò , apparantibus pituitam , vt rhodomelle , & aliis dictis superius hoc cap. de curatione anasarcae , quamuis in hac specie sit minùs necessaria euacuatio , quàm in anasarca, & ascite , in quibus multa est copia humoris , & pauca flatus,

*Vacuatio.
Sectio
vena.*

*Quare
vena se-
cunda.
Purga-
tio.*

*Laus
hiera
simp.
Cantharides im-
proban-
tur.*

Alteratio.

*Curatio
Tympani-
tis.
Victus.*

*Prepara-
tio.*

*Observa-
discrimine*

DE CVRAND. MORB.

in Tympanite verò plus flatus est, & minus humoris.

Vacua-
tio.
Historia
mira.
Resolu-
tio.
Pulvis.
Sacculi.
Cucurbi-
tula.
Cata-
plasma.
Alter-
atio & cor
roboatio.
Curatio
ascita.
Victus.
Prepa-
ratio.
Purga-
tio.
Duo ne-
cessaria.

Tertio, vacuantibus materiam frigidam, vt agarico trochif-
cato, hiera simp. benedicta, & similibus tam per os sumptis
quàm per clysterem iniectio. Quidam medicus doctus & senex
curauit pilulis mezereon sacerdotem quendam senem tympa-
nite laborantem. Flatum resoluunt balneum sulphureum, sal-
sum, arena calfacta sole, aut igne fofus, & suffitus per lapides
ignitos, & alia dicta tertio genere remediorum superius hoc
capite. Pulvis hic optimè resoluit flatum, vt ℥. anisi, ane-
thi, seminis foeniculi, carui, cymini, origani, cinnamomi,
gariophyllorum an. ʒ. iij. sacchari ʒ. 3. misce, & fiat pulvis.
Dosis cochlearium vnum ante cibum cum vino, & summo ma-
ne. Diagalanga, diamofcus, theriaca magna, mithridatum,
diatriumpiperon, diacyminum, & similia resoluunt & eua-
cuant flatum. Sacculi quoque ex sulphure, sale, milio, camo-
milla, kalendula, origano, pulegio, anthos & similibus ven-
tri actu calidi admoti dissipant. Cucurbitula magna flammâ
multâ vmbilico affixa valenter resoluit. Hoc cataplasma po-
tentissimè discutit flatum multis diebus ventri admotum: ℥.
stercoris vaccini, columbini, & caprini an. p. j. pulueris cymini,
carui, ameos, baccarum lauri, origani, rutæ syluestris, & anthos,
an. ʒ. ʒ. s. sapæ, q. s. misce, & fiat cataplasma, adde aquæ vitæ
vncias duas.

Quarto, & vltimò, tollentibus hepatis affectionem, mali cau-
sam per contraria, & corroborantibus hepati, de quibus dictum
est superius quarto genere in curatione anasarcae, & de his di-
cemus in curatione ascitæ.

Ascites curatur quatuor auxiliorum generibus. Primò, victu
calido & sicco dicto initio huius capitis. Carnes semper sint
faciles coctu, & boni sanguinis, & magis tostæ, quam elixæ.

Secundò, apparantibus humorem aquosum & corruptum.
vt ℥. syrupi endiuixæ compositi, & de scolopendria an. ʒ. ij.
rhodomellis ʒ. iij. misce. Item ℥. decocti, vel aquarum ab-
sinthij, foeniculi, & capillorum veneris an. ʒ. iij. misce parato

humore hoc, vel simili medicamento. Tertio, vacuantibus a-
quis excitantes hydropem, primò purgatoriis non valentibus,
& nocentibus iecori, vt fero lactis caprini, aut ouini, agari-
co, myrobalanis citrinis, & Kebulis simul, puluere hieræ sim-
plicis, vel hiera simplici, succo, aut puluere brasicæ marinæ

(quam vulgus sedanellam, Arabes cachitam vocant) citra mole-
stiam purgante aquam, & hepar roborante: quæ duo sunt
summè necessaria ad curandum hydropem. Dosis est à ʒ. ij. vs-
que ad ʒ. quatuor, & ego exhibui drachmas septem frequenter
manè

manè laboranti hoc genere hydropis, & fœliciter successit. Aliquando hic morbus ob sui vehementiam eget valentioribus purgantibus, etiam si ab iis iecur lædatur: inter quæ succus radicis ireos: dempto sedimento ab omnibus laudatur. Dosis à sedrachmis duabus vsque ad drachmas tres semel in hebdomada, dummodò inter has vacuationes valenter iecur corroboretur puluere diarrhodon Abbatis, vel trochiscis de rhabarbaro, vel syrupo de absinthio, vel puluere hepatis lupi, vel alimento ex vuis passis, ex auellanis, & ex limacibus. Hoc succo ireos multi hydropici deplorati fermè sanati sunt.

Pilula de serapino, de euphorbio, & mezereon potenter purgant aquam, sed molestè & violentè, quare iis non nisi raro, & exactè vtendum est. Dosis est ab scrupulis duobus vsque ad drachmam vnā. Succus quoque cucumeris agrestis siccatus, quem elaterium vocant, potentissimè purgat: & omnium maximè durat, autore Plinio, seruatur enim centum annis integer. Sauonarola medicus sua ætate celeberrimus dabat scrupulum semis huius succi siccati mense Augusti, & mixti cum speciebus elephanginis reductis in pilulas cum succo absinthij, & multos curauit hoc medicamento. Syrupus hic ex decocto radicis cucumeris agrestis est efficax in curatione hydropis & ascitæ, & eruditissimus doctor meus Iacobus de Leon Compluti Architielinum illustris Comitis de Salinas hydropi cum confirmatum curauit. ℞. radicis cucumeris syluestris ℥. iij. decoquatur in libris duabus aquæ, da dimidium, deinde accipe mellis libras duas, aquæ libras octo, bulliant per se ad dimidij vsque consumptionem, cui percolato adde ℥. j. decocti radicis cucumeris syluestris percolati quoque, & fiat syrupus, addendo in fine pulueris dragraganti vnciam vnā, cinnamomi electi drachmam vnā: Dosis quolibet mane cochlearium vnum. Medicamentum benè paratum ex cantharidibus in maxima hydrope, tam ascite, quàm anasarca, ex purgat per vrinam valenter aquosum hunc humorem, sed iis non vtendum, nisi cum alia non contulerint.

Valescus tamen de Taranta vir doctissimus & magnæ experientiæ hoc medicamento multos laborantes, & Anasarca, & Ascite sanitati restituit. Castigantur cantharides abscissis capitibus, & pedibus, non alis (vt quidam malè docent contra Hippocratem & Plinium, & veritatem) accipe ergo vnā cantharidem absque capite & pedibus, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum an. ℥. seminis sacchari candi violati ℥. ij. gummi crassi, vel dragraganti ℥. vj. misce, & fiat ad modum pulueris. Dosis est vncia vna summo mane:

DE CVRAND. MORB.

*Vesica
defensio.
Vis can-
tharidii
quanta
sit.
Purgan-
tia per
vrinam,
& iecur
corrobo-
rantia.
Historia
Alter
non mi-
nus insi-
gnis.
Lac an-
noceat
hydropi-
cis.
Clyste-
res lau-
dantur.
Clyster
optimus.
Pilula.*

sed defende vesicam admo-
uendo ei lac caprinum, vel doleum
rosatum tepidum : autore enim Aëtio cap. de dolore capitis,
sexto sermone, cantharides capiti admo-
tae nocent vesicae, &
quod magis incredibile videtur, quidam chirurgus Medio-
lanensis bis sanguinis profluvio correptus fuit per urinam so-
lum, portando cauterium ex cantharidibus in Byrsa. Tria gra-
na alkekengi in pulverem redacta cum vino albo curant hy-
dropem, vacuando per urinam. Quae per urinam clementer pur-
gant, & corroborant iecur, sunt diacurcuma, dialacca, & tro-
chisci de rhabarbaro, hi enim obtinent principatum in hoc cu-
rando morbo, quibus curatus fuit excellentissimus Dux Medio-
lanensis Franciscus: Dosis à drachma vna vsque ad drachmas
duas. Propter illorum amaritudinem fiant pilulae cum aqua ab-
sinthij. Iisdem trochiscis curavi ego magnificam vxorem ma-
gnifici Francisci Marci, quae laboravit principio ascite cum
febre ferme habituali: cui dedi praeter hos trochiscos mul-
tis diebus lac asinae, quae pasceretur herbis diureticis, lac enim
non nocet hydropi, vt multis grauissimis medicis placet, praes-
sertim, si ab ea animante emulgeatur, quae pascatur herbis
diureticis. Ideoque à quibusdam laudatur lac caprarum ara-
bicarum propter pastum. Clysteres acres purgant hanc aquosi-
tatem, & flatum. Vacuatio haec tutior est aliis purgationibus:
quare frequens illorum vsus est utilis, & necessarius. Hic cly-
ster, vel huic similis est optimus: ℞. furfuris, camomillae,
stichados an. p. j, rutae, & salviae an. m. j. hellebori, agarici,
& turbit an. ʒ. ij. carthami ʒ. ʒ. roris marini, cyclaminis an.
m. j. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℥. j. olei de ru-
ta, & de lilio an. vncias duas, salis drachmam vnā ʒ. mis-
ce, & fiat clyster. Pilulae haec purgant materiam hydropis: ℞.
cinnamomi, squinanti, cuscuthae, croci, calami aromatici, se-
minisapij, fu, prasij, nardi asati, mastichis, mirrhæ an. ʒ.
ʒ. serapini, agarici, an ʒ. iij. euphorbij, turbit, colocin-
thidis an. ʒ. j. rhabarbari ʒ. iij. aloës ad pondus omnium, misce,
& cum succo absinthij, fiant pilulae. Dosis qualibet hebdoma-
da drachma vna. Sex vnciae feri caprini cum drachma vna se-
mis pulueris pulueris spicae nardi manè saepe sumptae purgant
clementissime hanc aquositatem. Succus maioranae cum oxymelle, si
manè frequenter sumatur, hydropem hanc curat, purgando aquo-
sitate. Idem facit succus prasij deficcatus, & mistus cum vino al-
bo. Idem praestat sanguis coturnicis; resoluunt venter aquositatem
omnia superius dicta in resoluendo flatu in tympanite: quamvis
valentioribus egeat ascites cum difficilius vacuetur humor, quam
flatus posita parilitate. Hoc, aut simile cataplasma est optimum
in

*Serū ca-
prinum,
Maiora-
na.
Prasium
Cotur-
nix.
De tym-
panite.
Topica.*

in resoluendo: ℞. foliorum althææ m. ij. radicum cucumeris *Cata-*
 sylvestris, & ireos an. ʒ. j. ficus siccas numero 20. omnia de- *plasma-*
 coquantur in vino albo, & fiat cataplasma: vel ℞. fellis tauri, *ta resol-*
 nitri, an. partem vnam, piperis puluerizati, partem semis, cum *uentia.*
 melle, fiat ad modum cataplasinatis, quod per dimidiæ horæ
 spatium admoueatur ventri, ne vesica, aut vlcera intumescant:
 vel ℞. stercoreis bubuli, & caprini an. p. j. cineris quercini, &
 vitis an. p. ʒ. salis, sulphuris an. ʒ. ʒ. baccharum lauri, staphila-
 griæ an. ʒ. j. ex his decoctis cum vino fiat cataplasma, cui adde
 vnguenti Aragon, & marciaton an. vncias duas. Cauteria mul- *Caute-*
 ta ventri sæpè admota non profunda purgant hanc materiam & *ria.*
 his curauit quidam Agarenus duos Valentinus nobiles. Idem *Histo-*
 præstant cauteria tibiis infixa, vt per ea materia vacuetur, quia *ria.*
 illarum vlcera in hydrope difficulter curantur, nisi priùs hy-
 drops tollatur. Aliqui scroto setarum immittunt, vt eo multis *Incisio*
 diebus, & sensim vacuetur materia. Postremò, si æger fuerit iu- *pruden-*
 uenis, & satis robustus, incisione ei extrahatur hæc aquositas, *ter fa-*
 non vna eductione, sed multis & sensim ad vires conseruandas *sta.*
 præcedente tamen mortis præfagio, ne nobis ascribatur: nam *Exem-*
 præsentē Sauanarola, & aliis doctissimis medicis Patauij, Ioan- *plum.*
 nes Ludouicus vtriusque iuris doctor eximius, sexagenarius, su-
 bita facta incisione in manibus chirurgorum interiit. Eodem *Alte-*
 tempore quædam mulier quinquaginta annos nata laborauit *rum ex-*
 ascite sex annis, & ex casu in lapidem fuit vulneratus venter *emplum*
 eius, per quod vulnus subito omnis aquositas euacuata fuit, in- *admi-*
 cidit illa quidem in animi deliquium, sed post in xenodochio *radum.*
 Patauino bonis alimentis pristinam recuperauit sanitatem: quæ
 res digna est admiratione: fiat igitur incisio musculi obliqui
 dextri ascendentis, si primò fuerit hepar affectum, & sinistri si
 lien, priùs cute deorsum reuulsa, vt post incisionem, & aliquam
 aquæ extractionem locum naturalem repetens foramen obtu-
 ret, ne aqua affluat largior, vel immisso syphone in hiatum.
 Aqua autem quotidie bis, aut ter syphonis operculo ablato mit-
 tatur, tunc æger roboretur cibis optimis.

Quartò, affectionem hepatis causam mali tollentibus per *Alter-*
 contraria & corroborantia hepar, vt puluere diarrhodon Abba- *tio &*
 tis, hepate lupi, & aliis iam dictis superiùs. *corrobo-*
ratio.

Scholium.

HYdrops omnis.] *Hydrops nomen ex aqua assumpsit: in om-*
nibus enim hydropis speciebus, aquosus generatur humor. men.

DE CURAND. MORB.

Hydrops Quod in tympanite, in quo id difficile videtur, etiam verum est, quia in eo humor etsi paucus in abdominis regione coaceruatus apparet. **Hydrops** symptoma est, tumor scilicet præter naturam ventris, aut totius corporis sequens aliud symptoma, quod est actio iecoris deprauata. Morbus, ad quem sequitur, est intemperies frigida iecoris. Hac vel primam in eo generationem habet, quando à iecoris scirrho, aut obstructione fit, aut per consensum ei aduenit, ex affectu lienis, ventriculi, intestinorum, & pulmonis. Hæ enim partes refrigerata, per venas frigiditatem transmittunt, venis causa aut gibba partis iecoris, & inde eius carni. Iecur etiam frigiditatem concipit, ex immodica sanguinis per hæmorrhoidas euacuatione, aut suppressione, sicut ex suppressione mensium, quorum immoderata euacuatio, nec hydropem, nec cæchexiam efficit, ex Galeni sen-

Immo- tentia, lib. de curand. per sang. missionem, cap. 19. eò quòd menstrua dica eua euacuatio secundum naturam fieri solet. Frigida iecoris intemperies in Hydrope, aliquando à causa calida ortum habet: in febribus mēstrua enim ardentibus (etsi raro) etiam in principio visus est Hydrops, non fa- Qui malum signum est, ex eo enim colligimus adeò esse intensum cit hy- calorem, ut vitiosa coctione iecoris, aquosa humiditas in eo, pro sandropem. guine generetur. Quòd si Lupeius, & alij, sequuti Alexandrum, Hydrops frigida (quibus hunc Hydropem curari aiunt) post febrem concedant, à causa dant, grauius errabunt: non autem si eis utantur, ut febrem curant. A causis externis etiam potest hydrops nasci, potu aqua frigida, aut natatione in ea. Existimo autem aërem frigidum, hydro-

externa pem nunquam effecisse, eius enim vis non potest integris viribus ad **hydro-** iecur usque penetrare, præsertim cum eius tenuitas non sinat ipsum **pis.** magnam, & perdurantem actionem exercere. Iam cum hydrops, refrigerato iecore fiat, inde pro maiori aut minori refrigeratione, tres

Prima hydropis differentia ortum habent. Prima dicitur hydrops tympanites, in qua in iecore exigua est imbecillitas, ita ut chyli maiorem **hydropis** partem, in optimum sanguinem mutet, & alteram, quæ minor est, **differentia.** in aquam: ex qua in cavitare naturali multum flatum eleuant partes, adeò ut in ea multus flatus, & paucus humor collectus sit.

Secunda. Secunda nominatur Ascites, in qua iecur maiorem habens frigiditatem, & imbecillitatem, quam in prima, ex chylo paucum sanguinem, etsi optimum generat, & simul multam aquam: quæ cum sanguine non est multum permixta, eò quòd iecur, ut eam separaret, aliquod seruat robur. Hac aqua per iecoris carnem in cavitatem à peritoneo circumscriptam permeans, eam replet: quod non contingit aqua ex obstructione renum in venis coaceruata, non quia est pauca, ut sentit Valles. lib. 5. de loc. affect. cap. 6. sed quia non ge-

Tertia. neratur in iecore, neque ideò moram facit. Tertia differentia hydropis ea est, quam anasarcam, & leucoplegmaticam appellant, in qua maiorem

maïorem habet iecur frigiditatem, quàm in supradictis: ut sanguis non optimus, sicut in duabus primis: sed totus vitiosus generatur, est enim aquosus aut pituitosus potius, quia pituitosa humiditas in iecore præter naturam generata, ob imbecillitatem partis non potuit à sanguine separari. Atque hæc est causa, ob quam omnes partes corporis, malè nutriantur, & humiditate madcant. Qua in parte maxime mirandum est Valles. lib. 4. acutorum, & lib. 4. epyd. com. 42. Valles in anasarca minorem habere frigiditatem, quàm alias hydropis differentias, scripsisse. Ex his tribus differentiis, etsi in tympanite minor sit intemperies, est tamen in ea maius periculum, quàm in reliquis non ratione affectus, sed curationis: quia flatum discutientia (quibus curatur) calida cum sint, de nouo flatum generant.

Secundò apparantibus pituitam.] In hac sola hydropis specie, In qua qua dicitur anasarca, licet nobis ante purgationem preparare hu- hydropem morem: quia pituitosus & crassus est. Non autem licet in aliis dif- prepara ferentiis (nisi propter obstructionem id efficiamus) cum ex humore mus hu- aqueo tenui fiant. morem.

Tertiò, vacuantibus pituitam.] Multi sequuti Galen. lib. 4. de Anasarca. rat. vic. in acutis comm. 1, 3. in hydropem anasarca ex suppressione secunda mensium, ex hemorrhoidibus, aut alia plethorica affectione orto, vena in quando incipit venam secant. Quod difficillimum nobis videtur, anasarca imò falsum, quia in eo iecur maxime refrigeratum est, & sanguinis missio ex accidenti refrigerat. Dices sequitur ex sanguinis missione alia maior utilitas, quæ est mouere suppressam euacuationem, aut minuere plethoricum humorem à quo refrigeratum fuit iecur. Respondeo, non posse tunc opportunè, eo uti remedio, si consideremus massam sanguinariam adeò deprauatam, & validam iecoris intemperiem. Hoc quamuis ita sit, possumus tamen Galenum In anasarca (ut par est) excusare, si dixerimus ipsum per principium anasarca sarca o-cachexiam intellexisse. Cum ergo in anasarca, pituitosus humor in mne vacuationibus partibus contineatur, omne vacuationis genus in eo ten- cuatio- tandum est. Infernè per aluum, per urinam radice petroselini, aspa- nis ge- rari, & aliis, diureticis medicamentis. Per cutem etiam frictioni- nus ten- bus cum melle, balneis sulphureis, vel sponte nascentibus aliis, arena tandum. calida, frictione cum oleo trino sub sole, tecto capite, & similibus. le- Taxatur cur roborabis, & simul humorem discuties unguento in hac forma auctor. parato: ℞. olei absinthij, & irini an. ʒ. ij. utriusque dialthæ ʒ. ss. Cantharum parum, fiat unguentum. Cantharid. s non probat auctor, timent ridum earum vehementiam quasi eam quantitate, & nixtione, non possi- exhibi- mus minuire & corrigere. Proinde in eo omisso res sic distinguenda tio. est. In hydropem ascite & tympanite, fugiendus est usus cantharidum, quia humor in cavitate naturali inclusus, non poterit per urinam purgari. Si verò sit anasarca, in qua humor in venis continetur,

DE CVRAND. MORB.

earum vsus commodus erit, expurgabitur enim per urinam. Non quòd cantharides id præstent (ut malè sentit auctor) sed medicamenta urinam mouentia, cum quibus cantharides miscentur, tantum ut sint vehiculum. Neque est quòd timeamus, totas eas integras assumere, cum Galenum libris simpl. c. de cantharidibus subscriptorem habeamus.

Medica-menta ad hydropicos. Quartò, tollentibus dispositionem.] Hydrops ut in plurimum solet fieri ex obstructione iecoris & lienis: quem post purgationem cum agarico, in eo qui fit ex obstructione iecoris: & cum confectio-
ne hamec in altero, vtere unguentis, capitibus de obstructione iecoris, & lienis descriptis, & hac confectio-
ne: ℞. diacurcuma, & dialacca Isac. an. ʒ. j. trochiscorum de absinthio, & de rhabarbaro an. ʒ. ij. conserva capillorum veneris ʒ. j. cum syrupo de bizantiis fiat confectio.

In ascite aqua Secundò, apparantibus humorem aquosum.] Ex Galen. 4. non est acutorum comment. 113. humor in ascite aquosus est, & tenuis, præparanda. non ergo egebit præparatione: si memor es eorum, quæ primo Scholio docuimus.

Varia aqua purgatio. Tertiò, vacuantibus aqua.] Nonnulli, ut educant aquam in hydropicis vtuntur brasicæ marina, quam vulgo soldanellam appellant, eam exsiccantes, & ex puluere assumentes, singulis diebus ʒ. j. usque ad ʒ. ij. ℞. (si vires constant) cum mulsa & decocto eupatorij. Alij ex eius succo expresso & percolato, ob eius tenacitatem cum melle aut saccharo syrupum parant, cuius ʒ. j. singulis diebus propinare solent. Alij tithimalum marinum (quem Dioscorides tithimalum paralyon nominat) exsiccant, & eius pulueris ʒ. j. ℞. uno quoque die, cum mulsa, aut decocto eupatorij exhibent. Alij utrosque dictos permiscunt, addentes propter suauitatem, semen anisi, carui, & fœniculi. Quæ omnia etsi euacuent humorem aquosum, nihilominus tamen succus radicis iridis principatum hac in parte habet, cui uni debetur, desiderata aqua euacuatio: potenter enim eam educit, minúsque prædictis omnibus molestus est ventriculo. Præcedentibus ergo syrupis (si opus fuerit) purgare poterit succo iridis, agarico trochiscato, diaphanicone & aliis. Portionem in hunc modum parare poteris: ℞. succi radicis ireos ʒ. ij. aqua mulsa ʒ. ij. misce. Aut ex eodem succo iridis conservam efficere poteris hoc modo: ℞. radicis iridis rectè excorticata lib. i. mellis ʒ. xiv. fiat conserva ea ratione, qua fit caro cydoneorum.

Nota quæ in vase vitreo ponatur, commiscendo semen anisi, fœniculi & hanc hydropis curatio- nem. carui: cuius unum cochlearium singulo mane assumet. Quamvis verum sit in hydrope, humorem esse euacuandum, magis tamen intentos esse oportet ad roborandum iecur & lienem: quia ea medicamenta, quæ humorem euacuant, vehementia cum sint imbecillitatem viscerum

viscerum augent, atque hæc est causa, ob quam culpa medicorum, plus ad humorem quàm ad iecur respicientium, agroti in peius semper abeant, & misere moriantur. Curabitur ergo rectè hydrops, sensim euacuantes humorem medicamentis benignis, & simul viscera roborantes: cùmque sit morbus longus, longo tempore oportet assumere medicamenta, potissimum ea, quæ à nobis modò describentur. Tria enim sunt, in quibus tota hydropis curatio reposita est, primum manè sumendum est, secundum noctu, & tertium est unguentum, quo regionem ventris inungemus. *Medicamentum manè assumendum.* Medicamentum, quod manè assumi debet parabitur hac ratione. Noctu ex lacte asinæ, aut in eius defectu, ouis, & in huius defectu, capra extrahe ℥.vj. seri, ita ut in eo clauos numero duos, trochiscorum de eupatorio, & de capparibus an. 3. s. cum pauco cinnamomo apponas. Hoc serum manè assumatur, ita ut ager neque ad prandij horam abstineat à cibo. Est hoc medicamentum clementer purgans, obstruens, & viscera roborans. Aduerte tamen prædictos trochiscos de tertio in tertium diem, recenter esse construendos. *Medicamentum noctu assumendum.* Medicamentum noctu assumendum, quatuor horis post cœnam in hora, qua ager dormire vult utile erit: quo tempore (si iecur schirro careat) assumat tria cochlearia, confessionis ab Andromaco descriptæ, quæ dicitur cypoides, superbibens ℥.vj. vini albi veteris, ut medicamentum ad hepar permeet. Istius compositionis laudes lege apud Galenum lib. 8. de compos. medi. sec. locos. Unguentum hoc est: ℥. unguenti de Althæa ℥.ij. olei nardini & absinthij ana. ℥. iiij. olei laurini ℥.j. s. unguenti Aragon. ℥. iiij. unguenti marciaton. ℥. iv. misceantur omnia, & cum pauca cera fiat unguentum, quo calida regio ventris inungatur. *Unguentum.* Atque de curatione istius affectus. Solùm superest, ne cum auctore decipiaris, fugere usum lactis in tympanite propter flatum: in aliis verò, quia non poterit rectè concoqui, & sic acescens intemperiem frigidam augebit. *Taxatur auctor in lactis exhibitione.*

De lienis obstructione. CAP. XLV.

Lien perinde, ac hepar obstructione quoque laborat, quod bifariam contingit, aut obturato eo meatu, per quem humoris melancholici, qui sanguinis velut limus est, ad splenem fit deriuatio, ut hepar purgetur, & sanguis purior reddatur aut eo, qui eundem humorem ad ventriculum eructat. Causæ cap. de hepatis obstructione dictæ iam sunt. Notæ hæc sunt. In primis Gal. 5. de loc. affect. cap. 7. solo colore cognoscebat hepatis, & splenis affectum nulla audita præteritorum accidentium enarratione: imò (quod grauius est) non inuestigato viscerum affectu per tactum: hoc tamen intellige cùm ab hepatis, vel splenis *Descriptio.* *Causæ.* *Nota.* *Galeni peritia.* *vicio*

DE CVRAND. MORB.

*Utilitas
succ
melan-
cholici
in ven-
triculū
delati.*

splenis vitio fit icterus. Si obstructio in eo meatu fiat, qui crassum, atrūque sanguinem ad splenem mittit, nullus in splene tumor, aut grauitas sentitur: cutis tamen color, præsertim faciei nigrior euadit adeò, vt ater icterus sæpè oria-
tur impuro scilicet sanguine per corpus fuso. Quòd si non huius, sed alterius meatus, qui ad ventriculum atram bilem defert, obstructio infestet, & tumor, & grauitas sinistri hypo-
chondrij adsunt, & ventriculus ea commoda non sentit, quæ cum humorem in ipsum delatum sequuntur: hæc sunt constru-
ctio eius atque corroboratio: cuiuscunque tamen meatus ob-
structio sit, qui sic afficiuntur, timorem, atque tristitiam patiun-
tur, spiritus prætereà difficultatem, & somnos turbulentos ha-
bent, & hepar per consensum iis quamprimū læditur, vnde in aquam intercutem sæpè incidunt, præsertim si lien indura-
tus fuerit consentiēte iecore, vt docet Gal. 6. de loc. affect. cap. 1.

*Curatio
obstru-
ctionis.*

*Indica-
tio ex na-
tura par-
tis.*

*Topica.
Vnguen-
tum.*

*Scirrhi
curatio.*

Victus.

*Prepa-
ratio.*

*Purga-
tio.*

Potus.

Pilula.

*Molliē-
tia.*

*Sumen-
da.*

Lienis obstructio curatur quinque remediorum generibus, quemadmodum hepatis obstructio, sed valentioribus, propter maiorem distantiam, & partis ignobilitatem. Consideranda sunt ergo, quæ diximus cap. 42. in 4. tamen genere remedio-
rum præcedenti forū ex aceto, tamarisco, & ceterac simul de-
coctis bis in die ventriculo vacuo vngatur lien hoc vnguen-
to, aut huic simili: ℞. oleorum amygdalarum amararum, &
de capparibus an. ʒ. ij armoniaci dissoluti in aceto ʒ. iij. vn-
guenti Aragon, & dialthææ compositæ ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, &
fiat vnguentū. Scirrhus lienis curatur quinque remediorū ge-
neribus. Primò, victu tenuante, & mediocriter calido, ne parte
tenuiori resoluta augeatur durities. Sint ergo cibi boni succi, &
faciles cōcoctu, & tenuis substātiæ, & humidi, vt iura pingua cū
radice petroselini vel fœniculi, vel foliis raphani, & similibus.

Secundò, apparantibus materiā terrestre, hac aut simili mix-
tura: ℞. syrupi de scolopendria ʒ. iij. syrupi buglossæ, & rho-
domellis an. ʒ. ij. misce. Item ℞. aquarum aut decoctionis
buglossæ, capilli Veneris, cetarac, & tamarisci an. ʒ. iij. misce.

Tertiò, vacuantibus hanc materiā melancholicam, hoc aut
simili potu, ℞. confectionis diasenæ ʒ. ʒ. confectionis me-
dicaminis hamec. ʒ. iij. agarisci trochiscati ʒ. j. syrupi buglos-
sæ ʒ. j. aquæ borraginis, q. s. misce, vel si magis amat pilulas.
℞. pilularum indarum, & de fumo terræ. ʒ. ʒ. diagridij. ʒ. iij.
cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem.

Quartò, curantibus duritiem internis, & externis mollien-
tibus: vt ℞. caricæ numero xx. vuarum passarum sine granis
p. j. foliorum maluarū, & althææ an. m. j. seminis lini, & fœnu-
græci an. p. fiat decoctū in libris sex aquæ ad dimidium, de
quo

quo percolato accipe ꝑ. ij. ꝑ. & cum ꝑ. j. mellis fiat ad modũ
 fyrupi non perfectè decocti. Adde fyrupi de scolopendria
 ꝑ. vj. Dosis quolibet mane vnciæ quinque. Lien bis ter in die
 vngatur hoc, vel simili vnguento: Ꝓ. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ꝑ. j. olei de capparibus ꝑ. ꝑ. axungiae
 gallinae, & anatis, medullæ crurum vituli, an. ꝑ. ij. ꝑ. dialthææ simplicis & hyslopi humidæ an. ꝑ. iij. armoniaci dissoluti in aceto ꝑ. ij. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum: ante tamen vñctionem semper lien hoc vel simili fotu præmuniatur. Ꝓ. caricarum vuarum passarum sine granis, seminis lini, & foenugræci an. p. j. radicis althææ, & tamarisci an. ꝑ. j. ꝑ. aceti albi ꝑ. iij. fiat decoctum ad medietatem. Lien hoc aut simile emplastrum imponatur. Ꝓ. emplastri de meliloto, & filij Zachariæ loco ceræ quod sufficit, extendatur super alutam ad formam linguæ bubulæ, adde armoniaci dissoluti in aceto ꝑ. ꝑ. pulueris radicis ireos ꝑ. j.

Curatio

Fomentum.

Emplastrum

Quinto, corroborantibus lienem, vt trochiscis de rhabarbaro, & de capparibus simul. & puluere diarrhodon Abbatis cum syrupo de scolopendria, & hoc aut simili fotu. Ꝓ. radicis scolopendriæ. m. j. radicis capparidis. p. j. rosarum. m. j. aceti calybeati ꝑ. ij. decoctum ad medietatem.

Corroboratur.

Fotus.

Scholium.

Lien perinde.] In toto hoc capite solum est quod addas sanguinis missionem (cuius auctor nullam fecit mentionem) vt reuellas ab obstructione sanguinem prauum, nempe melancholicũ. Quod si non fuerit melancholicus, à sanguinis missione abstinebis.

De suppressione vrinæ: C A P. XLVI.

Suppressionem vrinæ Græci Ischuriam nominant, ea fit, quoties lotium in totum supprimitur, ita vt eo ægrotantes nihil reddant. Hæc fit nonnunquam propter vesicæ imbecillitatem, cum id, quod in ipsa continetur comprehendere nō potest, ita, vt exprimat. Interdum etiam obstructio inferiori meatu à crassis humoribus, aut ab impacto lapide, aut à pure, aut à caruncula, vel callo ibi genito, aut à sanguinis grumo. Aliquando accidit ab inflammatione, aut aliquo alio huiusmodi tumore præter naturā. Quorum occasione vel angustior redditur meatus aut, totum obstruitur. Propter obtusũ quoque vesicæ sensum suppressam vrinam aliquando vidimus, & Gal. de quodam scribit, cui torpente vesicæ sensu ob malè affectos neruos vrina fuerat cohibita. Accidit & sanis sæpè, vt ait. Etius, vrinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importu

Descriptio.

Causæ.

DE CVRAND. MORB.

portunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut som-
Nota ex nis, si diutius continuetur lotium. Haftenus de causis, nunc de
imbecil- notis agamus. Si ab imbecillitate vesicæ vrina supprimatur, fri-
litate. gidam eius intemperiem considerare oportet, & num ipsa ma-
 nu compressa vrinam reddat: si enim hoc contigerit, & insuper
 eam intemperie frigida laborare ex propriis notis coniicimus,
 argumentum certissimum habebimus suppressionis vrinæ cau-

Ex ob- sam vesicæ imbecillitatem extitisse. Si obstructus inferior mea-
structio- tus sit à glutinosis humoribus, antea vitam disquiremus,
ne. num in otio educatus sit, (vt inquit Galenus) qui sic affectus est,

Ex cal- multis cibis crassis, viscososque humores generare valentibus
culb. fuerit vsus. Si à lapide, notas ex sequenti capite desumemus. Si à

Ex pu- pure, inuestigabimus per proprias notas num in renibus, vel in
re. parte aliqua renibus superiori abscessus aliquis fuerit, quo ab-
 rupto pus in renes, & vesicam fuerit transmissum. Præterea num

Ex ca- vesica malo aliquo laborauerit, ex quo ea puris generatio po-
runcu- tuerit prouenire. Si à caruncula, aut callo genito, ex præcedenti-
la. bus vlceris notis colligitur. Si à sanguine in grumum concre-

Ex san- to, præcessit sanguinis per eam partem excretio. Atque in huius-
guine. modi coniecturis maximus est æneæ fistulæ vsus, siue lapidis in-

Æneæ terpositio, siue glutinosorum humorum, siue carunculæ, aut
fistula grumosi sanguinis obstructus meatus fuerit, ex eo quod traie-
usus. cto cathetere (sic enim æneæ fistula Græcis appellatur) mingitur
 sæpè obstructis rei vestigia apparent. Si oborta inflammatio,
 aut tumor aliquis meatum vrinæ angustiores reddat, aut om-
 ninò obstruat, vt in eo accidit, qui vulneratus in ea parte, quæ
 semen appellatur, (est autem spatium anum, & penem interce-
 dens, Græci perineon, dicunt) vrinæ passus est suppressionem, vt
 refert Gal. 1. de loc. affect. cap. 1. notæ facillè patent. Reliquas cau-
 sas ex ægrotantis sermone disces.

Curatio Si ab inflammatione renum, vel viarum vrinæ fiat, curatur.
suppres- Primò, victu tenui, & simili victui dicto cap. 41. de curatione
sa vrina inflammationis hepatis.

ex in- Secundò, auertentibus per sanguinis missionem ex venis ti-
flamma biarum, aut pedum autore Hippocrate aph. 36. sexti libri, & 48.
tione. septimi. Confirmat id Galenus comment. 36. sexti libri aphor.

Reuul- quamuis in libello de curandi ratione per sanguinis missionem
sio. doceat, posse in morbis renum tam venas brachiorum, quàm ti-

Ara- biarum secari, licet Arabes, & plerique alij non contemnendi
humopi- medici tam in initio inflammationis renum, quàm vesicæ primò
no. secant venas brachiorum, deinde tibiæ, si æger sit multo san-
 guine repletus: ne prius sectis venis pedum trahatur ad infernas
 partes à toto, augeaturque inflammatio.

Tertiò , vacuantibus bilem , vt rhabarbaro , cassia fistula, manna , tamarindis , & similibus : vt ℥. medullæ cassiæ recens extractæ 3. vj. infusionis ʒ. iij. rhabarbari in aqua endiuæ per noctem bene factæ , syrupi violarum ʒ. j. aquæ buglossæ q. s. misce , & fiat potus.

Purgatio.

Quartò, parti affectæ sunt sæpè admouenda non repellentia stipica, ne claudantur meatus, sed temperatè frigida, vt sunt lac caprinum, ouinum, oleum rosatum , & similia.

*Topica
medio-
criter*

Vltimò , digerentibus , & resoluentibus, vt oleo camomillæ, de semine lini , & decocto radicis althææ, & similitum, de quibus actum est cap. 41.

*frigida.
Resolu-
tio,*

Si sola intemperie fiat, curatur contrariis alterantibus. Si à vesicæ imbecillitate , corroborantibus , vt fotu vini rubri, & similitum. Si à lapide renum, aut vesicæ, per illorum abscissionem, de qua capite sequenti loquemur. Si à callo genito in viis vrinariis, curatur per recisionem calli, per medicamenta temperatè corrodentia imposita callo, seu carni additæ, candelâ cereâ , vel tenui ligno petroselini: hæc tamen à prudenti chirurgo sunt experta, eligendâque ne vlcus fiat in viis vrinariis. Quidam Lusitanus Romæ nostris temporibus multos curauit laborantes hac vrinæ difficultate: & inter alios Valentie curati sunt perfectè nobilis Gaspar Aguilar , & filius magnifici Ximen Peres de Peretusa. Si fiat à grumis sanguinis , vel à pure implente vias vrinarias , curatur. Primò sanguinis missione , si fuerit æger sanguineus, per sectionem basilicæ dextræ , deinde , si opus fuerit, purgatione. Postea mollientibus, & aperientibus vias vrinarias, vt balneis, fotibus, vnguentis, & cataplasmatibus, quæ dicemus capite sequenti.

*Subla-
tio alia-
rum
causarū.*

*Histo-
ria Va-
lentina.*

*Curatio
si fiat à*

*grumis,
aut à
pure.*

Vltimò verò, curatur dissoluentibus , & vacuantibus grumos sanguinis medicamentis necessariis, vt theriaca magna , aut mithridato à drachma semis , vsque ad 3. j. cum ʒ. ij. aquæ rubæ tinctorum, vel milij solis, vel ℥. coaguli hœdi 3. s. aquæ quinque radicum ʒ. v. syrupi capillorum veneris ʒ. j. misce, & fiat potus. Si fiat à pituita crassa obruente vias vrinarias, curatur. Primò , victu calido attenuante , & aperiente , de quo sequenti capite loquemur.

*Si à pi-
tuita.*

Victus.

*Prepa-
ratio*

breuis.

*Purga-
tio.*

Secundò , apparantibus materiam frigidam breui tempore propter necessitatem , quamuis pituita egeat per se longa, & magna concoctione , vt ℥. rhodonellis ʒ. vj. decocti capillorum veneris, vel fœniculi ʒ. ix. misce hoc, vel simili medicamento, sùpto primo die sùmo mane, meridie, & duodecima hora noctis.

Tertiò , vacuantibus medicamentis phlegmagogis , vt ʒ. j.

DE CVRAND. MORB.

- hieræ simplicis**, vel drachma vna semis agarici trochiscati, vel saltem vacuetur hoc, aut simili clystere. ℞. foliorum vtriusque maluæ, & parietariæ an. m. j. furfuris, camomillæ, seminis lini, fœnugræci an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. ix. olei sesamini, & amygdalarum dulcium an. ℥. j. β. butyri recentis, & benedictæ an. ℥. j. salis ℥. misce, & fiat clyster.
- Clyster.** Vacuatio, quæ fit per clysteres, est tutior in his, & similibus affectionibus præter naturam: tutissima autem, quæ fit per sup-
utissima positoria, quæ minorem extensionem in intestinis efficiunt, mi-
usque nûsque comprimunt vias vrinarias.
- Quarta** Quattò, prouocantibus vrinam, primùm mitioribus, vt com-
cuatio sit pressione imi ventris, glande acri ex sale, aut felle, aut frictione
utissima peritonæi, & pudendi prope ignem, pediculo immisso in pri-
usque mam virilis membri partem qui motu titillet, & irriter ex-
utissima pulticem facultatem sopitam, aut ægri iacentis supra dorsum
utissima tibiæ, & pedes in altum sæpè, & validè moueantur: quæ si non
utissima sufficiant, pecten illinatur oleo scorpionum, & lilij cum pin-
utissima guedine cuniculi, vel imponantur parietaria frixa, vel apium,
utissima vel hoc vnguentum. ℞. olei scorpionum. ℥. ij. olei sesamini
utissima & axungia cuniculi an. ℥. j. croci puluerizati ℥. j. ceræ. q. s.
utissima misce, & fiat vnguentum. Valentior est focus imi ventris ex
- Vnguen-** Spongia cum camomilla, radice althææ semine lini fœnugræco
tum. origano, pulegio abrotano, mentastro & similibus: & infusus ex
utissima decocto prædictorum, & similibum. Spuma saponis vmbilico
utissima admota vrinam prouocat: sed valentiùs galerus vetus (quo vtun-
utissima tur fullones genibus imposito ad lanam oleo imbutam appa-
utissima randam, cum aceto acri, calido, vmbilico admotus. Oleum
utissima amygdalatum dulcium, vel sesaminum cum saccharo vrinam
utissima prouocat, meatûsque reddit molliores, & ideò prius his vten-
utissima dum, vel hoc ℞. decocti maluæ syluestris ℥. iiij. butyri recentis,
utissima & mellis an. ℥. j. misce, & fiat potus: vel ℞. pulueris seminis
utissima dauci ℥. β. aquæ millij solis ℥. ij. syrupi de duabus radicibus
utissima ℥. j. misce & fiat potus: vel ℞. pulueris corticum ouorum, è
utissima quibus pulli egressi sunt ℥. j. sacchari candi ℥. ij. vini albi opti-
utissima mi ℥. ij. misce, & fiat potus, vel valentius. ℞. duo capita allio-
utissima rum vini albi optimi ℥. vj. decoquantur ad medietatem: cui per-
utissima colato adde theriacæ magnæ ℥. j. In hyeme & sene tutior est
utissima hic potus, vel ℞. corticum limacum parum adustarum ℥. ij. de-
utissima cocti capillorū Veneris ℥. iiij. vini albi ℥. j. misce, & fiat potus.
- Laus po-** Hoc potu multi ex suppressione vrinæ morti propinqui sunt ad
tus. pristinā sanitatē restituti. Vinum alkekengi valenter, & certif-
utissima simè vrinam prouocat. Vide historiam ab Arnaldo de Villanoua
utissima traditā, qua demonstrat Cardinalem quendam affectum: sup-
utissima pressionem

pressionem urinae quatuor diebus hoc vino fuisse curatum à medico quodam indocto, & nullius ferè nominis, qui ex paupere diues factus est hac sola curatione. Fiat vinum alkekengi hoc modo, accipe poma rubra (quæ ab antiquis dicuntur solanum rubeum) quo tempore vinum fit, quum hæc poma rubescunt, vt cerasa, & sunt plena granis paruis similibus granis ficuum, habentque tum saporem bonum cum amaritudine quadam, conseruanturque per annum filo appensa, & vbi hoc caremus vino, accipe quinque, vel septem poma in puluerem reducta, & vino albo parum decoquantur, quod percolatum bibat æger. Urinam quoque prouocat calamus gallinae oleo tinctus, si meatui penis imponatur, vel candela cerea, vel algalia argentea à viro experto (quam catheterem appellant. Græci) vt si à vesica ad penis extremitatem sit aliquid impediens exitum urinae facilius in vesicam redeat, sed hoc non est faciendum nisi à viro docto, & in hoc multum exercitato, ne viæ urinariae exulcerentur, vt sæpè fit.

Admonitio.

Scholium.

SUppressionem urinae.] Vesica pars est instrumentaria, quæ urinam seruat, quoad molestiam sentiat ab eius multitudine, aut acrimonia, tunc enim eam excernit. Urina excretio propria actio est vesicae, in qua tria symptomata solent accidere, cum non fit actio, cum malè fit, & cum deprauatè. Quando non fit actio, dicitur à Græcis hoc symptoma ischuria, à Latinis verò urina suppressio, de qua disputat auctor presenti capite. Ischuria sumitur improprie, aut proprie. Improprie pro urina retentione in qualibet parte sit affectus: hac ratione, obstructio in renibus à lapide arenulis, pure, aut humore crasso facta, urina transitum impediens, ischuria dicitur. Eam cognosces ex eo, quod in regione pubis nullus in vesica apparet tumor, quia vacua est: tum quia nullum est irritamentum ad urinam excernendam. De hac ischuria non agimus modò, sed de illa, qua proprie sumitur, in qua urina in vesica contenta non potest excerni. Causa illius ischuria ex Gal. lib. 3. de caus. symp. c. 2. duæ sunt, imbecillitas vesicae ab intemperie potissimum frigida ortu habet. Angustia meatus duæ sunt causa, praclusio, & obstructio. Praclusio etiã duas habet causas. Prima est tumor praeter naturã, qui in cervice vesicae ortus, ipsam cogit cõcidere. Secunda est siccitas. Obstructionis quinque sunt causa. Prima est grumus sanguinis. Secunda pus. Tertia lapis, ad quã reuocari possunt arenula, & crassa excrementa, quæ communem habent materiam.

Ischuria duobus modis sumitur.

Ischuria propria causa.

DE CVRAND. MORB.

materiam. Quarta corpulentum tuberculum cernicis vesica, aut
meatus urinarij, ex ulcere non rectè curato ortum; quod nostris tē-
poribus ex morbo gallico, frequenter ac idere videmus. Quinta,
callus in eisdem partibus. Qua ratione hac distinguantur, & cu-
rentur, & quod præter dictas ischuria causa, soleant esse alia dua,
nempe sensus exiguus vesica, & immodica quantitas urina in præ-
seni capite habes ab auctore rectè tradita. Dysuria, id est, urina
difficultas ab eisdem causis fit, à quibus ischuria, sed remissioribus.

Sanguis mis- Secundo, auertentibus.] In sanguinis missione, qua in
sio in re- renibus inflammatis exercetur, hac ratione distinguens, habebis
nibus in- cõciliatos Galeni locos. Si inflammatio hoc est tumor præter natu-
flamma- ram) sit recens, cum in parte paucus sanguis sit collectus, & mul-
tis, tus fluat, sanguinem mitte ex basilica, maiorem enim ex ea facies
 reuulsionem. Si verò sit inflammatio inueterata, cum in parte
 multus sit iam coaceruatus humor, & paucus fluat: tunc ex pede
 sanguis missus iuuabit, multo humore ex parte affecta euacuato.
 Quod quamuis ita sit, Galenus tamen in methodo semper, ex pede
 secat venam.

Curatio ischuria Tertiò, vacuantibus bilem.] Consuevit auctor semper in qua-
ab humo libet inflammatione purgare bilem: nescio certè qua ratione ductus.

re crasso Si fiat à pituita crassa.]. Si ischuria ab humore crasso originem
facta. ducat: primò sanguinem mittes propter venarum affectum, hac e-
 nim ratione minuemus humorem obstruentem, ne fluat ad renes.

An sit Deinde si occasio locum det preparabimus humorem, cum oximelle
purgan- rhodomelle, & aliis. Postea eum purgabimus cum pilulis paratis ex
dum hel- 3. benedicta cum aqua fœniculi. Dices, nonne purgabis helleboro
leboro. ea ratione, qua docet Galenus lib. 6. epyd. par. 1. sent. 6. Respon-

Balnea. deo, non licet, quia ex eodem Galeno in hellebori assumptione debet
Medica- fieri magna corporis preparatio, qualis non poterit exerceri in is-
mentum churia ob urgentiam symptomatis: bene tamen in eo, quem dolo-
cantha- rem grauem in renibus per multos dies perdurantem, pati vide-
ridibus mus. Post purgationem balnea, in sequenti capite descripta, utilia
paratū. erunt. Quæ si non prosint, in balneo medicamentum ex cantharidi-
 bus constitutum exhibebis. ℥. cantharidum preparatum ḡ. viij.
 (quantitatem pro virtutis robore, aut imbecillitate augens, aut mi-
 nuens) cum aqua pastinaca fiat potio.

Quartò, prouocantibus urinam.] Optima aliqua medicamen-
ta hoc in loco proponuntur, solum aducerte, nullum ex his impo-
nendum umbilico, sed pubi, aut perineo. Medicamentum etiam ex
alliorum capitibus, tanquam ingratum omittatur, sicut illud, quod
ex corticibus ouorum, tanquam inutile.

De renum calculo, & vesicæ.

CAPVT. XLVII.

Renum & vesicæ calculi duplex est causa, altera, vt maté- *Causa:*
ria: altera vt efficiens: Materia, est humor visciens, & pitui-
tolus in ventriculo ob assiduas cruditates genitus. Efficiens tū *Materia*
renum, tum vesicæ calor materiam adassans, & in lapidem in- *Efficiens*
durans: Differunt inuicem hi lapides: nam renum minores sunt *Discri-*
friabiliores, asperiores, & rubri: vesicæ contra: & quantū ad co- *men.*
lorem attinet, albi sunt, aut paulum ad cineris colorem declinant.
Præterea illis prouectæ ætatis homines sæpius quàm pueri, quā *Puerorū*
æate prouecti frequentius corripuntur. Voraces enim sunt *natura*
pueri, cibisque largius vtuntur, nulla temporis, ordinis & nulla
sumendi habita ratione: quiescere à cibo ingesto non possunt,
peperuōque mouentur: vnde crudum alimentum per venas &
vniuersum corpus distribuitur. Mollia verò cum sint illorum
corpuscula, & facile eedētia obturari renes non patiuntur. Cras-
sissimæ igitur vrinæ in vesicæ amplitudinem nullo impediēte
recipiuntur, ibique velut in vino fæx, & in aqua limus, crassum
illarum sedimentum subsistit, & à caliditate, quæ, multa, in pueris *Nota:*
est, cogitur desiccatum, & lapidescit: quo fit, vt frequentius in *Sabulū.*
vesicæ lapidem pueri incidant, quem cum patiuntur, vrinas ha- *Scalptio.*
bent aquæ similes, in quibus subsident sabulosa quædam: ipsi in- *Suppres-*
super assidue pudendum scalpunt, idque vel axum, vel intentum *sio:*
præter rationem, vrina repente aut in totum supprimitur, aut *Procidē-*
non nisi guttatim redditur. Sæpè etiam comitatur ani prociden- *tia ani.*
tia: certius tamen nullum signum est, quàm digitus immissus *Nota*
in rectum intestinum: sic enim nūm lapis vesicam infestet, & *calculorū*
quantus ille sit, detegitur. Renum calculus sic deprehenditur: re- *rum rea-*
nē grauis dolor, & infixi aculei instar, nullo foris tumore appa- *num:*
rente infestat. Spina ægrè inflecti potest, crus stupet: quod è di-
recto laboranti reni respondet. Vomitus præterea, & cibi fa-
stidium adest. Vrina inchoante obturatione pauca, & aquosa
mingitur, post in totum supprimitur. Aluus cum iam nihil ex-
cernat, ad egerendum subinde mouetur. Calculo è renibus
emoto vrina subsidentiam arenosam habet, & sanguis plerun-
que excernitur, ob violentiam videlicet asperioris calculi ex-
cussi. Porro cum dolores coli sæpè cum nephritide confundā-
tur, non ab re fuerit signa quibus inuicem distinguantur, pro-
ponere: sunt autem, quæ sequuntur. Renum dolor, breue oc-
cupans spatium, vno loco innititur immobilis, aut saltē per vte-
teres declinans ad vesicā protenditur: colicus verò magna appre-
hendis

Distin-
ctio dolo-
ris colici
ex renis.
Differen-
tiæ loco.

DE CVRAND. MORB.

hendit sedem, hac illac reuoluitur, & ab vno latere incipiens in alterum fertur, dolore interim ventriculo per transitum infestato. Præterea colicus affectus à cibo intenditur, nephritis remittitur. Denique in cholico dolore vehementior est, ac magis frequēs & vomitus, & nausea: per vomitū verò excreta tū biliosa, tū pituitosa sunt, quibus assūpti cibi aliquid admixtū videtur. Sunt & alia signa, sed breuitati studentibus hæc sufficiant.

*Curatio
Vicius.*

*Qua no-
ceant.*

Lapis in renibus, & vesica gigni prohibetur. Primò fuga eorum, quæ augment pituitam in corpore, calculi scilicet materiam: qualia sunt, alimenta frigida, crassa, lenta, & difficilia concoctu, vt caseus, præsertim antiquus, salus, panis azimus, animalium partes pingues, & nervosæ: vt sunt intestina, ventriculus, cor, & similes partes, aues aquaticæ, sus, bos, lepus, hircus, pisces, præsertim grandiores, legumina demptis ciceribus: herbarum frigida, cruda, & cibus largior, & à cibo somnus, venus, labor, & balneum, & animi perturbationes, vt ira, tristitia, timor, & similes, quæ omni tempore nocent: sumendi ergo sunt cibi parcius, quàm pro appetentia, bonique sint succi, & faciles concoctu, quales sunt pullus gallinaceus, gallina, motacilla, quæ dicitur à quibusdam cauda tremula, coturnix, perdix, hœdus, carnes arietinæ, præsertim in Hispania, & similes. Potus sit vinum album, aqua liquiritiæ benè dilutum, vel aqua cinnamomi, vel aqua sola optimi fluuij, aut fontis, vel pluuiialis percolata lapide Baleatico, vel saltem sine arenosa, & terrestri residentia.

Remissio

*Clyster
leniens.*

Cassia.

*Catholi-
con.*

*Terebin-
thina.*

Pilula.

*Diureti-
ca, pitui-
tosam*

*materia
expellen-
tia.*

Secundò, pituitam genitam nobis praua victus ratione vten- tibus (ne ad renes ruat) retrahentibus, & auertentibus, vt iniecto bis in hebdomada clystere hoc leniente, vel simili. ℥. decocti maluarum, radicis althææ, seminis lini, & fœnugræci ℥b. j. butyri recentis, & benedictæ an. ʒ. j. olei sesamini, & camomillæ an. ʒ. ij. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster, vel ʒ. j. medullæ cassiæ fistularis sumpta in hebdomada, vel ʒ. j. diacatholicon, semel in hebdomada sumpta, vel terebinthina bene lota aqua capilli vene- ris, vel maluæ & postea cum saccharo mixta, hæc enim ven- triculus, intestina, renes, & vesicam purgat sine alicuius partis detrimento. Vel pilula vna elephangina, aut ex hiera simp. sin- gulis diebus, vel alternis sumpta.

Tertiò, pituitosam materiam, si viis vrinariis hæsit, ne in re- nibus, aut vesica lapidescat, expellemus vreticis vt ʒ. vj. deco- cti maluæ sylvestris cum ʒ. j. sacchari candi, vel ʒ. v. decocti cicerum & liquiritiæ, aut ʒ. vij. seri caprini, decoctionis liqui- ritæ cum ʒ. j. ʒ. sacchari candi, vel ʒ. viij. iuris galli gallina- cei decrepiti decoctionis liquiritæ, maluarum & capilli vene- ris, seminis lini, & fœnugræci.

Quar

Quartò, temperamus calorem harum partium, calculi causam effectricem emulsione quatuor seminum frigidorum maiorum, syrupis violato. nenupharino summo mane sumptis, oleo violato tepido renibus, & vesicæ sæpè admoto, lacte caprino, vnguento santalato, & similibus: vitamus tamen astringentia, ne materia calculi retineatur, sæpè, præsertim æstate lumbos aëri aperimus pelles, plumas, cæteraque calorifica contingere lumbos prohibemus.

Alteratio.

Expēde.

Calculus concretus in renibus, si dolorem efficiat vbicunque fuerit, sed potissimum in vreteribus expellentibus curatur, frangentibus scilicet lapidem lubricantibus, aperientibus, dilatantibus, & vrinam prouocantibus: prius tamen obseruare oportet necessariam esse corporis euacuationem ante vretica, & lapidem frangentia medicamenta, siue per sanguinis missionem si dolor fuerit magnus, æger carnosus, ne partes dolentes inflammantur, siue per vomitum si ventriculus abundauerit cruditatibus, siue per clysteres, si intestina, & meatus propinqui, siue per alia medicamenta purgantia, si fuerit his opus, ne trahantur excrementa à ventriculo, vel aliis partibus ad vias urinarias, & ibi augeatur dolor, vel vrina omninò supprimatur.

De curatione calculi.

renum

Sanguinis missio.

Vomitum

Clyster.

Secundò, considerandum satis est tutiorem esse purgationem, quæ fit per clysterem lenientem, & parum acrem, ea quæ fit per potionem purgantem, seu pilulas, præsertim si sit paucus clyster, ne suo pondere extendens comprimat vias urinarias, dolorémque in ipsis augeat: quia medicamentis purgantibus, præsertim valentibus moti humores per corpus à partibus dolentibus attraherentur. Nonnulli hanc euacuationem per suppositoria, seu glandes faciendam esse tutius censent, quos ego non omni ex parte laudo.

Clyster porioni anteponendus.

Cur portio non probe-

Opinio non nullorum.

Dolor in primis sedandus.

Potus.

Tertiò, sciendum est, necessariam esse ante lapidis fractionem doloris curationem omni auxiliorum genere, potionibus videlicet, clysteribus exiguae quantitatis, fotibus, vnguentis, cataplasmatibus, & balneis, vt hoc, aut simili potu. ℞. decocti radicis althææ, foliorum maluæ, & seminis lini ʒ. j. sacchari ʒ. j. misce, & fiat potus: vel ℞. olei amygdalarum dulcium recentis ʒ. iiij. sacchari ʒ. j. misce: vel ℞. decocti camomillæ, & radicis althææ ʒ. vj. sacchari ʒ. ij. misce, & fiat potus. Hic vel similis clyster dolorem harum partium curat, intestina purgat, ac vtramque viam lenit: ℞. parietariæ, foliorum maluarum, bisinaluæ ana. manip. j. seminis lini, fœnugræci, & camomillæ ana. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. vj. olei sesamini, & de semine lini

Clyster

an.

DE CVRAND. MORB.

an. ʒ. ij. benedictæ, & butyri recentis an. ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster. Dolor quoque curatur hoc, aut simili fotu ex decocto, seminis lini, fœnugræci, camomillæ, meliloti, radicis althææ, maluæ, parietariæ & similibus. Inde facit hoc, aut simile vnguentum sæpè renibus & vesicæ, & viis vrinariis adnotum: ℞. olei scorpionum sesamini, & camomillæ an. ʒ. j. axungie cuniculi ʒ. ij. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci: & pulueris croci an. ʒ. j. ceræ quod sat est, misce, & fiat vnguentum. Vel admoveatur hoc, aut simile cataplasma bis in die renibus, & vesicæ: ℞. foliorum parietariæ, senationum apij, & herbæ medicæ, hoc est alfalfa an. m. j. decoquantur omnia, deinde cum oleis scorpionum, de semine lini sufficientibus fiat cataplasma, addendo farinæ camomillæ, fœnugræci, & de semine lini, an. ʒ. ʒ. axungie cuniculi, vituli, & gallinæ an. ʒ. ij. croci puluerizati ʒ. ij. Optimum quoque est in hoc genere remediorum sæpè admovere renibus, aut vesicæ parietariam, vel herbam medicam diuisam in partes paruas, & parum cum vino albo decoctam, vel rorem marinum cum cineribus calidis, & paucò vino, quod à nostris fœminis dicitur Tabalet. Tortella ex ouis v. aut vj. cum aqua nasæ benè permixtis, & postea frixa cum cepæ albo diuiso in partes minimas, & cum pinguedine porci, & oleo scorpionum iuuat multum. Infessus vsque ad vmbilicum in balneo per semihoram ex decocto radicis althææ, seminis lini, fœnugræci, parietariæ, camomillæ, ficuum v. radicum diureticarum, foliorum alliorum & caparum, capilli veneris, liquiritiæ, & similibus. Et dum æger sedet in balneo, bibat potum aliquem lapidem frangentem, de quo postea dicemus: his peraetis si dolor augeatur, aut si vehemens, nec spem vllam frangendi lapidem det sine periculo vitæ, tunc narcotica sunt necessaria mixta medicamentis externis, vel clysteribus, vel potionibus, semper attentè considerando, quæ diximus in vfu narcoticorum capitibus superioribus, præsertim capite. 40. de curatione colici doloris: in hoc tamen dolore ʒ. j. theriacæ magnæ femè recentis sex vel octo mensium est tutior aliis narcoticis, quia simul sensum morbi eripit, vrinam prouocat, & lapidem frangit, vt ℞. theriacæ magnæ sex vel octo mensium vsque ad annum ʒ. j. aquæ capilli veneris ʒ. ij. syrupi de duabus radicibus ʒ. j. misce, & fiat potus. His sic adnotatis accedamus ad medicamenta, quæ lapidem frangunt, & vrinam prouocant, quorum quædam à qualitate manifesta id faciunt, alia tantum à substantia, seu proprietate, alia sunt, quæ à proprietate, & qualitate simul

mani

manifesta. Quæ à manifesta qualitate agunt, amara, nonve-
 hementis caloris. quia vehemens caliditas exiccando, & re-
 soluendo lapidem duriores faceret: incisio enim in his maior
 solet esse caliditate: quæ tamen lapidem renum frangunt
 (præter pauca) possunt vesicæ lapidem frangere, quamuis ma-
 iori vi egeat lapis vesicæ ob magnitudinem, duritiem, & di-
 stantiam maiorem. Medicamenta, quæ rectè lapidem renum,
 aut vesicæ frangunt, multis facultatibus, ac naturis egent, quæ
 rarò vel nunquam in simplicibus reperiuntur. Primò, urinam
 prouocant, ac humores secum ad vias vrinarias trahunt. Se-
 cundò in renibus, aut vesica ipsa, vel facultates earum tem-
 pore debito detinentur, vt possint lapidem frangere. Tertiò,
 renes, & vesica ab ipsis corroborantur, vt postea lapidem fra-
 ctum expellere possint: hoc Galenus docet 10. de compositio-
 ne medicamentorum secundum locos. Simplicia quæ lapidem
 renum, & vesicæ frangunt, grauissimis & antiquis medicis,
 & à me sæpè experta hæc sunt, vinum scilicet, præsertim
 album, radix graminis, semen maluæ sylvestris, ceterac, ca-
 pillus veneris, pentaphyllon, radices cannarum, blitis,
 crocus, cinnamomum, polium maius, cicera nigra, radices
 v. diuretici, asparagi scilicet, petroselini, fœniculi, brusci, &
 apij, raphanus, bdellium, cortex ciperi Ægyptij, cortex radicis
 capparis, armoniacum, ameos, saxifragia, vrtica, chamæpi-
 tys, millium solis, amygdalæ amaræ, nuclei cerasorum, gra-
 na hederæ, nuclei persicorum, siliqua fabarum, eryngium,
 cuius vim in hoc morbo vide apud Ætium. Aqua seu decoctum
 ex his, & similibus quantitate ℥. iiij. vsque ad ℥. vj. cum mel-
 le in hyeme, & saccharo in æstate ventriculo vacuo est exhi-
 bendum: semper tamen præcedat lenitio, & mollificatio via-
 rum urinæ per oleum sesaminum recens, vel amygdalarum dul-
 cium cum saccharo cando, vel per decoctum maluæ sylue-
 stris cum butyro, & melle, vel per terebinthinam benè lo-
 tam.

Frangē-
tia lapi-
dem à
qualita-
te mani-
festa.
Discri-
men re-
num &
vesicæ.

Simpli-
cia lapi-
des frā-
gentia.

Lenitio
præcedat

Sunt etiam & multa alia valentiora medicamenta lapi-
 dem frangentia, vt lapis Iudaicus (de quo Dioscorides libr. 5.
 capite. 93.) quantitate ciceris, præparatus in lapide marmoreo,
 ad modum sieph, lapidem vesicæ frangit cum ℥. iiij. semis
 decocti diuretici, vt capilli veneris: aliqui tamen, vt Galenus
 nono, de facultatibus simplicium medicamentorum lapi-
 dem solum renum frangere existimant. Quidam huius lapi-
 dis præparati drachmam semis præbent cum paucis vino
 albo.

Valen-
tiora.
Lapis Iu-
daicus.

Cin-
is
scorpio-
rum.

Cinis scorpionum assatorum validè, & violenter calcu-
 lum

DE CVRAND. MORB.

lum vesicæ frangit pondere granorum quatuor hordei cum vino maluatico. Ego non auderem eo uti : oleum tamen scorpionum pectini admotum sæpè confert , & eius iniectio per penem.

Lapis spongia. Lapis spongiæ renum tantùm calculos frangit, ut quibusdam medicis grauíssimis placet. Dioscorides tamen scribit frangere etiam vesicæ lapidem. Cuius dosis est è drachma ꝑ. ad drachmam vnam cum pauco vino, vel decocto aliquo vretico.

Lapis lyncis. Lapis lyncis calculos renum , & vesicæ frangit. Dosís est drachma vna cum pauco vino albo , aut liquore aliquo vretico.

Cinis leporis combusti. Cinis leporis combusti valenter frangit lapides renum & vesicæ. Dosís cochlearium vnum, vel drachma vna vsque ad drachmam vnam semis. Forma comburendi leporem tradita est à multis, & à Matthæo de Gradi capit. de lapide renum, & vesicæ, & ab omnibus fermè pharmacopolis cognita est: Plinius tamen lib. 28. scribit renes leporis exsiccatos lapides renum & vesicæ frangere.

Cinis corticū ouorum gallina- ceorum. Cinis corticum ouorum adustorum , à quibus pulli sunt egressi, valenter frangit lapides renum, & vesicæ, à me sæpè est expertum hoc medicamentum. Dosís à drachma semis , vsque ad drachmam vnam cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico.

Sanguis hirci. Sanguis hirci præparatus valenter frangit lapidem renum & vesicæ, est expertus à multis, & à me facileque obtinet principatum in curando hoc morbo. Eius dosís est à ʒ. ꝑ. vsque ad ʒ. j.

Cinis motacillæ. Cinis motacillæ, quam caudatremulam vocant, valenter frangit lapides renum , & vesicæ , & caro huius auiculæ tam elixa, quàm tosta habet eandem facultatem.

Lapis hominis, vel porci. Lapis hominis, vel porci lapides renum frangit , autore Galeno, sed aliorum sententia renalis lapis frangit renum lapides, & vesicæ calculus comminuit vesicæ calculum. A me non est expertum medicamentum, neque à meis præceptoribus.

Puluis cimicis. Puluis cimicis lapides quoque frangit. Dosís ʒ. ꝑ. cum vino albo, vel aliquo alio liquore vretico. Non sum expertus : viuæ tamen per penem immissæ vrinam prouocant, quemadmodum pediculi.

Ossa mespilorum. Puluis ossium mespilorum lapillos renum, & vesicæ frangit. Dosís à ʒ. ꝑ. vsque ad ʒ. j. Est à multis, & à me hic puluis sæpè expertus.

Puluis corticū auellanarum. Puluis corticum auellanarum frangit lapidem: Dosís ʒ. j. decoctum etiam earum eadem vi pollet. Est expertum medicamentum.

Puluis

Puluis anseris combusti cum paucō vino albo frangit lapidem, vt aliquibus autoribus placet. *Puluis anseris.*

Puluis pullorum hirundinum combustorum frangit lapidem. Dosis drachma vna. Carnes eadem facultate præditæ sunt. *Pullorū hirundinum.*

Lapides inuenti in capitibus gallorum, & columborum veterum frangunt lapidem cum paucō vino albo: Dosis à drachma semis vsque ad drachmam vnam autore Plinio libro 30. *Puluis lapidis gallorū gallinaceorum,*
Crista galli gallinacei habet eandem vim, vt quidam arbitrantur. *& columborum.*

Puluis vesicæ mustellæ frangit lapidem. Dosis drachmæ duæ. *Puluis vesicæ mustellæ.*

Puluis vesicæ apri cum vrina exiccata (Plinio autore lib. 15.) frangit lapidem. Multi alij volunt solam vrinam apri hac eadem vi præditam esse. *Puluis vesicæ apri.*

Puluis cornu cerui assati frangit lapidem. Dosis 3. j. *Cornu cerui.*

Puluis foliorum mori valenter frangit lapidem. Dosis drachma vna. *Puluis foliorū mori.*

Pellicula interior ventriculorum pullorum gallinaceorum frangit lapidem, vt docet Plin. lib. 30. *Pellicula interior.*

Lapides inuenti in vesica fellis bouis frangunt lapidem. *Lapides vesicæ fellis bovis.*

Puluis renum asinorum frangit lapidem, vt scribit Plinius lib. 18. *Puluis renorū asinorū.*

Cinis glandium frangit quoque lapidem, vt docet Plinius lib. 24. *Cinis glandiū.*

Lumbrici terrestres frangunt lapidem, autore Plinio, lib. 30. *Lumbrici.*

Lapides reperti in hepate apri lapidem quoque frangunt, vt vult Plin. lib. 28. *Lapides hepatis apri.*

Cinis Erinacei combusti rumpit lapidem, præsertim si repariatur iuxta rubum, quia rubi fructus habet hanc vim, vt ego sum expertus. Dosis à drachma semis vsque ad drachmam vnam. *Cinis Erinacij.*

Stercus columbinum mistum cinnamomo, & theriacæ magnæ frangit lapidem: vt ʒ. pulueris stercoris columbini, cinnamomi, & theriacæ magnæ. an. 3. ʒ. aquæ capilli veneris 3. ij. syrupi de duabus radicibus 3. j. misce, & fiat potus. *Stercus columbinum.*

Puluis scarabei combusti, & apis fortiter comminuit calculum. Dosis ab ʒ. ʒ. vsque ad 3. semis. *Puluis scarabei.*

Cinis leporis, & præsertim capitis valenter frangit lapidem, & carnes eiusdem habent eandem vim, si comedantur. *Cinis leporis.*

Puluis cantharidum præparatarum, cicadarum, & noctilucarum valentissimè frangit lapides, & eo non est vtendum, nisi cum columbinum. *Puluis cantharidum, & noctilucarum.*

Puluis scarabei. Cinis leporis. Puluis cantharidum, & noctilucarum.

DE CVRAND. MORB.

Forma cū alia non suffecerint. Præparandi forma scripta est capite
præpara- 44. de curatione hydropis : quam etiam hic decreui indicare.
ndi can- Accipe duas , aut tres cantharides demptis capitibus , & pedi-
tharides. bus tantum, vt Hippocrates, & Dioscorides docent, & non alis,
 vt Arabes volunt, benè pistas: quibus adde dragaganti , & gūmi
 Arabici in aqua maluarum dissoluti. an. ʒ. iij. postea in vmbra
 exiccentur , & eodem modo bis , vel ter infundantur omnia in
 decoctum maluarum , & tandem fiant trochisci. Quorum dosis
 est ab scrupulo vno cum paucō oleo sesamino , vel amygdala-
 rum duleium , vel decocto maluarum.

Compo- Composita medicamenta, quæ lapides renum & vesicæ fran-
sita lapi gunt, parari possunt omnia necessaria, & vtilia huic morbo me-
desfran- lius quàm simplicia, vt superius diximus. Et quamuis sint mul-
gentia. ta à doctoribus tradita, in præsentia nobiliora, & magis exper-
Confe- ta trademus : vt ℥. cineris vitri , cineris scorpionum , cineris
ctio salu- cauli nabati, cineris leporis, spongiæ, sanguinis hirci præparati,
berrima. cineris corticum ouorum, à quibus pulli egressi sunt, lapidis Iu-
 daici, gummi, nucis, macis, acori. an. partes æquales, seminis pe-
 troselinæ, dauci, pulegij, gummi Arabici, seminis althææ, & pipe-
 ris. an. partem vnā , & semis , mellis. q. s. misce, & fiat con-
 fectio. Dosis, drachmæ tres cū aqua, vel aliquo decocto vretico,
 est medicamentum expertū, & saluberrimum. Hoc quoque me-
 dicamentum est optimum, & ab eruditissimis medicis probatū.

℥. lapidis Iudaici, gummi cerasi, lapidis spongiæ, corticis me-
 lonis, liquiritiæ, an. ʒ. iij. seminis dauci, vitri combusti, abro-
 tani. an. ʒ. medullæ granorum pini, & amygdalarum dulcium.
 an. ʒ. iij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis drachmæ tres.

Alterā an. ʒ. iij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio. Dosis drachmæ tres.
cōfectio. Hoc etiam medicamentum est vtilissimum, & valenter frangit
 lapides renum, & vesicæ: ℥. sanguinis hirci præparati , lapidis

Tertiā. Iudaici , lapidis inuenti in vesica fellis vaccæ aut tauri : anisi
 asari , amygdalarum amararum, seminis cucumeris, bdellij, co-

Quartā. sti. an. æquales partes , mellis quod sufficit , misce, & fiat con-
 fectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubæ , vel asari,
 vel camomillæ. Hoc medicamentum Gal. 10. de compositio-
 ne medicamentorum secundum locos valenter frangit lapi-

Medici des & purgat renes , & vesicam , & dolores curat. ℥. cassiæ
cuiusdā lignæ ʒ. ij. seminis apij. ʒ. iij. myrrhæ ʒ. x. piperis ʒ. ij. oli-
cibus, bani ʒ. iij. lapidis de syria masculi , vel fœminæ ʒ. j. seminis
aut bo- pastinacæ, anisi an. ʒ. ij. spicæ nardi ʒ. ij. amygdalarum amara-
lus. rum, asari. an. ʒ. iij. storacis, ireos. an. ʒ. iij. seminis papaue-
 ris albi ʒ. ij. seminis cyperi. ʒ. ij. mellis quod sufficit , misce,
 & fiat confectio. Quidam medicus eruditus laudat non pa-
 rum ad lapides frangendos cibum , qui fit ex hepate, pulmone,

reni

renibus & testiculis cum priapo hirci, cum croco, cinnamomo, & melle, & postea imple intestina hirci hac mixtura. Dosis sunt duæ, aut tres bucellæ. Habet tantam vim hoc medicamentum ad lapides expellendos, ut non solum à renibus, & vesica, sed ab annulo comedentis fracti omnes excutiantur. Res est monstruosa, si vera est. Præter supradicta quatuor medicamenta composita, sunt multa alia à doctoribus laudata, & probata, inter quæ litrонтipon à 3. j. usque ad 3. ij. theriaca magna, & mithrydatum, electuarium ducis, dialacca, & diacurcuma sunt magis in usu, & magis experta: quamuis multa alia scripta sint, & etiam componi possint ex simplicibus superius dictis, & similibus: semper tamen, ut superius admonuimus, præcedant hæc vretica, & quæ lapidem frangunt mollientia, & anodina externa, & interna: de quibus iam satis diximus. Sed præter illa utilis erit hic, aut similiter clyster semel, ut minimum in die, ℥. florum camomillæ, p. iij. meliloti, fœnugræci, seminis lini. an. p. ii. ℥. seminis fœniculi 3. ℥. olei libr. vj. vini libr. j. decoquantur omnia ad vini consumptionem, postea conseruetur oleum percolatum. Dosis cuiuslibet clysteris vnciæ sex. Sæpè in die, vel saltem ter vngatur pecten, femur, & tota regio vesicæ, & renes, si opus fuerit, hoc vnguento: ℥. axungiae cap. 3. j. axungiae anatis, gallinæ, & cuniculi an. 3. ℥. axungiae ursi, medullæ crurum ursi, vel vituli, & theriacæ magnæ. an. 3. iij. emplastri filij Zachariæ 3. vi. olei scorpionum, lumbricorum, camomillæ, & anethi, an. 3. ℥. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Sæpè quoque admoveatur parti dolenti vesica porci, vel hirci, plena sequenti oleo. ℥. olei ℥b. j. florum camomillæ. p. j. ℥. vini optimi ℥b. ℥. decoquantur omnia donec vinum consumatur, cui percolato adde olei lumbricorum, de lilio, & sesamini. an. 3. iij. olei scorpionum 3. ij. misce, his impletur prima vesica. Ad implendas alias vesicas: ℥. florum camomillæ, melliloti, utriusque stichados, suæ arteticæ an. p. j. foliorum vrticæ. m. ij. parietariæ m. iij. radicum althææ 3. ij. malvarum. m. ij. ℥. seminis lini, fœnugræci, & milij solis an. 3. j. seminis fœniculi, & carui. an. 3. iij. liquiritiæ 3. j. fiat decoctum in libris duodecim aquæ donec tertia pars consumatur. Inter ea, quæ maximè utilia, & necessaria sunt ante usum, & in usu vreticorum, sunt balnea usque ad umbilicum ex decocto rerum dictarum superius, quæ vias urinarias aperiunt, molliunt, & dolores sedant: hæc tamen temperatè, & non in frequentissimo usu conferunt, ne pars dolens, & ægra fiat nimis apta ad recipienda excrementa totius corporis, & humores, & iterum generentur lapides:

Observatio.

Vnguentum.

Vesica admo- uenda.

Balneo- rum v- sis mo- deratus.

DE CVRAND. MORB.

lapides : semper tamen ventriculo , & intestinis vacuis oportet ingredi balneum. Præter hæc balnea, quæ fiunt ex rebus vreticis, & lenientibus , sunt alia multa naturalia balnea calida, sulphurea, vel salsa, quæ habent vim manifestam, & occultam provocandi urinam, & lapidem frangendi: quæ quotidie experimur apud Italos, Gallos, Hispanos, & præcipuè inter Vasconiam & montes Perinæos sunt optima balnea dicta de Cautes. De his

Proble. ult. 24. Philosophus 14. particula problem. ultimo.

part. In exhibendis vreticis medicamentis debet esse prudens medicus & non audax : sed semper, si fieri potest, ab iis absteineat, præsertim valentibus , nisi urgente dolore , & præsentē calculo , & necessitate : quia sæpè ex usu eorum immodico fiunt ulcera , vel ardor urinæ , profluuium, & tandem alij morbi perniciosi.

Cucurbitula. Cucurbitula renibus admota movet lapidem, & postea admota per vretes versus vesicam ducit ipsum ad eam.

Si urina supprimatur. Aliquando lapis inter vesicam, & penem infixus urinam supprimit, & instrumento argenteo dicto cathetere, seu algalia impellenda est ad vesicam, vel scapo petroselini, vel calamo gallinæ, vel candela cerea. Si verò appareat, ferreo instrumento extrahatur.

Incisio, & eius curatio. Aliquando necessaria est incisio in pene. Si fuerit prædurus, & magnus lapis in vesica , sola incisione extrahi potest: hæc tamen faciendā est à viro perito, & docto: incisio verò pro magnitudine lapidis erit faciendā , quæ cognoscentur immisso digito per anum : & postea curetur vlcus per consolidantia , & glutinosa, & per cibi, & potus abstinentiam. Si sanguis in vesicam descenderit, ibique coalescat, antequam putrescat, theriaca magna , vel coagulo hœdi cum decocto liquiritiæ euacuabitur per urinam.

Scholium.

REnum & vesicæ calculi.] *Vrina frequenter supprimitur à renum calculo, aut vesicæ. Proinde breviter, qua ratione huic malo occurrendum sit, explicabo. Prius autem scias velim me consultò omittere multa, quæ in calculi disputatione proponuntur (ea enim habeo diffusè scripta, in lib. de simpl. med. fac. quem imprimendum statim, domi seruo) solùmque supponere, materiam, causam efficientem, & generationem calculi, ut inde colligamus essentiam medicamentorum, quæ ipsum comminuere nata sunt. Calculi materia est humor crassus, siue sit pituita, aut melancholia. 3. de alim. fac. cap. 6. siue purulenta substantia epy. 6 par. 1. comment. 15.*

Causa

Causa, qua calculum efficit, est calor immodicus quantitate aut tempore, non autem frigiditas, ut male voluit Vallesius, lib. 6. epy. non considerans ex Galeno, ac proinde ex veritate, viuentis animalis non posse, tantam frigiditatem intendi, ut ex ea aliquid concrescat in duritiem. Generatur calculus, calore euaporante humidam partem crassi humoris, & reliquam concrecente, ita ut si ille concretus humor in renibus moram faciat ab altero augeatur, quoad lapidis magnitudinem ex arenula acquirat. Lapis in renibus generatus & detentus, dolorem grauem efficit 6. epy. par. 1. sent. 6. quia renes non sentiunt nisi per membranam. Vallesius eodem loco existimat, magnum lapidem, quando exciditur ex carne renis, acutum dolorem inducere. Id colligit ex eo, quod hunc dolorem, difficile distinguere possumus, à colico dolore. Quæ sententia facile refutabitur, ab eo qui considerat, carnem renis esse insensilem, ac proinde neque à magno lapide posse acutè dolere, quod exemplo inflammationis docet Galen. 6. aphor. com. 5. Adde in carne renis, non posse generari lapidem, quia deficit locus, nempe cavitatis: & ita Gal. 6. epy. agens de lapidis generatione, semper eius meminit. Accidit quòd si in carne renis lapis generaretur, non posset ad vreterem permeare. Probatio etiam infirma est, quia cùm principium vreteris, sit iuxta colon, dolor à lapide in eo contento excitatus, bene poterit à nobis colicus iudicari, præcipuè acutissimus cùm sit, vreteres enim multum sensiles ex natura sunt. Hunc renum dolorem nephritim appellamus. Quem vomitus primò pituita, & deinde bilis aruginosa comitatur. Ratio hæc est. Hic dolor ad se attrahit sanguinem, & spiritum magis, quibus destitutus ventriculus debilitatur, & cùm sit pituita naturalis officina eam euomit: in vreis autem quæ sunt iuxta renem, à caliditate bilis adurit & fit aruginosa quæ ad ventriculum languidum expulsa vomitu euacuatur. Franciscus Vallesius 7. epy. com. 59. dubitat, qua ratione lapide existente in vno rene, aquosa fiat urina, aut supprimatur: si verum est ex Galeni sententia, partes geminas affectas esse, ut una lasa, altera ageret. Respondet venas emulgentes, simul oriri ex vna causa, ac proinde, posita raro unum renem, lapidem congerere, quin alter, à crassis succis & arenis obstruatur: & ideo urinam supprimi, aut colatam per ambos eiusdem renes puriorem excerni. Hoc autem intelligendum est in affectibus dolorem generantibus, quia in indolentibus benè potest esse affectio in vno rene, altero non cessante ab actione. Quod confirmat in homine, quem totum renem corruptum habuisse, & per urinam excretum, se vidisse testatur, qui urinam altero rene solo reddebat. Quid si in vretere prodiit lapis, & supprimatur urina? id inquit fieri, quia ob dolorem perit nixus musculorum abdominis, qui ad reddendam urinam necessarius maxime est. Hæc Vallesius. Quæ omnia falsa sunt, imprimis

Causa efficiens. Vallesius errat.

Modus generationis calculi.

Dolor grauis.

Vallesius errat.

Nephritis.

Vomitum in nephriti-

de.

Dubitatio à Val-

lesio pro-

Solutio

primis

DE CVRAND. MORB.

Refuta- primis cūm responderet, emulgentes venas à caua oriri, ac proinde
tur Val- affecto uno rene, alterum affici, rem falsam supponit: nempe simul
lesius. debere affici duos renes, hoc enim est contra experientiam, quia in
 dies experimur lapidem in uno rene existente, alterum renem re-
 ctè operari, ea ratione qua abiecto uno oculo sapè, alter alius ser-
 uatur. Neque distinguit rectè, quia siue sit affectus dolorificus, siue
 indolens, affecta una parte, reliqua optimè aget. Præterea si duo
 sunt renes, & duo ureteres, quis sibi poterit persuadere, lapidem
 unum ureterem obstruentem suppressere urinam? Ratio ex nixu
 musculorum desumpta nil persuadet, quia muscoli abdominis non
 habent vesicam subiectam, qua intra ossa pubis latitat, & sic potest
 comprimi solum, quando repleta est, à musculis rectis, ea parte qua
 ossibus pubis adherent. Adde, urinam excerni à facultate natura-
 li, qua expultrix dicitur. Tum si propter dolorem cessat musculorū
 nixus: debuit etiam in colico dolore cessare, & eadem ratione u-
 rinam suppressere. Experimentum etiam illud quod adducit, cor-
 rupti renis & per urinam excreti tanquam impossibile omittendū
 est: si enim ureteres tensi seruantur à renibus, non corruptus per
 quam partem ingredi poterit ureterem laxatum? tum si ren corru-
 ptus urinam non attrahebat, qua ratione renis frustula deducebā-
 tur ad vesicam? omissio ergo hac in parte Vallesio, qui controuer-
 siam ponit ubi non est: dico naturam duos fabricasse renes, ut im-
 peditam unius actionem, alter suppleret (non ut voluit Vallesius, ne
 facile obstruerentur) & uide sequi esse impossibile (rectè se habente
 collo vesica) à lapide in uno rene contento, posse urinam suppressi.
 Quod si urina suppressio contingat, necessario in duobus renibus erit
 obstructio; aut si in uno tantum rene sit lapis (quod ex dolore colli-
 ges) excrementa crassa in vesicam delapsa obstruerēt eius collū, &
 impedirēt, urina transitum. Qua ratione distinguatur dolor ne-
 phriticus, à colico capite de dolore colico explicatum habes.

Medica- Calculus concretus in renibus.] Quando aliquis solitus est la-
menta pidem in renibus generare, eo tempore quo arenulas emittit, neque
renes dolore cruciatur, potest habere usitata aliqua medicamenta renes
expur- expurgantia: qualia sunt mel cum vino albo, mel cum pulvere os-
gantia. sium messilorum, decoctum pastinaca cum melle, aqua distillati-
 tia florum fabarum cum melle, & similia. Si lapis existat in ure-
 tere acutum excitans dolorem, dilatantibus viam indigemus, simul
 etiam possumus frangentia lapidē assumere. In dolore hoc nephri-
 tico auctor sanguinem mittit, si ager sit carnosus: quasi solum
 oporteat secare venam in plethoricis affectibus. Secabimus ergo ve-
 nam in magno dolore, non propter dolorem, quia hic cūm deiciat
 vires, potius eam impedit: neque propter morbum, quia lapis sui
 ablationem indicat, qua sanguinis missione, excerni non potest,
 sed

**Sectio
vena.**

sed propter morbum magnum, qui futurus timetur, nempe inflammationem.

Secundò considerandum.] Non rectè hoc in loco rem explicat Taxatur auctor, quia si multus humor continetur in venis, potius medicamentum auctor. to purgati per os assumptio euacuabitur, quàm clysteribus lenibus.

Tertiò sciendum est.] Dolor nephriticus aut urget, aut non. Curatio si urget, cum deiciat vires, ad se trahit curationem, & ideo sedandus doloris est. Quod còmode prestabit hoc unguentum, exterius positum in ilibus urgentis supra locum dolentem. ℞. olei scorpionum, & camomilla an. ʒ. ij. unguenti aragon, & axungia gallina an. ʒ. Philonij maioris. ʒ. ij. cera parum, fiat unguentum. Hoc dilatat partem emollientibus, & stupescit narcotico medicamento. Possumus etiam uti aliquo ex dictis oleis, cum ʒ. ij. opij permixto. Per os assumere potest ager iheriacam magnam, quando fermentationem patitur, quo tempore stuporem inducet, quia opium adhuc seruat vim: aut ʒ. j. Philonij maioris (quod post duos annos totius est) cum aqua pastinaca, aut fœniculum, ut permeet. Quod si neque remediis dictis sedatur dolor, in balneo (quod statim describetur) bibat medicamentum narcoticum: si hoc non possit, assumat, quæ vim habent calculum còminuendi, oleum amygdalarum dulcium, cum melle, aut saccharo candi appellato, quod etiam habet lubricandi vim: pulvis etiam ossium messillorum, vulgò azeroles utilis est, sicut & hæc potio. ℞. litontripon ʒ. j. s. pul. elec. dæcis. ʒ. s. cum ʒ. iiij. aqua pastinaca, fiat potus. Si dolor non urget, curatio à cause ablatione inchoabitur propellentes lapidem à renibus ad vesicam, medicamentis, quæ calore & humiditate laxando, ureteres dilatabunt. His exterius applicatis, & clysteribus prestabis, exterius multis poteris uti unguentis, illud, quod paulo supra descripsimus, ab eo auferentes Philonium, ac commodatum est. Sicut & hoc alterum. ℞. unguenti agrippæ. ʒ. j. olei scorpionum. ʒ. ij. olei rutacei. s. cera parum, fiat unguentum, cui adde axungia cuniculi. ʒ. ij. His inungatur ilij regio, & superponantur herba medica folia, à caliditate moderate madentia, vulgò alfasa absasnor. Clysteres parare poteris ex ruta, anetho, fœniculo, maluis, fursure, semine lini, & fœnugraci: decoctioni addens, benedicta confectioem cassiam, saccharum rubrum, oleum rutaceum, aut butyrum. Quod si his remediis dolor non remittitur, ad balneum uniuersale deueniendum erit, paratum ex aqua in qua lauer seu sion vulgò erexena, parietaria, alihæa, malua, & semen lini bullierint: ita ut ex eisdem herbis meatus urinary fricentur, ut dilatentur. Quod si ager noluerit ingredi balneum, prædictas partes eadem aqua fouebit, spongia vel lana. Si his omnibus peractis lapis sæper resistat, neque excernatur, imò suppressionem urinæ efficiat, paucos ab ea liberari videbis. Quod si descendat ad vesicam lapis, & ibi

Curatio
nephriti-
dis, cum
non ur-
get dolor
Exterius
applicā-
da.

Clysteres

Balneum.

Si lapis
in vesica
urinam
suppri-
mat.

in medica arte sunt, ne conniuentibus, quod aiunt oculis, causas huius mali inspiciant: decipiuntur enim passim credentes ex vesicæ calculo oriri, vnde medicinas comminuendis calculis accommodatas miseris ægrotantibus ministrant, quod in eorum perniciem vertitur: augetur enim per ea medicamenta, quæ calidâ facultate sunt prædita, urinæ acrimonia: vnde vlcus aut in renibus, aut in vesica generari necessum est, ideoque iugiter cruciati torqueri, qui in tam impias carnificum manus inciderunt, quemadmodum cuidam meo tempore contigit, qui initio remedia necessaria fugiens, post empiricorum omnia remedia amplectens in urinæ multitudinem lapsus est, & eos morbos, à quibus deinde periti medici leuare minimè potuerunt.

*Historia
obser-
uanda.*

Stranguria, si à calculo fiat, curatur iis, quæ diximus superiori capite. Si ab vlcere, abstergentibus, mundificantibus, & incarnantibus (vt ita dicam) vlcus: de quibus cap. 28. de curatione sputi sanguinei diximus: quanquam hîc miscenda sunt, quæ clemèter ad vias urinarias alia medicamèta deferant. Si ab acrimonia, auferentibus causam. Primò, si bilis est urinæ mixta, victu frigido, & humido, vt vsu lactucæ, portulacæ, cichoreæ, vtriusque maluæ, cremoris hordei, & similium: quatuor tamen semina frigida maiora sola nocent prouocando urinam. Prodest fugere acria, falsa, acetum, coitum, labores animi, & corporis. Secundò, sanguinis missione per sectionem venæ hepaticæ dextræ, euacuando sanguinem plenitudini & robori respondentem. Hæc refrigerat hepâr, bilem vacuat, & à viis urinariis auertit.

Curatio

*Si ab a-
crimo-
nia cu-
ratio.*

*Quæ fu-
gienda.
Sectio*

Tertiò, purgantibus bilem prius sumpto syrupo rosarum ex infusione siccarum cû aqua portulacæ per tres, aut quatuor dies ad tollendam bilis acrimoniam, & caliditatem, medicamentis clementibus, vt cassia fistulari, manna, tamarindis, myrobalanis citrinis, & rhabarbaro, vt hoc aut simili potu ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. j. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuivæ ʒ. iiij. syrupi violarum ʒ. j. aquæ borraginis. q. s. misce, & fiat potus. Et quia morbus est diuturnus, hac confectio fiat vacuatio frequens ℞. medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ʒ. j. medullæ tamarindorum, & diaprunis solutini, & confervæ rosarum recentis, an. ʒ. ss. mucilaginis seminis psyllij in aqua maluarum extractæ ʒ. iiij. pulueris diarhodon. Abbas ʒ. ij. sacchari dissoluti in aqua rosarum ʒ. iiij. misce, & fiat confectio. Dosis qualibet hebdomada cochlearia duo. Hoc etiam, vel simili clystere purgatio frequens est utilis. ℞. foliorum maluarum, lactucæ, violarum, & portulacæ an. m. j. hordei excor-

*vena.
Præpa-
ratio.
Purga-
tio.
Potio.*

*Confe-
ctio ad
usum.*

*Dosis.
Clyster.*

DE CVRAND. MORB.

ficati. p. j. seminis psyllij, & cydoniorum, an. 3. ij. fiat decoctū: de quo percolato accipe vncias decem, cui adde olei violarum vncias tres, cassiæ fistularis præparatæ 3. j. vitellos ouorū numero duos, misce, & fiat clyster. Ex solo lacte ouino, vel caprino clyster est optimus, & eius frequēs vsus vtilissimus huic morbo.

Alteratio.

Balnea.

Electua-

ria.

Conserua

Aqua.

Vnguentu

Vsus vi-

tellorum

ouorum

lauda-

tur.

Puluis.

Syrupus

eximius.

Quartò, refrigerantibus hepar, renes, & totum corpus internis & acrimoniam vrinæ tollentibus, & externis auxiliis, vt balneo folius aquæ tepidæ, electuario diatrium santalorum, diarrhodonis Abbatis, conseruis violarum, rosarum, nenupharis, & acetosæ: aquis, vel decocto portulacæ, endiuia, cichoreæ, acetosæ, & similibus. Vnguento santalato hepatis, & renibus bis in die admoto, vel hoc, & simili vnguento. ℞. oleorum rosarum, nenupharis, & violarum aqua rosata lotorum an. 3. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum aqua rosata extractæ an. 3. ij. santalorum omnium, & trochiscorum de cāphora an. 3. j. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Vsus longus vitellorum ouorum recentium cum syrupo violato tollit vrinæ acrimoniam, & stranguriam. Puluis hic curat quoque eam. ℞. seminis papaueris 3. j. seminis lactucæ, & portulacæ parum tostæ an. 3. iiij. pulueris liquiritiæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum an. 3. j. sacchari candi violati 3. iiij. misce, & fiat puluis, qui cum ouo recenti summo manè, vel cum iure ante cibum quantitate vnus cochlearij sumatur. Syrupus de mucilaginibus ex Matthæo de Gradi, curat hanc vrinæ acrimoniam, & prohibet vlcus fieri in viis vrinariis: estque medicamentum singulare, optimum, & expertum, cuius est hæc descriptio. ℞. seminis althææ, maluarum, cydoniorum. an. 3. j. dragaganti. 3. iiij. infundantur in aqua tepida decoctis maluarum, seminis papaueris albi, & granorum alkekengi an. quantum sufficit: postea fiant expressiones dictorum seminum, & dragaganti, de quorum mucilaginibus fiat syrupus, vt ℞. prædictorum mucilaginum 3. j. s. decoctum prædictæ 3. iiij. sacchari optimi 3. ij. misce ad vnā dosim, quæ per sex, vel octo dies exhibenda est: & si fuerit vehemens caliditas, adde parum mucilaginis seminis psyllij. Aliquando in maxima acrimonia, & caliditate vrinæ oportet syringe argenda per sy teo per penem lac ouinum sæpè iniicere, vel aquam plantaginis vel hordei decoctum cum mucilagine seminis psyllij, vel cydoniorum vel collyrio albo Rhasæ sine opio, & in maximo dolore cum opio.

Scholium.

Ardor urinae quem medici.] Stranguria, à Latinis *urinae* stillicidium dicitur, in quo *urina* parum, & frequenter reddimus, l. b. 5. aph. com. 53. Quod symptoma proprium est vesicae deprauatae expellentis *urinam*. Neque enim loquimur de stranguria critica. Cuius meminit Hipp. epy. part. 1. sent. 41. in qua humores Causa acres per renes ex toto corpore expurgantur. Causa symptomatice stranguria, ex Galeni sent. lib. 3. de caus. symp. c. 2. duae sunt, *ria* duae: imbecillitas facultatis retentricis vesicae, & *urinae* acrimonia. Imbecillitas vesicae fit ab octo intemperiebus, quatuor nudis ex lib. 3. itatis v. aph. com. 16 & potissimum à frigida 7. aph. com. 48. aut à quacumque fluxione humoris 3. aphor. com. 16. Acrimonia *urinae* sa- varias habet causas. Prima est abscessus ruptus in renibus, aut aliis Variis partibus, & per *urinam* expurgatus. Ad hanc causam reducenda causa est bilis acris, quae permixta cum *urina* stranguriā efficere solet: de acrimonia intelligendus est Gal. 3. aph. com. supradicto, cū scribit intemperie primò calidā, secundo calidā & siccam, tertio humidam acrem na- reddere *urinā*. Quo loco, ubi Gal. habet humidā, lege siccam, quia Prima. humida intemperies impedit humoris acris generationem, quam ipsam generare possit. Secunda causa est pituitosum simulque salsum Secunda excrementum. Hoc autem salsum redditum est, non à putredine, sed ex permixtione salsa serosa humiditatis, hoc est *urinae*, quae salsa est pituita enim crassa & glutinosa cū sit. habensque permixtam salsam serosam substantiam detineatur in vesica, magis irritat, quàm faciat *urina* sola. Tertiam causam stranguria addit Gal. 6. de loc. aff. c. 4. vlcus in vesica, aut meatu pudendi. Vbi per meatum pudendi intellige vesicae principium, quod cervicem vesicae appellant. Potest tamen aliquis hoc in loco Gal. tanquam diminutum accusare, quia omittit lapidē, & arenulas, à quibus stranguria excitari solet. Cui satisfacimus ea ad acrimoniam reuocantes, quia reuera arenula, & lapis caliditatem, & ardorem habent, aut ad vlcus, quia haec in transitu per corpora sentientia (saltem lapidis) sua asperitate molestiam inducunt. Quod si lapis in cervice vesicae contineatur, stranguria etiam causa est, quia obstruens, & si non omnino liberum *urinae* transitum impedit. Si acrimonia *urinae* Curatio quae stranguriā facit, à pure abscessus rupti ortum habeat, absterge- stranguramus vlcus renis, mulsa permixta cum decocto pastinacae, & mariae ab aluarū: pastinacae, ut sit vehiculum, maluarū verò propter acrimoniam. crimo- Mundato ulcere (quod ex paucis pure, minori faetore *urinae* & paucis *urinae* sanguine excreto colliges) cicatricem inducemus cum decocto capivi nae factae glandium, aut malicorij, addito paucis melle, aut saccharo cando

Tertia.

Excusatur Galenus.

DE CVRAND. MORB.

ut penetret. Exteriùs ad conglutinandum illines, unguento comi-
tiffa cum pauco aceto, ut penetrare possit. Alia etiam unguenta ex
oleis myrtillorum, rosarum, & cydoniorum cum pulueribus myrtil-
lorum, corticis maligranati, & similium, qua adstringere nata sunt
construere poteris cum pauca ceras. In acrimonia vrina à pituita
salsa, aut bile, sanguinem mittes propter venarū affectū, tum etiā,
quia sanguinis missio, ex accidenti refrigerabit euacuato humore ca-
lido. Secundo preparabis humorem, si sit pituita, oxymelle, rhodo-
melle, & aliis cum decocto maluarum, & liquiritia propter acri-
moniam. Si sit bilis, non eget preparatione, quia tenuis est. Tertiò
purgabimus bilem, cassia simul cum electuario de succo rosarum, &
syrupo rosarum Alexand. ex 9. infusionibus: pituitam verò diaca-
tholicon, diaphanicon, & agarico cum predicto decocto. Aduerte
tamen, in ardore vrina ex pituita salsa maxima utilitatis esse, usū
therebintina abietina: si eam à ʒ. ij. usque ad ʒ. ʒ. cum syrupo
violaceo assumamus. Renes & iecur in stranguria unguento re-
frigerante illines, ceroto santalino, aut ceroto refrigerante Gal cum
pauco aceto. Hoc etiam. ℞. ceroti sandarini ʒ. ij. olei nenuphari-
ni ʒ. ij. aceti ʒ. ʒ. cera parum, fiat unguentum, Neque omittendū
erit balneum aqua tepida, quod excrementa renum refrigerat, &
dilatat vias, ut ipsa euacuari possint. Syrupus de mucilaginibus à
Matthæo de Gradi, compositus maxime ardorem extinguit: si ta-
men non sint in renibus crassa excrementa: Tunc enim permiscebi-
mus cum eo oximel, aut paucum oximel scillitici. Syrupus hoc mo-
do parari poterit: ℞. seminis althæa maluarum, & cydoniorum an.
ʒ. j. dragaganti ʒ. ij. infundantur in aqua decoctionis malua-
rum, seminis papaueris, & granorum Alkekengi, an. q. s. deinde
fient expressiones dictorum seminum, & dragaganti: de quorum
mucilaginibus, & decocto predicto q. s. cum saccharo albissimo con-
ficiat ut syrupus bene coctus. Huius assumet manè ʒ. ij. cum hoc
decocto: ℞. decoctionis maluarum, liquiritia, seminis papaueris &
granorum. Alkekengi ℞. j. Si stranguria à lapide aut arenulis
oriatur, curabitur ea ratione qua diximus c. superiori.

Cate-
ther con-
struendus

Aliquando in maxima acrimonia.] Si instrumento argenteo ab
auctore posito, liquorem immittas, non perueniet ad vesicam, sed
poteris construere catether, quod habeat longitudinem quindecim
digitorum, ita ut in parte superiori sit latius.

De mictu sanguinis. CAP. XLIX,

Causa
Externa

Sanguinis mictus sæpè à causis exterioribus fit, nonnun-
quam etiam ab interioribus. Exteriores sunt casus, & ictus
maximè cum partibus, quæ iuxta vrinae instrumenta sunt,
inferun

inferuntur: rumpitur enim ex hac occasione vena aliqua in illis locis vnde sanguinis mixtio contingit. Prætereà rerum calidarum vsus, & immoderata corporis agitatio, & ea omnia, quæ sanguinem attenuare, & ad renes, & vesicam propellere possunt, hoc malum pariunt. Internæ sunt corporis plenitudo, hepatis imbecillitas, renum in attrahendo valida facultas, eorūdem, atque vesicæ exulceratio. Calculus porro in renibus, aut abscessus aliquis, & naturæ indicium, quam Crisim appellant, causæ sunt. Si à causis externis proueniat hoc malum, ægrotum, quod milles dictum est, interrogabimus. Si ab internis, in causarum cognitionem sic deueniemus: si corporis plenitudo causa fuerit per methodos superius traditas, maxime cap. de cephalalgia, signa patebunt. Si hepatis imbecillitas, vrina emittitur cruenta, carniū recens cæsarum lotioni non absimilis. Si reni in attrahendo robur, vrina pari ratione cruenta, sed aliquando albidior. Si exulceratio renum aut vesicæ, sanguinis puri commixtus, & modicus excernitur: ad hæc dolor sentitur circa locū, cui vlcus inest. Si calculus renum aut abscessus, signa ex propriis capitibus mutuari oportet. Si naturæ indicium, iuuari ab ea re laborantem cernimus.

Mictus sanguinis, qui à redundantia fit, vel criticus, nisi vires deiiciat, non est suppressendus. Si fiat ab vlcere corrodente, curetur prius vlcus: si ab immodico coitu, instauratione & glutinatione succurrendum est. Si à recenti solutione, victu frigido astringente, sanguinis missione, & astringentibus medicamentis externis, & internis curabitur: de quibus dictum est de sanguinis profluvio è naribus, & hinc quoque de iis agemus. Si ab imbecillitate retentrice facultatis renum, curabitur prius, victu frigido astringente, de quo capitibus de curatione profluvij sanguinis è naribus, & de curatione sputi sanguinei. Secundò, sanguinis missione, à quacunque fiat causa, dempto coitu, per sectionem venæ iecotariæ.

Curatio

Si ab im

becilli-

tate ch-

ratio.

Sectio ve

Tertiò, concoquentibus bilem, vel pituitam, vel atram bilem, si alius humor fuerit sanguini mixtus, quem cognosces colore, & multis aliis argumentis.

Præpa-

ratio.

Quartò, vacuantibus per medicamenta dicta cap. 1. & 21. de profluvio sanguinis è naribus.

Vacua-

tio.

Quintò, astringentibus, & glutinantibus internis, & externis, ut syrupo rosarum ex infusione siccarum, myrsillorum, cydoniorum cum aqua, vel decocto plantaginis, portulacæ, & similibus, lacte ouino calybeato cum paucis bolo armeno, confectua rosarum antiqua vel hac mixtura: ℞. micleæ, confervæ rosarum antiquæ, ana. ʒ. j. pulveris coralli rubri præparati,

Astrictio

Et con-

glutina-

tio.

Astrin-

gentia.

Karabæ,

DE CVRAND. MORB.

*Confe-
ctio.*

*Unguen-
tum.*

Potus.

Karabæ, lapidis hæmatitis præparati, spodij, dragaganti, corti-
cum glandium, boli Armenici, quatuor seminum frigidorum
maiorum mundatorum an. 3. j. syrupi rosarum quod sufficit,
misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua
portulacæ, vel plantaginis summo manè, & omni hora, præser-
tim vacuo ventriculo. Renibus & vesicæ admoueaturnguen-
tum santalatum, vel cerotum santalatum, & panni linei perfrusi
hoc, vel simili liquore: ℞. succi plantaginis & portulacæ, an.
3. iiij. aceti rosati 3. j. misce. Aliquando necessaria sunt nar-
cotica simul & astringentia, vt sunt trochisci de spodio, de
terra sigillata, & de Karabe, quorum dosis est à 3. ss. vsque ad
3. j. Et in maximo sanguinis mictu sequens potus est necessa-
rius: ℞. philonij Romani ʒ. ij. syrupi papaueris 3. j. ss. aquæ
portulacæ 3. j. misce, & fiat potus. Si sanguis in vesica coales-
cat, curatur per medicamenta dicta c. 28. de sputo sanguinis, qua-
lia sunt theriaca magna, coagulum hœdi, & similia.

Scholium.

Sanguinis mictus.] *Omnes causa mictus sanguinis reducendæ
sunt ad tres illas, quas capite de sanguinis è naribus profluvio
ex Galeni sententia proposuimus.*

De Diabete.

C A P. L.

*Descri-
ptio.*

*Historia
inaudi-
ta.*

Diabetes à quibusdam fluor vrinæ dicitur, ab aliis hydrops
matulæ, & diaplacon à nonnullis nominatur: differt non
parum ab vrinæ multitudine, nam in syncera diabete potus non
mutatur, vt in lyenteria cibus, expellitur. In non vera, quam-
uis aliquando vrina potum superet, mutatur tamen, & non sunt
omnia signa veræ diabetis. Puella olim Mediolanensis per se-
xaginta dies singulos sexdecim matulas vrinæ mictu impleuit,
cum biberet circiter tres ampullas, corpus tamen per sanata
puellæ parum conciderat, magno exempli miraculo medici il-
lius temporis credebant aërem in vrinam conuerti. Hæc igitur
spuria diabetes si non curatur, in synceram transit, quæ à Ga-
leno tantum bis visa est, & à me quater, ab Ægyptiis tamen sæpè,
siue propter cælum, siue propter aquam Nili. Est autore Gal. 6.
de locis affect. cap. 3. affectuas renum proprius, in quo tantus
inest vrinæ fluor, vt totum corpus exhauriatur, quo quicquid bi-
bitur, quale sumptum est, tale per vrinam redditur, qua parte si-
milis est hæc affectio ventriculi, intestinorumque læuitati, il-
li proportionem respondens.

Prove

Prouenit ex imbecillitate retentricis facultatis renum, attrahentis verò magno robore: attrahunt enim ad se renes vehementer aquosum id excrementum, quod in sanguinem est, quod cum retinere ipsi præ imbecillitate non possint, ad vesicam demittunt, quæ res cum continuo fiat, continuus quoque adest vrinæ fluor, adeò vt poculenta omnia nulla sui qualitate mutata per vrinam continuo excernantur. Comitatur sic affectus sitis vehemens, & quæ satiari alicuius liquoris haustu non possit, vnde etiam assidue bibere cupiunt, aut bibunt, nec ab re: cum id quod fuerit iniectum continuo ad renes, & vesicam delabatur. Viscera præ nimia caliditate exuri videntur: tumor autem magnus lumbos, testes, ac coxas infestat. Quod si amplius viscerum calor increuerit, superior venter corrugatur, & venæ, quæ in ipso sunt, attolluntur. Vniuersus habitus corporis gracilescit, & tabe quadam generali afficitur.

*Causa**Signa.*

Multitudo vrinæ, quæ propriè non est diabetes, si à potu largiori fiat, curatur abstinentia potus. Si à qualitate falsa, & acri, cibi & potus vt largo esu alliorum, cæparum, & porrorum abstineat ab iis. Si à frigore externo, calidis internis, & externis, de quibus dictum est cap. 31. de imbecillitate, vt ascites curabitur. Si à paralyfi, per ea quæ diximus cap. 13. Si à musculo rupto, vel dilacerato, curatio est difficilis, & fermè impossibilis, vt in quibusdam à partu laborioso vidimus. Si autem inuitis vrina excidat, vt pueris, & aliis quâdoque dormientibus causæ auferentur per euacuationem, si sit humor calidus medicamentis cholagogis, de quibus cap. 1. & aliis multis locis dictum est: deinde per refrigerantia dicta superiori cap. & in hoc in curanda diabete. Si sit humor frigidus pituitosus post illius concoctionem, & vacuationem per ea, quæ dicta sunt c. 1. & c. 13. de paralyfi, curabitur his pilulis. ℞, castorei, myrrhæ, mastichis, thuris, pyrethri, copularum, glandium, an. par- tes æquales, cum syrupo myrtillorum, fiant pilulæ septem pro drachma. Dosis drachma vna. Hi trochisci, autore Arnaldo de Villanova, sūt optimi in hoc affectu, quibus curatus fuit iuuenis affectus diabete, & vrinæ profluuiò in lecto: ℞. rosarum, spodi- dij ana. 3. v. seminis portulacæ, liquiritiæ, boli armenici, sumac an. 3. j. seminis lactucæ, coriandri, santalorum, berberis an. 3. j. dragaganti, gummi Arabici, balaustiarum an. 3. j. cum succo malorum granatorum acidorum fiant trochisci. Dosis 3. j. in die cum syrupo rosarum, & aqua calyceata.

*Curatio**Ex pi-
tuitoso
humore
curatio.
Pilula.**Trochis-
ci mei-
tibz in
lecto.*

Diabetes, seu transitus vrinæ non mutatae curatur sex reme-
diorum generibus: Primò, victu refrigerante, & astringente, de-
ptis cydoneis, quæ vretica sunt, & ex eorū esu serenissimus, diabet-

*Curati**vena**diabet*

Rex

DE CVRAND. MORB.

Victus. Rex Neapolitanus Alfonsus incidit in diabctem : vehementer enim nocent huic morbo calida vretica, & etiam animi, & corporis labores, & coitus. Potus sit aqua calybeata non frequens, neque magnus, quamuis caliditas immodica ipsum semper appetat, & eo egeat, quare si potus multæ frigida aquæ euomatur, est utilis: refrigerat enim, humectat ventriculum, iecur, & renes, à quorū immodico calore attrahitur potus non mutatus.

Renul-
sio & re
frigera-
tio. Secundo, auertentibus, & refrigerantibus simul, vt sanguinis missione per sectionem basilicæ in initio cū vires adsunt, & frequenti vsu clysteris huius, vel similis: ℞. foliorum lactucæ, violarum, maluarum, & portulacæ an. m. j. hordei præparati p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. j. cui adde olei rosarum, & papaueris an. ʒ. ij. cassiæ fistularis præparatæ, & diacatholiconis ana. ʒ. j. sacchari rubri ʒ. j. β. misce, & fiat clyster.

Conco-
ctio. Terriò, concoquentibus bilem, vt syrupo rosarum, violarum, myrtillorum, & papaueris, & aquis vel decocto portulacæ, lactucæ, bursæ pastoris, & similitum.

Purga-
tio. Quarto, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, manna, rhabarbaro, myrobalanis citrinis, & aliis, si opus fuerit, valentioribus: vt ℞. medullæ cassiæ fistularis, & tamarindorum an. ʒ. β. rhabarbari electi infusi per noctem in aqua endiuia ʒ. j. diaprunis solutiui ʒ. iiij. syrapi rosarum ʒ. j. aquæ buglossæ, q. s. misce, & fiat potus.

Alter-
tio. Quintò, refrigerantibus hepar, renes & totum corpus internis, & externis, vt electuario diatrion santalorum, diarthodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi, conseruis rosarum, violarum nenupharis, & acetosæ, & trochiscis de camphora, & aliis multis, vt hac mixtura: ℞. mucilaginis, seminis psyllij, aquæ rosarum extractæ ʒ. j. conseruæ rosarum ʒ. ij. conseruæ acetosæ, violarum, & nenupharis an. ʒ. β. trochiscorum de camphora, pulueris diatrium santalorum, & diamargaritonis frigidi, an. ʒ. ij. syrapi myrtillorum, quod satis est, misce, & fiat confectio.

Confe-
ctio. Dosis duo cochlearia quolibet die summo manè cum aqua, aut decocto refrigerante. Balneum aquæ tepidæ est in hoc genere optimum auxilium bis in hebdomada ventriculo vacuo. Multi etiam viri prudentes balneum aquæ actu frigida ab vmbilico ad partes infernas laudant: ego tamen nisi in iuvene, & assuetu, & æstate non auderem eo vti. Hepati, & renibus admoueantur epithemata, & vnguenta refrigerantia: vt ℞. aquarum endiuia rosarum, & portulacæ an. ʒ. iiij. aceti rosati ʒ. j. sandalorum omnium, & trochiscorum de camphora an. ʒ. j. misce, & fiat epithema ad hepar, & renes, quod post hoc, aut simile vnguentum

guentum sæpè admoueaturn æstate frigidum actu: ℥.olei rosa-
rum, & myrtilorum ana. ʒ. j. ꝑ. vnguenti populeonis ʒ. ꝑ. pul-
ueris mastichis, thuris, sanguinis draconis an. ʒ. j. ceræ, quòd
sufficit, misce, & fiat vnguentum.

Sextò, corroborantibus renes, vt lacte ouino, vel caprino epo-
to, & per clysteres sæpè iniecto cū succo renū arietis, & lamina
plumbi tenuissima, & perforata supra renes, & lumbos posita
curat, non solum hoc vrinæ profluuiū, sed etiam gonorrhæam.

Corrobo-
rantia.
Vis la-
mina
plum-
bea.

Scholium.

Diabetes à quibusdam.] Diabetes variè nominatur, Diabetes
à celeri vrina transitu: hydrops ad matulam, cū vrina quan-
titatem. Sicut enim in hydrope naturalis cavitas aqua impletur,
ita in hoc affectu matula: unde malè Vallesius existimat hydro-
pem ad matulam dici ob sitim, cū propter hanc dyspnoeos appel-
letur. Diabetes est velox exitus per urinam eius, quod potatum
est, eodem à sua qualitate non mutato. Vbi per qualitatem, spe-
ciem intellige: quia aqua epota suam seruans integram naturam
excernitur, nec tantillum in colore, odore, aut consistentia mutata.
Diabetes est symptoma in actione renum laesa: deprauatè enim at-
trahunt, si immodicum eorum motum consideremus. Inde sequitur
imbecilla retentio & alteratio, tantam enim vrina quantitatem
non possunt continere renes, & ideò nec alterare, quia res, qua al-
teratur, quieta sit oportet. Morbus, ad quem sequitur hoc sympto-
ma, est intemperies calida renum, quæ vim habet attrahendi. Mo-
dus generationis is est. Renes multum appetentes, ex venis tra-
hunt secum, hæc ex iecore, hoc ex intestinis & ventriculo. Orificium
autem ventriculi inanitum, & suctionis sensum sentiens, sic im-
mouet, hoc est appetitum potus: quo assumpto, statim à venis, iecore
& renibus rapitur, suæque mole irritat renum expultricem. Hic
affectus raro contingit, ita vt bis tantum eum viderit Gal. & ferè
lethalis est, quia cū cognoscitur, iam agri in magnam imbecilli-
tatem deueniunt: quia in principio agrè cognoscitur, cū sensim
fiat, in augmento, quando iam cognoscitur, extenuatos videmus
egrotos, non enim possunt rectè nutriri, cū ob defectum vehiculi,
alimentum non rectè distribuatur.

Multitudo vrinæ.] Auctor & alij quandam diabete[m] non ve-
ram finxerunt, & quod peius est, curant multam urinam ex ali-
mentis & aliis causis generatam: quæ, cū non sequatur affectum
morbosum, non eget curatione. Neque paralysis musculi vesicae
multam efficiet urinam, cū non excernatur una vice multa.

Error

practi-

corum.

Alimē-

ta in dia-

bete.

Diabetes, seu transitus vrinæ.] Alimenta non solum frigi-

da

DE CVRAND. MORB.

da sed crassa sint ex Alexandro, ne facile urinam mutantur, aut à renum calore attrahantur. Concedantur ergo caro suilla, pedes arietini, poma, pyra, & similia.

Sanguinis mis- Secundo, auertentibus.] Sanguinem mittes, quando renum calida intemperies, ex calido humore orta erit.

si. Quinto, refrigerantibus.] Balneum sit ex aqua, in qua malua, lactuca, oxalis, viola & alie herbe frigida sint decocta. Quibus regionem renis fricabis, quam postea cerato refrigerante Galeni inunges. Assumet ager per os ʒ. j. sacchari rosacei cum lb. j. aqua hordei.

De Lumbricis. CAP. LI.

Diffe- Lumbricorum) vt autor est Galen. 3. aphor. comm. 26.) tres
rentia. sunt differentiae, quidam enim rotundi, seu teretes sunt,
Rotun- alij lati, alij, quos Græci Ascarides appellant, rotundi seu te-
di. retes, in superioribus intestinis magis generantur magnitudi-
ne palmari, & aliquando maiori, & ad ventriculum ipsum non-
nunquam ascendunt, ibique pessima excitant symptomata: in
ipso tamen ventriculo vermes gigni non possunt, vt docent
Ab Ari Aristoteles, & Hieronymus Gabucinus libro suo de Lumbricis:
stot. dis- cis: quamuis in auribus, dentibus, renibus, & matrice ali-
sentit quando fiant: intestinis tamen magis, & plures generantur.
Ama- Ego enim anno 1545. vidi puellam nobilem expulisse mille
tus Lu- ferme vermes paucis diebus, & spatio quatuor horarum qua-
sitanus dringentos, quorum aliqui etiam viui, & alij mortui, & vixit,
centuria viuitque nunc incolumis, Deo fauente. Sæpè etiam per os &
i. cura- nares eiiciuntur. Ascarides tenues sunt lumbrici, qui in parte
ione 6. inferiori crassi intestini magis gignuntur, & plurimi manifestè
Histo- apparent in iumentis malè cibum concoquentibus, quorum
ria. malam concoctionem foetor indicat excrementorum. Latus
Ascari- lumbricus rarò accidit, longissimus tamen est, & sæpè per to-
des. ta extenditur intestina. Paulus verò Ægineta lib. 4. capit. 57. &
Lati. Ætius lib. 9. cap. 40. affirmant, lati lumbrici generationem per-
mutationem esse membranæ intrinsecus tenuia intestina am-
bientis in corpus quoddam viuum, quod continuos stomachi
Causa. morsus infert. Generantur in humano corpore huiusmodi ani-
malcula ex frigidis, & pituitosis humoribus putredini tamen
Note. accommodis, & vi caloris animatis, perinde ac externis cætera
animalia videmus gigni, quæ non ex semine, sed ex putredine
ortum habent. Signa, quibus singulas lumbricorum differen-
tias cognoscas, ex Paulo, & Ætio in hunc modum desumpsi-
mus. Teretes lumbricos habentes morsu tum ventriculi, tum
etiam

etiam intestinorum corripuntur, & tussi item arida, & non magna: verum frequenter irritanti. Quidam etiam singultiunt, & dormientes tremunt, & præter rationem expergefiunt, quod nonnulli vociferantes faciunt, atque profilientes, sed rursus in soporem conuersi prosternuntur. Pulsus inordinatum habent, febrésque citra ordinem errantes, refrigeratis extremis partibus, augentur tertia, interim quarta die, vel nocte, sine ratione accessionem habentes. Pueri verò, & grandiores natu linguam exerunt, atque oculis clausis silentium, & taciturnitatem amant, ideoque excitantibus irascuntur ob imbecillitatem vigilare nequeunt. Quibusdam, dum dormiunt linguæ accidit manducatio, & conformatio oris in modum lactentium, aut accipientium cibos: qui aliquando etiam dentibus strident, & conuiuent oculis, qui aliquando sanguine suffusi sunt, & habent faciem maximè iuxta malas rubicundam, quæ rursus mutato colore liuescit: breui verò hæc, & ex interuallis fiunt. Quibusdam in ventriculum ex intestinis ascendant nauseatum cibi, atque vellicationum causæ futuræ: vnde laborantes cibum auersantur, quod si comedendum impuleris, nauseabundi, quod dentibus terunt, aut non deglutiunt, aut illic euomunt. Venter nonnunquam corruptos cibos excernit, & tympani modo intumescit: reliquum verò corpus tabe citra rationem consumitur, neque inedia, neque immodica vacuatione aliqua exinanitum. Multi quasi dilirantes absurda in somno loquuntur, alij decubitus huc illuc mutant, ex loco ad locum sese vicissim proiciunt. Qui ab ascaridibus infestantur, vehementem habent ani pruritus, subindeque ad egerendum irritantur, & post excretionem, ut plurimum melius habent. Quibus verò lati lumbrici fiunt, ij morsus in ventriculo vellicantes sentiunt, & ad cibos potentem, & qui corrigi non possit, appetitum habent: rapiunt enim, atque consumunt huiusmodi animalia quicquid alimenti oblatum fuerit: vnde de nouo cibos assumi expedit, alioqui erodentur intestina: & ideò quædam puella (ut diximus cap. 33.) ob vermem duodecim cubitorum incidit in famem caninam. Consequitur sic affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate: minimè verò fallax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur.

Histo-
ria.

Duplex est lumbricorum curatio, prima eorum generationem prohibet, secunda eos genitos enecat, & expellit de quorum omnium speciebus, & generationis locis multi multa scripserunt: inter quos edidit librum Hieronymus Gabucinus Fa-
nensis de lumbricis. Præcautio itaque fit per ea, quæ pituitam
gigni

Cura-
tio.

Præcau-
tio.

Vidus.

DE CVRAND. MORB.

gigni prohibent, à qua cruditatibus putrescentibus fiunt vermes. Necessaria est tunc alimentorum pituitam generantium priuatio, nocetque immodicus cibus, & deprauata victus ratio, vt si cibus crassior præcedat tenuem, si à cibo animi & corporis labores absint, vt coitus, præsertim si sit immodicus, & si manus, & pedes à cibo lauentur aqua calida. Frequens quoque vacuatio per picram simp. non solum enecat vermes, sed ipsos fieri prohibet, vacuando materiam pituitosam, & crudam.

Vacuatio.

Lumbrici iam geniti curantur primò, victu tenui calido & sicco, acri & amaro. Aliquando eorum morsus, si fame sæuiant, rebus dulcibus est placandus.

Vera curatio.

Secundò, medicamentis enecantibus à tota substantia, seu proprietate, vel à qualitate manifesta calida in tertio gradu, &

Victus.

amara, quæ sua vi natura eos enecat. Et horum quædam sunt

Enecantia vermes.

simplicia, de quibus Hieronymus Gabucinus c. 22. sui operis, & quædam composita, de quibus idem autor cap. 25. loquitur: in præsentia aliqua meliora, & probata scribam. Quæ ventri ad-

Quatuoriora.

mouentur, sunt tutiora, & infantibus, & pueris magis admo- uenda. Sed interna per os aliquando exhibentur, præsertim cum in superioribus intestinis reperiuntur: aliquando per clysteres, si locus vermium sint intestina inferiora.

Calida simplicia.

Calida medicamenta simplicia, quæ vermes enecant, sunt mentastruum fluuiale, cordumeni, semen porri, nigella, nuclei, & folia persicorum, cortex arboris celsi, & succus eius, radix silicis, myrrha, aqua rutæ, semen apij cum lacte aut syru-

Seminis Alexandrini excellentia.

po acetoso, nasturtium, semen crucæ, semen Alexandrinum obtinet inter omnia principatum, quæ vermes enecant. Dosis eius cum aceto infusi 3. j. Absinthium vtrumque, abrotanum, allium præcipuè cum aceto, amygdalæ amaræ, amonium, aristologia, præsertim longa, calamentum, radix camaleontis, eupatorium, gith, succus lapathij, breui tempore, centaurea, costus, enula, lupini, puluis martubij statim, origani succus, polium, scabiosa valenter, semen vrticæ, hyssopus, zedoaria, granum milij indum. Succus chelidonix, raphani, succus cardamomi, puluis dictami, santonicum valenter, gentiana, semen brasicæ valenter, omnis matricaria, herba, quæ à nostris Valentinis dicitur cuquera, seu lumbrigera, quæ in littoribus inuenitur, & sub aqua maris iuxta saxa nascitur, vt in oppido de Xabea re-

Laus herba contra vermes, quæ

gni Valentini, & aliis multis locis: hæc enim vermes hominis non solum interficit, sed terrestres, si imposita ipsis fuerit, vt à pharmacopola fide digno accepi, & nos sæpè experti sumus hoc. Dosis in infantibus est scrupulus semis vsque ad scrupulum vnum cum melle & aqua portulacæ, seu graminis. Errant nostræ

nostræ foeminæ Valentinae, quæ opinantur huius herbæ vsum *moschu* vermes efficere, cum sit falsum, & rationi contrarium; vulgò *marinu* dicitur à quibusdam corallina, & à Dioscoride lib. 4. c. 84. mari- *à Dio* nus moschus. vide quid de ea sentiat Anton. Musa lib. de exa- *scoride* mine simplicium. *dicitur.*

Frigida medicamenta, quæ vermes interficiunt, sunt, granum *Error* coriandri, si sæpè comedatur, sumac, acacia, hypoquistis, portu- *foemina* lacæ semen, & aqua, & succus, malum granatum acidum, cor- *rum.* tex mali granati, flos, & radix ipsius, plantago minor, endiuiæ, *Frigida* cichorea, lactuca, acetosa, rubus, lac asinæ, succus citrangelò- *simpli-* rum, acerositas citri, & omnia acida, quæ pituitosam materiam *cia.* materiam incidunt.

Composita medicamenta, quæ vermes interficiunt, multa *Compo-* sunt, vt theriaca magna, myrridatum, syrupus de absinthio, sy- *sita.* rupus de menta, syrupus de prasio, syrupus de calamento. Et hic syrupus valenter ipsos enecat: ℞. succi mentastri, succi radicis enulæ, succi absinthij, succi rutæ, ana. ℥. iiij. succi lactucæ asi- næ, succi cichoreæ, succi graminis ana. ℥. vj. sumac, cornu cerui vsti, seminis portulacæ, & corticis granatorum an. ℥. iiij. fiat de- *Syrn-* coctum ad medietatem de quo percolato, & sufficiente quanti- *pus.* tate mellis, vel sacchari in æstate, & ægro bilioso fiat syrupus, cuius dosis ab ℥. j. vsque ad ℥. ij. Hoc medicamentum potenter *Confe-* vermes interficit, & est vtile omnibus: ℞. theriacæ de citro ℥. j. *ctio.* rasuræ cornu cerui adusti, seminis Alexandrini ana. ℥. ij. ℞. se- minis portulacæ, corticis mali granati, ana. ℥. ij. nigellæ, myr- rhæ, an. ℥. j. theriacæ magnæ ℥. j. ℞. rasuræ eboris, corticis mori celsi, an. ℥. iiij. syrupi de absinthio q. s. misce, & fiat confectio. Dosis est cochlearium vnum cum aqua portulacæ, vel grami- nis Hiera sump. à Gal. drachinis tribus vsque ad vnciam vnam *Hiera.* vermes enecat, & expellit. Agaricus trochiscatus habet eandem *Agari-* vim, & rhabarbarum quoque vt ego expertus sum. Et si prius *cus.* bibat lac, vel per clysterem mittatur, citius peribunt vermes. Si *Rhabar-* infans habuerit vermes, & noluerit bibere potum ex hiera *barum.* simplici, vel ex aliis medicamentis vermes enecantibus, ventri *Topica.* & vmbilico admoueat fel arietis, vel bouis, cum pauco pul- uere aloës, lupinorum, centaureæ, coloquintidæ & similium. Hoc cataplasma ventri sæpè admotum vermes interficit: ℞. *Cata-* centaureæ vtriusque absinthij, polipodij quercini an. ℥. ij. cen- *plasma.* tonicæ, ℥. ℞. decoquantur omnia cum aceto, & postea cum fel- le arietis, vel bouis fiat cataplasma. Hoc vnguentum valenter eos interficit: ℞. absinthij, costi, amati, calamenti, origani, pule- *Vnguen-* gij, persicariæ, foliorum persici, an. m. j. decoquantur omnia *tum.* in aceto, & post piansantur, & percolentur ad modum earnis cydonio

DE CVRAND. MORB.

cydoniorum, cui adde aloës, agarici, an. vnciam vnam, coloquin-
tidæ vnciam semis, olei amygdalarum amararum, & pellis bu-
buli, quod sufficit, misce, & fiat ad formam vnguenti.

Scholium.

Lumbricorum ut autor est.] Non est quod in hoc loco immo-
remur, inquirentes, an elminthes vox significet omnes lum-
bricos: an verò duo tantum eorum genera. Neque an lumbrici in
omnibus possint generari partibus. Sufficit enim ei qui rectè cura-
re volet, scire ex Gal. lumbricorum esse tria genera. Tum lumbri-
cos posse generari in ventriculo, renibus, vesica, utero & aliis par-
tibus. Quod quamvis ita sit, cum in intestinis frequentissime, & in
aliis partibus raro generentur, proinde Galen. lumbricos in inte-
stinis generari in lib. de locis affectis scripsit. Practici in radice
errant. dentium, vermem generari existimant, decepti ex nervo ibi im-
plantato. Lumbricorum ex 3. aph. comm. 26. tria sunt genera: Pri-
mum continet eos lumbricos quos teretes, aut rotundos ex figura
lumbricorum nominamus: qui in tenuibus generati intestinis, aliquando ad ven-
triculum ascendunt, ubi humores agitantur varia pariunt sympto-
mata. Hos per nares & os aliquando excerni videmus, quos melius
esset infernè egredi ex 2. prog. sent. 17. quia gula non est fabricata
prepter expulsionem. Secundum genus est lumbricorum elatorum. Hi
in duplici sunt differentia, quidam adeò magni sunt, ut eandem
intestinorum figuram habeant, & appellantur tenia, hoc est fascia.
Vidi ego à Ludouico Collado præceptore accersitus fasciam adeò
magnam ut ferè vlnæ longitudinem attingeret, & adeò caua, ut
totam manum includeret. Alij appellatur cucurbitini lumbrici, ob
figuram, quam habent semini cucurbitula similem. Generantur
lumbrici lati, ut practici scribunt sequenti Paulū ex interna mem-
brana intestिनorum animata, & mutata in vermem. Cucurbitini
verò, ex eadē mēbrana in latas, sed minores partes animata. Quorū
sententia falsa est, quia si interna intestinorū tunica animari de-
bet, ex putredine id fiet. Qua autem ratione poterit tam magnū vl-
cus viuēte animali in intestinis excitari, & quod magis est sine fe-
bre. Hi lati lumbrici cum raro generentur, proinde Gal. 3. l. aph. com.
26. eorū non meminit. Tertij lumbrici ascarides appellantur, in inte-
stino recto generari soliti. Qui similes sunt vermibus in stercore iu-
uentorū & casco ortis, vehemētissimos inducentes pruritus. Hi om-
nes lumbrici tribus differentiis inclusi, cōueniunt in materia, & in
causa efficiente. Materiā. habent pituitosum humorem putrefactū,
cuius efflatu digna quantitas (generatur enim in vētriculo) in in-
testi-

testinis coaceruari solet. *Causa efficiens calor est præter naturam* *Causa excitatus in pituita putrescente, ac proinde Gal. lib. 3. de loc. af-* *efficiens.*
fect. com 26. à magno calore eos fieri scribit. Si dicis, non videri, *Obiectio*
ratione consonum, calorem præter naturam (cuius proprium est
omnia corrumpere) rei viuentis esse causam. Respondeo, illum
calorem respectu nostri, esse præter naturam, at respectu materia
prædictæ esse naturalem, & in ea certo modo permiscere elemen-
ta, & ideo posse rem viuam efficere.

Secundò medicamentis enecantibus.] *Lumbricus pars est in Quo-*
corpore addita toto genere præter naturam, ac proinde auferenda. do aufe-
Aufertur à duobus generibus medicamentorum. Primum toto runtur
temperamento operatur, cum enim lumbrici animalia sint, ha- *lumbrici*
bent sua venena, corallum, cornu ceruinum, lumbricos terre-
stres & similia, solo experimento cognita. Secundum genus me-
dicamentorum, qualitate manifesta lumbricos interficit amar-
tudine videlicet, 14. method. ca. ultimo, vel quia amarum non est
esculentum, ac ideo assumpto ex defectu nutrimenti moriuntur
vermes: vel quia amara eis infesta sunt. Aliqui ab acribus etiã,
lumbricos interfici sentiunt. Quorum sententia nobis non placet: *Acrida*
quia si loquantur de acribus non esculentis, squamma aris, & non in-
aliis decipiuntur, cum hæc per os non assumantur: fide esculen- *terficiunt*
tis, alimenta sunt, poterunt ergo vermes nutrire. Sentio ergo acrida *lumbrici-*
medicamenta non interficere lumbricos, sed mediis ipsis expelli, *cos.*
cum acrida irritent. Lumbrici teretes & lati medicamentis per os
assumptis oppugnantur, at Ascarides per clysterem infusis, de-
cocto hordei cum lupinis, & aliis amaris (dummodò non adstrin-
gant) addita hiera picra.

De hæmorrhoidibus. CAP. LII.

Hæmorrhoides, vt ex Ætio lib. 14. cap. 5. aliisque gra-
 uissimis autoribus colligere possumus, venarum in sede *Descri-*
 sunt explicationes, dilatationesque à crebro sanguinis defluxu *ptio.*
 sic appellatæ, qui nos à multis morbis lethali- bus liberat, autore
 Hippocrate libr. 6. Aphor. quamuis Gal. lib. 6. de symptoma-
 tum causis, capit. 2. velit omnem sanguinis fluxum præter na-
 turam toto genere esse, excepto eo, qui mulieribus ab utero
 defluit: hæmorrhoidum tamen fluxus, si ordinem seruet, & non
 sit immodicus, melancholicum morbum, affectionesque renū
 curat, & ipsæ longo tempore suppressæ hydropem, tabem fa-
 ciant, autore Hippocrate aph. 12. lib. 6. Quare idem pater, &
 magister noster Hippocrates lib. 4. Aphor. 26. sanguinē suprā
 emissum, malum esse, & infrā bonum vult: & Galin comment.

DE CVRAND. MORB.

confirmans sententiam, dicit: si ab hæmorrhoidibus, & mensibus fluat. Quidam putant aliquos ex genere Hebræorum hoc sanguinis fluore esse singulis mensibus affectos diuina ultione, alij credunt ob perpetuum timorem ipsos sanguine atro abundare, & ideo hoc sanguinis defluxu indigere. Harum quædam sunt cæcæ, quædam apertæ: cæcæ à Græcis condylomata dicuntur. Manardus tamen lib. 7. epist. dicit, condylomata esse tubercula in ambitu matricis sanguinem fundentia à similitudine extremorum in pugno clauso in quatuor digitis nodorum. Nihil ex his sanguinis euacuatur, aut parum: perpetuò tamē intumescunt, & illarum variæ sunt differentia & species, si Arabibus barbaris, & experientia credimus, verrucalles videlicet, vneæ, morales, & vesicales propter variam earum figuram, & naturam sanguinis. Apertæ verò sunt, à quibus certis temporibus defluit sanguis, aliquando seruat, ut diximus, ordine sæpè non seruat, nec debita quantitate. Et omnes, præsertim cæcæ, reperiuntur cum dolore, & aliquando sine ipso. Proueniunt utraque ex copia, & malitia sanguinis melancholici, cuius causæ externæ, & internæ solent esse variæ, ut ex c. 9. huius libri cognoscere possumus. Signa quibus hoc malū deprehenditur, sunt satis nota: cæcus tamē sæpè comitatur dolor ani, cū stercus excernitur.

Curatio Hic fluxus immodicus curatur quatuor auxiliorum generibus. Primò, victu frigido astringente, & incrassante sanguinē, sensim tamen, & cautè: nam si fuerit antiquus, non omninò est astringendus, cum ex doctrina Hippocratis Aph. 12. lib. 6. si una earum non fuerit relicta, periculum est, ne fiat hydrops, vel tabes: neque enim Aëtius 14. sermone, c. 5. est audiendus, qui contra Hippocratē, rationē, & experientiam docet omnes has venas esse claudendas, post antiquum sanguinis profluiū, si ægri vtantur debita victus ratione. Sit ergo victus similis victui illi, qui præscribitur in profluvio sanguinis è naribus, & spuito sanguinis, de quo c. 21. & 28. dictum est: quamuis hîc sit alius lenienda vis passis sine granis, prunis damascenis, iure mercurialis, & blitis, ne stercus sua duritie noceat.

Reuulsio Secundò, auertentibus, ut secta vena iecoria dextra vacatione larga, & quæ respondeat plenitudini, & naturæ ægri, & cucurbitulis hepatis, & partibus superioribus affixis: & vinculis, & frictionibus earundem & fotibus, post sanguinis tamen missionem, vel sine ipsa, si ob virium defectum vena rumpenda non sit.

Obturbatio. Tertio, contrahentibus, & glutinantibus ora illarum venarum, & refrigerantibus, & incrassantibus sanguinem sumptis, Sumenda & admotis, ut syrupo rosarum, malorum granatorum, myrtillorum

tillorum. cydoniorum aquis, vel decocto portulacæ, plantaginis, acetosæ, solani, & similium. Conserua rosarum antiqua, *Confectio* conserua cydoneorum, bolo Armeno, terra sigillata. Karabe, hæmatite lapide, sanguine draconis, spodio, & similibus. Hæc mixtura est utilis, & necessaria huic profluvio. ℥. micletæ, conseruæ rosarum antiquæ an. 3. j. β. corallij rubri præparati, lapidis hæmatitis, Karabæ, gummi tragaganti an. 3. ij. sanguinis draconis, thuris, mastichis an. 3. j. syrupi cydoniorum q. s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum summo mane, & omni hora cum aqua sanguinariæ, vel portulacæ, vel plantaginis. Aliquando necessaria sunt narcotica, si fuerit immodicus fluxus hic. Si supradictis, & similibus non curatur, *Narcotica.* inter quæ trochisci de Karabe, vel spodio, vel de terra sigillata à drachma semis vsque ad drachmam vnam sunt optimi, & athanasia, & requies magna ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam cum aqua, aut syrupo astringente aliquando seruatis legibus, & ordine capite 36. descripto de curatione scilicet diarrhææ est necessarium philonium maius, vel Persicum, vel Romanum ab scrupulo vno vsque ad drachmam vnam. Sistit *Admouenda.* hoc profluvium albumen oui mixtum aqua rosata, & puluere mastichis, sanguinis draconis, thuris & aliorum medicamentorum astringentium ipsis venis actu frigidum admotum, de his tamen abundè diximus capite 21. de curatione profluvij sanguinis è naribus. Aliquando in hoc sanguinis profluvio, *Cauteria.* quemadmodum in aliis, sunt necessaria cauteria, vel medicamenta narcotica, vt suppositorium ex rebus astringentibus, cū pauco opio, seruata tamen vna si antiquus fuerit fluxus, vt diximus cum Hippocrate. Si verò summa esset imbecillitas virium, totus est sistendus fluxus hic, & postea facultate per alimenta optima corroborata iterum posset scindi aliqua vena ex iis, ne hydrops, vel tabes, vel mania fieri possent.

Quartò, emendantibus sanguinem victu, & aliis: nam si sanguis largior sit in corpore, victu tenui curatur, & sanguinis missione. Si biliosus, victu frigido, & purgatione per myrobalanos citrinos, rhabarbarum, tamarindos, & cassiam fistularum. Si pituitosus, victu sicco cū temperata caliditate, & astringentione, & purgatione per myrobalanos Kebulos, agaricum, & alia medicamenta phlegmagoga, dummodò ipsis misceantur astringentia. Emendant sanguinem, postea electuarium diatrion santalorum, diarhodonis Abbatis, conserua buglossæ, rosarum, & cydoniorum. Squamma ferri debite præparata, sæpè videlicet in aceto infusa, & decocta, & exsiccata prodest. Eius drachma vna, vel duæ bis in hebdomada suprà *Emendatio sanguinem post evacuationem*

DE CVRAND. MORB.

ventriculum & hepar roborant, & humorum malignitatem leniunt, & castigant.

*Curatio
doloris.*

Dolor hæmorrhoidum curatur per causæ abscissionem, quādo non est vehemens, nec facilitatem nimis resoluit: nam si

*Doloris
ab in-
flamma-
tione*

vehemens dolor est, amouendus etiam erit per narcotica, ut sæpe dictum est, non habita ratione causæ. Dolor, si ab inflā-
matione fiat, primò curatur, victu tenui, & refrigerante. Se-
cundò, anertentibus, ut sanguinis missione per sectionem basi-
licæ, & vinculis, frictionibus, & fotibus partium superiorum.

*curatio.
Reuellē-
tia.*

Tertiò, repellentibus, ut aquā rosarum, portulacæ, plantaginis, & candido oui cum oleo rosato, mucilagine seminis psyllij, & cydoniorum. Quartò, in augmento, & vigore, repellentibus,

*Repellē-
tia.*

& resolventibus, ut oleo camomillæ, & rosarum misto, vel hoc vnguento. ℞. olei rosarum, & camomillæ, an. 3. j. mucil-

*Repellē-
tia &
resolue-
tia.*

laginis seminis psyllij, & fœnugræci, & seminis althææ an. 3. ij. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguentum. In declinatione resol-

*Suppu-
rationis
curatio.*

uentibus tantum curatur. Si inflammatio in suppurationem transeat ab arte est natura corroboranda, & iuuanda: quæ ta-

*Causa
difficilis
curatio-
nis.*

men post primam dictam tutior est duabus aliis, nempe quæ in lapidificationem, vel corruptionem finiantur: pessimi enim sunt hi duo vltimi modi omnium tumorum præter naturam,

*Mixtu-
ra suppu-
rans.*

præsertim huius partis, cuius affectus, autore Gal 9. de com-
positione medicamentorum secundum locos, difficulter curā-
tur quatuor de causis. Prima, ob eius sensum. Secunda, pro-

*Extra-
ctio pu-
ris.*

pter vsum partis, excrementa enim sua vi acri mouent faculta-
rem expultricem. Tertia, medicamenta vtilia non detinentur
tempore necessario in ea parte. Quarta, ob caliditatē, & humi-

*Abster-
sio &
consoli-
datio.*

ditatem partis huius, ideoque amat hic locus siccantia, & re-
frigerantia medicamenta, ut sunt metalla, præsertim tuthiam.
Suppurata ergo inflammata parte à natura & ab arte per medi-
camenta suppurantia, de quibus fermè omnibus Iacobus Hol-
lerius lib. 1. c. 5. de materia chirurgica abundè scripsit: mix-
tura tamen ex farina tritici sine furfure, aqua decoctionis ma-
luarum, & oleo satis suppurationem efficit, est triapharmacū
Galenī, & si addas parum croci & vitellos ouorum, erit effica-
cior: deprehendes pus genitum esse per febris, & doloris re-
missionē. Post, necessaria est puris extractio apperto suppura-
to loco ferro, aut igne. Tandem curatur abstergentibus & vlti-
mò consolidantibus: sed in hoc consule doctū chirurgū, & se-
quere Iacobi Hollerij librū secundum de materia chirurgica.

Quando dolor hic à sanguine implente has venas absque in-
flammatione, & fluxu fit, quod per tumorem, & colorem de-
prehendes, sanguis ab illis est mittendus, præcipuè si ægroti

soliti

soliti sint habere hunc fluxum, quod fiet. Primò magnis frictionibus partium infernarum, pudendorum. Secundò, cucurbitulis admotis partibus internis coxarum, & parti, quæ est inter anum, & testes. Tertiò, secta vena saphena, vel poplitis. Quartò, apertione harum venarum lanceola, vel ferro tenuissimo. Et si ipsæ non appareant exterius, magna compressione versus inferiora, & magna cucurbitula fient manifestæ. Ex ipsis una, vel plures rumpantur, & secundum tumorem vnus, vel plurium extrahatur sanguinis copia respondens plenitudini, id fieri potest per hirudines. Quintò, acubus argenteis, vel aureis, præsertim si fuerit sanguis tenuis, vel foeminarum. Sextò, frictionibus per medicamenta acria, qualia sunt calamentum, origanum, cyclaminus, piper, nitrum, & fel, quod est aliis potentius. Septimò, per medicamenta excoquantia, qualia sunt folia ficus, scylla, & alia lacticinia, & puluis cantharidum, qui est aliis valentior in hoc morbo. Octaua, per ignem, seu cauterium actuale: hæc tamen apertio non fit, nisi cum est initium corruptionis, & gangrenæ. Tutius ab eis mittitur sanguis quarto & quinto auxiliis sanguinem mittentibus. Emisso sanguine sufficienti, locus affectus curandus est mundificantibus, & abstergentibus, clementibus, & consolidantibus hoc, aut simili vnguento: ℞. vnguenti basiliconis ℥. ij. olei de chrysomellis, terebinthinæ abietis, benè lotæ. an. ℥. j. camphoræ & ruthiæ præparatæ an. ℥. j. ceræ albæ ℥. iij. misce, & fiat vnguentum. Quando dolor est ob earum magnitudinem, & fluxum immodicum, & antiquum, curantur exsiccantibus, & resoluentibus post debitas vacuationes, & auersiones. Ligatura earum in radice filo tenui serico sensim arctius astringendo, donec in totum abscindantur, est probata, & satis tuta apertio earum secundum longitudinem per cauteria parua admouendo porci pinguedinem non salitam, donec eschara, seu crusta decidat: & postea secundo, & tertiò, & quartò eisdem paruis cauteriis eodem modo apponendo pinguedinem, donec crusta, & tota substantia earum putrida consumatur. Aliqui in hoc morbo laudant medicamenta corrodentia, sed ego non laueo ea, neque ignem actualem. Hæc sunt experta & tutiora ad hæmorrhoidas has exsiccandas, & ad curanda earum, & antidam opè vlcera, & incisuras, drachmæ scilicet dimidium pulueris radicis, vel floris lilij cum paucis vino rubro multis diebus sumptum. Eandem vim dimidium drachmæ vnus pulueris radicis pentaphilonis cum paucis aqua frigida in æstate, & calida in hyeme sæpè manè sumptum. Idem fit squinantij puluere. Vsu notum Drachmæ duæ galbani ter sumptæ cum aqua frigida potenter exsiccant.

*Aperien-
tia orifi-
cia vena-
rum.*

*Vnguen-
tum de-
tergens
& conso-
lidans.
Doloris
à fluxu
immodi-
co & an-
tiquo cu-
ratio.*

*Quorum
ad anti-
dam opè
ratio im-
probatum.*

- exiccant has hæmorrhoidas. Ego hoc sum expertus. Pulvis capitis piscis saliti, & casei antiqui æquis ponderibus: idem facit electuarium de scoria ferri, & pilulæ de bdellio valenter exiccant has hæmorrhoidas, si inreriùs sumantur. Multa quoque sunt, quæ admota ano valenter exiccant, & sanant has hæmorrhoidas, quorum aliqua meliora, & experta in præsentia adducam: ut ℥. mellis ℥. j. β. aceti ℥. j. vitreoli viridis, floris æris, tuthiæ præparatæ, lithargirij, plumbi vsti, an. ℥. ij. mel, & acetum prius feruefiant, deinde extra ignem misce pulveres, & fiat vnguentum: vel ℥. radice hyari sine cortice. ℥. ij. radicum liliorum alborum ℥. j. β. pulveris panis porcini, & pulveris panis furfuracei an. ℥. j. β. pulveris nucum cupressi ℥. j. granorũ myrti, seminis plantaginis, thuris, sandaracæ Arabum an. ℥. β. farinæ fabarum ℥. ij. olei laurini, & de chrysomellis an. ℥. ij. misce, & fiat ad modum cataplasmatidis, addendo parum decocti radicum præcedentium. antequàm admoueaturo ano, fiat fotus cum vino rubro, exiccat, & resoluit has hæmorrhoidas, & repellit humores fluentes ad eas. Balnea naturalia, quæ habent vim desiccandi sunt optima in hoc, ut sulphurea, salsa, aluminosa. Balneum, vel fotus ex decocto cannarum, filipendulæ, granorum myrti, radicum hyari, & similium valenter exsiccat. Suppositoria, seu glandes ex radice peucedani, vel gentianæ, vel hyari, vel ireos valde has hæmorrhoidas exiccant. Suffitus etiam stercoreis vaccæ, vel spoliij serpentis est in hoc optimus, & suffitus huius pulveris. ℥. anacardi ℥. ij. galbani ℥. j. stercoreis columbini, & stercoreis vaccini, an. ℥. j. β. misce & fiat pulvis. Hoc vnguentum hæmorrhoidas has curat exiccando, resoluendo, & aliquando aperiendo. ℥. melongenarum in partes paruas diuisarum ℥. iij. radicum iridis in partes paruas diuisarum ℥. ij. olei lib. j. fiat decoctum ad vini consumptionem, cui percolato adde axungia anaris, & gallinæ an. ℥. j. olei scorpionum ℥. j. β. ceræ q. s. misce & fiat vnguentum. Ego expertus sum quendam nobilem affectum his antiquis hæmorrhoidibus cum dolore vehementi & rhagadibus, seu scissuris post multas vacuationes, & auersiones incidisse ex crassa natura, & constitutione corporis in satis macram: curatum tamen fuisse fotu frequenti ex decocto rubi, & additione post fotum pulveris eiusdem rubi, & vnguenti pompholygos. Sed quia dolor in hoc morbo est grauissimum symptoma, & ad se omnem curationem trahit, nulla habita ratione causæ eius, omni studio oportet ipsum curare. Quare considera benè, quæ Iacobus Hollerius scripsit c. 5. tertij libri: in præsentia tamen aliqua probata adducemus. Primò, curatur dolor hic & quicuq;

quicunque alius fotu, & lotionē frequenti ex decocto croci. Secundo, ex fotu, & vnctione sæpè. Tertiò, ℥. pulueris camomillæ ℥. ij. pulueris anethi ℥. ij. croci puluerizati ℥. j. vitellos ouorum numero ij. sæpè q. s. misce, & fiat cataplasma: quod valentiùs dolorem curat duobus prioribus auxiliis. Quarto, ℥. olei rosati ℥. iiij. vitellos ouorum numero iiij. croci puluerizati ℥. j. misce, & fiat ad modum vnguenti, quod est præstantissimum remediũ. Quintò, ℥. olei nenupharis, & camomillæ an. ℥. j. succi lactucæ ℥. ij. farinæ hordei ℥. j. simul parum feruefiant, & in fine adde croci puluerizati ℥. j. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum cataplasmat. Si dolor fuerit maximus, adde iusquiamini, vel mandragoræ, vel opij ℥. j. Maximum hunc dolorem curabit etiam suppositoriũ ex solo philonio. Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimum: ℥. olei de nenuphare, & olei de papauere an. ℥. j. olei mandragoræ ℥. j. β. croci puluerizati ℥. j. ruthiæ, cerusæ lithargirij an. ℥. β. amydi, terræ sigillatæ an. ℥. ij. opij. ℥. β. vitellos ouorum numero iiij. misce, & fiat ad modum vnguenti in instrumento plumbeo. Hoc cataplasma est valentissimum in dolore curando: ℥. radicũ althææ ℥. β. radicum liliorũ ℥. ij. foliorũ maluarũ, & iusquiami an. m. j. camomillæ ℥. j. meliloti, seminis anethi an. ℥. β. farinæ fœnugræci, seminis lini, & hordei an. ℥. j. β. olei sesamini ℥. iiij. opij. ℥. j. misce, & fiat cataplasma cum decocto herbarum & radicum præcedentium.

Vnguentum.

Cataplasma.

Scholium.

HÆmorrhoides vt ex Aëtio.] *Hæmorrhoids nil aliud significat, quã sanguinis euacuationem: ac proinde, per quãlibet explicatã partẽ contingat sanguinis euacuationes, si vim nominis consideremus, hæmorrhoides dici poterunt.* Consueuerunt tamen veteres medici, fluores sanguinis per venas ani tantum hæmorrhoides appellare, quia per has venas solet frequenter sanguis præter naturam excerni: & ideo existimo Gal. lib. 6. epyd. par. 5. comm. 25. hæmorrhoides appellare sanguifluas venas. Et quamuis hæmorrhoides quadam sint caca, & quadam reclusa, cum frequentius soleant esse reclusa, proinde huic effectui, nomen impositum est euacuationẽ significans: sunt enim hæmorrhoides euacuationes per venas ani. Inde videbis malè aliquos hæmorrhoides appellare distentiones venarũ ani. Hæmorrhoides reclusa symptoma sunt, in iis quæ excernuntur toto genere præter naturã. Morbus est instrumentarius, in via, aut canitate. Hæmorrhoides caca dolorẽ inferunt: qui reclusa

Nomen.

Hæmorrhoides

symptoma

DE CVRAND. MORB.

ptoma symptoma est, ortum, ex inflammatione illarum venarum, & sunt. continentium partium, ut ex nimia earum mole colligimus. Cau-
 Morbus sa supradicti morbi in via humor est, varius tamen, & vario mo-
 ceca. do ad eam perueniens partem. Quia aliquando melancholia, aut
 Causa sanguis abundans, à natura expulsa per dictas venas euacuatur:
 morbi su aliquando verò ex Galeno 6. epyd. par. 5. com. 25. siue natura
 pra dicti prouidentia, aut conatu, sanguis dilatans impetu orificium ve-
 na excernitur. Hinc varias intelligemus Hippocratis sententias.
 Quarum una est 33. lib. 6. Epyd. par. 3. altera verò 11. libri
 6. aphorismorum: si enim per ani venas sanguis fluens, optimus
 sit, & solum quantitate peccans, liberabitur aeger à pleuritide
 & peripneumonia. Si sit cacochimia melancholica, aut sanguis
 melancholicus, non patietur phagedenica ulcera, id est, corrodentia,
 neque furunculos, neque exanthemata in cruribus oriri solita:
 quæ similia sunt cum terebinti fructu. neque melancholiā, nec ne-
 phritim à lapide (cuius melancholicus humor est materia) oriā. So-
 Contro- let quari à medicis exortus venarum ani, quas hamorrhoides ap-
 uersia pellare solent. Rondoletius, Altomarius & alij existimant, per par-
 de venis tem exteriorē intestini recti, disseminari exiguas venas à caua or-
 hamor- tas: at per internam partem venas maiores, ex vena porta proce-
 rhoidi- dentes. Vnde colligunt hamorrhoides venas, esse ramos vena caua,
 bus. & vena porta: & ita euacuatione humoris in toto corpore iecore,
 Senten- & renibus contenti, per venas exteriores intestini, qui à caua pro-
 tia Ron- cedunt, excerni: at euacuationem melancholia ex liene per venas
 doletij internas. Curtius in hamorrhoidibus, per viraque venas sangui-
 & alio- nē excerni persuadet, raro tamen per ramos vena porta, quia hi
 rum non propter expulsionem, sed propter attractionem fabricati sunt
 Sentētia à natura. Certè si exactè rem cōsideramus, videbimus omnes hos
 Curtij. errare: quia vena sanguiflua se aperit in cavitatem intestini,
 Omnes aliter non possent sanguinem profundere. Et ideò solum vena à
 supradi- porta enata, hamorrhoides dicentur, quia habent ora in cavitatē
 si errāt intestini patentia. Adde per hamorrhoides venas copiosum ex-
 cerni sanguinem aliquando, quem per propagines vena caua per
 musculū disseminatas, & intestini partē exteriorē euacuari nō pos-
 se ostēdit earū paruitas. Id quod Altomarius scribit de euacuatio-
 ne totius corporis per hamorrhoidas, fieri scilicet per venas à caua
 ortas, falsum est. Nam praterquàm quòd per illas non potest fie-
 ri (ut diximus) copiosa euacuatio, nil impedit, quominus per alias
 fiat, habentes cum vena porta communicationem, ob quā frequē-
 ter natura solet totū expurgare corpus. Neque Curtij ratio con-
 cludit, si aduertas Gal. in lib. de natu. fac. ex professo proba-
 bare, per easdem venas, per quas distribuitur alimētum per corpus
 fieri etiam humoris, aut excrementorum euacuationem.

Altoma-
rij la-
psus.

Curtij
ratio
nulla.

Hic

Hic fluxus immodicus curatur.] Si in hemorrhoidibus euacuetur plethora, aut peccans humor, cum liberentur homines à supradictis malis, nihil efficiendum erit, quia euacuatio cum commodo animalis exercetur. Si sit excedens, solet cachexiam, & hydropem. Quae se efficit re refrigerato iecore. Si sit deficiens, & diminuta euacuatio, si quatur, supprimatur humor melancholicus: fit melancholia, & iecoris re-suppressio: si vero sanguis, hydrops, & cachexia suffocato calore sit haec contingunt: sicut pleuritis, peripneumonia, aut in alia parte hemorrhoidum inflammatio sanguine ad pleuram, pulmonem, aut aliquam aliam partem decumbente. Cum ergo immoderata hemorrhoidum euacuatione, aut suppressione, tot eueniant mala, oportebit diligenter occurrere. Si immodica euacuatio sit, simul & recens, tota suppressio. Cura-
men da erit. Dubium autem est de inueterata. Hippocrates 6. aphorismorum sent. 12. in antiquis hemorrhoidibus, venam apertam re-
linquit: at Aëtius purgato corpore omnes claudit. Verior tamen est de inueterata Hippocrates, quia in antiquis hemorrhoidibus natura per anum terata consuevit sarcinam deponere: quam consuetudinem si repente mutemus, supradicta mala excitabimus. Quod exemplo confirmauit 4. epy. sentent. 132. ubi Alippum (qui hemorrhoidibus affectus erat) curatum, insanum redditum scribit. Dices, nonne si una una aperta relinquitur, totum corpus refrigerabitur? Respondeo, maius malum, & citiorem mortem sequi, si eam statim supprimamus. Si hemorrhoides non fluant, aut nunquam fluxerunt, aut aliquando fluxerunt. Si nunquam fluxerunt, aperienda à nobis sunt videntes hominem lienosum, aut melancholicum. Si fluxerunt aliquando, multò melius eas mouebimus, potissimum si videamus ex earum suppressione aliqua mala iam sequi. In fluxu immodico hemorrhoidum, victum frigidum & adstringentem imperat auctor, & alij cum ipso. Male tamen, quia ea quae frigida sunt, & adstringentia, stercus indurant: quod magno egens conatu, & forti expressione ad hoc ut expellatur, sanguinum fluxus augebitur. Sint ergo alimenta temperata, aut lenientia alium propter dictam causam.

Iacotius
reprehē-
ditur.

Secundò auertentibus.] Distinctione opus erit, si noluerimus errare cum auctore. In immodica euacuatione humoris melancholici ex liene, basilicam sinistram seca, quae vasorum & naturae nis mis-
habet rectitudinem: in ea vero quae ex toto corpore, aut iecore fit, se-
ca basilicam dextram. Idem seruandum est in cucurbitularum applicatione.

Tertiò, contrahentibus.] Omnia medicamenta, quae ab auctore hoc in loco per os assumenda describuntur, omitte: quia sua adstrictione stercus indurant. Adde ab his non posse obstrui venam reclusam, quae in ano posita multum distat ab ore: uti tamen poterit

Vnde
Lapsus
auctoris.

DE CVRAND. MORB.

illis medicamentis, quæ ab auctore ano applicantur.

Medica- Quarto, emendantibus.] *Medicamento ex squamma ferri præ-*
mentum parato, non est quod utaris per os: bene exterius applicando sequi-
ex squa- tus Galenum lib. 5. metho. c. 10. qui eo exsiccat ulcera auris & ani.
ma fer- Septimo per medicamenta excoriantia.] *Fel taurinum con-*
ri, ubi uenientissimum anostomicum est.

utile. Ligatura earum in radicem.] *Si tenues sunt, ligatura utilis est:*
Ligatu- *secus si crassa.*

ra quæ- Aliqui in hoc morbo laudant.] *Abstinendum à corrodentibus*
do pro- *medicamentis, quia fluxionem mouent: Et ab igne actuali propter*
dest. *vicinas partes.*

Vt ℥. mellis ʒ. j. & c.] Omittatur hoc medicamentum, quia vi-
triolum, & flos aris caustica sunt.

Error Vel ℥. radice hiari.] *Si radix hiari, & liliorum, & pulvis pa-*
auctoris. *nis porcini aperiendi habent vim, cur ea miscet auctor in hac com-*
positione, in qua ulcera ani exsiccare instituitur? Suppositoria de-
me ab his acia.

Hoc vnguentum est in hoc symptomate optimum.] Optimum
est, sed nonne breuius oleo rosaceo, oui luteo, & opio id præstabis?

De procidentia ani. CAP. LIII.

Descri- Cum anus aut propter musculorum obliquorum sedem sur-
ptio. sum reuellentium imbecillitatem, & resolutionem, aut
 propter ingentem in egerendo conatum procidit, aliquando ab
 inflammatione, vel alio tumore præter naturam, cuius curatio
 necessario præcedere debet, reductionem intestini, malum sit
 nulli non notissimum, quam procidentiam ani nominamus,
 barbari exitum ani, aut langæonis dicunt.

Curatio. Si ani procidentia sit à sola intemperie, contrariis curatur se-
 di admotis in forma vnguenti, vel cataplasmati, vel fots: in
 omni tamen quiescat altis clunibus, & iunctis præcipue ano
 reducto in suum locum. Si sit ob imbecillitatem, vel resolutio-
 nem, seu paralysem muscorum, curabitur. Primo victu exiccan-
 te, & calfaciente, de quo c. 13. Secundo, pituitam apparantibus.
 Tertiò vacuantibus medicamentis conuenientibus, de quibus
 eodem 13. capite egimus. Quarto & vltimò, dissipantibus, & re-
Vnguen- soluentibus, ut hoc, vel simili vnguento: ℥. olei costini, & ca-
tum. storei. an. ʒ. j. olei rutæ. ʒ. j. ʒ. pulueris castorei, & anthos. an. ʒ. j.
 pulueris mastichis ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Ante
 cuius appositionem pars affecta foru huius decoctionis præ-
 paretur: ℥. camomillæ, anthos, saluæ, balaustiarum, foliorum
 lauri an. p. j. nucum cupressi, & gallarum an. paria. vj. fiat deco-
 ctum.

ctum in libris sex aquæ, donec tertia pars consumatur.

Si infans, aut puer laboret ani procidentia, humidis, & frigidis corporibus humoribus purgatis per hieram simp. vel agaricum trochiscatum, infideat decocto saluæ, absinthij, stæchados, abrotani, rutæ, origani, roris marini, facto ex vino calybeato, & aqua aluminosa, vel sulphurea, & vngatur anus vnguento superiori, vel simili, & quiescat multis diebus clunibus elatis, & clausis. Pix comesta curat ani procidentiam, & eius suffitus par-
 ti affectæ immixtus. Folia porri, vel thasi barbari decocta cum vino, & ano admota valenter curant ani procidentiam. Suffitus ex corio anguillæ salito est optimus in hac ani procidentia curanda. Idem fit suffitu plumbi vsti. Cuius cancri fluuiatilis admotus ano curat eius procidentiam, & scissuras Pilulæ de bdellio sumptæ idem faciunt.

Scholium.

Cum anus aut propter.] Anus extremitas est intestini recti, *Anus*
 ubi tres muscoli reperiuntur. Vnus transuersus, ipsi ano circum-
 uolutus, dictus sphynx ab actione: quia constringendo anum in voluntarium fluxum excrementorum impedit. Duo alij sunt obliqui, non magni, sed membranosi, & lati: utraque ani parte supra prædictum rotundum musculum siti. Horum usus est in magnis contentionibus, euersam sedem sursum retrahere. Est etiam in ano membrana, qua alligatur ossi sacro, & lumbis. Ex his facile est intelligere, quæ hoc capite à doctoribus proponuntur. Procidentia ani tunc dicitur, cum extremitas intestini recti, foras delabatur: ita ut non lateat visum. Morbus est in situ vitioso. Causæ erunt omnia, quæ laxare possunt musculos, & ligamentum ani, qualia sunt humida: & quæ paralysim in musculis inducere possunt, ut frigida: & tertio magnus ad egerendum conatus, qualis tenesmus comitari solet. Practici aliam addunt causam, nempe inflammationem: decipiuntur tamen, quia inflammatio non laxat, sed musculos tendit. Quod si in procidentia ani, intestinum inflammatur: non poterit reponi, quin prius inflammatio sedata sit.

Si ani procidentia sit à sola intemperie.] Procidentia ani neque à calida, neque à sicca intemperie fit, quod debuit auctor distinguere.

Si infans aut puer.] Cum anus sit pars affecta, ei applicanda sunt medicamenta. Unde ea, quæ ab auctore per os exhibentur, cum eorum vis non perueniat ad anum, omittantur.

De procidentia vteri. CAP. LIV.

**Descri-
ptio.** **Q**uando vterus ita euertitur, vt exteriùs emineat, autore
Ætio libr. 16. capit. 78. malum fit, quod ipse prociden-
tiam vteri nominat. Arabes autem præcipationem matricis
& exitum appellant. Cuius causæ quamplurimæ sunt, non-
nunquam enim accidit ob casum ab alto decidente, scilicet
muliere in coxarum vertebra: rumpuntur enim tunc mem-
branæ quædam, quibus vulua propinquis partibus annectitur
vnde procidere ipsam necesse est, sæpè ob ingentem conatum,
quo premitur mulier, in laborioso & difficili partu, maximè
verò in abortu, vt secundam expellat. Aliquando propter
inconsideratam partus extractionem, aut nimiam spiritus de-
tensionem, aut immensi ponderis elevationem, aut percussio-
nem vteri, aut animi vehementes affectiones hoc ipsum acci-
dit: & ob humoris plurimi, ac tenacis defluxum, partumque
frequentiam: laxantur siquidem atque solvuntur appendices
profundo vtero superius inhærentes. Iam & sine vlla causa
istarum hic morbus contingere solet, cum debilitato corpo-
re membranæ, musculique vuluam sustinentes exoluuntur,
quod ingrauescente ætate fieri consuevit. Morbus satis, per se
patet, cum vterus ipse procidens oculis cerni possit. Procidit
autem secundum os eius, & quod pendet struthio camelii o-
uum similitudine refert, maioris tantum, & minoris ratione
differens, Causarum porro notæ tum ex ægrotantis sermoni-
bus, tum ex corporis constitutione notatæ intelligentur.

Causa. Similis est hæc curatio præcedenti, causa enim in illa & in
hac est auferenda, si possit, & vterus loco nativo est restituen-
dus, nisi impediat tumor vteri magnus, quem dissipabis fotu,
& lotionem ex decocto cymini, anisi, baccarum lauri, camomillæ,
& similibus facto vino rubro. Post insperges pulueribus sti-
pticis, ne recidat, de quibus superiori capite dictum est. Su-
fitus rerum graue olentium, vt pennarum perdicis, assæ fœti-
dæ, castorei, solæ combustæ, capillorum, sulphuris, & simi-
lium exceptus per vuluam infundibulo, vel cathedra perfora-
ta est necessarius. Ouum sub gallina factum, agitatum, lanis
inuolutum, & vuluæ admotum, vterum reducit ad proprium
locum: quia vterus maximè abhorret fœtida, & ab iis fugit.

**Laborio-
sus par-
tus,
Labor
corporis
& ani-
mi.** Amat non parum redolentia, quare naribus adnouenda sunt,
vt moschus, ambra, vel alia minoris pretij, vt galia, & flores
citranguli, rosæ, violæ, & similia. Cucurbitula magna fixa um-
bilico vterum ad proprium locum trahit, & conseruat. Redu-
cto vtero ad proprium locum cubet clunibus sublatis in sublime
aliquot

Nota.

**Curatio
Dissipa-
tia fla-
tum.** **Suf-
fitus re-
rum gra-
ue olen-
tium.**

**Vterus
maximè
amat re-
dolentia**

**Quæ v-
terum
ad suum
locum
trahunt,**

**Medica-
mentum**

aliquot diebus, & vmbilico imponatur hæc mixtura: conser-
uat enim vterum in propria sede, confert etiam suffocationi, *uās ute-*
& omni inordinato motui: ℞. alitæ muscata, galitæ musca-
ritæ, an. ʒ. iij. ambre, musci, an. g. v. vtriusque stioracis an. ʒ. *suo loco.*
ij. β. resinæ electæ, ʒ. ij. omnia cum oleo ex stiorace, miscean-
tur, & extendantur super pannum coccineum forma rotunda
ad præsidium vmbilici.

Scholium.

QVando vterus.] Vterus situs est inter intestinum rectum & Vteri si-
vesicam loti j qui locus maximè accommodatus est ad reci-
piendum semen, ad fœtum vsque ad iustam magnitudinem seruā-
dum, & cum usus postulat, excernendum. Habet vterus varia
ligamenta. Recto intestino, & vesica fibrosis quibusdam & tenui-
bus ansulis alligatur, sacro ossi (ut multi sentiunt) quibusdam ner-
uosis, & musculosis vinculis lumborum etiam vertebri ex Galeno
quod medio peritoneo intelligendum est. Prædictis ligamentis suo
loco seruatur vterus, quæ si laxentur, mutabit situm ad vnum, aut
alterum latus declinans, aut prominens exterius, nunquam ta-
men, vteri prolapsus contingit eius fundo per os egrediente, ut
multis placuit: hoc enim ab oris vteri angustia impeditur. Si ob-
iicis fœtum maiorem per hanc egredi partem. Respondeo non esse
parem rationem, quia fœtus ponderosus est, & à natura expelli-
tur. Curationem pete ab autore, solum adde, modum, quo vterus
debet restitutus seruari, ne procidat. Seruabitur ergo vterus re-
positus armilla, aut circulo ex are facto, in vuluam immisso, ita
ut cerea candela per ipsum circumuoluatur, ne, a carnem cōtin-
gat. Aduerte etiam auctorem, non rectè animi vehementes affe-
ctiones & imbecillitatem corporis prolapsus vteri causas statuere,
quia ab his non possunt vetri vincula laxari.

Anne-
xusQuomo-
do fiat
uteri pro-
cidentia
Obiectio
soluitur.Quomo-
do vterus
restitu-
tus ser-
uetur.

De immodicis mensibus. CAP. LV.

IMmodicè fluere menses in fœminis tunc dicimus, autore *Quid*
Aëtio, quando conferta sanguinis menstrui copia pluribus *mensiū*
diebus effluxerit, quod multis de causis accidit. Prima: quia in-
sto tenuior redditus sit sanguis, quæ res ab externis ut plurimū *immodi-*
causis euenire solet, tametsi ab internis etiam contingat. Et *fluum*
enim & legimus ipsi & vidimus aliquando in muliere, quæ se *Causa.*
pius æquo exercuisset, huiusmodi mensiū defluxū contigisse,
qui multis medicorū præsijs sisti non potuit & in mulieribus
tempe

DE CVRAND. MORB.

temperamento bilioso hoc ipsum accidere quotidie experimur. Porro quæ sint causæ tum externæ, tum internæ, quæ sanguinem possint attenuare, superfluum esset recensere, cum sæpius dictæ sint, & per se lector facile inuenire possit. Accidit præterea symptoma propter vasa aliqua aut aperta, aut fracta, aut etiam erosa, siue magna ea sint, siue parua. Nonnunquam etiam ob partus grandiores, & post abortus, quos ut plurimum mensium immoderatæ purgationes solent consequi. Cæterum si à sanguinis tenuitate oriatur hæc affectio, considerare oportet anteaactam vitam, & eas omnes causas tam exteriores, quam interiores, quæ sanguinem tenuiorem solent reddere. Si verò vasorum accidat vitio, vel quia fracta, aut erosa sunt, erumpentis sanguinis multitudinem (ut inquit Aëtius) conuenit considerare: cuius verba hæc sunt. Amplioribus vasis fractis, aut apertis, magna & conferta sanguinis copia defluit: ab angustioribus verò oppositum accidit, sicut ab erosione paulatim, & cum maximo dolore delabitur. Ab aliis causis si accidat, facile ex ægroti sermonibus deprehendetur. Consequitur sic affectos cutis decoloratio, appetitus imbecillitas, concoctionis difficultas, nonnunquam pedum, & totius corporis tumores quidam laxi, & generatim ea omnia, quæ excedentem hæmorrhoidum defluxum consequuntur.

Nota.

Curatio Si immodicus fluor mensium est à sanguinis copia, curatur
quando victu tenui, & astringente, ut cydoniis, pyris, agresta acetosa,
est à san- amygd, & oriza cum lacte amygdalarum, vel caprarum caly-
guinis beato, fuga carniū, ouorum, & sanguinem augetium. Sece-
copia. tur vena interna dextra, extrahaturque sanguis respondens ple-
Victus. nitudini, & viribus ægri. Si ob bilem mixtam sanguini, præce-

• Sectio denti victu frigido, & astringente, de quo capitibus vigesimo
vena. primo, & vigesimo octauo, de sanguinis profluuio ē naribus, &
Si à bile de sputo. Vacuetur bilis cholagogis, ut myrobalanis citrinis,
victus. rhabarbaro, tamarindis, cassia fistulari, & similibus: ut ℞. medul-
Purga- læ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ
tio. an. ʒ. ʒ. pulueris corticum myrobalanorum citrinorum, & rha-
barbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, an. ʒ. j. syrupi
rosarum ʒ. j. aquæ portulacæ quod satis est, misce, & fiat potus.

Quæ si- Deinde sanguis refrigeretur, & sistatur syrupo rosarum, gra-
stut san- natorum, myrtillorum, cydoniorum, de agresta, & de ribes, &
guinem. aquis portulacæ, plantaginis, sanguinariæ, & similium. Dosis
Purgan- quolibet die summo mane syruporum vnciæ duæ, & aquarum
tia pi- vnciæ quatuor. Si ob mixtam pituitam (quod color sanguinis al-
uitam. bus ostendit, quemadmodum flauus bilem) phlegmagogis va-
cuetur, ut myrobalanis chebulis, agarico, & aliis: ut ℞. diacatho-
liconis

liconis ꝑ. ꝑ. corticum myrobalanorum chebulorum, & agarici
 trochiscati an. ꝑ. j. diaphæniconis. ꝑ. ij. rhodomellis ꝑ. j. aquæ
 fœniculi q. s. misce, & fiat potus: præcedenti tamē pituitæ aquo-
 sæ concoctione per syrupos de absinthio, & rhodomel cum
 aqua fœniculi, & absinthij. Si ob atram bilem mistam, quod ni-
 ger color indicat, vacuetur epyrhimo, myrobalanis indis, sero, &
 aliis: vt Ꝓ. confectionis diasenæ ꝑ. iij. pulueris epithymi, &
 corticum myrobalanorum indorum an. ꝑ. j. syrupi buglossæ ꝑ. j.
 aquæ borraginis q. s. misce, & fiat potus, prius tamen appa-
 retur bene atra bilis per medicamenta dicta cap. i. & cap. 9. de
 curatione melancholiæ. Facta iam corporis euacuatione, &
 factis etiam auersionibus omnibus, tum per sanguinis missio-
 nem, tum per purgationes, per frictiones partium superiorum,
 & ligaturas dolorificas, & forum earundem; & per frequentes
 cucurbitulas scapulis, & potius mammis affixas. Sanguis om-
 ni studio refrigerandus, & incrassandus est, vt quiete animi,
 & corporis. Scimus enim Vicecomitem ipsam Castri boni
 perisse menstruorum immodico fluore, cuius causa fuit ma-
 gnus motus: confecit enim pedibus iter trium leucarum, vt
 vocant, ad visendam imaginem virginis Mariæ de Sarrança.
 Et aliis etiam omnibus internis, & externis stipticis, & re-
 frigerantibus est incrassandus, vt drachma vna pulueris ka-
 rabæ, & corallij rubri multis diebus sumpta cum paucis syru-
 po, vel aqua frigida, & astringente, vel iure arietis, vel pedum
 suis, vel vituli, vel amydo prædictio iure decocto, vel lacte ca-
 lybeato. Dimidium vnciæ conseruæ rosarum vetustæ cum
 syrupo, vel aqua astringente per aliquot dies sumptum sistit
 hunc fluxum sanguinis. Idem fit drachmis tribus micletæ:
 vel Ꝓ. micletæ, conseruæ rosarum antiquæ, ana. ꝑ. j. ꝑ. pulue-
 ris spodij, sanguinis draconis, Karabæ, lapidis hæmatitæ præ-
 parati, balaustiarum, rosarum, corallij rubri præparati, mastichis,
 cornu cerui vsti, thuris, acaciæ, gummi dragaganti, & gummi
 Arabici ana. drachmas duas syrupi myrtillorum, quantum
 sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis est cochlearium vnum
 cum aqua plantaginis, portulacæ, vel sanguinariæ. Vteri loco
 anteriori, vt & posteriori medicamenta adstringentia, & fri-
 gida actu potentia admota sistunt hunc sanguinis fluorem:
 vt sunt succi, vel aquæ plantaginis, portulacæ, solani, & si-
 milium cum aceto, & bolo armeno, & aliis pulueribus a-
 stringentibus. Stercus asininum non solum interiùs sumptum
 cum syrupo aliquo, & aqua astringente: sed exteriùs admotum
 cum aqua calybeata, & paucis aceto sistit hunc sanguinis,
 & quemcunque alium fluorem, vt ego expertus sum. Hoc
 vnguen

*Atram
 bilem
 purgan-
 tia.*

*Auer-
 tentia.*

*Refrige-
 ratio, &
 quies.*

Historia.

*Stiptica
 sangui-
 nem in-
 crassan-
 tia.*

*Mixtu-
 ra ma-
 ximè a-
 stringēs.*

*Vtero ad
 mouen-
 da.*

*Asini
 ster-
 cus.*

DE CVRAND. MORB.

Vnguentum. vnguentum est in hoc genere probatum: ℞. olei myrtillorū, cydoniorum, & mastichis an. ʒ. j. pulueris boli Armeni præparati sanguinis draconis, & trochiscorum de Karabe an. ʒ. j. aceti cochlearium vnum, ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. In vteri cavitatem necessariæ, & utilissimæ sunt iniectiones medicamentorum astringentium, glutinantium, & ora venarum ruptarum consolidantium, quales sunt aquæ, vel succi portulacæ, plantaginis, solani, sanguinariæ, & similium. Galenus enim diebus quatuor solo succo plantaginis infuso per metrenchitas curauit antiquū mensiū fluore, qui nullo alio auxilio curari potuit. Si his liquoribus addas pulueres astringentes, erit auxiliū efficacius. *Pessalus* seu pessarium longū ex supradictis succis, & pulueribus astringentibus cum terebinthina, vel pice & lana pudendo mulieris affixus valenter sistit hunc fluorem. *Suffitus* stercoris ouini, vel asinini per vuluā susceptus inhibet hoc sanguinis profluium. Suffitus ranarū combustarū egregiè retinet hunc defluxū sanguinis, vt ego expertus sum in excellentissima domina mea duce Cardonæ & Sugurbi anno 1544. hoc fluore affecta septem fermè mensibus, quæ diuino fauore ad pristinā restituta est valetudinē. Suffitum vngulæ mulæ sistere mirificè hunc sanguinem expertus sum: quamuis ab eo fiat per mensem sterilis fœmina, vt quibusdam placet: Hoc medicamentum multas nobiles Cottalanas laborantes hoc affectu satis antiquo curauit: ℞. corticum duorum ouorum recētium adulatorū, thuris, mastichis, an. ʒ. ʒ. margaritarū electarum, corallij rubri præparati, Karabæ, ana. ʒ. ij. lapidis hæmatitæ, & sinaragdi præparati an. ʒ. ʒ. farinæ hordei sine furfure. p. ij. albumina quatuor ouorū, & si opus fuerit adde parū aquæ calybeatæ, & fiant duo panes, seu placentæ, & coquantur in furno, vt possint in puluerē redigi: dosis huius pulueris est à drachma semis vsque ad drachmā vnā cum iure pedum arietinorum sūmo mane. Vltimò curatur hic fluor, vt cæteri narcoticis seruatis omnibus, quæ sæpè diximus præcipuè cap. 40. de curatione colici doloris: quia periculosiora sunt narcotica interiùs sumpta iis quæ inniiciuntur, vel admouentur parti inferiori, & omnibus minùs periculosa sunt exteriùs admota, inter ea quæ sumuntur, requies magna vt clementiùs narcoticum, deinde athanasia, postea trochisci de Karabe, de spodio, & de terra sigillata, postea Philonium maius, vel Romanum, vel Persicum, vel Tharsense: hæc tamen nullo modo sunt admouenda, neque exhibenda, quando facultas est imbecilla, ne paucus natiuus calor extinguarur à medicamentis tam frigidis, sed potiùs facultas est roboranda succo carniū

carnium & iure optimò cum succis cydoniorum, acetosæ, & agrestæ. Sed quia hoc sanguinis fluore, & aliis omnibus ventri- *Ventri-*
 culus imbecillior redditur, prudenter alimentis frigidis est nu- *culi cor-*
 triendus æger, ne magis debilitetur, & externis dictis cap. 31. *robora-*
 est corroborandus, & nullo modo internis, ne sanguis calefa- *tio.*
 ctus aptior sit motui.

Scholium.

IMmodicè fluere menses.] In ea sanguinis euacuatione, quam *Conside-*
 singulis mensibus utiliter in mulieribus experimur, hac omnia rāda in
 considerare opus est. Primò substantiam, quæ euacuatur. Secundo mensiū
 locum, per quem euacuatur. Tertiò tempus, in quo incipit & desinit fluxu.
 euacuatio. Quarto quantitatem sanguinis euacuati. Vltimò an possint *Quis sã-*
 concipere mulieres illæ, in quibus non fluunt menses. Quantā sit sub- *guis pro-*
 stantia, quæ in menstrua purgatione excernitur, ex Galeno facile *fluat.*
 colligimus: fœmina enim ex lib. 14 de usu part. cap. 6. ratione sexus
 mare est frigidior, eò usque, ut alimentum, quod conficit, totum di-
 scutere non possit: domi etiam agit, neque vehementibus motibus
 exercetur, aut sub claro sole viuit, lib. de vena sec. aduer. Eras. c. 7.
 ac proinde in venis copiosum sanguinem coaceruat: qui, tēpore quo
 non concipit, à natura (multitudine eius grauata, per uterum (qui
 pars languida est) salubriter expellitur, at tempore, quo utero ge-
 stat, idonea est ipsi fœtui materia. Vnde colliges duo. Primum san-
 guinem menstruum optimum esse, & ex quatuor humoribus consti-
 tutum: quem natura consultò per uterum expellit, quia est alterum
 principium nostræ generationis, & alimentū seminis & fœtus. Se-
 cundum, ridicula esse, quæ Plinius lib. 7. nat. hist. cap. 15. de san- *Plinij la-*
 guine menstruo scribit, cum nititur probare, nil mulierum profluvio *psus.*
 magis monstrificum esse: locus per quem sanguis mēstruus excerni-
 tur, uterus est: ad ipsum enim perueniunt vena magna, & arteria
 ex vasis, quæ sunt iuxta os sacrum. Ex quibus quadam inseruntur *Venarū*
 in uterum, per quarū orificia in eius cavitatē patentiā (cotylidonas *uteriva-*
 Græci, & Latini acetabula appellant, quibus vena & arteria um- *rius lo-*
 bilicales dictæ adharescunt) sanguis excerni solet in virginibus & *cus.*
 mulieribus quæ non conceperunt. Quadam verò in collum uteri, & *In gra-*
 pudendum disseminantur, per quas tempore conceptus, solet fieri in *uidis per*
 aliquibus gravidis menstrua euacuatio. Non ab interioribus, quæ *quas ve-*
 sunt in cavitatē uteri, quia ab his secūda pendent, & ideo nil pos- *nas fit*
 sunt in uteri sinum immittere, ut auctor ex Gal. lib. 5. aph. com. 60. hac eua- *cuatio.*
 Ex his intelligemus, an, quæ Iacotius in suo scholia scribit vera sint: *Sentētia*
 duo enim persuadere conatur. Primum est, in gravidis fluere ali- *Iacotij.*
 quando sanguinem menstruum non per collū uteri, sed per eius ca-

DE CVRAND. MORB.

uitatem: in primo tamē mense, in quo os uteri multum non est constrictū, ut ostendit superfœtatio, qua eo tempore fieri solet. Secundum est euacuationem sanguinis factam per venas, qua sunt in collo uteri, nō esse menstruam, sed hamorrhoidalem, quia sanguis ille crassus est, & venae sunt iuxta anum, & habent orificia in cavitatem patentia. Ex curatione hoc ipsum probat, quia si hac euacuatio per uteri collum facta supprimatur, curatur sanguine misso nō ex pede, ut in suppressis mensibus: sed ex brachio, ea ratione, qua in hamor-

Iacotius reprehēditur. rheidibus suppressis facere solemus. Hæc Iacotius, qui maxime & crasse decipitur. Primò, quia si orificia venarum in cavitatē uteri patentia, tempore conceptus, adherent orificiis vasorum, qua per chorion disseminantur, non poterit, ut recte docuit Galenus, sanguis per illas in cavitatem uteri excerni. Neque id recte ex superfœtatione probat, quia hæc nō solum in primo mēse, sed & in quarto, & quinto contingit: ut enim multa taceam exempla, uxor cuiusdam doctoris,

Historia. qui hic Valētia regia cancellaria praesidebat Gallart appellati, post quatuor menses ab obitu viri filiū peperit, & deinde nono mēse alterū. Neque enim causa superfœtationis consistit, in eo quod orificium uteri sit apertū aliquantulū, ut simul etiam voluit Vallesius

Causa superfœtationis. lib. 5. epy. comm. 11.) qua semper euenit orificio ita clauso, ut ne specilli cuspide admittat: sed in uteri attractione, qua tunc contingit, quia dilatatur in coitu à fricatione, & calore orificiū uteri, & ita semen attractū potest uteri cavitatem subire. Altera Iacotij sententia manifestā habet redargutionem, quia si sanguis per collū uteri euacuatur, semper ex vena caua fluit, & euacuatur nō per venas in eam cavitatē patētes, quomodo erit hamorrhoidalis. Praesertim cum non sit sanguis crassus (ut ipse sentit) sed optimus venas quantitate grauans. Ratio ex curatione desūpta nil cōcludit, quia si supprimatur illa euacuatio, qua in gravidis per collū uteri cōtingit, si ledit,

Non omnibus incipit eo dē tempore hac euacuatio. non mouemus eam, secantes venam pedis, ne multo sanguine euacuato, qui infernē habet impetum, foetus moriatur, sed ex brachio, ut euacuemus redundantiam. De tempore quo incipit, & desinit hæc euacuatio, nil certi diffinire possumus, quia pro quantitate sanguinis, & eius consistentia maxime euacuat. In quibus enim mulieribus, multus est sanguis, aut tenuis, citius incipit, & tardius desinit. In quibus menstrua euacuatio: contrā verò in quibus crassus est aut paucus.

Quod quāuis ita sit, maiori tamen ex parte incipiunt mens. 5 & 3. aut 14. anno, eo quòd tunc iam non absunt fœmina tantū sanguinis in corporis augmentū: desinunt autem 45, aut 50. quo tēpore iam sanguis ea copia non generatur, qua possit abundare singulis mēsis. Quantitas sanguinis, qui solet euacuari singulis mēsis, non est certo diffinēda: quia pro natura & victus ratione mutatur. Ad ultimum (quod in hac disputatione inquirendū diximus) re-

spondet

spondet Aristoteles, bene posse concipere mulieres, antequam menses fluant. Aliqui experientiam ad id confirmandū addunt. Caterum Gal. A. Galenum habet contrarium Aristoteles, qui libro de uteri dis. capi- Aristoteli te 10. ante mensium eruptionem non posse fieri conceptū scribit, quia contra- semen caret vero alimēto, sanguine videlicet. Tum quia levis uterus rius. est, ob vasorum occlusionem, & sic decidit semen: aptius enim est ad concretionem asperū quā leue: quod in lignis & lapidibus videre est, quæ si volumus vnire, prius (ut rectè dixit Diocles) scalpello exasperamus. Neque experientia potest dicere contrarium, quia in foeminis, quæ sine precedentibus mensibus conceperunt, tēpore coitus motum habuerunt. Prædicta ergo euacuatio menstrua si tempestivè fiat utilis est: si verò immodica (quam ex noxa colliges) mala, ut docuit Hippocrates 5. aphorismorū sent. 57. menstruus enim largiūs fluentibus morbi fiunt, refrigeratio totius corporis habitus, fœdus color, tumor pedum, omnium virium imbecillitas, animi etiam deliquium, & convulsio libro quinto aphorismorū, sentent. 56. Quod si Immodi- immoderatus hic fluor in gravidis contingat, fœtus afficitur iuxta cas flu- Hippocratem, eodem libro sent. 60. Hæc immoderata sanguinis per xus sym- uterum euacuatio, symptoma est in his, quæ excernuntur, quātitate ptoma peccantia. Eius causa ex libro quinto aphorismorum, commenta. 53. est. ires sunt. Apertio orificiorum eorum vasorum, quæ in uteri cavitatē Cause desinunt, sanguis calidus, & tenuis, & totum corpus (propter malū immodi- habitum, hoc est, imbecillitatem à sanguine etiam moderato aggra- ci fluxus uatum) expellens ad venas uteri. Prima causa est morbus instru- tres. mentarius in via. Secunda intemperies calida iecoris, multam bilē Prima generans. Tertia intemperies est totius habitus corporis, valida ta- causa. men, aliter ipsius vires nō deiecerit. Præter hos morbos, nullus alius Secūda. prædictum efficit symptoma, & ideò auctor, Rondoletius, Altoma- Tertia. rius, & alij Aëtium sequuti decipiuntur, existimantes erosionem, & Error venarum rupturam menses immodicos efficere: quia immodica mē- multo- sium eruptio, consueto natura tempore fit, ea verò quæ ex erosionem, rum. aut ruptura procedit, quolibet tempore contingere potest. Vnde hæc sanguinis euacuatio per uterum nominabitur, non mensium im- modica euacuatio. Ea autem sanguinis præter modum euacuatio, quæ post partum aut abortum, aliquando euenit, ut ex Galeno li- bro tertio epyd. parte 3. comment. 35. colligimus, menstrua euacua- tio appellatur, quia quod expellitur est sanguis menstruus propter fœtum in uterum immoratus: quamvis ille sanguis distinguatur ab eo qui singulis mensibus euacuatur, ut libro de atra bile cap. 8. docet Galenus: ille enim qui post partum expurgatur, portio est de- terrima: (nam optimum sanguinem fœtus attraxit, non solum pec- cans quantitate, sed & qualitate, & ita in epydimiis supradictō loco, hunc sanguinem melancholicum esse scribit.

DE CVRAND. MORB.

Si immodicus fluor mensium] Si ex imbecillo corporis habitu partes grauate expellant ad uterum sanguinem, & hac ratione fiat Vena se- immodicus mensium fluxus, secabimus venam basilicam dextri, aut Etio quã sinistri brachij, nihil enim refert. Cucurbitulam etiam magnam sub do est e- mammis infigemus, iuxta Hipp. 5. apho. sent. sunt enim communes xercen- utero & mammis vena: hac enim ratione reuellemus sanguinem à da. parte affecta. Alimenti quantitatem minuemus, & corporis habitum roborabimus.

Si ob bilem mixtam sanguini.] Bilis sanguini mixta ipsum tenuem reddet, & fluxioni aptum. Sanguinem ergo mutemus & utemur cucurbitulis, ut reuellamus. Alimenta frigida sint, aut temperata, frigidis tamen alterata.

Melan- Si ob mixtam pituitam] Si melancholia & pituita sanguinem cholia crassum reddunt, quomodo immodicos menses efficient.

& pitui- Facta iam corporis euacuatione] Tota ratio curandi hoc sym- ta non ptoma hac ratione procedat. Symptoma hoc aut urget, aut non urget. sunt cau Si urget, ei prospiciendum est alimentis & medicamentis incrassanti- sa. bus sanguinem, auxiliis etiam repulseris. Si vero non urget, causa Ratio to remedia applicabimus, habitum corporis roborantes, sanguinem te- ta curan nuem incrassantes, & intempericm, à qua procedit, corrigentes. Vlti- di hoc mò etiam meatuum laxitatem constringentes.

sympto- ma.

De suppressis mensibus. C A P. LVI.

Descri- ptio.

Quibus fœminis menses non flu- unt.

Quemadmodum menstruæ purgationes cum modum exce- dunt multarum ægritudinum causæ, ita quoque cum in totum supprimuntur, multos pariunt morbos, ut ex aphorif. 57. sectionis quintæ colligitur: de suppressis igitur mensibus pauca dicamus. Suppressos autem menses tunc dicimus esse, quoties cum secundum naturam fluere deberent, non fluunt: debent autem secundum naturam fluere in iis, quæ neque gra- uidæ sunt, neque infra decimum quartum annum, aut supra quinquagesimum constituuntur & præter has etiam illæ, quæ aut cantatrices sunt, aut saltatrices, aut immodicè se exercent, menstruis purgationibus naturaliter carent. Atque ut summa- tim dicam iuxta sententiam Aëtij, mulieres calidioris tempera- turæ, validisque exercitationibus addictæ, & agrestes parum admodum purgantur. Præter has quæcunque suppressos ha- bent menses ægrotare necesse est: supprimuntur autem men- ses, vel quia summa adest sanguinis plenitudo venas replentis, atque obturantis, vel quia sanguis sit crassus, viscidus, ac len- tus, à quo etiam venas obstrui necesse est. Non purgantur *Cause.* etiam mulieres, quæ longa aliqua ægritudine, aut acuta la- borant,

borant, vt phtisi, quartana, hectica febris, ardenti, atque aliis id genus. Præterea quæ insigni aliqua vacuatione sunt exinanitæ, vt sanguinis missione, vomitu, sudore, sanguinis è naribus profluvio, alui fluore. Ad hæc & quibus puris copia alicunde emanat, & pustulæ in cute effloruerunt. Ob peculiare vteri vitium menses quoque interdum retinentur, verbi gratia ob pinguedinis copiam, aut carnis excrescentiam, aut callum; aut cicatricem ex ulcere, quod in vtero antecessit. Hæc enim vasorum vteri ora obstruere possunt. Causæ facile *Nota.* patere possunt: generaliter verò quibus menses præter naturam retinentur, dolores circa lumbos, femora, collum, sciniput, & oculorum radices accidere solent. Corporis præterea gravitatem, quæ sic laborant, patiuntur, nauseant cibum, avertunturque, fastidiunt, & horridos quosdam per vniuersum corpus discursus habent, quales iis, quæ conceperunt, accidere solent: vrina interdum in nonnullis difficulter redditur, interdum planè suppressitur. Cæterum mensium suppressio si à pituita copiosa, & venarum ora obstruente contingat, videre est laborantem somnolentam ad omnem motum segnem, colore candidam: plumbi quoque interdum colori similem pituitam assidue excreantem, & aliquando euomentem. Vrina quoque aquosa esse solet.

Menses si ob sanguinis inopiam ex inedia, aut victu parco, *Curatio* aut longo morbo, aut alia vacuatione per se constiterint, proprie non sunt suppressi, cieri possunt antequam mulier redierit *quando* ad propriam naturam. Si verò alia de causa suppressi sint, per *ex san-* abscissionem causæ euocantur, vt si à siccitate fiat, rebus humi- *guinis* dis curatur, non calidis, & exiccantibus, ne augeatur morbus. Si *defectu* ab obstructione, à qua ferè semper fit, curatur primò victu te- *fit.* nui attenuante, & aperiente, de quo capitibus 42. & 45. de ob- *A siccitate.* structione hepatis, & lienis. *Ab ob-*

Secundò abigentibus causam suppressionis, & obstructio- *obstructionis* nis, quæ si sanguis fuerit per sectionem saphenæ, aut vena- *ne vi-* rum pedum abigeretur: quamvis Matthæo de Gradi videatur *aus.* primam sanguinis missionem esse faciendam ex basilica, *Sanguis* quando corpus est multo sanguine plenum, ne attracto san- *nis mis-* guine multo ad infernas partes augeatur obstructio. Deinde *sio.* euocandi sunt menses frictionibus, ligaturis & cucurbitu- *Matth.* lis partium internarum, & coxarum, lotionibus, & fotibus ea- *de Grad.* rundem. Vltimò, per medicamenta aperientia, & diureti- *Euacua-* ca, de quibus statim dicemus: clementiora tamen in hac con- *tio men-* ueniunt, quàm in facta ab humoribus pituitosis, & crassis, *sium.* quæ primò curatur victu tenuante, & aperiente, vt diximus.

DE CVRAND. MORB.

A pituita. Secundo apparantibus pituitam rhodomelle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis i. cap. cum decocto, vel aquis eodem cap. dictis ad concoquendam pituitam.

Victus cōcoctio. Tertiò vacuantibus phlegmagogis eodem i. cap. dictis, vt agarico, turbit, diaphanicone, electuario, indo maiori, & aliis similibus: vt ℥. pilularum de agarico, & cochiarum an. 3. ℞. cum aqua foeniculi fiant pilulae septem.

Purgatio. Quarto menses omni arte sunt euocandi, cucurbitulis videlicet coxis affixis, frictionibus, ligaturis, & fotibus partium infernarum, vt syrupo capilli Veneris, de artemisia, de duabus, & de quinque radicibus quantitate duarum vnciarum quolibet mane sumpto per multos dies cum aquis duplis, vel decocto radicum diureticarum, croci, cinnamomi, calamenti, artemisiae, sauinæ, & similium.

Fotus, & infessus. Fotus, & infessus ex decocto medicamentorum supradictorum aperientium in tempore consuetæ purgationis valenter ciet menses, præcipuè, si sumatur tunc

Potus valenter menses educens. potus, hic aut huic similis: ℥. hæmagogi 3. j. aquæ capilli veneris, & sauinæ, ana. 3. ij. syrupi de artemisia vnciam vnā, misce.

Suffitus. Et si menses inceperint, sanguinis missio ex poplite, vel pede valenter euocat menses. Suffitu per vuluam excepto rerum aperientium, & redolentium cum Hippocrate quinto aphorismorum 28. aphorismo menses euocantur. A fotu, & infessu, vngatur locus anterior, & posterior vteri hoc vnguento: ℥. olei de lilio, sesamini, & scorpionum, an. 3. j. axungia cuniculi, & gallinæ an. 3. ij. pulueris croci, spicæ, & sauinæ, an. 3. j. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Hoc

Vnguentum. medicamentum valenter menses euocat: ℥. diacurcunæ, & dialacæ, an. 3. j. trochischorum de myrrha, de capparibus an. 3. iij. pulueris spicæ, croci & cinnamoni an. 3. j. 3. ℞. syrupi de artemisia quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum quolibet die mane cum vnciis tribus decocti, vel aquæ capilli veneris, vel artemisiae, vel sauinæ, drachma vna, vel duæ theriacæ diateffaron cum decocto: vel aqua prædictarum rerum menses prouocat, valentiùs tamen theriaca magna, & mithridatus id efficiunt cum electuario hæmagogo.

Alia mixtura in hoc potentissima. Hoc medicamentum optimè menses excitat etiam suppressos septem annis: ℥. myrrhæ, calamenti montani, ana. 3. iij. medullæ passularum 3. ij. rutæ recentis 3. iij. sauinæ 3. vj. Ex omnibus contusis bene, & sufficienti quantitate mellis fiat confectio. Dosis drachmæ duæ cum decocto rubearum tinctorum. Pessi longi ex superiori confectioe, & felle tauri cum lana in vuluam & vterum affixi aperiendo venarum

ora menses prouocant. Pessus ex radice rubeæ tinctorum *Pess.* cum felle tauri, vel alicuius animalis rapacis clementer menses euocat. Idem facit hic. ℞. pulueris castorei ʒ. j. β. musci grana iij. olei sambucini, & terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & cum lana fiat pessus longus: vel ℞. medullæ caricarum ʒ. β. succi mercurialis ʒ. j. pulueris radices gentianæ, & pulegij an. ʒ. ij. pulueris nigellæ ʒ. j. cum pauca terebinthina, & lana vel gossypio fiant pessi, seu pessarij duo, vel tres longi. Pessi facti ex armoniaco, opopanace, galbano, sagapeno, & euphorbio sunt valentiores ad menses euocandos *Radix* aliis dictis superius, præcipue si addas cyclaminum, cuius ra- *cyclami-* *ni.* dix valentissime menses ciet, & ut quibusdam videtur, si super eam foemina transeat, etiam menses euocat. Si vulua, & uterus ab his, & similibus pessis, & aliis medicamentis calidis aperientibus afficiantur calida intemperie, initio vlcerum nescarium erit consilium docti chirurgi. Interim *Calidi-* *tatem* *g* *ulcus cu-* *rantia.* tus & lotio ex decocto plantaginis, & maluarum iuuat multum hoc affectu vexatos, & vnguentum album camphoratum. Pilulæ hæ valenter menses ouocant: ℞. musci, myrrhæ *Pilula.* an. ʒ. ij. stachados, rubeæ tinctorum, pulegij, corticum citri, piperis longi, corticis cassiæ lignæ, granorum pœoniæ, calami aromatici an. ʒ. iij. spicæ nardi ʒ. j. cum aqua artemisiæ fiant pilulæ septem pro drachma: dosis drachma vna: *Syr-* *pus.* syrupus hic egregie menstrua mouet ℞. rubeæ tinctorum, arthemisiæ, sauinæ ana. man. β. mentæ, absinthij, radicem fœniculi, radicem acori squinantij, anisi, origani, nepitæ, matris syluæ ana. ʒ. β. gariophyllorum, melissæ, linguæ bouis an. ʒ. iij. cyperij, galangæ, calami aromatici, fœniculi, ameos, cymini rustici an. ʒ. ij. cinnamomi, medullæ passularum an. ʒ. v. fiat decoctum secundum artem, cum quo percolato, & melle sufficienti fiat syrupus. Dosis vnciæ tres.

Scholium.

Quemadmodum menstruæ.] Ex Hippocr. lib. 5. aphor. sent. 57. Si menstrua non sunt, ex utero morbi cōtingunt, quia ex sanguine detento processu temporis uterus patitur affectionē similem aut inflammationi, aut erisypelati, aut schiros aut cancro, ex quibus lege consortij afficitur totum corpus. Et quamuis mensium suppressio noxia sit, magis tamen noxia est ea, quæ à partu contingit, eò quòd hæc non solam abundantiam, sed insignē etiā humorum pariat prauitatem 3. epy. part. 3. comm. 73. quia post partū, ut auctor est Galenus lib. de atra bile, euacuatur portio san-

DE CVRAND. MORB.

Sanguis- guinis deterrima. Solet menstrua euacuatio, in quibus coassueta erat
 nis men- cessare, ob defectum materia, nempe sanguinis: in his quæ morbo
 strui sup aliquo laborant mulieribus, quæ multum se exercuerunt, & in
 pressio. quibus copiosa sanguinis euacuatio præcessit. De hac mensium sup-
 Causa. pressione non loquimur modo, quia suppressionem menstruam illam
 De qua appellamus, in qua sanguine in venis non deficiente, eius per ute-
 suppres- rum fluor, ab aliqua affectione impeditur. Affectio hæc aut est in
 sione hic utero, aut in sanguinem in utero varia esse solet: Prima est, angu-
 sit ser- stia venarum uteri, à prima conformatione contracta: quam affe-
 mo. ctionem morbosam non licet appellare, cum à natura indita sit, &
 Prima morbus innatus non detur: erit autem morbus simpliciter, qui est
 causara- intra limites sanitatis. Secunda est uteri densitas, quæ à frigiditate
 zione v- contrahente corpus uteri, & vase in eo contenta ortum habet, &
 uteri. ideo non fluit sanguis, vel si fluit, tenuis & aquosus. Quod conside-
 Secunda rans Hippocrat. lib. 5. aphor. sent. 62. mulieres uteros densos habentes,
 causa. tes, non concipere scripsit. Tertia est cōpressio vasorum uteri. Quæ sit
 Tertia aut à tumore præter naturam circumiacentium partium, aut ab
 causa. omenti multa pinguedine, ut in obesis mulieribus in quibus descē-
 Quarta dit omentum usque ad os uteri: non curantes hæc in parte Vesaliū,
 causa. qui omentum non posse usque ad os uteri descendere sentit. Quarta
 Quinta est obstructio. quæ sit à crasso, glutinoso, aut multo humore. Quinta
 causa. intemperies uteri frigida densans uterum: aut sicca eum indurās.
 Sexta Sexta affectio suppressens menses, traditur à Galeno lib. 5. apho.
 causa. comm. 5. 7. est autem robur vasorum uteri, adeo ut quod influit, non
 Quid per admittat. Quod certe difficile mihi videtur, consideranti uterum à
 robur v- natura esse fabricatum languidum, ut sarcinā per ipsum depone-
 teri in- ret: ac proinde per robur non natium, sed factum à medicamentis
 telligat adstringentibus intelligo. Alia causa quæ sunt callus, oris uteri di-
 Gal. storsio, aut inflammatio, carnis excrecentia, & pellicula supra os
 Aliacau uteri generata in his, quas vulgò closes appellamus, à practicis ad-
 sa à pra- ducta nobis non placet, quia non possunt impedire mensium euacua-
 cticis tra tionem, quæ etsi per os uteri non fiat, potest tamen fieri per venas ad
 dita nul- eius collū peruenientes. Tum quia non possum mihi persuadere, tam
 ba. magnum collum in utero posse generari, ut omnium venarum orifi-
 cia ocludat. Affectus sanguinis est, cum est crassus aut glutinosus.
 Quæ causa non est distincta ab obstructione, quia si nullum sit in
 venis impedimētum, sanguis etsi crassus & glutinosus, fluet, & ex-
 cernetur. Dices, Cur ergo Gal. obstructionem causam distinctam, à
 sanguine crasso & glutinoso statuit? Respondeo, quia aliquando est
 obstructio, sine tali sanguine. Quamvis varia sine istius suppressio-
 nis sanguinis causa, ut in plurimum tamen sit ab obstructione à
 sanguine crasso orta: ac proinde lib. 5. aphor. comm. 36. ad excitandū
 menstruas suppressiones, duos scopos describit Galenus, aperiionem
 orificio

orificiorum vasorum ad uterum pervenientium, & sanguinis extenuationem. De hac ergo suppressione est praesens caput.

Secundo, abigentibus causam.] Ut sanguinem menstruum retentum moneas, non euacues ex brachio, quia cum reuelles, & contrarium motum ab eo, quem molitur natura, induces: sed ex pede, cum sanguis per uterum faciat impetum. Vnde male multi ex medicis sequuti Aëtium, prius secant venam brachij, ut euacuent venas, & deinde pedis, ut moveant menses. Quasi euacuatio ex pede, Vbi ex plenitudine ex vena caua non euacuet? Vbi nomine pedis intelligenda ge totum illud, quod est ab articulatione coxae usque ad digitos. sanguis. Euacuatio ergo (quam, ut moneamus menses, exercemus) potest fieri nis missio. Scarificatione, aut sanguinis missione. Scarificatione fiet, quando mulier candida est, aut simul candida & obesa. Ratio hac est: Mulier In muliere candida habet tenuem, & aquosum sanguinem (& ideo Hippocrat. liere cā- 6. epyd. part. 1. sent. 6. has mulieres appellat aqua laborantes) & dida scarificatio poterit per locum sacrificatum recte egredi. Dices, nonne melius rificatio egredietur secta vena? Respondeo verum esse, sed ex ea sequi aliud ne modum, quod est multos spiritus euacuari: at scarificantes prater uēdi mē- quān quod commodē fluit sanguis, exigua spirituum sit iactura. ses. In muliere obesa, cum habeat exiguas venas in cruribus, etiam si eas probe insecindamus, non poterit sanguis nec mediocriter fluere: ac proinde eam scarificare oportet. Sanguinis missione euacuabimus ex pede, si mulier sit nigra, & magis, si magnas habuerit venas. Nigra Nigra enim mulieres, sanguinem habent crassum, qui per scarificatum locum non cum, commodē non euacuabitur. Hae Gal. in lib. de curat. per san- scarifi- guinis missionem cap. 11. videant ergo qui in hoc affectu semper ventur. nam secant, & nunquam ex poplite euacuant, an secundum artis praecepta operentur. Euacuatio autem sanguinis missione siue scarificatione ex pede facta, non debet exerceri: quando iam fluunt menses, sed duobus aut tribus diebus antea, quo tempore futura expectatur euacuatio, ut libro de curat. ra. per san. miss. c. 17. docet Galenus, & hoc fecisse medicos Roma medentes in libro de vena sec. aduersus Erasistratos c. 7. scribit. Rationem huius rei hanc esse existimo, Cum in missione sanguinis soleat sequi animi deliquium (in quo sanguis recurrit ad cor) si quo tempore fluunt iam menses, ex missione sanguinis, animū linqueret mulier, euacuatio supprimeretur: quod cum non timeamus antequam fluant, ideo tunc euacuare oportet. Hoc verum est cum deficientem euacuationem curamus. Ratio victus sit extenuans.

Victus

Deinde euocandi sunt menses frictionibus.] Amara calida ratio. cum sint, & tenuium partium, menses mouent, quamuis etiam ha- Quae no- beant partes adstringentes (ut in absinthio videre est) quia hac cēt men- adstrictio poros. internos, qui magni sunt, non occludet. Omnia etiam ses.

DE CVRAND. MORB.

Spersa puluere nepitæ, aut pulegij. Possumus manè hac uti portione: ℞. mithridati ʒ. j. Syrupi capillorum veneris ʒ. j. misce cum aqua cap. veneris, & fiat potio. Hæc confectio accommodatissima est: ℞. diacurcume ʒ. ij. trochiscorum de absinthio, de rhabarbaro, & de myrrha, aut de capparibus an. ʒ. j. ʒ. quatuor sem. frig. an. ʒ. j. pulueris diarbodon. Abbatis ʒ. iij. pulvis foliorum sabina ʒ. ij. cum syrupo capillorum veneris, fiat confectio. Cuius singulo manè assumet ager cochlearium unum, cum aqua sabina & borraginis, & deinde se exercebit quoad incipiat sudor, aut difficilis respiratio.

*Medica- Solemus in hac Valentina ciuitate, in hoc affectu exhibere medi-
mentum camentum ex scobe ferri paratum, cum foelicissimo successu. De-
Valenti- bet autem hac ratione parari. ℞. trochiscorum de absinthio, & de
nis vfi- rhabarbaro an. ʒ. j. antidoti hamagogi ʒ. j. ʒ. artemisia, cinnamo-
tatum. mi, an. ʒ. j. limatura ferri preparati ʒ. j. cum syrupo capillorum
veneris fiat confectio. In hac compositione, quamuis limatura ferri
videatur basis, ei tamen non debetur medicamento totius actio, sed
aliis, quæ propter hanc limaturam melius agunt, cum enim sit cras-
sarum partium, in causa est, ut immorentur, & ita tota compositio,
propter limaturam redditur anostomoticum medicamentum. Ad-
uerte ultimo ex Gal. 4. method. cap. 7. opportunum tempus exhi-
bendi medicamenta menses mouentia esse, statim post balneum ad-
huc linteo inuolutis.*

De vteri suffocatione. CAP. LVII.

*Varia
nomina.*

VTeri suffocationem, alij strangulatum vteri, alij hysteri-
cam suffocationem, alij spirationis ob vterum ablatio-
nem, alij vterinam apnæam vocant (quam animi defectio præ-
cedit, ut docet Gal. 1. de arte curatiua ad Glauconem) quamuis
Stephanus Atheniensis discrimen esse inter apnæam, & vteri-
nam strangulationem velit, fit enim ipso dicente, apnæa ex su-
perfluitate se minis putrescentis, prauasque quasdam exhalatio-
nes, ac præsertim frigidas ad cor mittentis ipsum, atque ita spi-
rationem intercipientis. Contingit verò quandoque melancho-
licas exhalationes, quæ ex ipso semine feruntur sursum ad ce-
rebrum recurrere, symptomâque melancholica facere. Stran-
gulatione apud eum fit ex spasmio matricis sursum tractæ, & per
continuitatem intestina, ventriculum, septum transversum, ac
respiratoria alia membra comprimendis. Sed quia frequenter
ab vteri strangulatione fit morbus comitialis, & syncope per
consensum, propria, & vera huius affectus definitio erit hæc:
malum tunc accidens, cum vterus vaporis copia ita intendi-
tur, ut modò sursum modò in latus retrahi videatur. Eius duæ

Apnæa.

*Defini-
tio.*

Causa.

In vniuersum causæ sunt, retentum scilicet semen genitale, & *A semi-*
 menstruæ purgationes cessantes. Et licet nunquam hæc affe- *ne sape*
 ctio accadat, quin alterutri horum accepta referenda sit, fre- *eius sym-*
 quentiùs tamen euenire solet seminis detenti causa, & quæ ob *ptom-*
 hanc causam fiunt vteri suffocationes, vehementiùs solent af- *ta.*
 figere, & symptomata multò sæuiora inducere, vt copiosè Gal.
 disp. 6. de locis affectis cap. 5. Quem locum si quis optimè con-
 sulat, multa quæ ad hanc affectionem pertinere videntur, & de
 speculatione digna sunt, dilucidè à Galeno tractata comperies:
 eos igitur ad eum librum remittimus, quicunque diligentes na-
 turæ inquisitores magna interdum admiratione tenentur, quæ-
 rentes quid fiat, vt cum in hac affectione intercepta nonnun-
 quam respiratio in totum sit, & arteriarum pulsatio intermissa:
 ægrotans tamen viuatur, & paulò post ad solitas operationes, per-
 inde ac si tale quippiam non esset passa, reuertatur. Cur præte-
 rea tanta varietas accadat symptomatum pro intentionis remis-
 sionisque modo differentium, & quomodo detentum semen,
 cum mole quam minimum sit, tam grauium symptomatum sit
 causa. Quorum omnium quæstionum causas ibi leges: non
 enim breuitati studentes maluimus his omnibus prætermis-
 sis ad signorum enarrationem conuerti, quàm in iis, quæ ad artis
 opera non sunt necessaria, diutiùs immorari. Ex signis igitur *Notæ*
 alia sunt, quæ ipsam accessionem solent præire, alia quæ comi-
 tari. Præire solent, & maximè cum accessio proxima est, men-
 tis torpor, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus
 mœstus. Comitantur hæc, quæ sequuntur laborantes. Interdum
 iacent sine sensu immobiles cum obscuro paruòque pulsu,
 vel omnino sine vlllo. Interdum sentiunt quidem, & mouentur,
 integræque sunt ratione: cæterùm animi defectione & diffi-
 cili spiratione laborant. Interdum verò, & crura, & brachia
 contrahuntur. Adest præterea inclinatio ad somnum, desipien-
 tia, detentio instrumentorum sensus, vox obmutescit, & con-
 uelluntur nonnunquam. Cum iam inclinat accessio, rubore
 suffundi malæ incipiunt, & oculi attolli, atque aperiri. Hu-
 miditas præterea quædam perceptibilis è mulieribus locel-
 lis excurrit: Intestina immurmurant, atque vterus ipse paula-
 tim laxatur, mente, scilicet, sensu, ac motu iam redeuntibus.
 Per circuitus malum hoc solet corripere infirmas, præcipuè
 eas, quæ viduæ sunt, aut alias viri concubitu sunt usæ, & cum
 omni tempore poscit, maximè inuadit hyeme, & autumnò.
 Reliqua ex Gal. Paulo & Ætio sunt petenda. In accessione *Curatio*
 oportet vniuersum corpus perfricare, & extremas præcipuè in acces-
 partes infernas ligare, ægrotamque collocare, ceruico, & sca- *sione.*
 pulis

DE CVRAND. MORB.

pulis accliuioribus, & femoribus, & inguinibus decliuioribus. Naribus eius sunt admouenda foetida, vt funiculus lucernæ nuper extinctus, plumæ maximè perdicum, lancæ soleæ combuitæ, capilli, cornu capræ vstum, pix eliquata super carbones, galbanum, castoreum, assa foetida, vrina multorum dierum, & sulphur, quòd valentissimè excitat ad accessionem in qua raro *In acces-* *sione est* facienda est vacuatio, nisi timeatur suffocatio & mors repen- *vacuan-* *dum ali-* *quando.* tina: nam ad prohibendam eam necessaria esset sanguinis missio ex saphena, vel vena pedis, præsertim si ex suppressis mensibus sit morbus. Quæ etiam sternutamentum faciunt, naribus sunt admouenda, & vacuatio per acres clysteres non est *Si causa* negligenda, de quibus c. 12. de curat. apoplexia. Si à deten- *est semē.* to semine sit, curabit maritus, vel si non habet, nec possit, obstetrix suis digitis, & rebus aromaticis ad inferiora euocet *Optima* vterum, & per vuluam frictionibus purget semen, si citra pec- *mixtu-* *ra.* catum fieri possit hoc. Hæc mixtura est optima huic rei: ℥. olei de lilio, nardici, & cheyrini, an. ʒ. j. galix muscatæ, & alitæ muscatæ an. ʒ. j. musci, & ambræ an. ḡ. viij. zibeti ʒ. ss. misce. In *Medica-* *mentum* *odorum,* *valenter* *trahens* *ad pro-* *prium* *locum v-* *terum* *conser-* *uans* omni tamen causa in ipsa accessione pili pectinis radicitus, & vi magna sunt auellendi ad excitandum. Idem præstant cucurbitulæ coxis & tibiis affixæ, quæ si magna fuerit vmbilico affixa, vterum reducit ad propriam sedem, vaporesque à capite, & partibus superioribus auertit, trahitque ad inferiora: sed reducto vtero ad suum locum ad illius conseruationem debitam vmbilico sunt admouenda, quæ diximus cap. 54. de curatione procidentia vteri. Vel hoc: ℥. emplastri stomatico- nis quod s. galbani ʒ. ij. galix muscatæ ʒ. j. musci & ambræ an. ḡ. viij. misceantur omnia cum oleo sambucino, & extendantur super pannum coccineum ad formam rotundam pro vmbilico. Morbus comitialis, & syncope, si cum hac vteri suffocatione coniungantur, vt sæpe fit, curantur eo modo, quem diximus cap. 8. & 30. semper tamen habenda est prima curandi ratio partis eius, quæ prius affecta est, post aliarum quæ per consensum laborant.

Extra *accessio-* *nem cu-* *ratio.* Extra accessionem ipsam curatur per causæ abscissionem, vt si ex suppressis mensibus nascatur, adhibeantur, quæ diximus capite superiori. Si verò ex semine detento & corrupto, vocetur maritus. Si non possit viro uti, precibus, & ieiunio curabitur. Nutriatur ergo pane, & aqua: menta tamen & ruta, & agnus castus semen minuunt. Ad purgationem vteri iniectus hic liquor ad modum clysteris instrumento argenteo est efficax remedium: ℥. aquæ naphæ, seu florum aranciorum, ℥. j. aquæ oxymi ʒ. iiij. galix muscatæ ʒ. ij. galbani ʒ. iij. musci, & ambræ an. ḡ. v. syru

v. syrupi de artemisia ʒ. iiii. croci puluerizati, cinnamomi & gariophyllorum an. ʒ. ʒ. misce.

Scholium.

Vteri suffocationem.] Per uterū singulis mensibus excerni Vteri re-
solet sanguis, ut superius docuimus: solet etiam, & ex testibus tractio
foemina semen in eius cavitatē immitti, & ex his duobus principiis quomodo
(qua vicē habent causa efficiētis & materia) generatio omnis fieret. fiat.
Inde in corpore solent consortij lege ex utero tanquā ex radice va-
rij morbi prodire, cum aliqua ex dictis substantiis in utero abundat.
Si substantia qua abundat, sit sanguis menstruus ob aliquē affectū
retentus cū uteri venæ, qua multe sunt, & magna repleantur, ute-
ri sequetur retractio, recta, si ex aquo vena sanguine abundet, si ve-
rò non ex aquo, sed solum unius partis vena, versus illam partem
uterus retrahetur, ita ut semper uterus sursum aliquantulū recur-
rat. Adde aliquantulum, quia eiuꝝ ligamenta nō patiuntur ipsum
multum eleuari. Hic sanguis detentus, si putrescat, febrem synochū Sanguis
accendit, qua ex hac sola parte accidit, ob venas qua multe & mēstruus
magna sunt, ut docet Gal. lib. 6. epyd. part. 1. com. 2. Si sine putre- putrefa-
dine corrumpatur sanguis, si sit biliosus & acris, solet ad princi- ctus &
pium nervorum mittere vapores, & eo nomine motus convulsuos detentus
efficere: aut ad cerebrum eos mittens, convulsionem uniuersalem, feb. syno-
qua dicitur epilepsia. Quod si aliquando vera eueniat convulsio, id chū pa-
proueniet, quia in corpore disposito, agitatione humor motus & rit.
fluens replebit nervosa corpora. Si sanguis sit melancholicus, ex va- Sympto-
poribus eius cerebrum petentibus melancholica deliria excitantur, mala
sicut ex pituitoso sanguine sopores. Quod si multi vapores septum qua se-
comprimant, efficiunt (sicut in gravidis, & his qui ob alimenti copiā quantur
distentum habent ventriculum) difficilem respirationem, non autē ex isto
suffocationem, quam à vaporibus gutturis musculos replentibus, sanguine
fieri existimo. Quod colligo, quia qua hanc affectionem patiuntur bilioso.
mulieres eas partes habent eleuatas, & manus ipsis adhibent, indi- Quomo-
cantes molestiam & suffocationem. Refrigerationem totius corporis, do suffo-
quam comitatur respirationis (quoad sensum) priuatio, sanguis de- catio v-
tentus nunquā efficiet, neque Galenus lib. 6. affectorum loc. ubi ex teri con-
professo de hac materia disputat, id significauit, nisi dixerimus san- tingat.
guinē aliquando venenatam induere naturā, & eius vapores cor-
dis caliditatem celeriter extinguere. Nā si alter sanguis mēstruus
detentus refrigerare posset cor, cum frequēter supprimatur, frequē-
ter etiam cor refrigeraret. At rarissimē, aut nunquam cōtingit uni
medico etiam multis annis excrecenti medicinā eam videre, & tunc
in vidua, aut virgine. Si substantia, qua in utero abundat, semē sit,
tunc nō contingit retractio, quia vasorum spermaticorū sola disten-

DE CVRAND. MORB.

tio id non poterit prastare, ut ex affec. 6. colliges, quod non rectè cõ-
 sideravit Rondoletius, Neque retrahetur uterus (ut sentit Valle-
 zij error. sius) eo quod ob appetitum veneris extendatur, sicut pene in viris:
 Vallesius quia ob talem appetitum non retrahitur, inò descendit versus col-
 reprehẽ- lum uteri, ut cum virili mēbro iungatur. Quod similitudine osten-
 ditur. dit Galenus libro 1. de semine c. 5. ex v̄triculo desumpta: hic enim
 Semen quando appetit cum fundo suo ad stomachum recurrit. Si ergo se-
 putrefa- men retentum putrescat venenata putredine, vapores ex eo ascen-
 dũ qua dentes cum toto temperamento contrarij sint, & corruptrices, cali-
 sequan- dum innatum cordis extinguentes, totum corpus refrigerant, ita ut
 tur. sequatur respirationis (quoad sensum) abolitio, qua omnino viuẽte
 animali non potest cessare, Quod si semen non ita prauè corrumpat-
 tur, prout fuerint vapores ex eo ascendentes, aut acres, aut aliã ha-
 bentes qualitatem, sequẽtur animi deliquium & alia symptomata
 peiora, quàm sint illa, qua ex sanguine retento afficiunt: quia cor-
 ruptio seminis peior est sanguinis corruptione, ut experientia docet
 in symptomatis, qua viduis euenire solent. Ex his, qua diximus, in-
 telliges, quàm malè Altomarius, Rondoletius, & alij sequuti Paulũ
 Error suffocationem uteri appellant uteri retractionem: cum neque ex re-
 Pauli & tractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatione, qua ex semi-
 aliorum tractione suffocatio sequatur, neque in ea suffocatione, qua ex semi-
 de uteri ne retento sit, retractio contingat. Nec minùs errant existimantes
 suffoca- symptomata in suffocatione uteri euenientia fieri, ex eo quod semẽ
 tione. aut sanguis menstruus ex retẽtione, & mora refrigerantur, refrige-
 rantque uterum, & simul alteratione, aut vapore medio cor, & ce-
 rebrũ. Non enim est necesse, ut semen, aut sanguis refrigerẽtur, quia
 hac ratione semper in suffocatione uteri sequeretur corporis refrige-
 ratio, quod falsum esse supra vidisti. Adde ex prædictarum substã-
 tiarum frigiditate, non posse sequi tãtam corporis refrigerationem,
 qua ad pituitam vitream, quam frigidiorẽ esse certum est, nun-
 quam sequitur. Et ita tam magna in corpore frigiditas maiorem
 causam arguit. Posset quis per contrarium dicere, semen uteri suf-
 focationem efficit, ubi immoratur. Respondet Rondoletius, non reti-
 neri semen in vasis spermaticis, quia ibi conseruatur, aut in eorum
 alimentum absorbitur: sed in cavitare uteri, ubi quando grauat
 Rõdole- quantitate sua, inter somniandũ expellitur. Hac sententia mihi vi-
 zij sen- detur falsa, quia in viris ex retento semine in vasis spermaticis, vi-
 tentia. demus sequi capitis grauitatem, corporis pigritiam, inappetentiam,
 & alia symptomata. Secundo, si semen in cavitare uteri cõtinetur,
 Rõdole- ergo per eius os effluet, neque enim retinebitur ab utero, cum solũ
 tij sen- non possit conceptum efficere, sine maris semine. Tertio etiam si non
 tentia falsa. somniet mulier, si semen peccat quantitate poterit expelli. Dicen-
 dum ergo erit semen retineri in vasis spermaticis & glandulis illis,
 quarum meminit Fallopius, qua ad seruandum semen videntur
 facta.

facta. Symptomata varia, quæ in uteri suffocatione apparent, quem morbum uteri sequuntur. Altomarius uteri suffocationē dicit esse morbum in situ. Qui maxime decipitur, quia ea uteri retractio non Altomarum adit actionem, neque ex ea symptomata prædicta lege consortij se-
ri error quuntur. Alij eam, intemperiem frigidam esse fatentur. Qui etiam Alij ta-
errant, quia ut iam probauimus, uterus non refrigeratur in uteri xantur.
suffocatione. Obiicies, nonne in suffocatione uteri eleuantur flatu, qui à diminuto calore ortum habent. Respondeo, uteri calorem, comparatum ad multam substantiam ibi detentam, dici languidum, non quod talis sit in sua essentia. Ego in uteri suffocatione, in Auctori utero non unum morbum, sed multos esse existimo. Si uteri suffo-
sentētiacatio, à sanguine retento eueniat, varios poterit habere morbos, quos de uteri capite de menstrua retentione videbis. Si à semine oriatur, distin-
suffoca-
guere oportet. Non enim semen retentum & corruptum (etsi ex eo tione.
sequantur aliqua accidentia) semper est morbus, sicut neque cibus corruptus in ventre, etsi ex eo vertigo, dolor capitis, & alia sequan-
tur: Quia quando accidentia sunt exigua, videntur esse intra limi-
tes sanitatis: & tunc semen, & cibus afficiunt nos ea ratione, qua causa externa. Quomodo verò symptomata magna sunt, molestēque afficiunt, sequuntur tunc morbum in numero addito, semen enim est pars addita præter naturam ea ratione, qua cibus corruptus in ventre, & humor in atheromate, steatheomate, & meliceride.

In accessione oportet vniuersum corpus perfricare.] Ante accessionem proposuit auctor aliqua signa ex Aëtio desumpta: quæ non sunt inseparabilia, nam aliquando ridentibus, & ludentibus foeminis, repente præhendit accessio. In accessione si sit corporis frigiditas, non licet sanguinem mittere, quia illa non est sine animi deliquio. Ea non existente ex pede sanguinem educes.

Si à detento semine sit.] Si suffocatio proueniat à detento se- In suffo-
mine, non mittes sanguinem, quia sanguinis missio non euacuat se- catione à
men. An verò liceat fricatione facta in pudendo, irritare naturam, semine
ad expellendum semen, Theologis discutiendum relinquo. Solum sanguis illis aduertendum propono (ut melius iudicare possint) semen quod non mit-
eo tempore irritatione excernitur, foeminis inuitis, aut saltem non tendis,
consentientibus excerni.

Et secundo illud semen, iam non esse prolificum, imò venenum, & corporis excrementum inutile, & multorum malorum, imò sa-
pe certè mortis occasionem.

De Mola in utero. CAP. LVIII.

Mola, Authore Galeno, informis quædam caro est, aut si Descri-
mauis cum Aëtio, & Paulo, affectus quidam uteri ad pti-
scyrthi

Causa. scyrri naturam tendens nunc in yteri ostiolo, nunc in toto ipso ad tactum lapidosus apparens, à motus autem difficultate, & grauitate molæ nomen assumpsit. Fit hoc mali genus interdum post inflammationem præcedentem eueniens, interdum post locale vlcus, cui raro supercreuerit. Nascitur etiam à semine muliebri, & sanguine menstruo ad vterum utroque fluente, atque retento ibique caloris immodici vi tum coacto, tum in carnis formam transmutato. Signa ab Ætio sic ponuntur. Affectū tumor immitis consequitur cum hypochondriorum retractione, gracilitate, decoloratione, appetendique deiectione, ac primo conceptionis opinio suboritur: nam & menses supprimuntur, mammae intumescunt, stomachus euertitur, lumbi grauantur, venter attollitur: temporis verò progressu discernitur: molam enim dolor punctiōis sensum inferens, subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in vero conceptu percipitur, post toto corpore diminuto, & ventre ampliato certa hydropis imago deprehenditur, à qua tamen distinguitur: neque enim hic ut in hydrope magnus impulsu tumor recedit, aut excauatur, aut tympani sonum reddit, neque eiusdem manus concursu vlla fluctuatio percipitur: interdum tamen tempore præcedente iecur refrigeratur, & hydrops superuenit: animaduertere tamen oportet, hæc omnia signa, ne cum senē 135. annos nato Auenzoar, & doctissimo Matthæo de Gradi, decipiamur: ille uxorem vterum gerentem purgavit sexto mense: hic verò vxoris partum ad decimum tertium mensem expectauit: quæ post mola laborare inuenta, optimè ab eodem curata fuit.

Nota.

Historia.

Curatio. Curator vteri mola victu earum, quæ mensibus detentis laborant, de quibus cap. 56. diximus, post remediis euocantibus menses, de quibus eodem cap. Si ob flatum fiat mola (ut

Historia contingit cuidam fœminæ Iudææ Olysiponensi, quæ arbitratu se fœtum in vtero habere, ventum tantum peperit) curatur primo frequenti vacuatione per elephantaginas pilulas,

Pilula ratur primo frequenti vacuatione per elephantaginas pilulas, quæ in hac & omni ferme causa obtinet principatum. Eua-

elephan- cuato corpore flatus dissipandus est diacymino, diagalanga, dianthos cum decocto camomillæ, seminis fœniculi, ca-

Clyster pilli veneris, & artemisiæ. Clyster hic valenter dissipat flatum

potenter tum. ℞. camomillæ p. j. baccarum lauri, anethi, cymini, seminis fœniculi, & anisi an. ʒ. j. anthos, stichados calendulæ an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. x. cui adde diamusci dulcis, & diagalangæ an. ʒ. ʒ. misce, & fiat clyster. Si in vterum iniiciatur aliquid prædictæ mixturæ purgabit flatum vteri. Pessi ex rebus dictis cap. 56. sunt optimi huic quo-

Pessi. que morbo: ut ℞. pulue. seminis melanthij cardamomi ana.

3. j. pulueris euphorbij, & castorei an. 3. ss. succi mercurialis, & terebinthinæ, an. quod sufficit, misce, & fiant cum lana, vel gossypio duo pessi longi.

Scholium.

MOla auctore Gal.] Nomine mola non intelligimus cū Pau- Quid
lo tumore vteri, sed cū Gal. 14. de usu. par. cap. 7. carnem nomine
inutilem, atque informem. Quæ inutilis dicitur, quia nec est pars mola in
corporis, nec ex ea animal fit: informis verò, quia nec alicuius ani- telligen-
malis figurā seruat. Hæc mola ex Syluij sententiâ (in lib. de hem. na- dum.
tura, in Scholio illius sententiâ, quæ sic habet. Primum igitur necesse
est, &c.) Fit à sola fœmina, sine masculi semine, ea ratione, quæ oua
hypoemelia, hoc est subuentanea appellata, ex gallina sine galli coi-
tu. Errat tamen Syluius ut ex prædicto Galeni loco intelliges, in eo
enim probat bene posse in volucribus animalibus, solam fœminam
formam artificiosam induere, ob eorum caliditatem & siccitatem:
non autem in gressilibus, in quibus, ob humiditatem fœminæ corpus
omniñò est imbecillum. Mola morbus est in numero, est enim pars Mola
addita in corpore toto genere præter naturam ex 14. method. cap. quis
13. Quod videtur falsum, quia si mola est caro, erit ergo pars ad- morbus.
dita toto genere secundum naturam ea ratione quæ sextus digitus.
Respondeo, molam non esse veram carnem, aut si concedamus esse
carnem, Galenum eam appellare toto genere præter naturam, quia
non habet formationem, quam sextum digitum habere videmus.
Mola non fit sine coitu, ita tamen, ut viri semen sit modicum, &
morbosum, quod incipiat motum conceptui tribuere, & non perfi-
ciat. Ab hoc semine fit membrana chorion, quæ multis vasis adha-
ret utero, quibus mola viuens attrahit sanguinem, quo nutritur,
& augetur, ita ut vteri conceptus spem non adimat: proinde non re-
ctè Vega existimat, molam augeri non nutritione, sed appositione, &
agglutinatione. Solet tamen mola, ex venis multum attrahere (po- mola ma
tissimū in principio) & hac ratione iecore refrigerato sicut in copiosa gna at-
euacuatione) hydrops sequi. Ex hac etiam valida mola attractione tractio.
fit, ut in principio suæ generationis in mammis non coaceruetur lac,
quamvis deinceps copiosū generetur. Ex his colliges difficile esse co-
gnoscere, an mulier conceperit necne: videmus enim in mola genera-
tione, & suppressione menstruorum, s. qui generationē lactis. augmē-
tum māmillarum, tumorem in ventre, & flatum in eo motum. Ac
proinde non est mirum, si libro 4. epyd. uxor Antigenis ignoraret, an
pregnans esset: & similiter Himene soror, quæ ex suppressis mēsis
intenta habebat hypocondria. Altomarius & alij mola causam
materialem, semen & sanguinem efficientem modicum ca-

*Mola non à calore fit, ut vult Al-
toma-
rius, sed à tempe-
ramento
seminis.* *lorem statuunt. Errant tamen, quia calor est instrumentum mola,
qua à temperamento seminis, & sanguinis ea ratione, qua verus
conceptus generatur, aliter non viueret, quia qua à calore con-
crescunt, non viuunt. Curabitur mola, si auferatur, cum sit res
inutilis addita. Auferetur verò medicamentis, eisdem, quibus se-
cundas retentas expellimus.*

De partu laborioso, & secundis detentis.

CAP. LIX.

*Causas
& notas
pete à
Rhodio-
ne.* *Curatio
Ante
partum
Vitus.* *Balneil.* *Fotus.* *Qua fa-
cile par-
tum fa-
ciant.* *Impediē-
tia par-
tum.* *Iuxta
partum
vitus.* *Vnguen-
tum.* *Lapis a-
quila.* *Causa
laboriosi
partus.* *H* Vius rei copiosam, & necessariam doctrinam scriptam
reliquit Eucharis Rhodio suo lib. de hominis partu, in
quo cuiuslibet partus naturalis, & non naturalis formas depinxit,
nos tamen omissis causis, & signis breuitati studentes, & suo or-
dine curationem tantum indicabimus. Quando tempus parien-
di accedit, vterum gerens vtatur exercitatione moderata, nu-
triatūque alimentis facilibus concoctu, & mollientibus, quales
sunt vix passæ sine granis, caricæ, pruna, vix, butyrum, malua,
ius pingue. Balneum quoque ex decocto rerum mollientium est
optimum, & necessarium, & fetus partis inferioris vtero proxi-
mæ, cuiusmodi sunt malua, bismalua, semen lini, fœnugræcum,
vix passæ sine granis, caricæ, melilotum, & similia. Amet ea
quæ partū facile faciunt, cuiusmodi sunt lapis smaragdus, iaspis,
corallus, storax, radix cyclamini, & radix artemisiæ sinistrae
coxae alligata. Abstineat ab iis, quæ partum impediunt, vt est
aër frigidus comprimendo, & intense calidus vires matris, &
fœtus dissoluendo. Pyra à toto substantia impediunt partum,
etiam si non comedantur. Cum tempus pariendi appropinquat
prægnans ambulet pedetentium per loca decliua, & initio par-
tus bibat ius pinguis gallinæ cum facultate seminis lini, vel
fœnugræci, addendo parum croci, vel cinnamomi, & parum vi-
ni albi generosi, vel rubri mediocris substantiæ. Partes etiam
ventris inferioris, pudenda hoc vnguento bene calido vngantur
℥. olei sisamini, amygdalarum dulcium, & de semine lini an.
℥. j. vtriusque dialthææ, hyssopi humidæ an. ℥. ss. mucila-
ginis fœnugræci, & seminis lini an. ℥. ij. axungia gallinæ, &
anatis an. ℥. j. ss. croci puluerizati ℥. ss. ceræ. q. s. misce, & fiat
vnguentum. Comprimere anhelitum versus inferiora facilem
partum reddit. Lapis aquilæ suspensus de coxa parturientis va-
lenter trahit fœtum non solum viuum, sed mortuum, & secun-
das ipsas: oportet tamen post partum statim lapidem amouere à
coxa, ne attrahat ad se vterum. Difficilis partus fit vel ob defe-
ctum

Etum matris, vel vitium foetus, vel secundarum. Si vitio parientis, quia nimis crassa sit, vel animo pusillo, aut in experta dolo-rem, aut suapte natura imbecilla, aut habeat vterum exiguum ob ætatem, aut propter errorem in compositione, aut quia laborat vteri inflammatione, vel aliarum partium vtero proximarum. Si ob primam causam, ante partum est emacianda ciborum paucitate, & multo labore, multis vigiliis, & curis. Si sit timida, animus addendus est. Si doloribus non assuefacta, validissime spiritum comprimat, & locus vteri superiori vnguento, vel huic simili bene vngatur. Si imbecilla sit, optimo iure caponum, vel gallinarum, & aqua carniū, vino bono, & odoribus nutriatur. Si ob paruitatem vteri, superiori vnguento, vel oleo communi, vel iure pingui, & similibus mollientibus partes pudendæ vngantur sæpè, bene humectatæ, & *Curatio* mollitæ extendantur satis, & aperiantur in partu. Si ab inflam- *per cau-* matione, vel alio vteri morbo propriam pete curationem. Si *sarum* vitio foetus difficilis reddatur partus, quia magnus sit vterus, & *abscissio-* pudendum foru, balneo, vnguento vterum mollientium egent, *nem.* vt diximus, in exiguo vtero. Si ob figuram naturæ aduersam, *Figura* educatur ad naturalem figuram: est enim naturalis figura par- *natura-* tus, quando caput foetus à principio, deinde reliqua membra *lis par-* manibus super fœmoribus porrectis, & capite in neutram par- *tus.* tem declinante egrediuntur. Proxima huic figura est, quando pedes ambo priores apparent, & manus non suprà fœmora, sed in sublimē erectæ fuerint. Aliæ omnes figuræ præter has duas à natura abhorrent, quas omnes Eucharius Rhodio exactissime suo libro demonstravit. Quando igitur est figura naturæ contraria, à docta obstetrice habente manus, & digitos longos, & graciles, vel à pastore prudenti, & sene reducatur in primam figuram naturalem & omnium optimam, vel in secundam ei proximam, si figura non naturalis sit ei propinquior. Deinde *Admo-* expectabis partum naturalem, & verbis blandis bonam spem *nitio,* fœlicis partus, & masculi, quo omnes ferè mulieres gaudent, dabis: & si opus fuerit, vterum & vias omni arte aperies, partumque facilem reddes. Inter alia tamen excitanda est sternutatio patienti. Multa sunt præterea, quæ partum facilem reddunt præter superius dicta, quorum aliqua à multis experta, & laudata in præsentia adducam. Si ob foetus imbecillitatem fiat difficilis partus, corroborandus est per restaurationem matris, de qua superius dictum est, & præter illa pariens hoc pulvere cum optimo iure corroboranda est.

℞. cinnamomi electi, cassiæ lignæ, croci an. ʒ. j. ossium de *Pulvis.* corde cerui, & spicæ an. ʒ. ʒ. ambre & musci an. ḡ. x. sacchari *Fœtus* optimi

DE CVRAND. MORB.

*mortui
signa.
Expellē-
tia mor-
tuum
fœtum,*

*Lac hu-
manum,
Dicta-
mus.
Euphor-
bium.
Suffitus.*

*Vngula,
& ster-
cus asi-
ni, spo-
lium ser-
pentis.
Pessi.*

*Succus.
callitrici*

*Obste-
rix.*

*Ad se-
cundinā*

optimi ad pondus omnium, misce, & fiat pulvis. Dosis scrupu-
lus vnus. Si fœtus fuerit mortuus, quod cognosces frigidita-
te ventris inferioris, motu rei grauis ad motum matris, & fœ-
tore narium, & oris matris, hoc potu expelletur. ℥. pulueris
assæ fœtidæ, & castorei an. ʒ. j. aquæ sauinæ. ʒ. ij. syrupi ca-
pilli veneris ʒ. j. β. misce, & fiat potus. Hoc quoque medica-
mentum valenter educit fœtum viuum, & mortuum: in viuo
tamen educendo mitiora sunt necessaria. ℥. myrrhæ, castorei
storacis an. ʒ. j. β. cinnamomi, seminis, vel foliorum sauinæ
an. ʒ. j. mellis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis ʒ. iij. cum
vino albo, vel aqua quinque radicum diureticarum, vel alia
simili. Hoc medicamentum fœtum expellit clementius tamen
quàm duo superiora. ℥. assæ fœtidæ ʒ. β. rutæ sicca ʒ. iij.
myrrhæ ʒ. ij. misce. Dosis ʒ. j. β. cum generoso vino. Lac hu-
manum, si bibatur, expellit fœtum autore Arnaldo de Villano-
ua: est enim tutissimum auxilium, & clementissimum. Drach-
mæ duæ succi dictami, vel pulueris eius cum vino vel aqua ca-
lida expellit fœtum sine violentia. Drachma vna euphorbij a-
bortum inducit, & fœtum violenter extrahit. Suffitus huius me-
dicamenti frequens, & instrumento conueniente immissus e-
ducit fœtum viuum, & mortuum. ℥. timiamat, ameos, opopa-
naxis, galbani, sulphuris vini an. ʒ. iij. cum felle vaccæ fiant for-
mulæ cicerales, vel ad formam lupinorum. Suffitus vngulæ a-
sini, vel stercoreis eiusdem fœtum educit. Suffitus spolijs serpen-
tis similiter fœtum educit. Hi pessi molam vteri dissipant, &
expellunt valenter, & fœtum quoque. ℥. armoniaci, opopana-
cis, hellebori nigri, saxifragiæ, aristolochiæ longæ, & rotundæ,
pulpæ coloquintidæ an. ʒ. j. succi rutæ, cucumeris syluestris, &
fellis vaccini an. partes æquales, terebinthinæ parum misce, &
cum lana, vel gossypio fiant pessi longi. Pessus ex succo rutæ
& scammonio educit fœtum, sed minùs valenter quàm superio-
res. Succus gallitrici iniectus in vterum sanguinis profluium
illius prohibet, quod partum laboriosum præcipuè post acria
medicamenta, sequi sæpè solet. Si ob secundarum crassitiem
partus sit difficilis, quia non auelluntur, neque abrumpuntur,
obstetrix prudens digitis propriis, vel forcipibus eas scindat,
vt fœtus egredi possit. Si verò ob earum tenuitatem ante de-
bitum tempus rumpantur, & humor collectus in vtero fluat,
& tandem vulua, & viæ sicciore factæ partum difficilem effi-
ciant, oportebit pudendum, & partes iuxta vterum vnguen-
tis, fotibus, incessibus, & balneis iam dictis humectare, & vias
aperire.

Si à partu in vtero secundina detenta sit, summo studio
educenda

educenda est, non tamen subito & violenter, vt multi imperiti faciunt: enixa enim fatigata labore partus benignè tractanda est, ne simul anima, & secundina educantur, vel prius anima agatur, multis enim diebus viuunt enixæ non expulsis secundis, quas potest natura sensim, & multò tempore expellere. Quiescat ergo enixa, & mente confirmetur, & statim à partu bibat libram seminis olei communis, cum drachma vna croci puluerizati, post, vomitu, tussi, sternutatione, & anhelitus compressione excitetur expultrix facultas ad expellendam secundinam. Si tamen his non educatur, enixa nutriatur iure optimo caponum, vel gallinarum, aqua carnis, ouis recentibus, vino optimo, & aubus montanis. Vteri locus infessibus, vnctionibus, & fotibus rerum mollientium est parandus, vt dictum est superius in partu difficili. Post quæ fœtum mortuum expellunt, conferunt, qualia sunt superius dicta, & præter illa, infessus ex decocto foliorum, & granorum, aliorum foliorum vñem (est herba similis vermiculati sapore salso, ex qua fit sal) camomillæ, & foliorum ebuli educit secundinam. Pessus, & vnguentum ex leporis coagulo, & croco pudendo admotum secundinam educit. Suffitus spoliij serpentis, idem præstat, & cataplasma ex eodem spolio serpentis cum ruta, artemisia, & absinthio coxæ admotum, & vuluæ secundinam educit. Suffitus vngulæ asinæ, & capræ, stercoreis bubulli, columbini, seminis porri, allij corticis, minoris pini, hellebori, aristolochiæ longæ, nigellæ, & similium educit valenter secundinam. Infessus, vel suffitus, seu euaporatio ex decocto rutæ, prassij, abrotani cum oleo de lilio extrahit secundinam. Pessi, & clysteres ex allio: aspalto, assa fœtida, balsamò, stercore accipitris, galbano, gentiana, serapino, scammonio, vite alba ireos, & succo dictami: omnibus simul vel aliquo ex his secundinam educunt. Vnciæ duæ succi ex aliquo horum medicamentorum valenter educunt secundinam dictam scilicet, artemisiæ, pollicitrichi, petroselini, prassij, mercurialis, verbenæ, porri, rutæ, pulegij, hypericonis, & similium. Drachma vna pulueris huius cum vino optimo, vel aqua diuretica valenter educit secundinam. ℞. myrrhæ, castorei, seminis dauci, dictami, seminis porri, pulueris lumbricorum terrestrium an. 3. ij. misce, & fiat puluis, qui obtinet principatum in hoc morbo. Balsamum sumptum secundinam expellit, & efficit fœminam sterilem, vt quorundam fert opinio.

*Oleum.**Vomitus, tussis, sternutatio.**Anhelitus detentio.**Infessus.**Pessus.**Vnguentum.**Spolium serpentis.**Suffitus.**Infessus.**Suffitus.**Suffitus.**Suffitus.**Pessi.**Clyster.**Res.**Puluis.**Potentissimus.**Simus.**Balsamum.**Mortuum.*

Scholium.

H Vius rei copiosam.] Ex Gal. 3. de nat. fac. cap. nouem mensibus plerisque mulieribus perficitur in utero foetus. Vbi nomine perfectionis foetus, non generationem, sed eius augmentum intelligit, quod est finis retentionis uteri. Foetus absolutus, cum iam per os nutriri possit 15. de usurp. c. 7. moleque sua molestus sit utero, manibus & pedibus motu membranam primò internam (qua ei contigua est) rumpit, & deinde alias: quo tempore postulante usu, os uteri dilatatur, à vinculisque absolutus, foras procedit suo pòdere, & nixu, expulsus etiam ab utero, & matre adiuuante contrahendo musculos abdominis. Vnde ad optimū & facilem partū hac omnia concurrant opus est. Primò orificium uteri expeditū. Secundò motus foetus, quo rumpāt mēbranas: figura eius accōmodata, ita ut prius caput, & deinde totū corpus, manibus ad latera adherentibus egrediatur, aut prius pedes, manibus sursum eleuatis: numerus etiā foetus si unus egrediatur: & ultimò magnitudo mediocris, ut possit per os uteri egredi. Tertiò necessum est ut membrana foetum obuoluentes, nec sint nimis dura, nec molles. Quartò uteri robur. Vltimò robur matris ad tolerandos dolores, & comprimendum abdominis musculos. Hinc partus difficilis varias causas colliges. Prima in utero ore consistit, quando angustum est, distortum, tumore affectum, aut aliquā contraxit duritiem. Secūda, in foetus praua figura, qualis est omnis alia à supradictis: in amisso, aut languido eius motu, cum mortuus est aut imbecillus: in magnitudine modū excedente: & in numero cum multi foetus in utero continentur: viuit enim adhuc hoc anno qua est 1579. mulier Salustra nomine, obesa, & statura humilis, qua nouem uno partu enixa est quod nonnullis semel, sed bis ei euenisse certissimè scio. Tertia causa est, membranarum durities, qua difficulter rumpuntur, aut mollities ob quam eis ante tempus ruptis egressaque urina tempore partus via non lubrica, simulque deficit utero humor ipsum ad expulsionem etiam irritans. Quarta imbecillitas expultricis uteri, qua ab intemperie oriri solet. Vltima verò causa in foemina pariente consistit, cum languida est, aut malè tolerat labores.

Quomo- do fiat partus. Si à partu in utero secundina detenta sit.] Tribus membranarum tenuibus obuoluitur foetus, dum est in utero.

Partus facilis causa. Prima qua eius adheret cuti Annion appellatur, à molliie. Hac veluti sudorē foetus excipit, in quo veluti innatans vehitur, ita ut minus grauis utero sit. Altera subsequitur tenuissima, quā allātoi- dem nuncupant, à similitudine farciminis quod allas dicitur. Hac ad vesicam est peruia, & ideò facta ut urinā pueri coaceruet. Tertia & externa tenuis, sed foris reliquas duas & forum ambit.

Difficilis partus varia causa.

Historia mira.

Amnios mēbrana.

Allātoi- des mēbrana.

Chorion mēbrana.

Hanc

Hanc Græci chorion (quod est radicatio) appellāt, quia in ipsā innumera vena radican- tur: Latini secundā, aut secundas quia videntur esse secundū domicilium fœtus ab utero. Hæc fulcrum est venarum & arteriarum, quæ tandem in venam umbilici degenerant, & respondent venis, & arteriis uteri, ita ut ora oris adhæreant, quibus fœtus utero alligatur. In huius membrana historia, Vesalius duplici nomine reprehendit Gal. Primò quòd putarit Galenus hanc membranam ex semine fieri, cum fiat potiùs ex sanguine, & eius substantia non sit membrano- sa, sed carnosā, carni lienis simillima. Secundo, quòd dixerit hanc membranam totum fœtum obuoluerè, cum tantum à mucronata cartilagine, usque ad os pubis fœtus obducatur. Malè tamen reprehenditur Galenus à Vesalio, quia Vesalius chorion membrana ex semine ortum habet, & totum obuoluit fœtū. reprehēdit Gal. Deceptus autem fuit Vesalius, existimans membranam hanc non esse rem distinctam à substantia carnosā ei adharente, quam distinctam esse ex primo de semine, & 4. de usu pa. colliges. Hæc est mēditur brana quæ fœtu uterum iam egresso, aliquando interiùs remanet. Gal. quam oportet extrahere ea ratione, quæ docet autor.

De ramice, seu hernia

CAP. LX.

Descri-
ptio.

QUum peritonæum (quam Arabes membranam sifach nominant) qua parte vasis seminariis peruium est, aut laxatur, aut etiam rumpitur, ita ut aliquid vel in inguinā, vel in scrotum descendat, ægritudo fit, quæ Græcis cele, Latinis tum ramex, tum hernia dicitur, barbaris ruptura. Porro cum variè hæc affectio contingat: plures enim eius numerantur differentiæ varia. pro corporum, & substantiarum ad scrotum, aut ad inguina deuolutarum natura, iis omnibus nomina imponuntur: nam si intestinum descendit, enterocèle, hoc est intestini ramex: si omentum, epiplocele. i. omenti ramex: si aqua, hydrocele, hoc est aquosus ramex: si melancholicus sanguis in vasorū anfractibus colligitur, circocele, id est, varicosus ramex: si spiritus, pneumatocèle, hoc est flatusosus ramex, denique si caro dura intra testium tunicas increscit, sarcocèle, hoc est, ramex carnosus dicitur.

Causa.

Fit hoc morbi genus multis de causis: nam quod in inguinā, aut in scrotum, tum intestina, tum etiam omentum descendant, perinde ac in enterocèle, & bubonocèle contingit, occasionem præbere solēt multa: cuiusmodi sūt ictus, saltus, clamor, immēsa alicuius molis sublatio, & quicquid huiusmodi corpori, aut extrinsecus, aut intrinsecus potest accidere: ab his enim causis facile peritonæum aut extēditur, aut laceratur. Cōmunes autem notæ vtriq; intestinorū inquā, & inguinis ramici hæc sūt. Tumor in inguine, vel scroto cōspicius cernitur, & in exercitationibus, itine-

Nota.

DE CVRAND. MORB.

re spiritus retentione, & aliis occasionibus maior quam ante apparens, qui sic comprimatur, tardè quidem recurrit, celeriter autem rursus deuoluitur. Cæterum quò diiudices, num propter peritonæi extensionem ramex sit factus, an propter eiusdem ruptionem, animaduertere oportebit, quoties ob extensionem peritonæi ramex obortus sit, intestinum non vniuersim, sed particulatim temporis spatio, & ob causas quilibet deuolui, tumoremque æquabilem, ac profundum apparere intestino, quod deuolutum est, peritonæo costricto: secus fit, quum vniuersim deuoluitur, idque ob causas violentas duntaxat. Tumor præterea immensæ magnitudinis, inæqualisque in cute protinus eminet, quod scilicet intestina extra peritonæum elabuntur. Aquosi ramicis causæ simul ac notæ, & differentiæ apud Aëtium libr. 14. & 22. hunc in modum leguntur. Hernia aquosa quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta causa contingit, ex occulta quidem quum aquosus humor circa partes corporis, quæ scrotum continent, ac implicant sanguini admixtus collectus fuerit. Ex manifesta verò, quum ex plaga collisis, aut fractis vasis sanguis affluens ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte constiterit aquosus humor collectus, subflauus, aut sup pallidus inuenitur. Vbi verò ex plaga, cruentam, ac faeculentam materiam reperiens. Humor autem vel intra rubicundam testiculi pelliculam consistit, vel extra ipsam inter eam & pelliculas adiacentes, vel in propria pellicula velut vesica quædam continetur, atque hoc genus herniam in tunica superagnatam vocamus. Aliquando verò duplex hernia oboritur, cum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit: siquidem igitur in pellicula rubicunda humor collectus fuerit, tumor vnus coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio ad contactum cedens: postea verò aucta collectione testiculus humore vndique circumdatus occultatur: at tumor in ambitu extensus ac renitens ad tactum herniæ carnosæ suspicionem imperitis exhibet, possunt tamen tactu discerni: nam hernia carnosæ omnino renititur, sed aquosa digitis cedit. Si verò in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus, siue paruus fuerit omnino circumscribetur: at si simul quoque in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumoresprehenduntur, alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula.

Quòd si extra rubicundam pelliculam collectio fiat, testiculus tactui occurrit. Cæterum ab hernia aquosa differt
her

hernia intestinorum, quoniam in aquosa tumor eiusdem penitus magnitudinis semper, & quolibet corporis situ persistit: neque enim humores velut intestina transferuntur. Inguen prætereà in hernia aquosa secundum naturam se habet, qua nota vel maximè aquosa ab omenti hernia distinguitur: nam in hernia omenti semper in scroto omentum persistit: neque unquam transfertur, id quod etiam in aquosa contingit. Verùm in omenti hernia inguen rarefactum deprehenditur. Atque hæc de ramice sunt satis: nam quæ de aliis speciebus dici poterant, cum vel ex iis, quæ supradicta sunt patere possint, superuacaneum esset hîc scribere: qui pleniorē tamen disputationem desiderant, adeant Aëtij librum 14. & Galeni medendi methodum.

Flatuosa hernia curatur primò, victu calfaciente ægri, & *Curatio* nutritis si fuerit infans: secundò dissipantibus flatum internis, *flatuosa* & externis, qualia sunt rosata nouella, armoniacum, rosarum, diacyminum, diagalanga, dianthos, electuarium de baccis lauri. Infans qui non potest omnia medicamenta necessaria sumere, cum lacteumat semen fœniculi, vel anisum māsū, vel parum aquæ nasæ, & parti affectæ admoueatut carica assata cum puluere cymini, vel carui, vel arancium assarum cum eodem puluere, vel mel parum decoctum cum stercore bubulo. Si æger fuerit puer, iuuenis, vel senex valentioribus eget, de quibus capite 31. de curatione imbecillitatis ventriculi.

Aquosa hernia curatur, primò victu calido & exiccante, de *Aquosa.* quo diximus cap. 44. de curatione hydropis.

Secundò, apparantibus humorem aquosum, vt rhodomelle, oxymelle simp. syrupo de duabus radicibus, & aliis dictis cap. 1. & multis aliis locis.

Tertiò, phlegmagogis: vt agarico puluere hieræ simp. turbit, diaphænicon, & aliis, de quibus eodem 1. capit. sed frequenter oportet purgare pilulis elephanginis. & de hiera simp. & agarico trochiscato: quia euacuant sine molestia.

Quartò, dissipantibus flatum medicamentis internis & externis dictis capit. 44. de curatione ascitæ. Vltimò verò omnis aqua euacuanda est filo transfixo in seroto, qua emissæ vlcera exiccantibus, & glutinantibus sunt curanda, adhibendo tamen medicamenta partibus primò affectis, vt hepati, lieni, & aliis.

Carnosa hernia, si antiqua non fuerit & minùs dura, curatur rebus emollientibus, & dissipantibus carnem, vt hoc *Carnosa* præcedenti tamen debita victus ratione & corporis purga-

DE CVRAND. MORB.

tione: ℥. igitur oleorum camomillæ, anethi, sesamini, & amygdalarum dulcium, an. ʒ. j. mucilaginis seminis lini, & fœnugræci, an. ʒ. ʒ. pulueris rosatæ nouellæ, camomillæ, & croci an. ʒ. j. ʒ. emplastri de meliloto, quod sufficit misce, & fiat vnguentum. Vtrumque diachylon cum armoniaco hanc herniam longo

Varicosa tamen tempore dissoluit.

Varicosa hernia non sine magna difficuliate curatur. Primò, victu dicto cap. 9. de melancholia. Secundò, apparantibus atrū humorem conuenientibus medicamentis, de quibus eodem c. 9. Tertiò, vacuantibus, vt confectione diasenæ, confectione medicaminis hamec, sero caprino, epithymo, pilulis de fumo terræ, Indis, & de lapide lazuli. Quartò, mollificantibus, & dissipantibus, vt medicamentis dictis superius in curatione carnosæ herniæ.

Vltimò verò varices eximantur more cancerorum ferro candenti, quamuis hoc opus non ab omnibus ferri possit. Alij omnes modi, & differentiæ earum, quæ ex laxato dydimò, aut rupto peritonæo, siue omentum decidat, siue intestinum in Infantibus, & pueris, sunt faciliores curatu, præsertim si recentes fuerint: antiquæ enim sine opere manuum non possunt curari.

*Aliarū
specierū
curatio
difficilis.*

*Intestini-
nalis.*

Hernia, quæ curatur primò victu adstringente, & glutinoso, de quo cap. 28. de curatione sputi sanguinis, & somno, & quiete, fugaque cibi flatuosi, vehementis, saltus, & clamoris. Postea si intestinum fuerit extra peritonæum ægro resupinato, sublatis cruribus sensim reducatur intestinum ad locum proprium, nisi stercus, vel flatus hoc impediat, quo tempore flatus est dissipandus iam dictis, & stercus mollius factum fortibus, vnguentis, suppositoriis, & balneis ex butyro, mucilagine fœnugræci, seminis lini oleo sisamino, & amygdalarum dulcium est euacuandum: intestino tamen in scrotum lapso, vel extra peritonæum iniectio clysteris est suspecta, & maximè timenda: quum multi nostris temporibus sine voce subito perierint, excepto clystere post motum intestinum à proprio loco, ad quem reduci non potest plenum postea substantia clysteris.

*Clyster
periculo-
sus habē-
ribus in-
testinum
extra.*

Intestino ad locum suum reducto à chirurgo docto, & prudenti, conserua ipsum idoneis instrumentis, & ligaturis. Scissuram quoque astringe, id tamen fiet à viris in hoc in lapidibus à vesica extrahendis exercitatis, & probatis. Et incisioni impone medicamenta glutinantia, & constringentia, vt emplastrum contra rupturam in omni regione satis cognitum, & ab omnibus pharmacopolis confectum. Hoc quoque est

est optimum: ℥. picis naualis. ʒ. j. lithargyrij, ceræ albæ, & ci- *Empla-*
 trinae colophoniae, armoniaci, galbani an. ʒ. v. ʒ. visci quær- *strū op-*
 cini, thuris, myrrhae, gypsi an. ʒ. ij. & ʒ. iij. boli armenici, nucis *timum.*
 cupressi an. ʒ. j. & ʒ. iij, aloës caballini, consolidæ maioris, &
 minoris, mastichis an. ʒ. v. ʒ. aristologiæ longæ, & rotundæ
 an. ʒ. j. & ʒ. ij. & ʒ. ij. gallarum ʒ. ij. & ʒ. ij. terebinthinæ lo-
 tæ forti aceto ʒ. ij. & ʒ. iij. acaciæ, sanguinis draconis, mu-
 miæ an. ʒ. ʒ. his omnibus puluerizatis accipe ilia pellis arie-
 tinæ sine pilis diuisa in partes paruas, decoquantur in aqua
 donec liquefiant: quibus adde glutinis ligni fabrorum & scri-
 ptorum, & piscium ana. ʒ. j. His omnibus liquefactis adde pul-
 ueres, & fac secundum artem emplastrum in magdalconi-
 bus, cuius quantitas, quæ satis sit, extensa super alutam ad
 magnitudinem rupturæ semper ei adhæreat. Lactens quoque *Infans*
 his externis facillimè curabitur, præsertim si nutrix debita *facilli-*
 ratione victus vtatur. Puer vel iuuenis præter iam dicta si per *mè cura-*
 xx. dies, vel xxx. resupinus quiescat, & quolibet die manè *tur.*
 accipiat ʒ. j. pulueris consolidæ maioris, vel minoris cum iu- *Cōsolida-*
 re pedum arietis, vel alio liquore astringente, vel paucō vino *utraque.*
 rubro astringente, vt est Saguntinum, mihi crede, curabitur *Dacty-*
 hernia, maximè si non fuerit antiqua. Eandem habet vim pul- *lus pal-*
 uis seminis, vel dactylorum palmæ syluestris, si multis diebus, *ma syl-*
 & in eodem pondere sumatur. Dimidia drachma pulueris radi- *uestris.*
 cis. Valerianæ cum paucō vino rubro decem, vel quindecim *Valeria-*
 diebus sumpta curat herniam, vt fide doctissimorum virorum *na.*
 habeo compertum. Vnciæ duæ succi scabiosæ sumptæ manè
 quolibet die curant herniam. Hoc medicamentum paucis die- *Succus*
 bus curat herniam: ℥. mastichis, olibani, colophoniae, boli ar- *scabiosa*
 menici, sanguinis draconis an. ʒ. j. pilorum leporis incisorum *medica-*
 in partes minimas ʒ. iij. mellis, & farinae orobiam. q. s. misce, *mentum*
 & fiat mixtura. Dosis ʒ. iij. vel iij. Puluis radicis pentaphyllonis *probatū.*
 curat herniam. Guido de Cauliaco doctissimus medicus & chi- *Radix*
 rurgus aliorum, & sua ipsius experientia curauit herniam scru- *penta-*
 pulo vno limaturæ chalybis sumpto singulis diebus manè per *phyllo-*
 30. dies, cum paucō vino rubro, & aqua decoctionis hepati- *nis.*
 cæ, dummodò per aliquot dies ante & ponè emplastrum ex *Chalybs*
 magnete, & apostolicone, & contra rupturam parti affectæ ad- *Empla-*
 hærens portet, permutatione eius facta tertio quoque die. Hoc *strum*
 emplastrum est optimum, quamuis sit paucorum simplicium, *bonum*
 quod per mensem curauit herniam: ℥. aloës, thuris, mastichis, *paucorū*
 dragaganti, gummi Arabici, sanguinis draconis, boli armenici, *simpli-*
 mumia an. partes æquales cum albuminibus ouorum, fiat em- *cium.*
 plastrum.

DE CVRAND. MORB.

**Opus per
instru-
menta.**

Quando supradictis auxiliis hernia non curatur, oportet ad opus chirurgicum aggredi. Aliqui partem, per quam descendit intestinum, contrahunt ferro candentia, & caustica potentia admovent: ab aliis acu perforatur, & meatus astringitur, ne intestinum vel omentum descendat. Sed quia admodum difficile est laxationem, vel peritonei incisionem antiquam curare sine testis extractione, ab erudito, & in hoc exercitato diu viro testis, vel testes cum dyndimo abscindantur, & extrahantur, cuius modum & formam Paulus libro 6. cap. 62. & Albubumalis scripserunt.

Scholium.

**Varia
hernia-
rum spe-
cies con-
numerā-
tur.**

QUum peritonæum.] Ramicis differentia quadam à loco, & quadam à materia tumorem efficiente desumuntur. A loco cum humor est in inguine, qui dicitur bubunocoele, aut scrotio, & appellatur ocheocoele. A materia, si sit aqua, dicitur hydrocele. Qui suae contentione carnosam herniam representat, quod ex testis pelluciditate (qua in aquosa apparet) in loco obscuro accensa cerea candela distingues. Si sit flatus, appellatur pneumatocoele, in quo ramice ei si testis lumine appposito sit perlucidus, est tamen testis leuior, quam in supradicto. Si sit caro, sarcocoele nominatur, qui tumor est durus, & longus formam habens testiculi, & qui longo tempore sensim increuit. Fit à carne duriori, in aliqua scroti parte nata, aut ut voluit Gal. ab scirrho, per scirrhum non eum, qui ab humore, sed carnem duram intelligens. Si sit varix, cirsocele nominatur, qui ramex à tumore venarum nutrientium testiculum fit. Quem cognoscimus ex inaequalitate, quā tactu sentiunt in multis exiguis extuberantiis apparentibus. Si intestinum enterocoele dicitur. Vbi per intestinum non intelligimus rectum, quod cum relaxatur, in anum delabitur, neque colon, quia hoc tenibus adheret, neque ieiunum aut duodenum, quia hac sublimiora sunt, sed ileon, ut recte docuit Paulus. Hic ramex cognoscetur ex tumore molli repente nato, augetur clamore, & multo cibo, & in eo tactu saepe deprehenduntur indurata excrementa. Si tandem ramex fiat ab omento tanquam ex materia, appellatur epiplocele. Quem cognosces ex tumore paruo eodem modo semper apparente tactuque molliusculam senties substantiam. Hunc ramicem non admittit Vallesius 2. epy. sec. 1. comm. 19. deceptus à Vessallio, qui omentum usque ad pubem non posse descendere scribit. Iacotius duas hernias, quae vera non sunt, sed apparentes tantum describit. Quarum una est, cum translatus est testis ad inguen: Altera cum ex vehementi imaginatione in libidinosus colligitur semen inter tunicas testiculi. Difficile tamen videtur, imò

**Entero-
cele ab
ileo solo
fit.**

modò est impossibile, testem posse in regione inguinis sibi cauitatem parare: sicut & alterum quod de semine scribit, cum nulla pateat semini via, per quam intra membranas possit colligi. In ramice intestinali, & omentali, morbus est in situ. In aliis morbus est intemperies cum affluxu humoris, hoc est tumor præter naturam. Reliqua ex auctore pete.

De Arthritide. CAP. LXL

Arthritis tunc fit, cum in vniuersum omnes corporis articuli propter alienum à natura humorem confluentem dolor occupat. Latini hunc morbum articulare appellat, Barbari arthreticam passionem: verum animaduertere oportet arthritidem, podagram, & ischiadem affectiones esse genere easdem loco tantum differre, cum alioqui vna sit communis omnium origo: est enim arthritis, cum in omnibus articulis dolor insidet, podagra cum in pedibus tantum, quemadmodum chiragra cum manus obsederit dolor. Ischias autem cum eam iuncturam, quam Græci ischiam, Latini coxam nominant. Quare non ab re fuerit, nobis præsertim, qui breuitati studemus, harum omnium affectionum curationem hoc cap. comprehendere: tametsi de arthritide caput tantum inscribatur. Fit autem arthritis multis de causis, quarum quædam internæ sunt, quædam externæ. Externæ sunt casus, percussio, corporis immodica exercitatio, vt lucta, cursus, aliæque id genus, præsertim si statim à cibo fiant, articulorum prætereà luxationes, & quicquid extra incidens articulos ita potest debilitare, vt ad recipiendos deriuatos aliunde humores idonei sint: inter quæ veneris immoderatus vsus, & solitæ exercitationis intermissio numerantur. Mœrores prætereà, curæ & vigiliæ, cæteræque animi perturbationes ex eorum genere sunt, quæ arthritidem, podagram, & cæteras articulares affectiones possunt efficere, non modò quod corpus imbecillius reddant, sed quòd noxios quoque humores procreent. Inter alia quoque, quæ maximè hanc affectionem inducunt, sunt assiduæ cruditates, crapulæ, & eorum alimentorum vsus, quæ & difficilia coctu sunt, & pituitosos insuper humores generant. Docet hoc Galen. com. 28. lib. 6. aphor. dicens, ætate quidem Hippo. pauci podagra laborant propter vitæ moderantiam, nostris verò temporibus vsque adeò auctis eduliis, vt nihil addi posse videatur, infinita est podagrarum copia, cum nonnulli sint, qui non exercentur, & cruditatibus atque ebrietate obruuntur, & ante cibum assumptum bibunt

Descriptio.

Species.

Causa.

Quare tempore Hippocratis pauci laborabant arthritide.

DE CVRAND. MORB.

bunt vina generosa, ac venere vtuntur immoderata : nonnulli verò etsi non in his omnibus, in aliquibus saltem eorum, quæ dicta sunt, delinquant, sed cum peccatum fuerit magnum, sæpius in vno eorum, quæ diximus deliquisse satis erit. Ob hanc igitur causam etiam eunuchi podagra corripuntur, quamuis non vtantur venere, talis enim est eorum desidia, insatiabilitas ebrietásque, vt etiam sine venereorum vsu podagra possint corripi. Confirmans hanc sententiam Gal. comm. 30. eiusdem libri, eunuchos, inquit, itaque videmus quosdam podagra laborantes, pueros verò non vidimus : quia illis Venus non nocet, nec vitæ immoderantia in cibis ob caloris copiam : sed ego vidi, quod Hippoc. & Galen. non viderunt, nobilem videlicet puerum septem, aut octo annos natum Vallesium laborantem non tantum podagra, sed arthritide vere & autumno, cui non fuit hæreditarius morbus articularis, & satis ille biliosus erat. Vsus etiam vreticorum præsertim à cibo multo, difficili concoctu hanc generat affectionem. Compertum quoque est vini meracioris præsertim vetusti, assiduum vsum huius affectionis causam quam maximam esse : ac proinde medicorum omnium decreto huic malo obnoxius vini vsus, quamprimùm interdictur. Sed neque silendum erit, quòd sæpè à parentibus hoc vitium in posteros dimanarit, vnde hæreditarij morbi esse consueverunt arthritidis, & podagra, quod nec diffitetur Galen. 6. apho. comm. iam dicto 28. multos dicens laborare podagra, quòd auos & patres podagricos habuerint. Porro internæ causæ sunt hæ sunt humorum multitudo, aliquando sanguineorum, biliosorum nonnunquam, atque melancholicorum : frequentius tamen crudorum, atque pituitosorum : quia articulorum cavitates replentes tumores & dolores, quales in inflammationibus reperiuntur, excitant : quam rem plurimùm iuuat tum articulorum ad recipiendum propter imbecillitatem aptitudo, tum cæterorum membrorum ad expellendum fortitudo, quò fit, vt qui in vniuersum causas colligere vellet, in tria genera partiretur, humorum, inquam, copiam, articulorum imbecillitatem, & cæterorum membrorum robur : hoc tamè admonere vellem priusquam ad signorum enarrationem, & curationem deueniatur, Bilis vis. frigidos, crassos, & pituitosos humores ad ipsos articulos facile deferri non posse, & neruorum compactæ substantiæ insinuari, ni ab aliquo humore, cuiusmodi est bilis, deducantur. cuius beneficio fit, vt tametsi crassi consistentia sint, angustissimos tamen meatus permeent, tenuissimo scilicet humore

viam

viam aperiente. Vnde veræ curandi methodi præceptum est medicamentis, quæ ad hos humores vacuandos propinantur, aliquid misceri debere, quod bilem educat. Signis, quibus morbus cognoscitur, non est opus, cum vel dolor ipse articulis innitens morbi speciem statim exprimat. Causæ verò, humores scilicet abundantes, quicunque sint, siue biliosi, sanguinei, melancholici, aut pituitosi: nam procatacticæ causæ ex ægrotantis sermonibus sunt petendæ, & per traditas superiùs methodos, maxime cap. de cephalalgia dignoscenrur. Cum Paulo verò *Ægine-
ta.* neta hunc in modum inuestigabis, habet autem verba eius hic subscribere. Variæ itaque sunt affectionis huius, ceu dictum est causæ: humorum tamen negotium facientium differentia hæud difficulter locis quibus impacti sunt perspicuæ redduntur, tum coloribus, tum cæteris accidentibus prodita. Biliosus namque fluxus colore sublurido, & rufo deprehenditur. Idem caloris insuper sensum ingerit, cruciatumque acerbiorum efficit, & protinus ad supremam cutem circa amplum tumorem erumpit, calidarum rerum impositu magis exacerbatur, quemadmodum è diuerso dolorificis placatur: quod quidem cæteris ferè omnibus magna ex parte, peculiariter verò aliis biliosis euenit. Febris item sæpenuerò in accessionum summis vigoribus accedit, valdeque sitibundi redduntur. Consimili modo, & in melancholicis attrioris coloris corpus deprehendas, sicut in pituitosis album, & aquosum corpus cernitur, vnde minus cruciatur, & seriùs tument particulæ: perinde atque si sanguineus humor in corpore abundat, cruentum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem iudicationem iuuabit te superior victus ratio, &c.

Dolor iuncturarum à causa calida cum humore curatur sex re- *Curatio
calida.* mediorum generibus. Primò, victu tenui, & refrigerante, & calidorum abstinencia, præsertim vini & veneris: hæc enim in causa etiam frigida nocent.

Secundò, phlebotomia partis appositæ: vt in arthritide dextræ manus, venam cubiti sinistri secamus, & in podagra dextri pedis venam cubiti dextri incidimus: quamuis aliqui cum Galeno venam poplitis dextri secandam esse volunt. In dolore tamen iuncturæ dextræ coxæ (à Græcis dicitur ischias) vena poplitis dextri est secanda, vt Galen. ostendit in libello de curandi ratione per sanguinis missionem, & in plerisque aliis locis. Multi initio, & corpore pleno existente venam cubiti eiusdem partis secant, quod Galenus visus est docere 10. de compositione medicamentorum secundo loco.

Tertiò

DE CVRAND. MORB.

*Quando
vacuan-
dus est
humor
absque
concoctio-
ne in hoc
sympto-
mate.*

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem frigidis, & astringentibus, vt syrupis rosarum, granatorum, myrtillorum, cydoniorum cum dupla aqua portulacæ, plantaginis, acetosæ, & solatri per tres, aut quatuor dies: in dolore tamen magno absque syrupis, & concoctione euacuanda est bilis: quamuis non sit turgida propriè: nam quemadmodum in vehementissimo dolore narcotica sunt necessaria, quæ dolorem non auferendo causam curant, ita coactè vacuandus est humor dolorem pariens vehementem sine concoctione, quia maius est auxilium nocumento.

*Anody-
na.*

Quartò vacuantibus bilem, vt pilulis hermodactylorum minorum à drachma vna ad scrupulos quatuor, vel drachmis quatuor electuarij de succo rosarum, aut diaprunis solutiu.

*Admo-
nitio.*

Quintò, anodynis, à quibus incipiendum aliquando est & repellentibus, vt cassia fistulari dissoluta in oleo rosato, farina hordei, mucilagine psyllij, vel cydoniorum extracta aqua rosarum, & paulo aceto ad penetrandum magis, vel succo, aut aqua solani, plantaginis, vel portulacæ. Prodest quoque panis medulla, lacte macerata, & parum cocta addendo vitellos duos onorum, & oleum rosatum, cum quo vermes terreni sint cocti, frigidum applicetur. Hæc omnia dum calefcunt, sunt mutanda, & sæpè. Si dolor est intolerabilis, prædictis addes opij drachmam vnam, croci ad penetrationem parum. Hoc cataplasma est optimum in doloribus iuncturarum intolerabilibus à causa calida: ℞. farinæ hordei sine fure, & medullæ panis. an. p. ij. foliorum iusquiami, maluarum, & violarum an. m. j. florum camomillæ & corticis papaueris albi. an. p. j. Ex his decoctis fiat cataplasma addendo oleorum lumbricorum, & papaueris an. ʒ. j. opij, & croci an. ʒ. ʒ.

*Cata-
plasma
ad ma-
gnum
dolorem.
Dissipa-
tia deco-
ctum.*

Sextò, dissipantibus id, quod fluxum est, & vt oleo camomillæ, de lilio, anethi, decocto camomillæ, radicis althææ, fœnugræci, & meliloti, vino austero facto, vel aqua marina, stercore vaccino, vel hoc, aut simili vnguento. ℞. olei camomillæ ʒ. ij. olei de lilio & de semine lini an. ʒ. j. mucilaginis fœnugræci, & seminis althææ an. ʒ. ij. pul. rosatæ nouellæ, & stercoreis bubuli an. ʒ. j. ʒ. ceræ. q. s. misce, & fiat vnguentum. Arthritis à causa frigida pituitosa curatur, primò victu parum calido cum astrictione, quare vinum in ea nocet, quia crudos humores ad iuncturas trahit, in quibus, vt & in nervis facile in acetum conuertitur. Bibat ergo laborans ex hoc dolore aquam cinnamomi, vel decoctum seminis fœniculi, vel

*Vnguen-
tum.*

*Frigida.
Vinum.*

vel anisi. Quòd si vinum valenter appetat, sit rubrum, & astringens, vt Saguntinum, & aqua multa dilutum.

Secundò, apparantibus pituitam vt rhodomelle cum aquis, aut decocto fœniculi, melissæ, & similium, dummodò valentia diuretica non sumantur, præcipuè ante purgationem, quia humores ad iuncturas ducerentur, & ideo calculo renum, aut vesicæ affecti ex vsu longo diureticorum in arthritidem incidunt.

Tertiò, vacuantibus pituitam à iuncturis, vt drachma vna pilularum hermodactylorum maiorum ad scrupulos quatuor, vel drachmis quinque diacarthami ad drachmas sex. In hac causa, quia est diurnus dolor, bis, vel ter in mense fiat vacuatio per has pilulas. ℞. pilularum arthetricarum maiorum, & agarici trochiscati an. ʒ. j. turbit electi ʒ. ij. diagridij optimi ʒ. j. cum aqua vixæ arthetricæ, fiant pilulæ triginta. Pro dosi tres. Vel si non potest transglutire pilulas, hæc mixtura fiet. ℞. diacatholiconis ʒ. j. ʒ. diacarthami ʒ. j. agarici trochiscati, & turbit electi an. ʒ. ij. conseruæ buglossæ ʒ. iij. pulueris rosatæ nouellæ ʒ. j. ʒ. rhodomellis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis, cochlearium vnum qualibet hebdomada. In hac, & omni materia arthritidis utilis, & necessaria est vacuatio in vere per sanguinis missionem & per medicamenta purgantia, etiamsi non actu dolore afficiantur, vt docet Hippocrates aphoris. quadragesimo septimo lib. 6. & Galenus in comment.

Quartò, dolorem sedantibus statim principio adhibendis, vt oleo camomillæ, oleo lumbricorum, de therebinthina, de semine lini, de lilio, de vulpe, & similibus. Cataplasma ex farina camomillæ, meliloti, fœnugræco, semine lini, & puluere stercoris vaccini cum oleis supradietis valdè sedat dolorem. Cataplasma ex mucilagine seminis fœnugræci extracta cum aceto, & aqua cum melle est probatum, & efficax auxilium, si per tres dies hæreat loco dolenti.

Quintò, dissipantibus, corroborantibus, & resoluentibus moderatè, ne tenui dissoluto crassum duritiem lapideam suscipiat. Hæc omnia quoque dolorem mitigant, qualia sunt dicta in quarto genere auxiliorum, & hoc vnguentum. ℞. oleorum camomillæ, vulpini, & de lilio an. ʒ. j. vnguenti Aragon, & marciaton an. ʒ. ʒ. mucilaginis seminis fœnugræci, & seminis ligni, an. ʒ. iij. pulueris mastichis, & rosarum an. ʒ. ʒ. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum. Præstantissimum quoque est partes dolentes ab hac frigida materia oblinire sæpè adipe anseris pinguis exenterati & farti lumbricis terrestribus fœnu-

y græco,

Admonitio.

Frequens Purgatio.

Pilula.

Admonitio in præseruatione.

Quia hæc tollunt dolorem.

Dissipantia.

Præstantissimū auxilium.

DE CVRAND. MORB.

*Terebin-
thina
laus.*

*Lignum
guaiac-
cum.*

*Ischias
valen-
tioribus
curator.*

Vrtica.

*Cata-
plasma.*

*Cucu-
mer syl-
uestris.*

*Aliud
valen-
tius.*

*Cantha-
rides.*

*Mel
anacar-
donum.*

*Exper-
tum &
potens
auxi-
lium.*

græco, croco, terebinthina, confusi & tosti. Secundus adeps, qui defluit in vas aceto albo plenum est melior fons, & balneum ex decocto camomillæ, meliloti, fœnugræci, vnz arthetice, roris marini seminis lini cum aqua salsa, vel à qua chalybs, aut ferrum candens extinguitur, est efficax remedium. Longus vsus pilularum terebinthinae abietis decies lotæ cum aqua vnz arthetice curat hanc arthritidem antiquam, si curabilis est, quia soluere nodosam nescit medicina prodagram. Dosis tertio quoque die tres magnitudine ciceris. Potus aquæ ligni guaiaci per tringinta, vel quadraginta dies euacuato corpore solet curare hanc antiquam arthritidem: muta tamen eius facultatem secundum variam naturam ægri & morbi. Dolor iuncturæ coxæ, quæ à Græcis dicitur ischias, & à barbaris sciatia, valentioribus indiget remediis propter huius iuncturæ magnitudinem, qualia sunt pyrethrum, costum, nasturtium, sinapis, nitrum, stercus bubulum, ciconiæ, & leporis. Cataplasma ex his omnibus, vel aliquibus cum oleo scorpionum, vulpino, & foliis lauri, rutæ, cyclamini, & squillæ est optimum, vel vnguentum. Cataplasma ex pice, sulphure admotum huic magnæ iuncturæ antiquam ischiadem curat. Aliquando sunt necessaria maxime attrahentia, & quæ vesicas afficiunt & adurunt, vt est cataplasma ex foliis vrticæ bis in die loco dolenti admotum, post lauetur locus decocto saluiæ: & roris marini cum aqua salsa.

Cataplasma ex ruta viridi, & scordeon cum pinguedine porci & aceto valet multum sua facultate in hoc morbo. Maioris vis est cataplasma ex radice cucumeris syluestris cum pinguedine suilla, vel ex alio. Hoc etiam est optimum & experitum. ℞. absinthij, radicis ebuli, fursuris ana. p. j. stercoris columbini ℥. j. & β. salis communis ℥. j. omnia in aceto decoquantur, & fiat cataplasma, vel fiat ex sinapi, & ficis. Omnium quæ diximus est potentissimum cataplasma ex cantharidibus & fermento, & staphisagria factum, à quo fiant vesicæ, quæ apertæ per dies aliquot conseruentur foliis brassicæ, vel fermento, & pinguedine porci. Cataplasma ex melle anacardonum est valens causticum in hoc probatum à quodam doctissimo medico, fit hoc modo. Anacardi pisti infundantur in aceto per septem dies, postea sensim, & igne paucò decoquantur, donec tertia pars consumatur. Post caloris absentiam, quod supernatat, collige, quia illud est mel anacardonum antiquorum.

Sapientissimus quidam medicus multos suo tempore laborantes coxendico dolore curauit, & vnum affectum eo per annos decem & octo caustico facto ex capitulo viuz calcis, & alum

aluminis, cuius crusta butyro, vel axungia porci non salita est, est amouenda: deinde locus apertus à docto chirurgo est conseruandus salsa carne, vel ligno busti per sex menses, vt possit materia per vlcus euacuari.

Aliqui medici satis eruditi igne actu aperiunt locum supra *Ignis.* iuncturam, primò, & secundò supra coxam, & tertio sub genu: semper tamen particularia auxilia sequantur vacuationes totius corporis: quamuis tutius esset, si sex digitos infra iun- *Admo-* cturam dolentem aperiretur locus igne, & apertus per aliquot *nitio.* menses conseruaretur. Sed si de his auxiliis omnibus pyroticis perfectam, & integram, doctrinam accipere cupis, lege caput quintum libri tertij Iacobi Hollerij de materia chirurgica. *Hollerius.*

Scholium.

A Rthritis tunc fit.] Vt quæ in hoc scholio dicenda sunt, re- *Quid* etè intelligantur, supponere oportet. Primò articulum esse *articu-* naturalem ossium compositionem, ad motum voluntarium factam. *lus.* Secundò, in articulis cum caput vnius ossis, ingrediatur cauitatem alterius, maximam esse in hac re varietatem, quia aliquando caput ossis magnum est, & cauitas profunda vt in coxa articulatione videmus: aliquando verò caput in superficiariam cauitatem recipitur, vt in articulationibus digitorum. Tertio, ex articulis, aliquos habere multas partes suprapositas, vt est supradictus coxa articulus, qui habet musculos tibia, fæmoris, membranam carnosam, cutem, neruos, & tendones, aliquos nudos esse, quales sunt illi, qui in manibus & pedibus sunt. His suppo- *Quid* sitis ad arthritim descendamus, quæ nomen assumpsit à symptoma- *arthri-* te, & loco affecto. Est enim dolor articularum, non quilibet, sed fa- *tis.* ctus à fluxione humoris. Cum diximus arthritim esse articularum dolorem, intelligimus aut omnium, aut multorum. Quare si in uno articulo est dolor, et si à fluxione humoris fiat, non arthritim, sed articuli dolorem appellamus: nisi in manu, pede, & ischio, ubi dolor hic, proprio nomine dicitur chiragra, podagra & ischias. Arthritis est symptoma sensus tactus, actio scilicet eius deprauata. Morbus ad quem sequitur, est tumor præter naturam articularum, distendens partes in eis contentas. Aduerte tamen hunc tumorem factum à fluxione humoris, esse distinctum à veris tumoribus: non enim tumor continetur in poris partium similiarium (nam sequeretur ad arthritim conuulsio neruo aut tendone distento) sed in cauitate articuli, aut iuxta articulum, à quo supra posita corpora,

DE CVRAND. MORB.

qua vim habent sentiendi, distenduntur, & ita dolent. Vnde morbus hic erit referendus ad tumorem prater naturam, ut ex 6. aph. comment. 49. colliges. Hic autem tumor fit à duabus causis. Prima est imbecillitas articuli, quam etsi à natura habeat, imbecillior tamen se ipso reddi potest, aut in prima conformatione, cum à semine languido formatur: & ideo aliquando arthritidis videtur morbus hereditarius: aut secundo, extra uterum, cum intemperiem aliquam contraxit. Secunda causa est fluxio humoris ad articulos. Fluxio duas habet causas. Vna est plethora, siue sit ad vires, siue ad Iacotius vasa: altera est cacochima: ab his enim solet natura aggrauari, & labitur. irritari. Neque Iacotius rectè sentit, cum scribit, arthrim fieri sensim in articulo congesto humore ob malam partis nutritionem: hac enim non erit arthritidis, cum neque à sanguine, neque ab alio humore naturali fiat. Humor enim, qui sensim coaceruatur, sensim etiam mutat naturam, ut in atheromate & meliceride videmus. Neque in morbo galli fit arthritidis ex congestione sine tumore, ut voluit Rondoletius. Quia si humor in articulo inclusus non facit tumorem, neque distensionem efficit, ac proinde non erit arthritidis, in qua ob distensionem excitatur dolor in articulo. Dices, in arthritide cuius partis distentio excitat dolorem? Rondoleticus respondet, ligamentum esse duplex, vnum quod ab esse ortam habet, & hoc non sentire, alterum à periostio, & hoc sensum habere, & ideo huius ligamenti distentionem in arthritide doloris esse causam. Decipitur tamen, quia ligamentum ex periostio ortum in nulla corporis parte reperitur. Verum quidem est, aliquando tendonem vicem habere ligamenti, ut in lato tendone in genu apparet.

Qua Dicendum ergo est supra articulos transire nervos & tendones pars do- musculorum, qui dolent à tumore distenti, ut constat ex 6. aphor. leat in com. 49. ha enim partes acutè sentiunt, nervus, quia defert vim arthri- sentiendi, tendo verò, quia fit ex febris nervorum. Humorem facien- vide. tem arthritim ex multis cognosceret, ex natura agri, ex colore articuli, doloris sensu, iuvantibus & nocentibus. Arthritidis à melanco- A me- lia raro fit, & ideo non describimus eius notas, ut plurimum ta- lanchol- lia raro fit à pituita, quia articuli pituitoso sanguine nutriuntur, qua fit ar- et si non fluat, & dolorem non efficiat sua frigiditate sensum aufe- thritidis. rens articulitamen mixtam cum sanguine aut bile fluere ad articulos experimur, frigiditatēque eius retusa tensione dolorem efficere. Quibus Cognoscemus arthritidem ortum habere ex pituita ex natura pi- signis tuitosa, colore articuli albicante, dolore obtuso & persenerante, & arthriti- quod ledatur à frigidis, & quod talem habuerit victus rationem dis cau- qua multam pituitam generavit, & ultimò quia singulis diebus se cogno- habet accessionem. Cognoscemus arthritim fieri ex sanguine, ex na- scantur. tura agri, si sanguinea sit, ex rubore articuli simul cum gravi do- lore,

lore, addo simul, quia signum ex rubore articuli in principio arthritidis non habet magnam vim: ex ante acta vita si multum sanguinem generauit. Si arthritidis fiat ex bile, cognoscetur ex natura agri biliosa, ex colore articuli ad flauum tendente, ex dolore acuto rei pungenti simili praecessit ratio victus bilem generans, & exacerbationes doloris fiunt de tertio in tertium. Arthritidis quo plures afficiet articulos, aut maiores, maiorem arguet causam, quod pauciores, minorem.

Dolor iuncturarum à causa calida.] Etiam si à bilioso humore oriatur arthritidis, non tamen solus est, sed permixtus cum pituita, & ideo vide, ne nimius sis in frigidis alimentis.

Secundò, phlebotomia.] In dolore arthritico semper secanda est vena, idque non semel, nec bis solum, sed aliquando ter, quater, & decies, & amplius, si opus fuerit, inspecto virium robore, quod consensit: & fluxione, quae est affectus postulans euacuationem omnium humorum, quoniam hi fluunt ad locum tumore affectum, ac proinde mittere uellendi sunt. Ex loco autem affecto collige utendi modum in sanguinis missione. Si enim omnes articuli afficiantur, secabis basilicam dextram, aut sinistram. Si articuli dextri brachij affecti sint, ex sinistro euacuabis, & contrà. Si sit podagra dextri pedis, seca locum venam brachij dextri, aut pedis sinistri, quia haec partes, eandem habent vasorum rectitudinem cum loco affecto. Si dolor sit in coxendice, distinguendum est: nam in principio, quia scopus reuulsionis magis urget, ex brachio eodem secabimus venam, aut ex altero crure, potissimum in mulieribus, in quibus suppressi sunt menses: tunc enim reuellemus, & euacuabimus ex parte, magis tamen reuellemus. Quod si in principio, ex eodem pede venam secare ausi fuerimus, magis attrahemus humorem (deorsum impetum habentem) ad partem affectam. Facta reuulsione quando iam humor ex parte euacuandus est, quod indicat affectus factus, tum ex eodem pede secanda est vena.

Tertiò, remittentibus sanguinis feruorem.] Non est quod his frigidis & adstringentibus utaris, quia haec neque fluxionem sistunt, & causam arthritidis augebunt, quoniam plures humores crudos generabunt, qui semper solent esse arthritidis causa.

Quartò, euacuantibus bilem.] Non est euacuanda sola bilis, sed opus est permiscere Agaricum, aut diaphaniconem ob pituitam.

Quintò, anodynus.] Dolor aliquando urget, quando scilicet deijcit vires, aut auget affectum, & tunc trahit ad se curationem 12. method. c. 1. Quod si aliquando Gal. dicit symptoma indicare curationem, cum affectui officit, per affectum tunc non morbum, sed sanitatem intelligit, quae continetur etiam in genere affectus, ut patet ex Galeno. de diff. morb. Si ergo in arthritide ex dolore sequa-

In ar-

thritide

semper

sanguis

humorum

ac proinde

mittere

uellendi

sunt.

Ex loco

autem

affecto

collige

utendi

modum

in

sanguinis

missione.

Si enim

omnes

articuli

afficiantur,

secabis

basili-

cam dextram,

aut sinistram.

Si articuli

dextri

brachij

affecti

sint,

ex sinistro

euacuabis,

& contrà.

Si sit

podagra

dextri

pedis,

seca locum

venam

brachij

dextri,

aut pedis

sinistri,

quia haec

partes,

eandem

habent

vasorum

rectitudinem

cum loco

affecto.

Si dolor

sit in

coxendice,

distinguendum

est: nam

in principio,

quia scopus

reuulsionis

magis

urget,

ex brachio

eodem

secabimus

venam,

aut ex

altero

crure,

potissimum

in mulieribus,

in quibus

suppressi

sunt

menses:

tunc enim

reuellemus,

& euacuabimus

ex parte,

magis tamen

reuellemus.

Quod si

in principio,

ex eodem

pede

venam

secare

ausi

fuerimus,

magis

attrahemus

humorem

(deorsum

impetum

habentem)

ad partem

affectam.

Facta

reuulsione

quando

iam

humor

ex

parte

euacuandus

est,

quod

indicat

affectus

factus,

tum

ex

eodem

pede

secanda

est

vena.

Tertiò,

remittentibus

sanguinis

feruorem.]

Non

est

quod

his

frigidis

& adstringentibus

utaris,

quia

haec

neque

fluxionem

sistent,

& causam

arthritidis

augebunt,

quoniam

plures

humores

crudos

generabunt,

qui

semper

solent

esse

arthritidis

causa.

Quartò,

euacuantibus

bilem.]

Non

est

euacuanda

sola

bilis,

sed

opus

est

permiscere

Agaricum,

aut

diaphaniconem

ob

pituitam.

Quintò,

anodynus.]

Dolor

aliquando

urget,

quando

scilicet

deijcit

vires,

aut

auget

affectum,

& tunc

trahit

ad

se

curationem

12. method. c. 1.

Quod

si

aliquando

Gal. dicit

symptoma

indicare

curationem,

cum

affectui

officit,

per

affectum

tunc

non

morbum,

sed

sanitatem

intelligit,

quae

continetur

etiam

in

genere

affectus,

ut

patet

ex

Galeno. de diff. morb. Si ergo

in

arthritide

ex

dolore

sequa-

tus

DE CVRAND. MORB.

sur noxa in viribus, cum sedabimus anodynis medicamentis, quae nec multum calida sunt, quoniam hac reddunt humorem coctum difficilem. Vteris ergo cataplasmate ex lacte cum croco & pane constructo, aut ex fursure & sapa addito rosaceo, aut oleo de lateribus aut alio tenuium partium: quod viam sternat anodina facultati.

Narco-
ticis non
utendū.

Quod si vehementissimus sit dolor, solent medici ad philonium persicum, & alia narcotica, quae anodina improprie dicuntur, descendere. Existimo autem ego melius esse abstinere ab his, quia si ingentissimus est dolor, signum est fieri à sanguine bilioso, is autem, cum tenuis sit, citò feretur ad cutem, tendones & nervos sine tensione relinquens. At opium, & alia narcotica bilem impengendo, & impediendo eius motum ad externa longiorem dolorem efficiunt, etsi ad tempus ipsum sedent.

Arthritis à causa frigida.] Et si pituita sit arthritidis causa, semper tamen cum ea permixta est aliqua portio humoris biliosi, ut supra docuimus. Hoc loco autor exhibet alimenta aliquantum adstringentia, alij non solum alimenta adstringentia perscribunt, sed cum medicamentis attenuantibus adstringentia miscent, ne attenuantia humorem ducant ad locum affectum, qui videntur ignorare occasionem exhibendi attenuantia: nam non est utendum eis, nisi sedata fluxione.

Purgans
medica-
mentum.

Tertiò, euacuantibus pituitam.] Cum medicamentis pituitam purgantibus misce quae euacuent bilem hoc modo. ℞. Syrupi rosarum Alexandrinarum ex nouem infusionibus ℥. iiij. Electuarij de succo rosarum, & diaphœniconis an. ʒ. iij. cum decocto communi, fiat potio. Possumus purgare pilulis de fumo terra, aggregatiuis, & arthericis: neque in hoc affectu sufficit semel purgare, & sic per interualla possumus purgare pilulis, aut confectione aliqua, aut sumentes ℥. ss. terebintina prout purgauerit aucta aut diminuta quantitate.


Curatio

Quintò, dissipantibus.] Cum arthritis ad tumorem prater naturam referatur, eadem ratione curabitur, qua tumor in principio, utentes repellentibus medicamentis, quod potissimum prestabimus in arthritide à bilioso humore facta perfundentes articulum aqua frigida 5. aphorism. sen. 2 5. ubi Gal. in commentario duplici nomine aquam dolorem sedare scribit. Primò, quia doloris causam renouat. mouet repellendo. Secundo, quia sua frigiditate sensum torpidum efficit, quod idem scribit Galenus decimo de comp. secundum locos. Neque existimes in arthritide semper repellendum esse, quia si dolor sit in ischiade, non licet repellentibus uti, quia cum hic articulum tegatur à multis musculis repellentium medicamentorum vis ad articulum non perueniet, & augebimus affectum, quia ex venis per partes suprapositas disseminatis repellemus humorem ad articulum.

culum. Neque utendum est repellentibus in arthritide critica, quia In criti-
 in febris melius est humorem ad articulum fluere, quàm ad partem ca ar-
 principem. Neque repellendum est cùm ex parte principe fit fluxio, thritide,
 nisi fiat ad partem, qua habeat insignem usum qualis est oculis, & in ea
 tunc enim repellentibus utemur: quod non faciemus, si fluat humor in qua
 ad articulos, quia magnum incommodum est ferri humores ad par- pars
 tem principem. At si ex venis ad articulos fluat humor, facta reuul- princeps
 sione repellentibus utemur, nullum enim sequetur incommodum, humorẽ
 imò humor ad venas repulsus concoquetur. Hoc loco Galenus sibi trans-
 videtur contrarius, quia ut diximus ex 10. de comp. secundum lo- mittitne
 cos, & 5. aph. in arthritide repellere licet: at libro secundo de homi- repellas.
 nis natura commentario 11. in fine contrarium videtur sentire. Iam
 (inquit) non rarò cùm in morbo articulari & podagra artus humo-
 res peterent, & illinc repulsi in principem aliquam partem inua-
 sissent, morte conspeximus hominem affectum esse, unamque restare
 spem salutis si ad artus retrahere eos valeamus: Hac Galenus. Vbi Galenus
 videtur sentire ex articulis non esse repellendos humores. Respon- ab inu-
 deo repellere & corroborare esse res distinctas: corroboramus enim ria vin-
 in sanitate, robur addentes parti, ne recipiat: repellimus verò in dicatur:
 morbis humorem fluentem ad partem, & eum, qui iam fluxit. Iam
 nobis non licet articulos roborare, ne recipiant quoniam sunt partes
 languide, ad quas melius est humorem fluere, quàm ad aliquam,
 qua necessaria est: possumus tamen repellere ex articulis facta prius
 reuulsione, eo modo quò supra diximus, quod idem in cute etiam
 efficimus. Ex his facile liberatur Galenus à contradictione,
 quia in libro de hominis natura de repulsione, qua
 medicamentis roborantibus articulos
 fit, loquitur.

FINIS PRIMI LIBRI

y 4 PETRI



PETRI PAVLI,
PEREDÆ
SETABENSIS,
IN

LIB. II. MICH. IOANN. PASCHALII,
de curatione Februm,

SCHOLIA.

*De febre sanguinea, seu continenti, quam synochum
cum putredine appellant.*

CAPVT. I.

Defini-
tio.



Diuisio.

YNOCOS Græcis, continens Latinis est febris, in qua vna accessio ab initio ad finem perpetuò manens in multos dies porrigitur. Hæc duplex est, altera sine putredine, quæ similis est diariæ, de qua in præsentī non agimus, cū raro medicus ad curandas diarias vocetur: quomodo autem solus sanguis non putris febrim efficere possit, quando calidus, & humidus existens putredini magis expositus videtur, non est hoc loco & tempore explicandum. Altera est synochus cum putredine, de qua nunc agimus, cuius tres sunt differentiæ. Nam quædam à principio ad finem æquali magnitudine perdurant, has Græci omotonas vocant, in eodem vigore permanentes: alia enim tria tempora occulta sunt: quædam verò semper augentur, eas Græci acmasticas, id est, incrementum suscipientes, aut inualescentes nominant, principium, vigor, & declinatio in his occulta sunt, quemadmodum in vltimis tria tempora priora. Aliæ paulatim diminuuntur, & decrescunt, paracmasticas, hoc est

est decrefcentes appellant: de his fufius Galen. 9. method. & lib. 2. de differentiis februm, cap. 2. lib. 2. de crifibus cap. 7. agit. Quare fallitur Auicenna, credens Galenum negaffe dari febreſ ſanguineam putridam. Fit ſynochus ex putredine ciborum multorum, & ſanguineorum, multa exercitatione, præſertim à cibo & vere, & iuvene carnoſo: otium immodicum auget ſanguinem, & humores omnes, à quibus in vafis maximis poſiſſimum (quæ circa alas & inguina exiſtunt) putreſcentibus ſynochus hæc fieri ſolet, præcipuè ſi obſtructiones adſint, quas Venus gignit à cibo, & ebrietas. Signa huius febris ponuntur à Galeno 9. methodi, quæ multa ſunt, rubor ſcilicet faciei magnus, & totius corporis ſomnus immodicus, calor magnus, qui acrior eſt eo, qui ſequitur ſynochum ſine putredine, minus tamen mordax, quàm in ardenti. Pulsus iis maximus, vehemens, celer, creber, & inæqualis tamen, ſi cum aliis febribus putridis comparetur, vrina rubra & craſſa.

Error
Auicenna.
Cauſa.

Nota.

Curatur hæc ſex remediorum generibus. Primò, victu frigido, & humido, (minus tamen humido, quàm bilioſæ febres) & tenui, vt ſucco malorum granatorum, cremore hordei, lacte amygdalarum dulcium, cichorea, lactuca cocta, ſi ventriculus eſt imbecillus, vel cruda, cum aceto & ſaccharo, ſi eſt validus, carne cydoniorum ſaccharo condita, radice bugloſſæ ſaccharo condita, pyris, & malis cotoneis aſſatis, pane loto. Si facultas ſit imbecilla, vel poſt ſanguinis miſſionem, & alias vacuationes, nutriatur iure, & carne pulli gallinacei refrigeratis, agreſta, acetofa, hordeo decorticato, ſemper tamen conſideranda eſt natura ægri, ætas, regio, conſuetudo, & anni tempus in quantitate, qualitate, numero cibi ſumendi, vt Hippocrates docet 17. aphoriſmo primi libri. Potus ſit aqua hordei, & in declinatione vinum album bene dilutum, præſertim ſi ventriculus fuerit imbecillus.

Cura-
tio.
Victus.

Secundò, ſecta baſilica dextra, & miſſo ſanguine uſque ad animi deliquium, ſi vires adſint: ego ſemper noſtris temporibus extraho ſanguinem non ſemel, ſed bis aut ter, & quandoque quater vno, vel duobus diebus: numerus tamen dierum non eſt ſemper inſpiciendus. In hac tamen febre à principio oportet mittere ſanguinem, ita tamen vt reſpondeat plenitudini, & robori virium. Ante tamen ſanguinis miſſionem ſi non times ſubitam ſuffocationem, & ſemel in ipſo quoque febris die hoc aut ſimili clyſtere alius lenienda eſt, & inteſtina purganda: ℞. foliorum maluarum violarum, & mercurialis an. m. j. farfuris, & hordei ſine cortice an. p. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℥. j. & 3. iij. cui adde caſſiæ fiſtulæ præparatæ, & diacatholiconis an. 3. ij. miſce, & fiat clyſter.

Sectio.
vena.
Obſer-
uatio.
Clyſter.

Tertiò,

DE CVRAND. MORD.

*Potus
aqua
frigida.*

*Impe-
dientia
potum
aqua
frigida.
Aduer-
te.*

*Conco-
ctio.*

*Purga-
tio.*

*Prescri-
ptio di-
niti ac-
commo-
data.*

Pilula.

*Vsus pi-
lularum*

*damna-
tur in*

morbis

biliosis.

*Boli lau-
dantur.*

*Qua no-
ceant.*

*Dictum
Torna-
mira.*

Tertiò, potu magno aquæ frigidæ, qui Galeno autore 9. method. post sanguinis missionem in hac febre maximum est præsidium, nisi quæ illum impedian, æger habeat, vt sunt tumor, partis principis obstructio, magna inflammatio, vel imbecillitas alicuius visceris, defectus caloris innati, & natura contraria potui aquæ frigidæ: solet enim potus multus aquæ frigidæ hanc febrem præsertim non putrem, & putrem quoque post sanguinis missionem, & humoris biliosi concoctionem curare sudore, vel ventris profluuiio, vel aliquando febrem hanc & ardentem in pituitosam mutare: quo autem modo id fiat, non est præsentis instituti, nec sanguis, nec bilis possunt in pituitam verti, cum coctum non possit fieri crudum.

Quartò, concoquentibus, refrigerantibus, & bilis, quæ fit ex sanguine tenuiori, acrimoniam remittentibus, vt syrupus granatorum, acetosæ S. violarum, rosarum, & endiuia: S. & comp. & similia cum aquis, vel decocto duplo endiuia, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, & similia sumptis per duos vel tres dies.

Quintò, vacuantibus bilem, vt cassia fistulari, tamarindis, rhabbaro, myrobalanis citrinis, manna, diaprunis solut. & electuario de succo rosarum, vt ℞. medullæ cassis fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ss. infusionis rhabbaro in aqua endiuia per noctem factæ ʒ. j. squinanti ʒ. iij. diaprunis solut. ʒ. iij. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus: vel si est diues, ℞. mannæ electæ ʒ. j. ss. rhabbari electi infusi per noctem in aqua endiuia, deinde electa substantia ʒ. iij. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Si tamen abhorret liquida medicamenta purgantia: ℞. pilularum de rhabbaro ʒ. j. cum aqua cichoreæ, fiant pilulæ septem, & aurentur. Sed ego in hac, & in aliis biliosis, non laudo pilulas: quia præterquam quòd omne medicamentum purgans (autore Galeno comm. 24. primi aphorif.) per se calfacit vehementer, forma pilularum magis calfacies propter siccitatem coniunctam, quæ simul cum caliditate non potest minui, quemadmodum in mixta cum syrupo, & decocto, & cassia, & tamarindis in potibus fieri solet. Quare post potionem magis laudo bolos, seu bucellas: vt ℞. rhabbari electi puluerizati, & pauca aqua endiuia madefacti ʒ. vj. sacchari, q. s. misce, & fiant boli quinque vel septem: & ideo in his & biliosis febribus medicamenta purgantia valenter, & insalubria etiam castigata nocent, vt est scammonium, colocynthis, helleborus, & similia: solebat dicere eruditissimus Tornamira, medicos eis in his febribus videntes non esse curatores, sed interfectores

Sextò.

Sextò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, & totum Altera-
 corpus internis & externis, vt electuario diatrium santalorum, tio &
 diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi conferva rosarum, corrobo-
 conferva violarum: vel hoc electuario: ℞. pulueris diatrium ratio.
 santalorum ʒ. ij. pulueris diamargaritonis frigidi ʒ. j. conser- Sumen-
 uæ acetosæ ʒ. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum q. s. mis- dum ele-
 ce, & fiat electuarium in tabellis pondere ʒ. ij. Dosis quoli- ctuarium
 bet mane ʒ. iij. cum ʒ. iij. aquæ cichoreæ, vel acetosæ, vel cū aquis.
 endiuixæ, vel decocti hordei sine cortice, vel cum vino albo Admo-
 bene aqua diluto, cordi sæpe, admoueatur hoc epithema tepi- uenda
 dum, vel actu frigidum in æstate, & ægro iuvene. ℞. aquæ ro- cordi.
 sarum ʒ. iij. aquæ acetosæ, & huglossæ an. ʒ. iij. aquæ melif-
 sæ ʒ. ij. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de
 camphora an. ʒ. j. misce, & fiat epithema cordi admouendum Epithe-
 omni tempore ante & post vacuationes, quia cor non potest ma.
 obstructione affici. Hoc vnguentum bis admoueatur cordi, Vnguen-
 quod in omnibus febribus biliosis, & pestilentibus est opti- tum bi-
 mum, eoque Carpetani medici vtuntur, & est Gainerij. ℞. olei liosis, &
 nenupharis ʒ. iij. pulueris nenupharis ʒ. ij. santalorum rubro- pestilen-
 rum, seminis acetosæ, coralli rubri præparati an. ʒ. j. marga- ribus fe-
 ritarum electarum, ossis ex corde cerui an. ʒ. ss. camphoræ bribus.
 ʒ. iij. misce, & fiat vnguentum. Hepati bis in die ventriculo
 vacuo admoueatur vnguentum santalatum, vel cerotum santa-
 latum & hoc epithema tepidum. ℞. aquæ endiuixæ, & cicho-
 reæ, an. ʒ. iij. aquæ rosarum, & absinthij, an. ʒ. ij. santalorum ru-
 brorum ʒ. ij. spodij ʒ. j. aceti rosati cochlearium vnum, misce, & Hepati
 fiat epithema. Balneum aquæ tepidæ in hoc genere auxiliorum epithe-
 est optimum huic, & aliis febribus, præsertim hecticæ, vt dice- ma.
 mus capite octauo huius libri. Totum enim corpus refrigerat, Balneū.
 & reliquias materiæ resoluit.

Scholium.

SYNOCHOS Græcis, continens Latinis.] Febris est intemperies Quid
 Scalida, in toto corpore, aut saltem pluribus, aut præcipuis par- febris.
 tibus existens, & actionem ladens. In hac definitione, in-
 temperies est genus, quo communicat febris cum aliis intempe-
 riebus. Reliqua, quæ in definitione continentur, differentia sunt.
 Cùm dicimus hanc intemperiem esse calidam, separamus eam ab
 aliis tribus intemperiebus frigida, sicca & humida, cùm eam
 collocamus in toto corpore, separamus febrem ab intemperie calida
 unius partis. Vltimò definitionis membro, febris distinguitur

. DE CVRAND. MORB.

ab aliis intemperiebus, quæ includuntur intra limites sanitatis: Singula partes istius definitionis breuiter explicanda veniunt. In primis febris est intemperies calida, ut Gal. lib. de causis morborum & 6. aphor. com. 16. & aliis locis docet. Quæ in re videtur contrarius sibi, & Hippocrati. Sibi contrarius est, quia 2. acutorum com. 24. calorem febrilem siccum, & 1. aphor. com. 16. febrem passionem calidam siccam nominat, Vnde febris non in solo calore, sed simul cum siccitate consistet. Hippocrati contrariatur, quia hic supradicto aphorismo victum humidum febricitantibus consulit sentiens febrem esse affectum siccum. Respondeo febrem solum esse positam in calore præter naturam, neque coniunctam habere siccitatem. Quod ultimum confirmat Vallesius, quia si aliquis vtatur victu humido, ita vt factus sit humidior quàm pro natura, & febricitet, tunc febris sine siccitate erit. Non tamen est, quod his & similibus vtamur argumentis, cum facillimum habeamus, & quod multum vrget. Argumentum huiusmodi est, si febris essentia in siccitate etiam est posita, ergo omnis febris coniunctum habebit marasum, sed hoc est falsum, ergo & primum. Maior nota est, quia marasmus nihil aliud est, quàm intemperies sicca morbosa totius. Assumptionem falsam esse, experientia docet. Ad argumenta facile erit satisfacere. Ad Gal. qui febrem appellat passionem siccam, & calorem siccum. Respondeo, in febre semper esse siccitatem, quia immoderata caliditas ex accidenti consumendo humidum eam sibi adsciscit, hæc tamen non est morbosa, sicut neque ea quæ est in homine bilioso. Quid ad Hippocratem? Vallesius sentit Hippocratem in febrilibus victum humidum imperare, præcautionis gratia: Quod nobis non placet, quia in febrilibus solent phrenitis, lethargus, & alia symptomata frequenter euenire, quæ à nobis non præuidentur, quia perat victum non contingunt necessario: cur ergo marasum, qui rarissimè in febrilibus euenit, præcauebit Hippocrates? Dicendum ergo est Hippocrati victum humidum imperare febricitantibus, propter calorem, quia Febris humiditas eum obtundit, sicut siccitas acuit. Secundò febrem dicimus esse in toto corpore, quia quum intemperies calida sit in corde corpore. quod fons est caloris, & à quo calidum parium fouetur, non est mirum, si affecto principio omnes partes afficiantur. Hoc autem intelligendum est, si nihil impediat, quod propter lypiriam & epialam dicimus. Hoc considerans Gal. 6. epyd. part. 1. com. 29. in febrilibus calorem in toto corpore, aut saltem præcipuis, aut pluribus partibus collocat. Vltima definitionis pars calorem febrilem morbosum & præter naturam esse demonstrat. Huius enim caloris proprium lādatur est omnia corrumpere, & naturalium actionum ordinem perturbare. in febrilibus. Vbi per actiones naturales, eas quæ secundum naturam fiunt, intelligimus, quæ animales & naturales comprehendunt, ita tamen, vt in febribus

febris actiones naturales potissimum laedantur, & inter eas illa, Obiectio.
 qua concoctrix appellatur. Dices, nonne in febribus saltem diariis, Differē-
 imaginatio, ratio, & memoria saepe illaesa servantur? Respondeo sem-
 per laedi, quia non ita rectè, neque tanto tempore exercentur actiones tia fe-
 praedicta, ac in sanitate. Neque hoc mirandum est, quia in febribus brium.
 instrumentum commune basum est, nempe calidum innatum. Tum Essentia
 etiam, quia febris morbus est omnium partium les fe-

His positis, differentia februm tradenda sunt: quarum quaedam brium
 sunt essentiales, quaedam accidentales. Essentiales ille sunt, quae ex differen-
 essentia febris (qui calor est) desumuntur. Quae tres sunt: Prima de- tia tres.
 sumitur ex qualitate caloris: Secunda ex motu: Tertia ex eius sub- Prima.
 iecto. Ex qualitate caloris, febres appellantur magna, aut parua: si Secunda.
 propriè loquentes intensa, & remissa. De his loquitur Hipp. 6. epyd. Tertia.
 sent. 29. cum scribit febres quasdam esse statim ardentes, & quas- Ex qua-
 dam debiles. Ex motu pendent illae febres, quas Hipp. eodem loco pri- litate
 mò mites, deinde incrementales, & alias è conuerso statuit. Ex mate- caloris
 ria diuiditur febris, in diariam, putridam, & hecticam. Diaria di- differen-
 citur illa, in qua calor factus est in spiritibus. Putrida, in qua in tia ex
 humoribus, ita ut ex eorum putredine ortus sit. Hectica verò in motu.
 qua in partibus solidis (hoc est, quae consistentiam habent) calor fa- Differ.
 ctus est, ac in humoribus & spiritibus in fieri. Differentia februm ex ma-
 ex qualitate & motu caloris desumpta à materia pendent, quia teria.
 calor in materia sicca intensus apparet, ac in humida remissus: in Diaria.
 materia tenui celeriter monetur, in crassa tardè. Et ideo has omit- Putri-
 timus differentias, & eas, quae ex materia sumuntur, appellamus es- da.
 sentiales, quia variam postulant curationem, & cum finis sit ratio Hectica.
 formalis artis, variant sine mistius partis curatiua in medicina, qui Omnes
 est curare morbos. Differentia februm, quae accidentales appellari februm
 solent, sumuntur ex accidenti proximo, aut remoto. Ex accidenti differen-
 proximo, cum ex colore febrem diuidimus, quia talis in cute efflo- tia reuo-
 rescit color, qualis est humor, qui redundat. Hac ratione Hippoc. su- catur ad
 praedicto loco. 6. epyd. febris praerubra, praepallida, & liuida. memi- differ. ex
 nit, ubi in rubris & pallidis utimur dictione pra, quia illi colores, mater.
 nisi sint valde intensi, non sunt mali, contra quam accidat in liuido cur dif-
 colore, qui malus semper est, etsi non sit valde intensus. Ex acci- fer. ex
 denti remotè varia etiam februm differentia sumi solent. Quae mat. di-
 sunt, febris longa, & brevis, nocturna, & diurna: continua, & in- cuntur
 termittens & aliae similes. Ex his omnibus februm differentiis, eas essentia-
 quae ex accidenti ortum habent, omittimus, tum etiam quae ex mo- les.
 tu, & qualitate caloris desumuntur, solumque disputare institui- Differ.
 mus de his differentiis febris, quae à materia pendent, de putridis, acciden-
 scilicet & hectica propriis capitibus, praesenti autem loco de diaria, tales.
 de qua autor non disputauit, agere non instituimus. Diffe-

DE CVRAND. MORB.

20. *Febris diaria aut est exquisita, aut non exquisita. Febris diaria exquisita illa est, qua ex calefactis spiritibus ortum habens, per spatium unius diei (hoc est viginti quatuor horarum) perdurat, sine ortu habeat à causa externa affectum in corpore relinquente, sine non relinquente affectum. Quod dico propter Menam & alios, qui eam febrem diariam, qua ex causa externa, affectum aliquem in corpore relinquente ortum habet, diariam minùs exactam appellant. Non exquisitè diaria est illa, qua ex vaporibus ab humoribus calidis eleuatis fit. Qua media est inter diariam, & putridam: communikat enim cum diaria, quia non fit ex putredine humorum, neque ex caliditate facta in partibus solidis: cum putrida verò communikat, quia ex calefactis humoribus ortum habet. Ex his diariis, quadam appellantur Synochi non putres, in quibus feruet sanguis in vasis ab ira exercitatione, aut alia causa, à cuius vaporibus cor calefit. De his febribus agit Galenus nono method. capite 1. & 2. Alia sunt diaria orta ex leui obstructione cutis in his hominibus, in quibus acres sunt humores 9. method. capite 4. In eis enim calidi vapores eleuati cor calefaciunt, & inde fit febris diaria. Haec febres facillè mutantur in putridas, aucta obstructione, nisi praecautione utamur, sanguinis missione reuellentes humores. Solent medici hoc in loco quarere. An detur febris diaria ex putredine spiritus. Hac controuersia ex hac altera pendet: An possint spiritus putrescere. Vallesius constanter affirmat spiritus posse putrescere. Quod probat primò auctoritate Aristotelis 4. lib. meteo. cap. 1. ubi scribit omnia putrescere prater ignem. At spiritus non est ignis, ergo putrescet. Secundò, aer potest putrescere, ergo & spiritus. Antecedens experientia docet, in pestilenti constitutione. Consequentiam probat ex Galeno, qui in libro, An sang. in art. contineatur, spiritum esse aëre crassiorem scribit, ac proinde oculis videri. Quod autem crassior sit Vallesius ostendit quia fit concoctione ex ipso aëre, at coctio incrassat. Ego tamen constantissimè assero, spiritum non posse putrescere. Quod consenten- firmo ex natura rei, quia ad putredinem obstructio requiritur, quam nunquam faciet spiritus, tenuissimus cum sit, & facillè difflectatur. Quod considerans Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. febrem diariam exemplo lapidum, & aliorum, qua alterari possunt, & non putrescere, demonstrauit. Praterea ad putredinem requiritur quies, quam spiritus non habet. Adde materiam putredinis esse humiditatem excrementitiam, qua in spiritibus non reperitur, cum ad igneam accedant naturam. Rationes Vallesii nil concludunt. Prima enim ostendit, ipsum non rectè aduertisse ea, qua docet Arist. 4. meteo. c. 1. Eo enim in loco non sentit omnia alia corpora ab igne putrescere: non ignorat Arist. ferrum, lapidem, elementum terreum, quod summè siccum est, non putrescere, sicut nec alia similia corpora, qua mul-*

tum

rum sicca sunt. Non ergo erit hac bona consequentia, ex Aristotele omnia putrefieri possunt prater ignem, ergo spiritus putrescent. Ad Aristotelem ex serie contextus respondendum est, in eo enim cap. 1. agit de generatione, quam dicit fieri à calido & frigido, quia calidum frigido temperatum (quod est calidum innatum) generationem efficit, permiscendo humidum cum sicco. Et ita igneum elementum est agens, quod permiscet: at alia elementa sunt materia ignis, quia cum miscentur, ab eo patiuntur: & ideo possunt putrefieri, cum ignis victus non potest gubernare mixtionem: cum autem vincit, non fit putredo: unde ignis non potest putrefieri, quia est agens, bene alia, qua sunt materia ipsius. Videat ergo Vallesius, quàm longè à mente Aristotelis proponat propositionem, qua simpliciter prolata falsa est, nisi contextus antecedentia, & consequentia aduertamus. Ad secundam rationem respondeo, negando consequentiam. In cuius confirmatione duo affirmat Vallesius. Primum est, ex Galeno spiritum esse crassiorem aëre. Secundum, spiritum videri. Quae duo falsa sunt. Primum, quia spiritus est crassior, non Solutio aëre, ut vult Vallesius, sed aethere (ut eo loco ait Galenus) hoc est secunda aëre purissimo, ex quo fit nam ex tenuissima aëris parte, & vaporis rationis. sanguinis etiam tenui parte, spiritus generationem obtinet in cor- Spiritus de, concoctione: quae, etiamsi incrasset, non proinde dicendum est spi- non est ritum esse crassiorem aëre, sed tenuissima aëris parte, ex qua ge- crassior neratur. Unde hac consequentia non valet, aër putrescit, ergo & spi- aëre. ritus. Quia aër quietus potest esse in uno loco, habetque continuitatem, & humiditatem, & sic potest putrefieri: quae omnia deficiunt spiritui, ut diximus. Secundum, quod Vallesius scri- Spiritus bit, nempe ex Galeno spiritum videri, quod & omnes affirmare non vi- video: ostendit ipsos per transennam legisse illum libellum, cui detur. titulus est. An sanguis in arteriis contineatur, in quo Galenus contra Erasistratum disputans probat, spiritum solum, non contineri in arteriis hac prima ratione. Si spiritus solus in arteriis contineretur, videremus eum exire, ergo solus non continetur. Propositionem confirmamus, quia si videremus eum exire, id colligeremus ex coincidentia arteriarum. Quod similitudine possumus ostendere in vire, in cuius compressione solemus dicere, nos videre aërem ex eo egredi. Respondebant sectatores Erasistrati Galeno, non est necessarium nos videre exire spiritum ex arteriis quia tenuis, & levis est spiritus, & sic facile expirat. Contra hos disputat, ea ratione, qua diximus ex compressione desumpta. Videant ergo, qui spiritum videri ex Galeno affirmant, quantum à veritate abhorrent: aliud enim est dicere videri spiritum, & aliud videre spiritum exire, hoc enim ultimum signo praedicto possumus intelligere. Iam si tam acutè vident, ut eis non lateat spiritus,

DE CVRAND. MORB.

spiritus, dicant mihi eius colorem, aut ipsum ostendant mihi, hoc enim sensu, non ratione debet probari.

Febrem diariam aliqui in varias differentias diuidunt, pro varietate spirituum, qui aut sunt vitales, aut animales. Non considerantes spiritum vitalem solum in corde calefactum efficere diariam.

**Difference-
diaria-
rum.** *Dicendum ergo est, febrem diariam unicam esse, neque posse in varias differentias partiiri, cum spiritus vitalis unicus tantum sit: ac cum pro causarum varietate, curatio diaria varietur, differentia diaria ex causis variis desumenda erunt. Diaria semper fit à causis externis, in quibus opus est considerare, an sint presentes, an non, tum an febrem efficiant, affectum aliquem in corpore generando,*

**Causa
presen-
tes indi-
cant.** *vel sine affectu. Si causa presentes sunt curationem indicant, non autem si sunt absentes. Si causa affectum aliquem efficiunt, ut frigigus, & balneum aluminosum densitatem cutis, ablatis causis non ad febrem, sed ad curationem affectus veniendum erit. Si vero nullus sit affectus, diariam curabimus, ut manifestum est in illa qua fit ex ira, & exercitatione. Et ita cum Galen. 8. method. in fine, diariam conuenire cum hectica scribit, intelligit de diaria, cuius causa nullum affectum in corpore generauit, hac enim curatur alteratione, sicut & hectica.*

**Signa
commu-
nia dia-
riarum.** *Signa februm diariarum quaedam sunt communia, quaedam vero propria. Communia omnibus diariis conueniunt, qua traduntur à Galeno primo de differ. febr. cap. 8. Propria signa sunt illa, qua causas particulares februm diariarum vstionem, refrigerationem,*

**Signa
propria.** *cruditatem, iram, tristitiam, bubonem, vini potum, & alias similes demonstrant: de quibus agit Galen. 1. de arte curat. ad Glauconem, & 2. Criseon cap. ultimo. Ex quibus locis hac omnia pete, neque enim animus est transcribendi ea, qua rectè à Galeno sunt explicata, ut multi facere solent, eo solum nomine, ut chartas impleant, & aucti voluminis auctores videantur.*

**Metho-
dus ad
curan-
das fe-
bres pu-
tres.** *De febribus putridis iam cum auctore agendum est, sed antequàm particularem earum curationem aggrediamur, aequum erit breuiter methodum generalem proponere, qua id prestare possimus. Primò ergo aduertendum est, in omnibus febribus putridis, hos septem affectus reperiri. Primus est febris, 2. putredo, 3. prohibita transpiratio, 4. obstructio, 5. humoris multitudo, 6. humoris crassities, 7. humoris glutinositas. Vnde febris varias habet causas antecedentes, quarum quaedam solùm sunt causa, ut putredo, & fluxio humoris multi, crassi, aut glutinosi. Prohibita transpiratio est symptoma, & causa putredinis. Obstructio est morbus, & causa putredinis. Ha februm causa aliquando omnes sunt presentes, aliquando non omnes. Presentes sunt omnes, cum febris est in principio, tunc enim est fluxio humoris, obstructio,*

pro

prohibita transpiratio & putredo. Non autem sunt omnes causa praesentes, cum febris est in aliis temporibus: nam in augmento febrium tam deficit fluxio, sicut in statu fluxio & obstructio non sunt, in destinatione verò sola est putredo (sicut in statu) sed iam euacuatur. Secundo aduertendum est, omnes febres putres conuenire in putredine, differre autem pro varia putredinis differentia ex loco, seu foco putredinis desumpta. Putredo enim vel est in toto corpore, aut maximis vasis, ut in febre syncho, vel est in una tantum parte. Rursus haec putredo, quae in una consistit parte, vel est cum phlegmone, vel citra phlegmonem: si est sine phlegmone, pars illa, quae obstructionem habet in qua putrescit humor, dicitur focus putredinis. Si humor putret in toto corpore, febris ex eo orta caret accessionibus. Si verò in una tantum parte putreat, particulares circuitus efficit: simulque febrem continuam, aut intermittentem: continuam, si humor putrefactus in foco, ob eius multitudinem, aut facultatis expultricis imbecillitatem, intra vasa continetur: intermittentem verò si propter causas contrarias, per habitum corporis expellatur. Haec omnia consideramus, propter curationem, quia cum in syncho non sint circuitus, hora consueta cibabimus aegrotum, non sic in aliis febribus, quae circuitum habent in quibus in hora accessionis abstinendum est ab alimento, nisi urgeat aliqua occasio: ut si vires concidant, qua ratione 8. metho. biliosi aliquando in hora accessionis cibantur. Tum in syncho, & continuis, dummodo adsint vires, quocumque tempore licet sanguinem mittere, at in intermittentibus solum in hora intermissionis. His positis methodo rationali ex indicationibus desumpta, febrem putrem hac ratione curabis. Febris putris est morbus fiens, hoc est, qui habet causam ipsum fouentem. Habet ergo aliquid factum, & aliquid quod sit. Id quod factum est, debet curari, quia est morbus: id quod sit, debet prohiberi, ne fiat, quod praestabimus auferentes causam, quae est putredo. Haec etiam habet quid factum, quod curationem etiam postulat, & quid fiens, quod prohibebitur auferentes prohibita transpirationem, quae est eius causa. Prohibita transpiratio non habet quod factum, & quid fiens, ut male voluit Altomarius, quia haec suam essentiam habet in fieri, & perpetuo ab alio dependentem. Debet ergo auferri quod praestabimus, prospicientes obstructioni, quae est eius causa continens. Obstructio etiam habet aliquid factum, indicans curationem: & aliquid quod sit praenisione egens, quam praestabimus, auferentes eius causam, quae est fluxio humoris multi, crassi, aut glutinosi. Vnde in hac resolutione principium à febre sumimus, & tandem ad fluxionem gradatim descendimus, ita ut id quod in resolutione ultimum est, sit primum in curatione: quia affectus non potest tolli manente causa, unde ortus est. His si addamus indicationes, quae à viribus, & natura sumuntur, integram habebimus methodum.

Differē-
tia pu-
tredinis
conside-
randa in
curatio-
ne.

Metho-
dus cu-
randi fe-
bres pu-
tres.

DE CVRAND. MORB.

methodum. Indicationem à natura tunc addemus, cum in quotidiana rationem habuerimus ventriculi, in tertiana iecoris, in quartana verò lienis. Aduertendum præterea est, nos in hoc libro non agemus de re de febribus, quæ inflammationes sequuntur, quoniam hæc sunt symptomata, & curata inflammatione cessent: sed de aliis febribus putridis, quæ citra inflammationem fiunt, & in quibus septem illos affectus consideramus. Quid autem unusquisque ex illis indicet, propriis capitibus explicabimus incipientes à syncho.

Nomina Febres quotidiana, tertiana, & quartana dicuntur, non quia hæbentur beant accessionem, singulis diebus, tertio, aut quarto euenientem, quia putrida- hac ratione duplex tertiana diceretur quotidiana: sed quia talium, de fiunt humore, quotidiana, quia fit à pituita, tertiana à bile, quarta syncho. na ab humore melancholico. Ex his manifestè patebit, febrem syncho-
Duplex chon (hoc est continentem) appellari eam quæ ex sanguine ortum habet: quæ caret circuitibus, & una continua clauditur accessione, quia non habet unum certum locum affectum, sed multos. Hæc duplex
Syncho plex est non putris, & putris. Synchum non putrem ex vaporibus ex sanguinis calefactis generari, & ad diariam referri supra, cum de diariis erat sermo, explicauimus. De qua in præsentia non disputari pro- mus, sed de altera syncho putri, quæ habet ortum ex putredine succorum, vel sanguinis (quod idem est) in omnibus vasis, vel maximis, eius cau- & calidis, qualia sunt illa, quæ inter alas, & inguina clauduntur: sa pri- ibi enim caudices vena, & arteria existere anatomes docet. Hanc
mò. autem putredinem in omnibus vasis, aut magnis inclusam solus sanguis (hoc est massa sanguinaria) efficere potest. Quia eius putredinis causa est plenitudo (ut ex 9. metho. cap. 5. & prima historia cap. 4. colligimus) non ea quæ est ad vires, sed ad vasa. Vtraque autem à solo sanguine fit, nullus enim humor solus tantum augeri potest, ut venas distendat, quod in morbo regio experieris, & aliis similibus affectibus. Dices, nonne dantur plethora biliosa, melancholica, atque etiam pituitosa, quam nos plethoram secundum quid appellamus?
Solutio. Poterit ergo ex hac fieri etiam synchos. Respondeo concedendo consequentiam, cum enim in hac plethora humor non sit separatus à sanguine, si in eo breue habuerit augmentum, poterit facere synchon: sin verò magnum, cum iam tunc sanguis sit multum pituitosus, melancholicus, aut biliosus, neque poterit facere plethoram ad vasa, & febris quæ sequetur habebit circuitus illius humoris aucti. Quod synchos febris fiat ex solo sanguine per præpollentiam dicto, (quia sanguis humor quartus solus nunquam extat) præter rationem dictam, aliis etiam conformabimus, ita ut hæc sit secunda ratio, desumpta ex
Secunda 9. method. cap. 3. ubi scribit Gal. febrem synchon fieri, cum humor
ratio. aqualiter, & citò, in omnibus vasis, aut magnis putrescit. Vbi illa duo verba aqualiter, & citò consideranda sunt: aqualiter enim in omnibus

omnibus vasis solus sanguis, qui in eis potest redundare, putrefieri poterit, sicut & citò, cum non disflatur, quia est calidus, & sic facile in temperiem calidam concipiet, & humidus : & ideò multi calidi & humidi vapores ab eo eleuati neque rectè gubernati citò putredinis erunt auctores: sicut & ipsemet sanguinis citò etiam facile putredinem concipiet. Tertia ratio ex eodem loco Galeni, synochos febris neque in frigida etate, ut senectute, neque in frigido corporis temperamento, quale est hominis melancholici & pituitosi, quia melancholia, & pituita citò non possunt putrefieri, neque in hominibus gracilibus, hoc est biliosis, quia multum disflantur, fieri potest. Ergo fiet in solis sanguineis. Quarta ratio ex eodem capite Galeni, synochos carnosos & multo sanguine affluētes afficit, ergo solūm fiet ex sanguine. Quinta in synocha pulsus est maximus ex eodem loco Galeni, ergo ex solo sanguine, fiet, quia homines sanguinei & carnosissimi, cum habeant maximum pulsum, & alia natura vsque ad magnum tantum possunt peruenire. Sexta ex curatione colligit institutum, quia solūm in synochis mittimus sanguinem vsque ad animi deliquium, ut inferius videbimus, propter plethoram, quæ à solo sanguine fit. Septima ex 9. method. cap. 5. desumpta aperte id monstrat, eo enim in loco Gal. plenitudinem ad vires synochon non efficere scribit, quia ea nec obstruit venarum ora, ita ut prohibeat refrigerationem, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit. Iam à contrario sola illa causa, illa causa faciet synochon, quæ distendit venas, ita ut in eis tumorem efficiat, qui est signum non plenitudinis, sed magnæ plenitudinis, quæ ruborem inducit in cute. Certissimum ergo erit homini vel mediocris iudicij, hæc omnia à solo sanguine summè aucto fieri, & ita hunc solūm synochon generare posse. Ex his colliges male Altomarium à bile, pituita & melancholia syncera synochon etiam fieri scripsisse. Probat autem etiam à bile fieri his rationibus. Prima vi desumitur ex Gal. lib. 2. diff. febrium c. 7. ubi continuam ex bile febrem diuidit in synochon, & continuam. Secunda etiam vim habet ex lib. 2. Criseon cap. 6. ubi Gal. postquam synochon febrem continuam esse, & acutam scripsit, consequenter de ipsa loquens hæc addit, sufficit enim genus agnoscere, quod biliosa sit, atque deirens, hæc probans Gal. si synochos est biliosa, ergo bilis synochon efficiet. Tertia ratio synochon Hippocr. 4. de ratione victus sic habet. Cum vena totius corporis fieri ex exiccata, attraxerint acres, ac biliosas humiditates ex carnibus, febres ardentes fiunt. Iam si hoc ita est, si bilis à venis omnibus attrahatur, ex carnosissimis partibus faciet synochon. Quarta ratio, si synochos febris fit ex sanguine putrescente, ergo & ex bile, consequentiam probat, quia sanguis cum admodum putrescit, eius tenuior portio in bilem mutatur.

Tertia
ratio.Quarta
ratio.Quinta
ratio.Sexta
ratio.Septima
ratio.Altoma-
tentia.Prima
ratio Al-

tomarij

probans

bile.

Secūda

Tertia

ratio.

Quarta
ratio.

Quod ex pituita etiam generare possit, probat ex lib. 4. acutorum,

DE CVRAND. MORB.

genera- ubi Hippocrates fatetur, pituitam salsam à totius corporis venis at-
re syno- tractam, aliud causa genus efficere: ergo cum hac pituita erit putre-
chon. facta in omnibus venis, vena habebit accessionem, & sic erit syno-
 chos. Hæc Altomarius. Cuius rationes soluenda sunt, cum iam paulò
 suprâ probauerim solum sanguinem ex quatuor humoribus constitu-
 tum, synochon generare posse. Prima ratio desumpta ex Galeni loco
Solutio non rectè considerato: ibi enim hoc est 2. de disse. feb. totum quæ ex
prima flaua bile fiunt additum est, & superfluum imò repugnans Galeni
rationis. doctrina, ut disputationis series persuadet. Postquam enim Gal. egit
Alto- de intermittentibus febribus, illo cap. 7. incipit agere de continuis, eas
marij. diuidens hoc modo, Continua febres, aut sunt continentes, aut nomen
 generis seruantes, continua dicuntur. Rursus continentes, tres habent
Solutio differentias, sicut & continua, quæ eo loco enumerantur. Et ita ex,
secunda plicatio huius loci, ostendet etiam locum, qui habetur 2. criseon, ex
rationis. quo secunda ratio habet vim, corruptum esse: ibi enim totum illud,
 quòd biliosa fit, delendum est, ut ex contextu colligo. In eo enim inci-
 piens agere Galenus de continentibus febribus, eas ait esse continuas,
 & ardentes. nullam faciens mentionem, quòd fiat biliosa, ac proinde
 cum concludit, sic legendum est, Sufficit enim genus agnoscere,
 quòd continua fit, & adutens. Tertia ratio ridiculam habet conse-
Solutio quentiam. In primis cum Hippo. dicit venas exiccatas attrahere bi-
tertia lem ex carnibus, intelligendum est, venas eo modo affectas attrahere
rationis. ex carnibus ichores sanguinis. Non tamen intelligendum est, hos sem-
 per ubi attrahuntur, facere febrem: hoc enim falsum est, sed tantum,
 quando in aliqua vena à crasso humore obstructio incepta est, tunc
 enim ichores ibi detenti augment obstructionem, & sic fit putredo tan-
 ta, quæ potest generare febrem. Secundo, etsi vena attrahant bilem ex
 carnibus, & hæc perficiendo obstructionem febrem generet, habebit
 circuitus tertianos. Tum bilis flaua non potest obstruere, quomodo
 ergo efficiet synochon? Quarta facillimum erit satisfacere, si enim
Quarta sanguis iam habet tenuem portionem in bilem mutatam, febrem
rationis efficiet habentem tertianos circuitus, & tunc Galenus eam ap-
solutio. pellat febrem biliosam, nos autem non loquimur, nisi de san-
 guine non mutato adhuc in bilem, aut melancholiam, & putre-
Differē- facto, hic enim est, qui facit synochon. Vltima ratio qua probat pi-
tia syno- tuitam salsam generare synochon duo habet absurda, quæ sunt, pi-
cha fe- tuitam salsam posse in toto corpore putrere, & secundo posse fa-
bris tres cere vnâ accessionem. De differentiis synocha febris disputemus,
sunt. quæ tres sunt. Prima appellatur à Græcis acmaistica, à La-
Prima. tinis augefcens: quia à principio suæ generationis semper ha-
Secunda bet accessionem incrementem: causa huius rei est, quia in ea plus pu-
differen trefcit sanguinis, quàm dissipetur de putrefacto. Secunda dicitur à
tia. Græcis omotonos, cuius accessio semper eundem seruat tenorem: hoc est,
 qua

qua neque diminuitur, saltem sensibiliter: quod prouenit ex eo quod tantum dissipatur humoris putrefacti, quantum de nouo putrescit. Tertia differentia synochos, à Græcis paracmastica, à Latinis de-
 crescens dicitur, in qua accessio semper decrescit, quia plus dissipatur ex putrefacto sanguine, quàm putrescat de nouo. Dices si una-
 quaque synochos unam habet accessionem, ergo habebit etiam unum
 tempus solùm. Respondent omnes medici, verum esse synochon so-
 lùm habere unum tempus morbi sensibile, & tria insensibilia. Quia quantum errent, hac ratione probamus. Sanguinis missio non
 est exercenda in statu, aut morbi declinatione; sed si synocha febres
 habent unum tantum tempus, tunc in eis sanguinem mittimus in
 statu, & declinatione: Ergo hæc febres non habent unum tantum tem-
 pus, sed multa. Maiorem probamus, quia tempore status non est flu-
 xio humoris, & est coctio perfecta. At in declinatione, cùm humor
 peccans iam à natura euacuetur, non est quod eius motum pertur-
 bemus sanguinis missione. Assumptio nota est, quia in omotono (si
 tantum habet statum) cùm sanguinem mittimus in statu exercemus
 euacuationem sicut in paracmastica in declinatione. Ego autem (unà
 cum Ludonico Collado præceptore doctissimo) sentio, has tres synocha
 febris differentias, habere quatuor tempora uniuersalia sensibilia.
 Cognoscuntur autem ex cruditate & coctione: principium enim est
 quando est signum cruditatis in calore, pulsu, & vrina. Augmen-
 tum, quando incipit coctio. Status, quando perfecta est, declinatio ve-
 rò cùm febris iam mute scit. Dices, si hoc ita est, qua ratione unam
 appellamus augescentem, aliam in eodem statu permanentem, & aliã
 decrescientem? Respondeo, quia hæc est propria constitutio huius febris,
 ut in declinante erit manifestum, in hac enim in principio humor
 multus facit obstructionem, ita tamen fluit ad eam ut minus fluat
 quàm dissipetur, hoc tamen, non tollit febrem esse in principio, idem
 dicendum in aliis temporibus. Quod autem hoc sit verum, colliges ex
 9. method. cap. 4. in secunda historia serui cuiusdam, qui synochon
 putrem patiebatur. Quem Gal. post secundam noctem vidit putres-
 centium humorum præbentem notas, unde queso Gal. desumit no-
 tas humorum putrescentium, nisi, ut iam diximus, ex calore, pulsu, &
 vrinis? Tum nonne quando humor putrescit, est cruditas? Adde in
 eadem historia inferiùs hæc scribere Galenum, itaque ad portionem
 minuētis se febris, vrinæ quoque concoctio præcesserat, eratque
 haud obscurum septimo finiendam. Sensim ergo procedebat con-
 coctio, in hac synocha post cruditatem, & ideo, quando in synochis san-
 guinem mittimus, in principio sensibili id præstamus.

Secundò secta basilica dextra.] Synochos febris non potest curari,
 nisi prius causa eam generantes auferantur, quæ sunt putre. o, probi-
 bita transpiratio, obstructio, & multitudo humoris. Ex his causis cùm

Tertia
 differen-
 tia.

Obiectio.
 Solutio
 medico-
 rum.

Refuta-
 tio solu-
 tionis.

Propria
 solutio
 & vera.

Obiectio.

Solutio.

Sectio
 vena.

DE CVRAND. MORB.

sit prima multitudo, ab hac incipienda est curatio. Hac indicat sui
 ablationem, qua fit per contrarium nempe euacuationem lib. 2. aph.
 sent. 22. Cum autem euacuatio possit fieri inedia, balneo, frictione,
 exercitatione, purgatione & sanguinis missione, de remedio euacuante
 in hoc effectu, hoc modo deliberabis. Plethora in syncho est magnus
 affectus: postulat ergo magnū remedium, qualia sunt inedia exercita-
 tio, balneum, frictio, & similia, qua ideo emittuntur. Remanent ergo
 duo remedia magna, purgatio, & sanguinis missio. Purgatio caret oc-
 casione, quia non est affectus eum indicans, remanet ergo sola sangui-
 nis missio, qua citò, & multum omnes humores potest ex toto corpore
 euacuare. Hac autē exercetur à Galeno aliquando, usque ad animi
 deliquium 9. meto. c. 4. sic & 6. epy. par. 1. com. 29. & aliis locis delibe-
 rans de ipsa ex affectu postulante talem euacuationem & prae-
 sentia virtutis. Affectus postulans est maxima plenitudo, qua maximam
 postulat euacuationem. Vires autem summae sunt: quia homo est car-
 nosus, & iuuenis, & ideo habet maximum pulsum: inde colliges, in his
 febribus synochis (cum ratione maioris & minoris differant) non esse
 necessarium mittendum sanguinem, usque ad animi deliquium, sed ani-
 mi deliquium esse terminū illius euacuationis, ita ut in summa pleni-
 tudine, non liceat ulterius euacuare, nisi voluerimus agrum interfice-
 re. Vnde videat Vallesius, qua ratione possit constare sua sententia,
 qua lib. 7. controuersiarum nititur probare, in febribus biliosis conti-
 nuis, etiam sanguinem mittendum esse, usque ad animi deliquiū. Pri-
 ma ratio, Gal. 2. aphor. com. 29. in ardentissimis febribus sanguinem
 mittit usque ad animi deliquiū: sed febris tertiana cōtinua est febris
 ardentissima, ergo in ea licebit talē euacuationem exercere. Secunda
 Gal. sanguinem mittit in hac febre, ut refrigeret, ergo & id licebit in
 tertiana continua, in qua intensior est caliditas, quā in syncho. Ter-
 tia ratio, in synochis Gal. copiose euacuat, ne humor propter feruorem
 in partem principē feratur: sed in tertiana continua magis feruet ca-
 lor quā in syncho, ergo licebit in ea propter eandem causam eua-
 cuare copiose, hoc est usque ad animi deliquium. Et cum possit aliquis
 ei obicere, in tertiana cōtinua deficere virium robur. Respondet se lo-
 qui non de ea tertiana, qua exquisita est, sed de notha, in qua vires
 possunt constare. Certē ego multum miror virum doctissimū nunquam
 aduertisse, has rationes nil concludere, neque ex quo affectu delibera-
 mus in syncho, de sanguinis missione. Nos enim ut Gal. & rei natura
 docent, in ea usque ad animi deliquiū euacuamus, indicatione sum-
 ma ex causa obstructionis, qua plethora est, nō ergo mittimus sangui-
 nem, ut refrigeremus, ut secunda ratio docet. Quod si ex tali euacuatio-
 ne sequatur corporis refrigeratio, & inde delectatio, id ex accidenti
 prouenit, non quod nos id instituamus efficere. Neque etiam sangui-
 nem mittimus, ne sanguis decumbat ad partem principem, ut ter-
 tia

ita ratio docet, verum est, ex hac sanguinis missione id aliquando prohiberi. Prima ratio nil concludit, quia et si Gal. scribat lib. 2. aph. in ardentissimis febribus, sanguinem esse mittendum usque ad animi deliquium. Quid intelligat per febres ardentissimas ipsemet explicat lib. 6. epy. & lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 11. & 9. methodi: in quibus locis agit de hac copiosa euacuatione, & solum meminit ardentissimarum, qua ex sanguine sunt, & quamvis id non scripsisset, nos ex natura rei debemus id colligere. Si enim hac tam copiosa & summa euacuatio, postulat magnam plethoram & summum virium robur, qua desiderantur in tertiana qualibet, quomodo licebit in ea summe euacuare? Quod si in tertiana notha sunt vires, ut vult Vallesius, non tamen summa, sed tales, qua poterunt ferre euacuationem, propter reuulsionem factam.

Tertio, potu magno.] Post sufficientem sanguinis missionem, qua cognoscas ex coctione, qua in urina apparere incipit, cum iam curata sit causa obstructionis ad hanc veniendum est. Curabitur obstructio suo contrario, quod est aperiens. Hoc varium est, decoctum capillorum veneris, cithorea, aut alterius similis cum oxymelle. Eligenda enim sunt aperiencia minus calida, quia qua calidiora sunt, augendo calorem humorum putrium, augebunt & putredinem. Aduerte tamen aperiencia medicamenta obstructionem curare, sanguinem fluxilem efficiendo, & motum ei tribuendo. Iam obstructione curata, ut possit putredo per conuenientes regiones expelli, utiliter exhibetur aqua frigida potus. Qui refrigerans partes ab intemperie calida languidas, eis robur addit, temperiem generando: haec autem roborata, putredinem expellere solent, per sudorem, urinam, vomitum aut deiectionem: aut simul multis ex his euacuationibus. Quod si ager iuuenis fuerit, & carnosus, astate media, natatio in aqua frigida commoda erit, qua corrigendo partium intemperiem, sudorem mouebit. Neque frigiditas densando poros cutis eam prohibebit, quia potius ab ea, ad mediocritatem reducentur, nimis dilatati a calore febrili, & aetatis. Quod si Hippocr. lib. 3. acutorum natationem in aqua frigida vitet in agrotis, intellige cum Galen. in illis agrotis, qui virium habent imbecillitatem. Dices, cur putredinem nos non euacuamus? Respondeo ad auferendam putredinem in viuentibus, nos expectare actiones facultatum naturalium, qua ratione in syncho separata parte putri a non putri, eam qua putris est, facultas expultrix euacuat, qua sollicita est de animalium salute, & proinde recte dicebat Hippocr. natura medicus, nos enim ministri tantum sumus. Iterum obijcies, diminute tradidisti curationem, quia prohibita transpirationem, qua etiam debet auferri, omisisti. Respondeo, consulto, id esse factum, quia, ut iam supradixi, prohibita transpiratio habet essentiam in fieri, & ideo curata obstructione cessare.

DE CVRAN. MORB.

Quartò concoquenti bilem.] Neque bilis eget preparatione, neque hic affectus pendet ex bile, cur ergo prepararet bilem, nescio.

Auctor Quintò, vacuantibus bilem. [Febris synochos, ex sanguine ortum taxatur. habet, & non ex bile, proinde non est quòd ea euacuemus. Vera est, si hac febris perseveret, sanguinis tenuiorem portionem mutari in bilem. & hanc febrem iam esse biliosam, quæ curabitur ea ratione, qua inferius videbis.]

De febre ardente. CAP. II.

Descriptio.

Ardens febris Latinis, caustos Græcis, est febris biliosa de genere continuarum: errant igitur qui cum Arabibus volunt à falsa pituita posse procreari: errant quoque qui cum iisdem ponunt discrimen inter ardentem febrem & tertianam continuam: quia neque à bile flava putrescente in venis, quæ a corde distant, fit, neque illa ab eadem bile putrescente in venis cordi propinquis tantum, sed (Galen. authore in variis locis, præsertim comm. 69. li. 4. aphoris. febris ardens eiusdem est generis cum tertiana exquisita intermittente, eò quòd ab eodem humore bilioso ambæ procreentur. Differt tamen ardens à tertiana exquisita, quòd in hac flava bilis per totum corpus fertur, in ardente autem febre ipsa

Causa.

bilis in venis una cum sanguine continetur. Omnia quæ bilem flavam procreant, efficere possunt febrem hanc, aer scilicet nimis calidus, alimenta acria & admodum calida, ut piper, sinapi, cæpe, allia, vinum vetus, & similia, & animi & corporis labores. Ex his enim flava bilis gignitur omni tempore, & ætate, præsertim æstate, & iuventute: à qua in venis putrescente fit ardens febris. His notis cognoscitur, lingua eorum qui hac febre laborant, arida fit, aspera & nigra ventriculi erosio, sitis intolerabilis, vigiliæ, capitis dolor, nonnunquam etiam delirium, moventur ferme semper ab una parte in aliam, ut animalia turgida & venere capta, & tumores turgidi, à quibus sæpè fit hæc febris. Quare deiectiones alui eis liquidæ, & pallidæ sunt, quamvis sæpe alvus dura sit. Pulsus celerimus, urina flava, & aliquando alba, quæ delirium futurum significat: fiunt aliquando surdi hi, & nonnunquam muti. Septem reme-

Curatio.

diorum generibus curatur. Primò victu tenui refrigerante satis & humectante, ut aëre in æstate parato, aqua rosata inspersa sæpe per totam habitationem, foliis etiam lactucæ, myrti, salicis floribus violarum, nenupharis, & rosarum, fuga anhelitus multorum, iræ, & aliorum, quæ calefaciunt. Nutriatur cremore hordei, succo granatorum, lactuca, præcipuè cum aceto & saccharo, cichorea, cucurbita, lacte amygdalarum dulcium, & quatuor seminum frigidorum, cucurbita saccharo condita, radice bulgossæ saccharo condita,

Nota.
Pachynos
significat
calor omnia
durans
significat
accidens
huiusmodi

condita, scapo lactucae condito saccharo, dicitur à Valentinis gorga daniel. Si sit æger imbecillus, nutriatur iure pulli cum lactuca in eo elixa, vel hordeo sine cortice: semper tamen habenda ratio eorum, quæ diximus capite præcedenti cum Hippocrate 17 aphorismo primi, & etiam eorum, quæ 8. & 10. Aphorismo eiusdem lib. docuit Hippocrates, in quibus habetur, in vigore morborum, & iuxta vigorem non esse cibum exhibendum, neque in his, in quibus vigor est omnis morbus, ut in apoplexia, vel maxima febre. At in aliis plus cibi esse dandam in initiis, & semper *Error facinorariū in victu.* versus vigorem minuendum, cuius contrarium consilium nostræ sceminae quotidie sequuntur, dant semper in morborū initiis parum cibi, & augent ipsum continuò usque ad vigorem, & ipsum sæpè augent, vel multum saltem præbent, quo errore non pauci ægri pereunt. Potus sit aqua hordei sine cortice solum. In prandio & coena, & cum julep violarum, & rosarum, & syrupo acetositis citri quacunque alia hora. *Potus.*

Secundò secta basilica dextra, si fuerint signa sanguinis, *Sectiones na.* rubedo scilicet totius, venæ magnæ & plenæ, vrina rubra & ætas florida, & robur virium. Cum verò in hac febre non apparent signa sanguinis, non est necessaria sanguinis missio: *An secanda sit vena in omni febre putrida.* sed purgatio bilis, neque in omni purrida febre est secanda vena, ut multi recentiores medici cum Gal. 11. meth. volunt. Nam non deprauato sanguine, primo vel secundo loco permixtionem vel corruptionem potius noceret, & ideo ipse Galenus libro primo de arte curatiua ad Glauconem cap. de curatione tertianæ exquisitæ, nihil de sanguine mittendo dicit: & post eodem lib. capite de tertiana notha: quòd si inquit, sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum, sed ab initio statim adhibita earum rerum quas scis distinctione tantum mittendum, quantum præsens exigit status: & capite de curatione quartanæ eodem libro, deinceps de quartanis dicemus, quas etiam ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullum acre medicamentum, aut euacuationem exhibentes, nisi sanguis fortè vehementer superabundans appareat, & si vena incisa is qui fluit niger videatur ac crassus, præcipuè verò in iis, qui liene laborant, huiusmodi cernitur. audaciùs mittendus est: quòd si tenuis, aut flauus extiterit, statim supprimendus: & postremo eodem libro cap. de curatione continuarum. Sanguinem verò, inquit, mittere oppottet, & ob morbi magnitudinem, & quibus multò plus ruboris insit, quàm naturæ conueniat, & maior quam pro consuetudine corporis tumor, & venæ eminentiores atque magis extensæ, his omnibus est auferendus, nisi vires,

DE CVRAND. MORB.

aut ætas, aut aliquid eorum, quæ supra commemorauimus, prohibuerit. Concludamus cum Gal. his in locis, sanguinem non esse mittendum in omni febre, quæ dependet ex putredine humorum. Huic libro est maxima fides adhibenda, quia scripsit in eo de febribus ex professo, & propriam disputationem de his tantum instituit, in methodo verò generalius omnia persequitur. Deinde librum hunc ad Glauconem scripsit, qui in philosophia & medicina diu multumque versatus erat.

Cur magna fides adhibenda lib. de arte curandi ad Glauconem.

Neque Galeni authoritas vndecimo methodi repugnat (vt diximus) huic nostræ, vel potius Galeni sententiæ & veritati, neque etiam commentarius 23. primi libri aphorismorum, vt aliqui recentiores medici censent, est contrarius nobis, in quo non docet Galenus omnem febrem ardentem indigere sanguinis missione vsque ad animi deliquium, nam non verum id est, nisi quando sanguis peccat cum bile. Cum enim sola bilis putrescit, sanguis nullo modo mittendus est: quia eius vacuatio simul cum spiritu & natuo calore vel mortem, vel maximum periculum induceret.

Si bilis turgat.

Bilis ergo putrescens in hac febre ardenti si sit turgida absque concoctione, & sine sanguinis missione vacuanda est hac, aut simili potione: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ. an. ʒ. ʒ. infusionis, ʒ. iij. rhabarbari in aqua endiuia per noctem factæ, diaprunis solutini ʒ. ij. ʒ. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus.

Potio. Potio diuini.

Vel si est diues: ℞. mannæ electæ ʒ. j. ʒ. infusionis ʒ. ij. rhabarbari in aqua endiuia factæ, iuris pulli gallinacei, decoctionis florum cordialium, quod satis est, misce, & fiat potus. Si fuerit pauper,

Potio. pauperi. Clyster.

fiat vacuatio per priorem portionem sine rhabarbaro, die sequenti, & omnibus diebus, dempto die euacuationis per medicamentata purgantia hoc, vel simili clystere alius lubricetur, ℞. foliorum maluarum, violarum, lactucæ, cichoreæ, & mercurialis an. m. j. furfuris, hordei sine cortice, quatuor seminum. f. m. conquassatorum an. p. ʒ. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. olei violarum ʒ. iij. sacchari rubri, & cassiæ fistulæ præparatæ. an. ʒ. j. misce, & fiat clyster. Si maxima fuerit caliditas febrilis, adde tro-

Epithema cordi admo- uendum Prepara- tio bilis non tur- gentis.

chiscorum be camphora ʒ. j. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum. an. ʒ. iij. olei papaueris ʒ. ij. Cordi à primo die omni hora admo-ueatur epithema aut simile: ℞. aquarum rosarum, & acetosæ. an. ʒ. iij. aquæ buglossæ ʒ. ij. aquæ melissæ, & aceti rosati. an. ʒ. ʒ. pulueris diamargaritonis frigidi, & trochiscorum de camphora. an. ʒ. ʒ. misce, & fiat epithema pro corde. Vnguentum cardiacum Gainerij, cuius descriptio continetur cap. præcedenti, sæpe cordi admo-ueatur tepidum.

Tertiò,

Tertiò, si materia biliosa non turgat, apparatus syrupo endiuia S. violarum, granatorum, endiuia compos. acetositatis citri, acetositatis limonum, nenupharis, de papauere cum duplo aquæ, vel decocti endiuia, cichoreæ, acetosæ, scariolæ, lactucæ & similia concocta hac bile.

Quartò, vacuantibus bilem, vt cassia fistularis, tamarindis, *Purgarhabarbaro*, & aliis dictis primo cap. lib. 1. ex quibus simpli- *tio.* cibus & compositis variæ & multæ sunt formulæ, vt ℞. me- *Potio.* dullæ cassiæ fistulæ recens extractæ, & medullæ tamarindorum an. ʒ. ʒ. infusionis ʒ. j. rhabarbari electi in aqua endiuia per noctem factæ, diaprunis solutiui ʒ. iiij. ʒ. syrupi violarum ʒ. j. decocti florum cordialium q. s. misce, & fiat potus. Die sequenti aluus leniatur, & lauentur intestina clystere descripto cap. præcedenti, aut simili, vel bibat ʒ. iiij. decocti hordei cum cortice cum vncia vna sacchari. Si omnino æger non possit bibere potum purgantem, vel eius ventriculus statim ipsum expellat, fiant boli, aut buccellæ, vt diximus capite superiori.

Quintò, refrigerantibus cor, iecur, & totum corpus in- *Alterat.* ternis & externis, vt potu aquæ frigidæ in magna quantita- *tio.* te, obseruatis omnibus, quæ diximus cap. præcedenti, tertio genere remediorum. Nam in hac febris ardenti utilior est & *Summen-* magis necessarius, & hac mixtura: ℞. conseruæ violarum, *da.* nenupharis, acetosæ & rosarum an. ʒ. j. conseruæ borraginis ʒ. ʒ. pulueris diamargaritonis frigidi, & diarrhodonis *Potus* Abbatis an. ʒ. j. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro *aqua fr-* coopertum, quo sæpe vtatur, præcipuè tempore sitis cum *gida his* aqua hordei: vel ℞. julep rosati, & violati. an. ʒ. iiij. syrupi *utilissi-* acetositatis citri ʒ. ij misce, & vtetur cum eadem, vel simili *mus.* aqua tempore sitis. Summo mane per aliquot dies accipiat *ra ad bi-* drachmas quatuor electuarij diatrion santalorum, vel diar- *berendum.* rhodonis Abbatis, vel diamargaritonis frigidi, cum pauca *Electua-* aqua acetosæ, vel cichoreæ, vel hordei, vel paucò vino albo *ria, &c.* benè diluto. Syrupus ex aqua, vel succo cucurbitæ valenter *Electua-* extinguit sitim & calorem febrilem. Hoc electuarium cor- *rium* roborat, refrigerat, & est suaue gustanti: ℞. sacchari dissolu- *suaue.* ti in aqua rosata ʒ. iiij. fiat electuarium in tabulis ponderan- *Confe-* ribus ʒ. iiij. si adderes pulueris margaritarum electuarum, & *lio car-* ossis de corde cerui an. ʒ. j. esset magis cardiacum, quod om- *diaca.* ni tempore est utile. Hæc enim confectio est bona, præsertim si cor afficiatur palpitatione, vel alio affectu, animi sci-

DE CVRAND. MORB.

*Aqua
cordi
admo-
uenda.*

*Hepati.
Obfer-
uatio.*

3.ij. pulueris diamargaritonis frigidi, & coralli rubri præparati ana. 3. j. foliorum auri numero iij. syrupi acetositis citri, q. s. misce, & fiat confectio. Dosis omni hora cochlearium vnum cum pauca aqua acetosæ, vel buglossæ. Admoueatur sæpe in die & omni tempore cordi epithema descriptum in fine secundi generis remediorum huius capitis, in æstate actu frigidum, & in hyeme tepidum: & bis in die admoueatur vnguentum cardiacum Gainerij, de quo capite præcedenti, aut simile. Hepati quoque bis in die admoueatur cerotum santalatum, vel vnguentum tepidum, & sæpe in die hoc, aut simile epithema: ℞. aquarum endiuix cichoreæ, & schariolæ an. 3. iij. aquæ absintij 3. ij. aceti albi cochlearium vnum, pulueris santalorum omnium, & pulueris diarrhodon Abbatis an. 3. j. misce, & fiat epithema pro hepate. Hæc non sunt admouenda hepati, nisi post vacuationes. Renibus, & spinæ admoueatur bis in die vnguentum, vel cerotum santalatum, quod habet vim refrigerandi.

*Corre-
ctio sym-
ptoma-
tum sic-
citatæ
& ni-
groris.
Confe-
ctio.
Doloris
capitis.
Vigilia-
rum.*

Sexto corrigentibus symptomata videlicet oris, & linguæ siccitatem, & nigrorem, capitis dolorem, & vigilias immodicas. Siccitas linguæ & oris, & nigror curantur continua ablutione facta aqua rosata cum paucis aceto rosato, vino albo, bene aqua diluto, lacte amygdalarum non decocto, & sine saccharo: humectantibus quoque, vt mucagine seminis psyllij & cydoniorum aqua rosarum extracta: & hac mixtura seu loch, quæ sitim quoque extinguit, sæpe & parum ex ea transglutiendo: ℞. mucilaginis seminis psyllij, & cydoniorum an. 3. ss. sacchari candri violati puluerizati 3. j. syrupi violarum q. s. misce, & fiat concoctio. Capitis doloris curatio tradita est cap. 3. primi libri, quamuis curata febre, illius causa curetur. Symptoma hoc, dolor scilicet, aliquando trahit ad se curationem ob sui magnitudinem. Vigiliæ immodicæ curantur, vt diximus cap. quarto prioris libri, emulsione scilicet seminis papaueris, syrupo papaueris, vnguento populeonis fronti admoto, & frotu seu lotionem tibiæ ex decocto foliorum arundinis, lactucæ, salicis, myrtillorum, corticum papaueris albi, & similium: & hoc potu sumpto hora nona, vel decima post solis occasum: ℞. confectiois Alkermes 3. ss. syrupi papaueris 3. j. ss. aquæ nenupharis 3. j. misce, & fiat potus.

Scholium.

*Febris
ardens
conditio
æ febr.*

ARdens febris. Latinis.] Febris causans, aut ardens, non est differentia febris, sed conditio. Illa enim febris dicitur ardens, quæ habet magnum ardorem, & inexhaustam sitim, 4. acut. sent. 17. & 1. epyd.

epid.com.1. Et ideò synochos, tertiana continua, tertiana intermit- Omnes
tens, & quartana continua, ardentes sunt. Dices nōne Hippocr. 4. cōtinua
acut. quandam causam ex pituita salsa describit? Respondeo verum ardētes.
esse, illum tamen ad eum, qui ex bile fit reuocari: quia ex lib. de mor-
bo & symp. omnis humor calidus biliosus est. Hoc cap. auctor de ter-
tiana continua disputat. Qua sicut & omnes alia continua, cum sy-
nocho conuenit in hoc, quod continua est tum in calore, putredine, &
obstructione. Differt verò ab ea, quia in synocho, obstructio fit à ple-
thora, ac tertiana continua ab humore crasso, aut glutinoso. Tum sy-
nochos caret accessionibus, non autem continua. Febres ardentes cu-
rantur, ea ratione, qua synochos: primò mittentes sanguinem: secundo
auferendo obstructionem: tertio putredinem: & quarto febrem refri-
gerantes. Curationem tertiana continua, de qua hic agit auctor, ex
sequenti capite (ubi agit de tertiana exquisita) etiam intelliges: quo- Curan-
niam amba sunt eiusdem generis, fiunt enim à bile, cum hoc tamen tur ar-
discrimine, quòd in febre ardente humor faciens febrem intra vasa dentes
manet, at in intermittente fertur per carnes, aut habitum corporis. sicut sy-
Solum duo hoc in loco explicare volo breuiter: Primum, An in febr- nochos.
bus continuis, sanguinis missio, in sola declinatione exerceri possit. Se-
cundum, An febris lenticularis appellata, propter symptoma, postu- An in
let particularem curationem. Vt ergo à primo exordiar, respondeo, in cōtinuis
febris continuis quocunque tempore accessionis, posse nos vtiliter sit mit-
sanguinem mittere, dummodo sit in principio morbi. Id confirmo hac tendus
ratione. De sanguinis missione deliberamus, ex affectu postulante in acces-
euacuationem omnium humorum, & absentia impediētiū. Sed in sione.
februm continuarum accessionibus, quocunque tempore illa duo re-
periuntur, ergo licebit in quocunque tempore sanguinem mittere. As-
sumptionem probo, quia in quocunque tempore accessionis prædicta,
est fluxio humorum ad focum, & robur virium. Imò melius est
tempore quo viget accessio, sanguinem mittere: quia tunc solent fluc-
re humores ad focum, in quo viget magis calor 11. method. Neque
est par ratio in intermittētibz, quia cū in his tempore accessio-
nis, humor à natura expulsus extra venas, si in habitu corporis,
sanguinis missione poterit remigrare ad venas, & ita ex intermit-
tenti fieri continua. Vnde cū in his habeamus prohibens, nempe mo-
tum natura contrarium, sanguinem mittimus tempore intermissio-
nis. Dices, Galenus lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 20. scribit, in ipso An fe-
die, in quo sanguinem mittimus, obseruandam esse inclinationem bris len-
febris (ut sta. im. addit) particularium circuituum declinationem. ticularis
Respondeo, loqui Galenum de illis febribz, in quibus sanguinis habeat
missio in hora circuitus propriam habet indicationem. Secundum propriā
explicemus, de febre lenticulari (quam Tauardilloca Castellani, & curatio-
nos Valentini vulgò appellamus, ob maculas in cute apparente nem.
similes

DE CVRAND. MORB.

similes pulicum mensibus) aliqui integros libros scripserunt, & ita postulabat integrum librum hac disputatio, in quo nil aliud faciendum erat, nisi errores in illis contentos refutare. Quidam enim hanc febrem semipestilentem efficiunt, hoc est ortam ex putredine, & venenato humore: & ideo esse contagiosam, & habentem periculosa accessientia. Alij hanc febrem non pestilentem, sed qua induxit naturam pestis appellant: & quod fiat à putredine, habente pravam qualitatem. Vnde omnes hi concedunt habere propriam curationem, tum propter maculas, tum quia sine alexipharmacis non cessat. Et ita quidam sanguinem mittunt ob plethoram, alij non ob virium imbecillitatem. Quidam purgant in principio, & alij non purgant. Quidam utuntur cucurbitulis, frictionibus, & sudorem mouentibus: alij bene utuntur cucurbitulis cum scarificatione, quia attrahunt ad cutem, & euacuant, non tamen sudorem mouentibus, neque urinam, quia hac cum sint calida, augent feruorem humorum. Omnes in principio utuntur alimentis frigidis & adstringentibus, quidam ob putredinem, quidam ob venenum, & alij ob seminarium, hoc est pravam qualitatem. Multi etiam in principio utuntur alexipharmacis ex margaritis, & aliis adstringentibus constructis. Non utuntur alio mento tenui, quoniam inquirunt à prauitate humoris statim vires debilitantur. Hanc & multam aliam varietatem videbis, qua ostendit eos ignorare morbum, & verem eius curationem. Breuiter ergo veritatem sic accipe. Hac febris continua est, quia à principio usque ad finem nunquam cessat: & putrida, ut ex calore, pulsu & urina conspiciamus. In eius principio solent apparere maculae, in cute, quae symptoma sunt in excretis. Non sunt autem exanthemata, quia non sunt tumores: unde reuocare eas poterit ad vitiliginem. Haec macula non sunt ob feruorem, ut Vallesius & alij sentiunt, nescio enim unde in hac febre feruor contingat, potissimum cum ipsimet ab humore crasso pendere scribant, sed sunt ab humore vi facultatis expultrici ad cutem delato, quia cum putredo sit in humore crasso, sua acrimonia irritat. Præterea hoc symptoma, cum non deiciat vires, neque augeat affectum, non trahit ad se curationem ac proinde contemnendum. Solum enim ex eo colligimus, morbum esse mali molis, hoc est qui fit ex inaequali humore, qui non ita facile coquitur. Non autem est signum putredinis venenatae, quia tunc hac febris multos interficeret: & excretionem veneni in cute videremus, quod non contingit, imò nulla sunt veneni signa. Dices, non est pestilens sed semipestilens. Quid mea, dicere febrem esse semipestilentem, est somnium & res ad libitum scripta: si enim putredo, quae facit febrem, habet venenum, nonne erit pestilens? huius febris putredinem appellat Mercado putredinem sordidam, quasi putredo sit ulcus. Neque in cute apparentes maculae, significant pravam qualitatem humoris

nobis

nobis incognitam, quia hac febris sine alexipharmacis ullis cessat. Iam si lenticula sunt symptoma, quod ad se non trahit curationem, cucurbitula, sudorifica medicamenta, frictiones, & alia nōne erunt inuutilia? In principio enim morbi si applicentur, aut adhibeantur augendo obstructionem putredinem etiam augebunt 8. method. Si in principio, quando apparēt, his non utantur, quid proderunt? Curanda ergo erit febris hac lenticularis, sicut alia febres continua. Primò vitum in ea insituentes habita ratione virtutis, & status morbi, absurdūque est, & prater experientiam affirmare, vires in hac febre statim in principio, à prauitate humoris debilitari, cum nos innumeros quos curauimus, decies aliquando, & plus in principio sanguinis missione euacuauerimus. Alimenta etiam adstringentia, quae exhibent, inspersa pulueribus ex margaritis & aliis lapidibus, & medicamentis adstringentibus maxime laedunt, obstructionem augendo. Iam statim in principio sanguis mittendus est, non ob plenitudinem, ut hi sentiunt, sed ut reuellamus humores fluentes ad focum. Sanguine misso, & curata fluxione, ad obstructionem veniendū est, eam aperientes attenuantibus medicamentis, constructis ex decocto borraginis, cicorei cum radicibus; capillorum veneris, cum syrupis capillorum veneris, borraginis, oximelle, & similibus. Aperta obstructione, si natura recte euacuat, nil est efficiendum: si verò non euacuat, aut diminutiue euacuat, tunc oportet purgare. Et tandem potius aqua frigida febris curanda. Vsus Alexipharmacorum nullus est, imò hac quocunque tempore nocent, quia sunt crassa, & obstruentia, neque habent in hac fibre qualitatem contrariam. Hac ratione curamus in hac Valentina ciuitate contemnentes lenticulas, ac si non essent, cum faelici successu: quia exercemus ea, quae rei natura docet, & experientia (quae in ciuitate multa est) confirmat. Neque mirandum est multos in Bethica regione mori, cum prauè curetur, imò tota medicorum curatio ex instituto videtur excogitata ad hominum perniciem. Quid de symptomatis in hac febre apparentibus? Hac febris cum sit continua pro varia corporis dispositione, modo phrenitim, modo lethargum, modo alia symptomata inducit, quae non solum in hac, sed & in aliis continuis febribus etiam euenire solent.

De Tertianā exquisita.

CAP. III.

EXquisita Tertianā, febris intermittens est, à sola bile flaua proueniens extra venas putrefacta, quare periculo caret, ut docent Hippocrates & Galenus Aphorismo 43. libri quarti, etiam si sit acutus morbus auctore Galeno comment. 20. libr. 3. cuius contrarium tradere videtur comment. 30. libr. 5. Aphor. in initio. Duplex est Tertianā sincera, prima

Definitio
Tertianā
exquisita.

DE CVRAND. MORB.

ma vnica, altera duplex: vnica verò est, cum tertio quoque die semel accessio fit. Altera duplex, scilicet ea cum bis accessio exquisitæ bilis fit, vel quolibet de solius bilis accessio apparet.

Causa exquisita tertiana. Signa tertiana exquisita.

Externæ causæ sunt similes causis febris ardentis, quamuis minores, Galeno autore commen. 59. libr. 4. aph. Vtraque à flaua bile fit, interna est bilis flaua mota per corpus totum, & extra venas putrescens, autore Galeno eodem commentario. Hæc tertiana exquisita statim ab initio in singulis accessionibus affert rigorem vehementem pungentem, ac vulnerantem: quia mouetur acris humor per partes sentientes, & in hoc differt ab ardenti febre, in qua non accidit rigor, nisi ante crisin bonam, vel malam: bilis quoque vomitu expellitur: Est in hac tertiana sincera ordo exactus, & æqualitas pulsuum, qui in augmento accessionum ad vehementiam, ac magnitudinem, atque frequentiam excitantur. In vigore sitim inuehit magnam, post calor æqualiter per totum corpus diffunditur, & primo contractu sentitur plurimus, ac mordax, & statim à manu tangente vincitur. Et fermè semper desinit cum sudore accessio, quæ intra duodecim horas terminatur: si verò diuturnior ac longior fuerit accessio, non est exquisita tertiana. Vrina eius similis, est vrinæ eius, qui febre ardente corripitur.

Curatio. Victus. Aduerte quando in accessione cibandus sit ager.

Curatur quatuor remediorum generibus. Primò, victu simili ardentis febris, per omnia ferè: quamuis hæc tertiana remissioribus egeat, & in ipsa accessione æger nullo modo sit nutriendus, Hippocr. autore aphor. 11. primi libri, nisi facultas esset imbecilla, aut natura ægri biliosissima parata ad hecticam, qua in re non solum est cibus dandus in ipsa accessione, sed in eius tempore deteriori, in statu scilicet. Præter hæc ante ipsam accessionem, saltem per septem horas est nutriendus, & post ipsam: semper tamen sequi oportet, quod docet Hippocr. aphor. 17. lib. in vigore tamen accessionis æger bibat copiosè aquam frigidam hordei cum syrupo violato, vel saccharo, præsertim si bilis sit concocta: sudore enim superueniente statim finietur accessio, & etiam totus morbus. Somnus maximè nocet in principio accessionum, & in augmento minùs, & in vigore forsan nocebit, in declinatione maximè iuuat, in qua si noceat, est signum lethale, cum Galeno com. 1. lib. 2. aphor.

Signum lethale.

Præparatio, Purgatio.

Secundò, apparantibus bilem, de quibus dictum est cap. superiori tertio remediorum & 1. c. primi libri.

Tertiò, vacuantibus bilem in die post accessionem quartam, quæ solet esse status huius morbi, præsertim quando finitur in septem circuitibus, aliquando vnico, vel duobus circuitibus

euitibus terminatur: intellige de vacuatione, quæ fit per inferiora. Nam in ipsa accessione non est facienda vacuatio ab arte, ne addamus laborem labori: per vomitum verò initio, & per sudorem in fine accessionum sæpe natura, & ars ipsam sequens solent euacuare. De medicamentis, quæ bilem purgant, simplicibus, & compositis dictum est cap. superiori quarto genere remediorum, & primo cap. 1. libr. & in multis aliis locis, præcipuè 1. 3. & 4. cap. primi libri.

Quartò, refrigerantibus, & corroborantibus cor, iecur, renes, & totum corpus, internis, & externis dictis quinto genere auxiliorum, cap. præcedenti: quamuis hîc paulò mitiora conueniant.

Aduerte.

Alteratio & corroboratio.

Scholium.

EXquisita.] *Tertiana intermittens, ex bile putrescente in loco obstructionis fit. Dico in loco obstructionis, quia bilis flaua tenuis cum sit, obstruere non potest: omnis enim obstructio ex Gal. fit à tribus causis, ab humore multo, crasso, aut lento. At bilis non potest esse multa, quia per multum Gal. 10. method. c. plethoram intelligit, quam bilis sola efficere non potest. Bilis etiam neque crassa est, neque glutinosa. Fit autem febris ex bile hac ratione, quando ab humore crasso aut lento obstructio est in aliqua vena, bilis adueniens perficit obstructionem, & cum ipsa abundet, putrescit non disflata, & hac ratione generat febrem. Est autem hac intermittens quia quando incipit putrescere bilis in foco putredinis, expellitur extra vasa per sentientia membra: ubi putrescit omnino, & facit accessionem, quæ ut plurimum sudore finitur. Dices, nonne bilis vitellina, & porracea possunt obstruere? Respondeo id concedendo, quia crassa sunt. Neque cum Gal. 1. de arte curatiua ad Glauc. scribit hanc febrem fieri ex concitata bile flaua, per concitatam bilem intelligit turgentem, sed bilem per habitum corporis motum. Signa februm putrium in genere habes lib. 1. de diff. feb. cap. 7. Signa verò Tertiana exquisita, lib. 2. cap. 3. & 1. de arte curatiua ad Glauconem.*

Bilis flaua non obstruit.

Obiectio Solutio.

Curatur quatuor remediorum generibus.] Si vires constant usque ad statum, tenui victu utere, ut ptisana. Quod si vires languidiores fuerint, victum augentes exhibebimus gallinæ pullum, aut gallinam. Post concoctionem crassiori victu utemur, (cerebellis suum, pedibus, carne porcelli & aliis, ut probe hominis substantia, quæ multum dissipata est) resartiantur. Tū quia hac alimenta facile corrumpi non possunt, imò qualitatem bilis retundunt. Quod si vires sint languida, misce cum eis quæ obstructiones aperiunt, malua utitur etiam Galenus lactuca, & atriplice, quæ frigida sunt. Quis utemur etiam

Victus.

ante coctionem decoctis cū pauco petroselino. Ex fructibus pira cocta cum pauco cinnamomo & saccharo optima sunt: pira enim refrigerant, cinnamomū adstrictionem corrigit, & saccharum aperit. Pruna etiam, & cerasa conceduntur, ex piscibus saxatiles: turdus, vilis, phichis, sparus. Vinum ante coctionem ob consuetudinem, aut ut sit aqua vehiculum concedatur, ac proinde debet esse paucum. Post coctionem liberalius dandum, quia urinam & sudorem mouet.

In ter- tiana apparantibus bilem.] In Teriana hi sunt affectus, calor, putredo, prohibita transpiratio, obstructio ab humore crasso, & fluxio humoris ad obstructionem: unde curatio debet incipere à sanguinis missione. Multi imò omnes affirmant, Galenum in libro artis curatiua omisisse sanguinis missionem, & incepisse à refrigerantibus, propter febrem, quæ magna est. Decipiuntur tamen, quia Galenus ibi etiam consulti sanguinis missionem, ut qui indicationes intelligit, videre poterit. Ibi enim postquam scripsit contrariorum contraria esse remedia, quæ quod superat reprimant, quod autem deest sarciant. Flaua autem bilis humor, omnium qui in corpore sunt humorum calidissimus ac siccissimus est, itaque exinaniendus est: hac Galenus. Si bilis est exinanienda, qua alia ratione quaso, nisi in principio sanguinis missione: & post coctionem purgatione? Dices in hac febre non sunt vires. Respondeo verum esse vires deficere ad euacuandum, non autem ad reuellendum. Quod si adeò imbecilles sint, ut sanguinis missionem non ferant, multum refrigerantibus utemur. Quæ acrimoniam bilis temperabunt, & sic retardabunt eius impetum. Ex Galeno enim 3. de san. tu. bilis cum impetu fluens perficere potest obstructionem, quæ si sensim moueatur, eâ extergit.

Obstru- Etio cu- ratur. Obiectio. Solutio. Secundò, apparantibus bilem.] Sedata fluxione humoris biliosi ad focum putredinis, quod ex coctione incipiente deprehendes: quo tempore iam incipit augmentum. Tunc non ad preparandam bilem, ut dicit auctor, sed ad curandam obstructionem veniendum est. Quæ curabitur syrupis refrigerantibus ob febrem, & aperientibus propter obstructionem, qualia sunt Syrupus endiuia, borraginis, acetositis citri cum decocto hordei, cichorei, borraginis & endiuia. Dices, in augmento non licet sanguinem mittere. Respondeo bene licere, quia tunc adhuc est fluxio, neque multum diuertimus naturam.

Purga- tio. Tertiò, euacuantibus bilem.] Aperta obstructione si natura non expurgat bilē, tunc eam purgabimus extra accessionem tamen, ne impediamus naturæ motū, qui ad externa fit. Considerare autem oportet motum humoris, qui si lateat, quia natura nullam tentauit euacuationem, tunc per intestina, per quæ solet communiter natura euacuare bilem, purgabimus. Per deiectionē purgat Galenus absinthio, quod deiectione, & per urinas optimè euacuat, obstructiones aperit, vètriculique os roborat. Per urinas purgat decoctum apij. Per sudorem

sudorem autem balneum dulcis aqua, quod humectat corpus, & excrementa, per habitum corporis euacuat; refrigerat etiam ex accidenti, euacuatis calidis excrementis.

Quartò refrigerantibus.] Si putredine euacuata intemperies aliqua calida remaneat in iecore, corrigenda est ea ratione, quæ docet auctor in fine capitis superioris: omitte tamen descriptionem cardiacam ibi descriptam, quia continet aurum & alia inutilia.

Refrigeratio iecoris.

De Tertianâ nothâ, seu spuria.

CAPVT IV.

Tertiana nothâ, seu spuria, est febris intermittens, quæ fit ex flaua bile vincente, & pituita pauciore: & hæc dicitur à barbaris maioris famæ: quia sæpius accidit: vel à bile flaua dominante, & atra bile pauciori, putridis extra venas, & per totum corpus: & hæc dicitur à barbaris minoris famæ, quia raro accidit. Externæ causæ sunt omnes, quæ bilem simul, & pituitam gignunt, vt de ipsa agamus, quæ magis accidit. Sed vincentibus causis bilem generantibus vide, quæ diximus capite 2. huius libri, & capite sequenti de quotidiana, & ex iis compara tecum causas: notæ enim mixtæ sunt, non simplices, vt in sincera, & exquisita tertiana, aut in quotidiana pura, & ideo incipit accessio cum rigore mitiori, & leuiori, quàm in exquisita tertiana: licet sit longior horror, sentiaturque frigus actu, à frigidis enim humoribus humor syncerus, & vehemens fieri nequit. Longius etiam principium est accessionis, quemadmodum omnia tempora accessionis & etiam totius morbi: nam excedit duodecim horas, & quantum maior est accessio, tantò magis ex pituita gignitur: & quantum longior accessio, tantò totus morbus longior: aliquando enim incipit tertiana nothâ initio autumnii, & finitur vere: exquisita verò longissima septem circuitibus iudicatur. Sitis in hac est minor, & sudor: quamuis aliquando ægroti sudent copiosè, quòd si frigidus sudor fuerit, maximam indicabit longitudinem. In ventre apparent obstructions, aliquando in hepate, & aliquando in splene. Quòd si in membris durities aliqua fiat, hydropem indicat imminentem. Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu refrigerante, & humectante magis, quàm calefaciente & exiccante, habita ratione multitudinis vtriusque humoris, quæ per signa cognosci potest, ideoque Galen. primo artis curatiuæ ad Glauconem optimè miscet parum piperis cum cremore hordei non nimis tenui, quia morbus hic diuturnus est, duratque multos

Descriptio.

Causa.

Note.

Curatio. Victus.

DE CVRAND. MORB.

Cibus. menses, aliquando sex: semper tamen nutriendus est æger extra ipsam accessionem vel in declinatione ipsius, nisi æger fuerit imbecillus, ut diximus capite præcedenti. Nutriatur ergo iure gallinæ teneræ, & carnibus arietinis cum hordeo excorricato, & paucis ciceribus nigris, vel radice petroselini. Nutriatur quoque carnibus ipsius gallinæ non solum elixæ, sed etiam affatæ, & pullo gallinaceo, coturnice, perdice, & hædo, & frusto aliquo cuniculi. In initio cœnæ comedat cappares sine sale, & cum saccharo, vel senationes cum melle, & aceto, vel folia raphani, & similia. In fine verò cortices citri saccharo conditos, vel nucleos pini conditos etiam saccharo, & similia.

Potus. Potus sit aqua cinnamomi, vel aqua ceterach, seu scolopendriæ Græcorum, non officinarum, quia est lingua ceruina, & phillitis Dioscoridis, quæ astringit. Quod si appetentior vini sit, debet album parari, vel rubrum tenuis substantiæ. Somnus in primis tribus temporibus accessionis magis nocet, quàm in exquisita tertiana. Motus & exercitatio extra ipsam accessionem moderata est utilis, & necessaria, saltem frictio totius corporis.

Horroris & frigoris ablatio. Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem, qui sua longitudine, & vehementia solet ægrum cruciare: ut pannis lini actu calidis partibus extremis admotus, & parti ei, quæ inter testes, & anum interiacet. Oleo ex camomilla, vel lilio, vel rutæ bene calido illis partibus admoto mederi possumus. Paucum vinum, si bibatur, curat hunc rigorem cum horrore: & si sit cum infusione trium radicum plantaginis erit efficacius remedium. Aliqui in hoc genere remediorum laudant tria hepata ranarum cum paucò vino. Quæ si in initiis trium accessionum sumantur, solent curare hos vehementes horrores, & rigores.

Potus vini sedat rigorem. Tertiò, secta vena cubiti dextra, si fuerint signa sanguinis (de quibus cap. 2. huius libri de febre ardenti diximus) sanguinisque copia extrahatur respondens plenitudini, naturæque ægri, inanito tamen ventriculo, & intestinis per hunc vel similem clysterem. ℞. foliorum maluarum, & folio. violarum nigrarum an. m. j. furfuris & camomillæ an. p. j. seminis carthami ʒ. ij. fiat decoctum, de quo percolato accipe ʒ. xv. in quo dissolve diacatholiconis ʒ. j. benedictæ ʒ. ʒ. olei violarum ʒ. iij. olei camomillæ ʒ. j. salis ʒ. j. misce, & fiat clyster.

Præparatio humorum. Quartò, apparantibus bilem cum pituita, quamvis habitatione pituitæ quantitatis, vel qualitatis sint vel augenda, vel multis diebus sumenda calida hac, vel simili forma, ut ℞. syrupi de bizantiis, & endiviæ composita an. ʒ. iij. rhodomellis

domellis ℥.vj. misce. Item ℥. aquarum capilli veneris, cichoreæ fœniculi, & endiuia an ℥. vj. misce, vel earundem rerum ℔. ij. Hæc sumantur per sex dies, vel si opus fuerit plures his, donec paratus sit humor: quamuis ob sui diuersitatem non vnica sed pluribus vacuationibus indigeat, semper præcedentibus concoctionibus multis.

Quintò, vacuantibus materiam mixtam ea bile vincente, & Purgapituita pauciori, vt ℥. diacatholiconis ℥. vj. diaprunis solutiui ℥. iij. diaphœnicis ℥. ij. rhodomellis ℥. j. decoctionis communis q. s. misce, & fiat potus. Vel ℥. pilularum aggregatiuarum ℥. iij. optimi diagridij ḡ. iij. cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Vel ℥. pilularum de rhabarbaro ℥. ij. agarici trochiscati ℥. j. optimi diagridij ḡ. iij. cum aqua borraginis fiant pilulæ septem, & aurentur. Aliqui hac notha tertiana affecti solo vomitu sunt liberati, vt vult Gal. primò de arte curatiua ad Glauconem, qui si sponte satis non excitatur, potest arte moueri, syrup. acetoso simp. cum decocto seminis raphani, & aliis similibus. Si tamen prior & vnica euacuatio non suffecerit, quemadmodum rarò in his nothis tertianis sufficit, iterum corroboratis ventriculo, hepate, & corde, & refrigeratis per ea, quæ dicemus sexto sequenti genere remediorum, est humor concoquendus syrupis, & mendicamentis iam dictis genere quarto præcedenti, vel hoc, aut simili medicamento: ℥. quinque radicum diureticarum, liquiritiæ an ℥. j. capilli veneris, ceterac. cichoreæ, endiuia, scabiosæ, absinthij, borraginis an. m. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe ℔. iij. sacchari ℔. j. syrupi de bizanriis, & endiuia compositi an. ℥. iij. trochiscorum de rhabarbaro ℥. ss. pulueris diarrhodonis Abbatis ℥. ij. pulueris, cinnamoni ℥. j. misce, & fiat syrupus non perfectè decoctus. Dosis vnciæ sex quolibet die. Et qualibet hebdomada semel, vel bis fiat vacuatio per has pilulas: ℥. pilularum de rhabarbaro, & aggregatiuarum an. ℥. j. fiant pilulæ xv. & aurentur, si non est pauper. Dosis tres. Si opus fuerit, adde cuilibet earum ḡ. j. optimi diagridij, vel si non amat pilulas, vel non potest ipsas transglutire, ℥. diacatholiconis ℥. ij. diaprunis solutiui ℥. j. diaphœnicis ℥. ss. agarici trochiscati, & conseruæ borraginis an. ℥. ij. rhomellis quod sufficit, misce, & fiat confectio. Dosis cochlearium vnum cum aqua absinthij, vel buglossæ.

Sextò, refrigerantibus iecur, & totum corpus internis, & externis, & aperientibus obstructions venarum meseraicarum, hepatis, & lienis, si fuerint quæ in hac notha tertiana sæpè reperiuntur, præsertim quando est longa: quamuis obstructio

DE CVRAND. MORB.

Obstru- curanda prius sit, quam vacuanda materia, imò sine eius
ctio prius curatione nunquam curabitur febris: apparente ergo obstru-
euranda, ctione fiat fons in ipsa & toto ventre inferiori ex decocto quin-
quã va- que radicum diureticarum, camomillæ, seminis lini, fœnugræci,
cuanda absinthij, præcedenti fons hoc, vel irrigatione facta spongia bis in
materia. die vacuo ventriculo vngatur venter versus splenem hoc vngu-
 ento: ℞. olei de capparibus, & amygdalarum amararum an. ʒ. j. β.
Vnguen- vtriusque dialthææ, vnguenti Aragon ana. ʒ. β. armoniaci disso-
luti spleni luti in aceto ʒ. iij. ceræ q. s. misce, & fiat vnguentum: adde pulueris
admonē- trochiscorum de myrrha ʒ. j.
dum.

Hepati laboranti obstructione admoueat hoc, aut simile
Hepati. vnguentum: ℞. olei amygdalarum amararum vnciam j. olei
 nardini ʒ. β. ceræ quod sufficit, misce, & fiat vnguentum. Et
 si opus fuerit vti non solum externis dictis, sed aliis, & internis
 ad has obstructiones necessariis, vide quæ diximus capitibus 42.
 & 45. primi libri. Curatis his obstructionibus, atque euacuata
 iam materia, refrigeratio, & corroboratio per electuarium
 diarrhodon Abbatis facto per aliquot dies erit utilis, & neces-
Refrige- saria, sumptis quolibet die drachmis quatuor cum paucis vino
ratio & albo aqua diluto. Et hepati admoueat hoc, vel simile vn-
corroboratio. guentum, ℞. vnguenti santalati ʒ. j. β. olei nardini ʒ. β. pul-
 ueris diarrhodonis ʒ. j. misce. Si ventriculus laborauit aliqua
Hepati. imbecillitate, ei admoueat hoc, aut simile vnguentum: ℞. olei
Ventri- de absinthio ʒ. j. olei laurini ʒ. β. pulueris gariophyllorum, cin-
culo. namoni, & rosatæ nouellæ an. ʒ. β. ceræ, q. s. misce, & fiat vnguen-
 tum. Et si opus fuerit, vide alia scripta c. 31. de imbecillitate ven-
 triculi libri primi.

Scholium.

Qua sit **T**ertiana nota.] Tertiana notha, aut spuria, potest fieri à bile vi-
tertiana tellina, qua crassa est, & hæc raro contingit: aut à permixtione
notha. humorum crassorum cum bile. Frequenter autem solet accidere ex
 permixtione pituitæ cum bile. Et ideo symptomata habet non bilis
 sincera, sed confusa & mixta, ut rectè docet auctor.

Victus in **P**rimò, victu refrigerante.] Galenus in lib. 1. de art. cur. in mor-
morbis. bis, inquit, victus ex morbi longitudine, & virium robore, virium ro-
 bur expulso cognoscimus: Morbi verò longitudinem, & breuitatem,
 ex humoris morbum facientis natura, & aliis symptomatis. Nam si
 humor sit pituitosus, longior erit morbus, quàm si sit biliosus. Tum si
 singulis accessionibus nulla fiat vacuatio, rigor sit exiguus, accessio-
 que perduret, signum est morbum esse longum: si contra res eue-
 niat,

niat, breuiorem. Si ergo vires sunt robusta, & morbus coctus difficilis, inedia conducet. Quia hoc victu nec morbus augebitur, nec vires concident, quæ ob robur sufficient, usque ad morbi coctionem quem vincent cum non impediuntur ab alimento. Quod si vires sint languida, & morbus facilis coctionis, utendum erit victu crassiori, quia etsi alimentum humorem augeat, cum facile coquatur, à viribus robustis vincetur. Hos duos modos solum adducit Galenus, quia ex his facile est tertium inuenire victum, qui in morbo contumaci, & viribus languidis imperandus est. Hic victus tertius mediocris esse debet: nec tam tenuis, ac in virtute robusta, nec tam crassus, ut in his, qui vires habent languidas, cum morbo facili coctu coniunctas. Corroborabimus ergo vires: sed non adeo ut malum augeamus, quod contumax est. Hinc colligemus quo victu sit utendum in hac tertiana, quem ex longitudine morbi, & viribus debemus instituire. Quod difficile est, posse exacte prestare, cum sint contraria indicationes, quæ ex morbo, & virtute sumuntur. Consulentes enim uni, alteri officimus. Quantum enim inedia morbo est utilis, tantum deicit vires, quas in hoc morbo oportet seruare, cum debeant longiori tempore laborare.

Secundò, tollentibus horrorem, & rigorem.] Radicem plantagininis proprietate valere contra rigorem, & horrorem, sentiunt multati: Quod ridiculum est, magis autem quod scribit auctor, de tribus menta hepatis ranarum, quasi duo, aut quatuor non possent prodesse, si contra verum esset facultate occulta agere, ita ut ex ipsis utilitas sequeretur.

Tertiò, secta vena.] In hac febre sicut in aliis putridis, supra dicti affectus sunt considerandi. Et cum indicatio à febre non urgeat: sicut in supradicta, proinde Galenus nullam mentionem fecit refrigerantium, & humectantium, incipienda ergo erit curatio ab obstructione fiente, siue ab humore, qui eius est causa. Hunc reuellemus mittentes sanguinem (etsi non sint signa sanguinis) si tamen vires constent. Dices, hac febris non est magnus morbus, ergo non licebit in ea sanguinem mittere, cum ex morbi magnitudine, & virium robore de hoc remedio deliberemus: Respondeo, verum esse, nos non mittere sanguinem propter magnum morbum presentem, sed propter alios morbos graues imminentes.

Quartò, apparantibus bilem.] Sanguine misso diuretica medicamenta propinabimus. Non quod velimus urinam ante coctionem mouere, hoc enim non est faciendum: sed quia diuretica aperientia sunt. Et ita propter obstructiones ea propinamus, dummodo non sint multum calida & sicca, ne febrem augeamus. Vtemur ergo syrupis his oxymelle simplici, syrupo endiuia composito, borraginis, fumiterræ, & aliis cum aquis quinque radicū, cichorei, borraginis. Si hac non sufficiunt potissimum hyeme & aliis temporibus in quibus humor con-

DE CVRAND. MORB.

**Apoze-
mata.** tumax est, uti poteris Apozematis: qua sunt syrupi longi ex syrupis,
**Absin-
thium.** aquis trochiscis & aliis compositi. Licet etiam uti syrupo de absin-
thio, aut decocto, nō ante septimum diem. Quia ante septimum diem
cruditates multa sunt in ventriculo, qua ab absinthio impingen-
tur ex 6. de sanita. At cū post septimum diem tenui victus ra-
tione, humores sint cocti, utiliter tunc absinthio utemur, quod robo-
rat interna viscera, & deobstruit. Coctione humoris iuvabimus
quiete, quia in hac calor non movetur ad externa, ut in exercitio.
Balnea. Fomentis etiam externis, ungentes iecur, ventriculum & lienem
oleo de absinthio ut calefiant, & roboventur. Balnea ante coctionem
inutilia sunt, tum quia in hac febre non est necessaria corporis hu-
mectatio: tum quia augent obstructiones: tum quia humores crassi
à balneo non poterunt euacuari. Post coctionem non adeo audacter
eo utemur ac in tertiana exquisita, propter dictas causas: semel ta-
men & bis ipsum concedemus, ut melius humores coquantur. Cly-
steribus fortioribus uti oportet ex chamemelo, ruta & aliis cum
agarico, aut diaphœnicone, & hiera.

**Purga-
zio.** Quinto, euacuantibus.) Rectè purgat auctor. Aduerte tamen,
**Vomi-
tus.** quod si materia impetum fecerit ad urinae meatus, tunc utendum
esse diureticis. Vomitus utilissimus est, hic tamen non est ciendus,
nisi nausea precedat. Facilius autem est post cibum vomere, quia
permiscentur excrementa cum alimentis.

De Quotidiana. C A P. V.

Divisio. **Q**uotidiana febris duplex est, altera intermittens, quæ fit à
Causa. pituita extra venas, & per totum corpus putrida, singulis
diebus aaccidens: altera sine intermissione, quæ fit à pituita pu-
trida in venis. Vtriusque febris causæ sunt alimenta pituitosa, ut
Signa. pisces herbae frigidae, legumina, & otium. Quotidiana intermit-
tens haud quaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed
temporis progressu, refrigeratio potius, quàm rigor occupat: &
quantò pituita est frigidior, tantò maior est refrigeratio. Qua-
re in ea, quæ ex acida, vel vitrea contingit pituita, erit maior,
quàm in ea, quæ ex dulci generatur. Pulsus, cū primū ac-
Pulsus. cessio fit, inordinatus est, & inæqualis, tardus, parvus, ac
debilis. Neque in augmento magnitudo, velocitas motus, &
Calor. frequentia quotidianæ accidunt: Calor illi non tam acris, ac in
tertiana, neque multum, ac crebro spirare compellit, sed anhe-
litus expirationes humidæ, fumosæ, & multum vaporosæ sunt.
Tardè ac ægrè accenditur, ac tempus longum consumit, dum
Urina. ad summum inualecendo peruenit. Non sitiunt ij, urinae al-
bæ, aquosæ, tenues, vel crassæ, aut turbulenta. Nullus sudor

in primis diebus erumpit, neque exacta quies apparet donec ad finem totius morbi deuentum sit. Spatium accessionum est decem & octo horarum, & quietis falsæ fæx. Has omnes notas, & plures alias scribit Galen. primo de arte curatiua ad Glaucodiana nem, & secundo de differentiis febrium, & secundo de crisibus. Sed quia Hispani, & qui habitant calidas regiones rarissimè his febribus exquisitis laborant, his prætermisiss ad curationem ipsam accedo.

Curatur quinque remediorum generibus. Primò, victu in- cidente, & extenuante, de quo capitibus septimo, & octauo, & aliis locis prioris libri dictum est, dummodò non nutriatur nisi in fine accessionis, & extra ipsam, nisi deficerent vires. Victus quoque non sit tenuis propter morbi longitudinem: nutriatur ergo iure columbi cum ciceribus, & radice petroselini, vel iure gallinæ cum eadem radice, & foliis raphani, vel perdice, vel turture & similibus cum pipere, cinnamomo, croco, & aliis aromaticis.

Potus sit aqua cinnamomi, vel radicis petroselini.

Secundò, corrigentibus rigorem, vel potius frigus oleis calidis spinæ toti admotis, vt rutæ, lauri, de lilio, de castoreo, & extremis apponantur panni bene calidi. Drachma vna theriacæ magnæ, vel mithridati, vel rubæ trochiscatæ cum paucò vino, decoctionis rutæ, saluæ, & abrotani est optimum remedium, in hoc præcipuè post 14. diem, & parum purgato corpore.

Tertiò, concoquentibus pituitam medicamentis dictis primo cap. & aliis de morbis pituitosis prioris lib. per 8. vel 10. dies.

Quartò, vacuantibus pituitam exhibitis tempore falsæ quietis: de quibus dictum est cap. 1. & aliis prioris libri. Aliquando est utilis vomitus in hac febre, præcipuè si natura indicauerit, quem decocto seminis raphani, & anethi cum oxymelle simp. poterimus prouocare.

Quintò, corroborantibus ventriculum, & hepar: vt electuario rosatæ nouellæ, aromatico rosato Gabrielis, theriaca magna, mithridato, conferva acori, sticados. Dosis horum est 3. vna vsque ad 3. ij. cum vnciis duabus, vel tribus aquæ vel decocti fœniculi, anisi, petroselini, melissæ, & similium.

Scholium.

Quotidiana febris duplex est. 1) Quotidiana febris à pituita putrescente ortum habet. Cuius signa lege apud Galen. libro secundo de diff. feb. cap. 4. In hac febre (putrida cum sit) affectus

DE CVRAND. MORB.

Signa. *superius cap. 1. explicatos, considerare oportet, ut recte curetur. De-*

Curatio. *bemus enim incipere à causa obstructionis, quæ est humoris fluxio.*

An in *An autem eam debeamus sanguinis missione auferre, nec ne, distin-*

quoti- *etione est opus. Si enim succi crudi in hac febre abundant, multum*

diana sit *sint, & paucus sanguis cum ipsis permixtus, tunc non licet sangui-*

sanguis *nem mittere, quia non constant vires. Quod si sanguis plurimus*

mitten- *sit, & humores crudi plurimum non excedant sanguinem mitte-*

mus. *mus: quia est robur virium. Sanguine misso, cum obstructio fiat ab*

Curatio *humore crasso, & glutinoso, in scindentibus, & urinam mouentibus:*

obstru- *(quæ vim habent aperiendi) utendum erit in primis diebus (ut ait*

etionū. *Gal. arcu. ad Glauco.) aut ut vertit Leonicens, post primos dies.*

Inter- *Acachia, Mena & alij primam lectionem sequuntur: nos secundam.*

pretatio *Quamuis enim utraque lectio tolerari possit, secundam tamen ele-*

loci Ga- *gimus, quia melius est primis diebus uti inedia, sic enim coquun-*

leni. *tur humores in ventriculo contenti, & hac ratione post primos dies*

Ventri- *melius attenuabuntur. Extenuantia quibus utendum est sunt*

culi ra- *oxymel, syrupus de stechade, rhodomel melioratum cum decocto fœ-*

zio ha- *niculi cichorei & similium. Circa statum opus est ventriculi (ubi*

benda. *pituita generatur) rationem habere, ita ut in ipso recte humores co-*

Quies. *quantur. Quietem ergo imperabimus, & exterius ungemus ven-*

Vnctio. *triculum corroborantibus, oleo irino, mastichino, de absinthio, nardi-*

no, & similibus: quæ calorem ventriculi augent, & ipsum constri-

gunt: quod post coctionem faciendum est, sicut & vomitus post co-

etionem mouendus, decoquentes semen radicle, & oxymel permis-

centes. Post humoris coctionem, eum purgabimus diaphanicone, hie-

ra & aliis. Victum ex cap. superiori institues. Aduerte tamen in

hac febre non esse multum calidis medicamentis utendum, quia ex

4. de san. tu. in his, qui cruditatibus laborant, eas ad venas dedu-

cant maiores.

De Quartana. CAP. VI.

Diffusio. **Q**uartana duplex est, quædam continua, quæ fit, ex atra bile putrescente in venis: altera intermittens, quæ fit ex atra bile extra venas, & per totum corpus putrescente. Et hæc duplex est, vna intermittens, quartana, cuius accessio accidit quarto quoque die, vel duplex, cuius duo circuitus fiunt in quinque diebus. Accessio primi respondet quarti diei accessioni, & secundi accessio quinti diei accessioni, tertius verò est dies quietis tantum. Cuius causæ sunt alimenta melancholica ut falsa omnia, carnes hircinæ, bubulæ, leporinæ, ceruinæ, cochleæ, legumina, animi & corporis labores immodici, & aliarum febrium longitudo, præcipue si fuerint sine ordine, & autumno. Hæc febris non

Causa.

Nota.

non statim, & primo die cum rigore vehementi, inuadit sed talis est, qualis iis, qui frigescunt gelu vehementi, Progrediente & adauēta febre vnā cum rigore augetur, inualescitque quotidie vsque ad totius morbi augmentum. Sensus rigoris non est pungentis, & stimulantis cutem, sicut in exquisita tertiana, sed inducentis algorem vehementem, & tanquam ossa frangentis. De differentia rigoris, tertianæ, & quartanæ vide Galenum 2. de differentiis febrium capit. 5. & 2. & de crisi- bus capit. 3. Et si vis scire, an frigidi humores rigorem efficere valeant, vide commentarium doctissimi Valleriolæ capit. 5. libro de symptomatum causis. Pulsus in ea sunt satis tardi, ac in principio accessionum rari, & duri, in augmento, & vi- gore sunt veloces, & frequentes: quamuis sic conferantur cum pulsibus febrium biliosarum, & sanguinearum, sint tar- diores & rariores: in hac enim paulatim humor veluti lapis, aut testa, aut os succenditur, & semel incensus diu conserua- tur. Quare longiores sunt accessiones, & morbus longissi- mus est, ferè semper durat vnum annum, aliquando duos, & quandoque duodecim annos scimus durauisse: atra enim bilis, vehementer resistit, & tardè mouetur: ægri cutis dura est, & densa, & tempus, in quo fit frequentius est inæquale, autumnus videlicet, vrinæ ægrotantium sunt tenues, albæ, & aquosæ.

Curatur sex remediorum generibus. Primò, victu humido, & *Curatio* parum calfaciente, vt iure arietis & gallinæ cum buglossa, & *Victus.* borragine, & aliis omnibus dictis capite nono prioris libri, *Qui cibi* dummodò æger sumat alimentum extra accessionem, nisi vires *vitandi.* deficerent. Cauendum est, ne sint alimenta flatuosa, & melan- cholica, vt legumina salsa, & alia similia his. Potus sit vinum ru- *Potus.* brum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ, dilutum aqua deco- ctionis radicis buglossæ. Utatur quiete corporis, & animi, & som- no. Bis saltem in hebdomade venter hoc, aut simili clystere lenia- *Clyster.* tur, & lubricetur: ℞. foliorum maluarum, mercurialis, borraginis & buglossæ an. m. j. epytimi ʒ. ss. furfuris p. prunorum damasce- norum paria sex, fiat decoctum, de quo percolato accipe libram vnā semis, cui adde diacatholiconis ʒ. j. confectionis medica- minis hamec, ʒ. ss. oleorum sesamini, & camomillæ, an. ʒ. ij. bu- tyri recentis ʒ. j. misce, & fiat clyster.

Secundò, si omnia fermè sanguinis signa adsint secta ve- *Sectio* na interna cubiti, dextri, & misso sanguine, qui plenitudi- *vena.* ni & viribus respondeat autore Galeno primo de arte cu- ratiua ad Glauconem: quamuis in hac longissima febre sanguis parcè est mittendus. Aliqui lienis venam secant in hac

DE CVRAN. MORB.

An secunda sit vena iecoraria sinistra. hac febre. Sauanarola vir doctissimus in ipsa coniunctione secatur iecorariam sinistram, & se multos laborantes quartana pristinae salutis restituisse dicit.

Concoctio syri. Tertiò, post tres menses ab initio febris concoquentibus, & apparantibus atram bilem, de quibus cap. 1. & 9. prioris libri dictum est. Sed propter tyrones: ℞. syrupi borraginis, & buglossæ, an. 3. vij. (syrupi de fumo terræ simp. & de epithymo. an. 3. iiij. syrupi de scolopendria, 3. iiij. misce: & ℞. aquarum buglossæ, borraginis, scolopendriæ, & capilli veneris an. vncias decem, vel decocti horum libras tres semissem.

Aque vel decoctum. Purgatio. Potio. Quartò, materia aliquo modo apparata vacuanda est hoc, vel simili medicamento: ℞. diasenæ, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ. an. 3. ss. pulueris epythimi, 3. ij. ss. decocti florum cordialium quod s. misce, & fiat potus, quem in secundo die quietis accipiat, si vnica sit quartana: si duplex, in die quietis, si verò continua, in die minoris laboris. Qui non possunt purgans liquidum bibere, vel statim ipsum euomunt, has aut similes pilulas hora consueta sumant: ℞. pilularum Indarum, & de fumo terræ an. 3. ss. optimi piagridij grana quinque, cum aqua buglossæ fiant pilulæ septem, & aurentur. Post debitam vacuationem propter siccitatem à pilulis relictam loco iuris sine sale, bibat vncias sex decocti fructuum & florum cordialium vncias duabus sacchari.

Admonitio. Sed quia hæc materia est heterogenea, & terrestris, non satis est vna præparatio, & purgatio, sed pluribus eget, dummodò inter eas corpus, & partes corroborentur medicamentis, quæ dicemus in quinto remediorum genere: hic tamen syrupus est optimus, & probatus in huius materiæ præparatione: ℞. pimpinellæ, buglossæ, borraginis, lupulorum, anam. ij. capilli veneris, scolopendriæ, absynthij, an. m. j. fiat decoctum: de quo percolato accipe ℞. ij. cui adde succorum sine residentia borraginis, endiuixæ, & fœniculi, an. ℞. j. succi pomorum redolentium ℞. iiij. sacchari, quod s. misce, & fiat syrupus. Dosis vnciæ tres cum aqua, vel decocto scolopendriæ, & borraginis. Post cuius vsum fiat vacuatio hoc, aut simili medicamento, ℞. cassiæ fistularis recens extractæ 3. vj. diasenæ, & confectionis medicaminis Hamec, an. 3. iiij. decocti florum cordialium facti in sero caprino addendo parum epithymi quod s. misce, & fiat potus. In hebdomada semel fiat vacuatio per hanc mixturam: ℞. diacatholiconis, diasenæ, an. 3. j. ss. confectionis medicaminis Hamec, 3. j. pulueris epythimi 3. iiij. conseruæ buglossæ. 3. vj. syrupi borraginis: quod

quod s. misce, & fiat confectio. Dosis cochlearia duo. Ali- *Confe-*
quando tamen initiis accessionum est conueniens vomitus ab *atio.*
arte factus, & à natura, quamuis hæc materia suo pondere *Vomitus*
aptius per inferiora expellatur, vt autor est Hippocr. 4.aphor. *lauda-*
propter causas nobis occultas graue ascendit, & leue descendit. *tur.*
Prius natura tentante bibat in initio accessionis vncias quatuor
decocti feminis raphani, & anethi cum vncia vna oxymellis,
vel infusionem, vel decoctum raphani cum virtute hellebori
in oxymelle simpl. factum.

Quintò, corroborantibus ventriculum, hepar, splenem, & to- *Corrobo-*
tum corpus, vt conserua buglossæ, borraginis, cortice citri *ratio.*
condito electuario rosatæ nouellæ, electuario diamargarito-
nis frigido. Dosis drachmæ duæ cum aqua aut decocto, vel
syrupo absinthij, vel de scolopendria. Hæc confectio est in *Confe-*
hoc genere optima, ℞. confectiois Gentilis contra melan- *atio.*
choliā, & conseruæ buglossæ an. 3. j. conseruæ borraginis & *Corro-*
corticis citri cum saccharo conditæ an. 3. ss. pulueris lætitæ *boratio.*
Gal. & lactificantis Rhasis, & rosatis nouellæ an. 3. ij. syrupi de
pomis q. s. misce, & fiat confectio. Dosis est omni hora cochlea-
rium vnum cum aquis melissæ, & buglossæ. Si splen laborat
obstructione, vel menses, vel hæmorrhoides suppressæ sint,
confidera, quæ diximus cap. 45. 52. & 56.

Sextò, rigorem & frigus curantibus, quamuis hoc sym- *Curatio*
ptoma ob sui vehementiam aliquando post secundum ge- *horroris.*
nus auxiliorum sit admouendum, præcipuè mitioribus re-
mediis, vt pannis benè calidis in initiis accessionum patti-
bus extremis sæpe admotis, & spinæ similiter, madefactis
oleis de lilio, de ruta, laurino, & de castoreo. Drachma vna *Vis the-*
theriacæ magnæ, vel mithridati cum paucō vino optimo *riacæ*
curat rigorem, & frigus, & quandoque ipsam quartanam, *magna*
maximè post debitam purgationem. Curat similiter hoc *& mi-*
symptoma, & ipsam quartanam drachma vna pulueris se- *thridati.*
minis hypericonis, vel pulueris mille folij cum paucō vino
optimo. Eandem vim habet drachma vna assæ foetidæ. Hæc
mixture est optima in hoc: ℞. pulueris assæ foetidæ, piperis
longi, rutæ siccat an. 3. ij. mellis quod s. misce, & fiat confectio. *Confe-*
Dosis drachmæ duæ cum vino optimo, vel aqua roris mari- *atio.*
ni, vel saluæ. Hic puluis est in hoc genere optimus. ℞. bac- *Puluis.*
carum lauri 3. j. zinziberis, & radicis gentianæ an. 3. ij. mi-
sce, & fiat puluis. Dosis scrupulus vnus cum vino albo opti-
mo. Rigor, frigus, & alia cum quartana curantur, præsertim
si extrema pannis, regulis, & lateribus ignitis calefiant, & *Vnguen-*
dorsum hoc vnguento benè calido vngatur: ℞. theriacæ ma- *tum.*
gnæ

DE CVRAND. MORB.

*Cura-
tiones
varia.*

*Vnguen-
tum.*

*Admo-
nitio.*

*Vis ti-
moris.*

gnæ ʒ.ij. gariophyllorum, spicæ nardi an. ʒ. j. ʒ. olei antiqui, & optimi vini an. ʒ. ij. ʒ. omnia prunis imposita vase aliquo ferueant. Vnguentum Aragon in hoc genere laudatur. Quidam in hoc genere laudant drachmam vnā pulueris cranei humani cum vino optimo. Alij experientia longa curabant simul rigores, & quartanas succo plantaginis, & aqua. Multi liberati sunt à rigore, frigore & quartana hoc medicamento: ℞. mithridati ʒ. iiij. succi plantaginis ʒ. ij. misce. Hoc auxilium ter in principiis accessionis exhibitum curat rigorem, frigus, & quartanam: ℞. succi radicis thapsi barbati, & vini albi odoriferi an. ʒ. ij. misce. Expertum medicamentum in hoc genere est vnum os de corde cerui redactum in puluerem cum paucō decocto dictami, saluæ, camedreos, & camepircos. Puluis ossis leonis curat rigorem, & frigus quartanæ, vt quibusdam placet. Granum vnum musci cum vino est in hoc genere optimum, præsertim si naribus & ori ad-moueatur oleum rutæ. Hoc vnguentum est valentissimum in hoc genere: ℞. pulueris castorei, theriacæ magnæ an. ʒ. v. myrthæ, olei laurini an. ʒ. iiij. mellis despumati lb. ʒ. misce, & fiat ad modum vnguenti, quo initio accessionis vngantur plantæ pedum, volæ manuum, tempora, frons, & pulsus, & nares: sit bene calidum, bibat drachmam vnā rubræ tinctorum cum vino optimo. Succus calamenti, si bibatur ante accessionem, curat quartanam: animaduerte tamen, ne hæc nimis calida ante euacuationem exhibeantur, ne ex vna fiat duplex, vel ex intermittente continua. Timor magnus ab inimicis incussus curauit quartanam vnus anni. Quidam initio accessionis in flumen deiectus curatus fuit: quidam etiā subito, & præter spem audiens tonitru artificiale à quartana liberatus est, hoc tamen prudenter fieri debet: nam etiā si gaudium magis possit interficere, quàm timor, tamen ipse timor magis, quàm ira, quæ nullo modo potest occidere hominem, autore Galeno.

Scholium.

*Focus in
quarta-
na.*

Quartana duplex est.] Cum lien humore melancholico nutriatur, ipsum ex iecore attrahens, non est mirum, si quartana (quæ ex humore melancholico generatur) in venis lienis habeat focum, & principium. Signa quartana intermittētis, de qua hic agimus, pete ex lib. 2. de diff. feb. cap. 5.

Secundò si omnia fermè sanguinis.] Ex Galen. lib. 1. de arte curatiua ad Glauc. quartanas ait per initia esse blandè tractandas.

Nullum

Nullum enim medicamentum vehemens exhibendum est, quia hoc Inter-
tenuis humoris capit, & reliquum incrassat. Neque vacuandum est, preteratur
nisi sanguis admodum exuperet. Vbi per exuperantiam sanguinis locus Ga-
non est quod intelligamus plethoram, quæ in his, qui quartana la- leni.
borant, non reperitur, sed in hominibus carnosiss, & multo optimo
sanguine abundantibus intelligimus: ergo per abundantiam sangui- Sanguini-
nis, multum sanguinem melancholicum in venis contentum. Quan- nis mis-
do enim talis extat, sanguinem mittimus in principio propter cau- sio.
sam sæpius dictam, quæ est fluxio humorum ad focus putredinis. Sanguini-
Quod si sanguis secta vena egrediens flavus sit, tunc non est mit- nis mis-
tendus sanguis, imò sistendus: quia cum is, qui in venis continetur, sio ex
non sit melancholicus, signum est, ipsum non augere obstructionem, quæ ve-
neque eius fuisse causam: imò ipsum oportet servare, ut iuuet humo- na.
ris frigidi, & crassi concoctionem. Sanguinis missio exercenda est ex Medica-
brachio sinistro semper & ex basilica, si apparet propter rectitudi- menta
nem venarum, & natura. quibus

Tertiò post tres menses.] Gal. in quartana utitur medica- Gal. at-
mento, quod diatrion pipereon appellant, & diaspolitico appellato. tenua-
Hæc ad extenuandos crassos humores exhibentur, compositiones eo- bat me-
rum 4. de san. tu. scribit, ubi diaspolitici medicamenti duas, tradit lanch-
compositiones: Vnam, quæ magis mouet aluum, in qua par est portio liam.
nitri & aliorum medicamentorum: Alteram vero ad magis atte- Prapa-
nuandum, quæ minorem habet nitri portionem. Nos non solemus his ratio
medicamentis attenuare melancholicum succum, sed syrupis de fu- melan-
moterra, borraginis, endiuia cõpositi, de bizantiis & aliis. Cum de- cholie.
cocto fumi terre, radicis capparis, borraginis, tamarisci & similibus. Purga-

Quartò materia.] Coctione absoluta quando iam non est obstru- tio.
ctio, purgandum est ea ratione, quæ docet auctor. Vomitu possumus Vomitus
etiam purgare post cibum, & sic si nil obstat vii possumus helleboro cum hel-
albo cum Gal. decoquentes ipsum cum raphano, & præbere rapha- labore.
num: hæc enim ratione ipsum propinabant antiqui, facta prius to- Theria-
tius corporis preparatione, humectantes ipsum cibo, potu, quiete, & ca An-
balneo. Nam qui ipsum aliter propinant, ex instituto interficiunt. droma-
Iam si vomitionibus non sit assuetus ager potius oportebit per in- chi.
ferna purgare quàm helleboro. Andromachi theriaca rectè purgat Medica-
hunc humorem. Vtitur etiam Gal. medicamento ex succo cyrenaico. mentum
Cuius compositionem tradit libro de rigore, fit enim ex succo cyre- ex succo
naico & castoreo. Quo medicamento utemur perfecta coctione, & cyrenai-
facta purgatione, quando aliquid humoris remanet, repetentque co-
paroxysmi, neque liberatus est homo à febre. Ab hoc enim medica- Quibus
mento quod relinquitur humoris attenuatur & expurgatur. vitur

Quintò corroborantibus.] Antè coctionem frictionibus, exerci- Gal. an-
tationibus, & balneis utitur Galen. Frictiones non debent esse te coctio-
fortes, sed pingues. Exercitationes non vehementes, balnea pauca nem.

DE CVRAND. MORB.

aut quod melius erit, nulla. Salsamentis etiam utitur, quæ sunt tres sale condita, multa enim sale condiebant veteres, ut asparagos, & alia arborum germina. His ergo utendum ob tenuandi vim quam habent: nam aliter sal crassarum est partium, & ideo probatur in quantum condimentum est. In morbi vigore, quies imperanda, & viscera fouenda ungentes lienem oleo de absinthio, de capparibus radicum tamarisci, & similibus, unguento etiam marciaton, & de agrippa, vel decocto radicis brionie, quæ maximè attenuat, vel oleo, in quo radices capparidis, aut thamarisci sint decocta. His humor melancholicus maximè attenuabitur.

Medica-
menta
quadam
dam-
nantur.

Sextò rigorem.] Hac symptomata, si fluunt refrigerato corpore ab humore, & à retractione sanguinis & spiritus ad interna, quid faciet cranium humanum, succus plantaginis, os de corde cervi, aut os leonis?

De Febribus compositis

C A P. VII.

Difficilis est descriptio febrium compositarum, difficilior earum tantum cognitio, quod docet Galen. i. de arte curatiua ad Glauconem, dicens: Paucae febres sunt, quæ ad sui dignotionem exquisitam die quarta indigeant: difficillima curatio, sua enim contraria natura, & longitudine hydropem, vel hecticam efficere solent. Sed antequam de iis verba faciam, prius oportet scire tertianam notham non esse adnumerandam inter has compositas febres, quamuis ex bile, & pituita constet: quia seruat motum bilis vincentis, siue sit vnica forma simplex actu, & potentia duæ, siue non. In aliis autem compositis, ut in hæmitritæo sunt duæ, vel plures formæ humorum actu, vel saltem hæ non seruant motum vnius humoris proprium. Harum compositarum febrium infinitæ fermè sunt species, quàm in primis omnia earum genera possint componi, & omnes etiam ex humoribus genitæ cum aliis, ut hectica putrida, & biliosa cum pituitosa, & melancholica: sed quia omnium complicatio, confusio, & compositio in præsentia non est tradenda, ne noster sermo prolixior fiat, tantum agam de febris tertianæ, & quotidianæ compositione, cuius quatuor sunt complicationes autore Galen. capit. 7. lib. 2. de differentiis febrium & capit. 9. libr. 2. de crisi. Vna, quum tertiana, & quotidiana commiscantur, altera, quando tertiana intermittens quotidianæ continuæ coniungitur, & hæc propriè semitertiana dicitur, & hæmitritæus: tertia, quando quotidiana intermittens tertianæ continuæ miscetur: quarta, vbi quotidiana tertiana tertianæ continuæ coniungitur: semitertiana (au-
tore

Diuisio.

tore Galeno commentario de typis) alia est exigua, alia media,
 alia magna: prima spatium 24. horarum vertitur, secunda 36. ma-
 gna verò 48. quæ & continuæ febrim propinqua est. Quidam vo-
 lunt tres esse differentias, seu species hæmitritæi, maiorem sci-
 licet, minorem & medium ponentes, apud quos maior est,
 quum continua biliosa, intermittenti melancholicæ coniungi-
 tur, minor quando biliosa continua quotidianæ intermittenti,
 medius, quando biliosa intermittens quotidianæ continuæ. Ha-
 rum febrium causæ, & signa ex notitia simplicium febrium
 cognoscuntur, similiter & curatio. Considera itaque dicta ca-
 pite de tertiana notha: nam eo ordine & ratione, qua cogno-
 scitur & curatur illa, cognoscetur, & curabitur quæcunque
 alia febris composita: semper tamen formidandus est exitus ha-
 rum febrium tanquam suspectus, & maxime periculosus, præ-
 cipue quando febris melancholica aliis coniungitur. Multos
 tamen laborantes hæmitritæo siue semitertiana sanavi post va-
 cuationes factas pilulis de rhabarbaro, pilulis aggregatiuis, vel
 confectione diaphœnicon, præcedenti longa concoctione, &
 post auxilia interna & externa obstructionibus hepatis & sple-
 nis vtilibus remediis, nimirum confectione ex testudine & sy-
 rupo, quorum hæ sunt descriptiones. ℞. carnem vnius testu-
 dinis benè coctam cum aqua hordei, pulueris electuarij re-
 sumptiui ʒ. ss. cinnamomi electi ʒ. j. medullæ passularum, gra-
 norum pini, in aqua rosarum calida prius infusorum, & amyg-
 dalatum dulcium sine cortice an. ʒ. ss. sacchari dissoluti in
 aqua buglossæ q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus
 Christi. Dosis quolibet die summo mane vncia semis cum vn-
 ciis quinque huius syrupi. ℞. mellissæ borraginis, cichoreæ ab-
 sinthij ceterach. capilli vene. rostri porcini, scariolæ an. m. j.
 quinque radicum diureticarum, radice buglossæ, liquiritiæ
 an ʒ. j. fiat decoctum, de quo percolato accipe libras octo, sac-
 chari libras quatuor, trochiscorum de rhabarbaro vnciam se-
 mis, diarrhodon Abbatis ʒ. ij. misce, & fiat syrupus non per-
 fectè decoctus.

*Causæ,
signa, &
curatio
unde pe-
tenda.
Quibus
remediis
curantur
autem
febres.*

Scholium.

Difficilis descriptio.] Qui rectè cognoscit febres simplices, &
 methodum eas curandi, non ignorat, neque ignorabit compo-
 sitarum febrium curationem.

De Hæctica. CAP. VIII.

B Hæctica

DE CVRAND. MORB.

*Descri-
ptio.*

Hectica febris est, quando calor præter naturam non solum in spiritibus & humoribus, sed in partibus etiam solidis consistit, neque pendet ab humorum putredine, neque à calore spirituum, estque fixus ac confirmatus difficulterque soluitur, quemadmodum habitus. Fit ferme semper sensim, & longo tempore, ideoque non sentitur, ut inæqualis intemperies: rarò tamen ob patientis affectionem, & agentis vehementiam, fit subito, & rarius non præcedentibus diaria & humerali febre, ut contingit in fulmine consumente ferrum intacto corio, & lana. Mœror ergo, ira, lassitudo, ieiunia, febres ardentes, & omnes diurnæ febres hecticam generant.

Signa.

Initio difficulter cognoscitur, quæ in marasimum incidit, cognitu facillima est. Quare hectica quum cognoscitur, curari non potest. Quando verò est sanabilis, est incognita, ideoque non esse tres hecticæ species affirmo, ut Ara-

*Error
Arabū.*

bes & alij non pauci voluerunt: neque etiam quatuor humiditates cum Avicenna pono, nempe nomen non habentem, rorem, cambium, & gluten, ob quarum consumptionem tres species constituuntur. Gal. tamen 7. Methodi quatuor siccitatis differentias recenset, à quibus forsan Arabes, & alij multi iuniores occasionem arripuerunt diuidendi hecticam in tres species: nos tamen cum Gal. duplicem esse tantum credimus, primam fixam inhærentem partibus solidis, quæ omnes corporis humores calfacit, alteram, quæ hectica marasimodes, aut simpliciter marasimus nominatur. Hæc omnes corporis partes colliquat, & consumit, omnemque curationem respuit, ut diximus, cuius signa notissima sunt: alterius verò notæ deprehenduntur, ex calore tantum percepto à cibo & potu per duas horas: nam quemadmodum aqua calci infusa calorem excitat, ita cibi & potus humiditas à partibus solidis calorem occultum mouet, & elicit. Totius corporis siccitas, & ariditas & sordes in ipsis aridæ apparent, pinguedo in excrementis quoque videtur, & totius corporis extenuatio: non illa maxima, quæ in marasmo spectatur. Pulsus tenuis, durus, debilis & frequens, & velocior est, qui augetur adhibito cibo, calorque, ut diximus, incenditur. Caliditas cum primum manus admouetur, debilis est, paulò post acris, & rodens erumpit: acriorque sentitur, quum diutius arteriam tetigeris. Si verò his præsentibus notis ventris profluvium superueniat, & pili defluant, mors propinqua est.

Curatio.

Victus.

Aër.

Hectica febris priusquam ad tabem deueniat, omni conatu curatur refrigerantibus, & humectantibus. Primò aëre arte parato (si naturalis reperiri non possit) violis, nenuphare, rosas,

rosis, aqua rosata, foliis salicis, lactuca & similibus. *Cibis Cibus.*
 boni succi & facilibus concoctu, & paucis, præcipuè glutinantibus, qui substantiam difficilem dissolutu generant, quales sunt pedes animantium, præcipuè suilli vnius anni, & ranæ, testudines, cancri fluuiatiles, & limaces: hi tamen egent præparatione: quamuis limaces inter alimenta, quæ attram bilem generant, à Galen. numerantur, ideoque à multis eorum aqua, & ius magis laudatur. Modus præparandi tradetur. Nutriatur ergo iure gallinæ, & cremore hordei, & iure arietis. Nutriatur etiam pullo gallinaceo, gallina tenera, perdice attagene, coturnice, turture, cuniculo paruo, vitulo assatis & elixis: ouis recentibus sorbilibus, piscibus paruis & saxatilibus, & anguilla, quæ in salubri aqua vixerit, si benè coquatur, eius tamen aqua est tutior. Lac laudatissimum & optimum alimentum est, nisi adsint, quæ eius vsum impediant, de quibus cap. 29. præcedentis libri de tabe: & hoc etiam cap. de his copiosius agetur. Et quia ob morbi longitudinem omnes ferme hectici carent appetitu cibi, oportet aliqua auxilia cap. 34. superioris libri in medium adducere, præsertim quæ huic feбри non nocent, quales sunt succus malorum granorum acidulcium cum saccharo, & pauco cinnamomo, succus agrestæ, succus acetosæ. Alimentum *Leucophagū.*
 etiam, quod fit ex oriza, pectore gallinæ, lacte caprino, (dicitur *manjar bianco*) vtile est. Aliquando in iis, atque aliis grauissimis morbis cum Hippocrate libr. 2. aphorismorum cibi mali præponuntur bonis, & ideo senex Rhases 10. ad Almanforem cap. de hectica præbet infirmis huiusmodi cibum ex hepatibus auium, ouis, croco & aceto simul frixis: laudat etiam intestina quadrupedum plena carnibus, quæ *Leucanice.*
lucanice dicuntur, à nostris *longanizas*. Fructus, qui huic feбри conferunt, sunt pruna damascena, vux præsertim per aliquot dies suspensæ, acida cerasa, quæ dicuntur guindas, mora parum matura, mala punica acidulcia, & melones aliqui molliores, scilicet qui pepones dicuntur, & à barbaris bathecæ refrigerant, humectant, & prosunt satis, nisi humida cum hectica coniungatur. Herbæ & olera bona sunt, vt lactuca, portulaca, cucurbita, borrago, spinachia & similia. Si æger *Si æger sit multum imbecillus.*
 sit multum imbecillus, nutriatur rebus liquidis, vt iure optimo gallinæ & testudinis cum cremore hordei, vel emulsione quatuor seminum frigidorum maiorum, vel succo acetosæ, vel agrestæ. Succus carniū refrigeratus aliqua ex rebus supradictis, & mixtus iuri optimus est, & maximè nutrit: aqua tamen carniū est concoctu facilior, maximè citissimè-

DE CVRAND. MORB.

que nutrit : sed eger hæc aqua carniū refrigeratione , facta per ius , & alia superius dicta , ne calor febrilis augeatur.

Aqua carniū Fit aqua carniū hac ratione. ℥. pectus vnius gallinæ iuuenis , & pectus vnius capi, diuide in partes minutas , deinde *Eius præparatio.* laua eas aqua rosata & buglossæ , vel malorum cydoniorum, si sit ventris profluuium , & filo suspende omnes has partes in vase vitreo patuo , cuius os bene occludatur massa , post imponatur prædictum vas vitreum ollæ semiplenæ aqua feruenti , donec aqua exprimatur à carnibus supradictis. Observandum tamen est , ne carnes admodum siccatae (à quibus omnis aqua per resudationem extracta fuit) ad se ipsam trahant. Huius aquæ quinque vel septem cochlearia præbenda sunt cum iuris pari quantitate , sexta quaque hora. Aliqui Medici satis eruditi & probari in maxima virium resolutione laudant aquam distillatitiam ex sanguine hominis iuuenis . & perfectè sani , dummodo extrahatur , cum primum fluit à vena secta & instrumento vitreo , & paucò igne. Quia superius diximus alimentum frigidum & humidum , glutinosum esse vtile , & necessarium hecticis , vt ex testudinibus , cancri fluuiatilibus , limacibus , & anguillis , de his omnibus , & horum præparatione verba facienda sunt. Nam anguilla genita ex putredine , vel per coniunctionem serpentis cum anguilla , est pessima , & si sequenti præparetur forma iuuabit multum. Diuisa ergo anguilla prius semota eius pelle , & bene lota aqua rosata salita imple eius carne præparata ventrem gallinæ iuuenis , & post cum sufficienti quantitate aquæ , & paucò hordeo excorticato concoquatur aqua , & anguilla , fiat aqua per distillationem instrumento vitreo , & igne paucò. Dosis vnciæ duæ cum paucò saccharo. Multi medici eruditi ex testudinibus , limacibus , & ranis parum decoctis cum herbis frigidis & humidis aquam per distillationem extractam non minùs , quàm factam ex anguilla , & anguillam laudant in hac febre. Cancris fluuiatiles ex bona aqua electi vehementi lotione egent cum sale , furfure , & cineribus : deinde si aqua dulci luentur & ex hordeo excorticato , sufficientique aquæ parte decoquantur perfectè , sunt optimi alimenti hecticis , & faciles concoctu. Testudines nemorales pauca egent præparatione , quamuis earum ius est facilius concoctu : limaces montani sunt meliores , & optimè nutriunt , si per aliquot dies non pascantur : post tamen saccharo , & farina nutriantur duobus tribusve diebus , dummodo prius decoquantur aqua & paucò sale , postremò iure optimo gallinæ , vel arietis. Hæc ratione præparati refrigerant,

Præparatio aquæ ex anguilla.

Ex cancris fluuiatilibus.

rant, humectant, & bonum sanguinem generant, nec difficiles sunt concoctu: quamuis aqua ex ipsis solis per distillationem expressa sit concoctu facilior, & eandem facultatem habeat, qua curatus fuit illustrissimus Marchio Zeneranus ab egregio doctore medico Doleſa Valentino. Inter omnia, quæ hanc febrem solent & possunt perfectius, & citius curare est lac, quia valenter nutrit, humectat, parum refrigerat, & facillimè concoquitur, humanum tamen est omnibus perfectius, atque vtilius ob similitudinem, huic bonitati proximum est asininum, deinde verò caprinum, & mox vaccinum, à quo butyrum extractum sit. Eligatur ergo iuuenis perfectè sana, optima prædita natura, vel sanguinea, à partu distans per duos vel tres menses: si tamen abhorret à lacte humano, vel si haberi non possit, eligetur lac asinæ nigræ iuuenis à partu distantis per duos, aut tres vel quatuor menses nutritæ hordeo, & herbis frigidis & humidis, aut lactuca, endiuia, cichorea & similibus: ante tamen lactis vsum aliqua sunt obseruanda prius, ea scilicet, quæ ipsum dari prohibent, vt sunt primum catarrhus, & distillatio, & capitis dolor, secundum febris putrida, tertium quibus hypochondria suspensa murmurant, quantum ventris profluuium. Quod verò lac quodcunque prædictis morbis maximè aduerſetur, docuit Hipp. lib. 5. aphor. aph. 64. lac inquit dare caput dolentibus malum, malum verò & febricitantibus, & quibus ilia suspensa murmurant, & siticulosi, malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis effusio multa accidit. Conuenit autem & tabidis dare, qui non valde febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem absumptis: quod confirmat Gal. variis locis, præsertim commentario huius aphor. in quo demonstrat lac ab omnibus causis calidis celerrimè in nidorem fuliginosum verti: quamuis per se probum gignat succum aliquid habens flatulentum: si tamen asininum sit lac, nullam habet acrimoniam, quum omnibus sit humidius, Gal. autore lib. 4. de ratione victus in morbis acutis aph. 7. ideoque ventrem solum magis soluit, etiam si inter purgantia omnia medicamenta mitissimum tranquilissimūque existat, & omni lacte sit humidius, ac proinde magis ventrem subducit, vt idem Gal. censet aph. 109. eiusdem lib. 4. de ratione victus in morbis acutis. A quibus Galen. locis & aliis, sumpsit Iacobus Syluius ansam purgandi affectos vere causo lacte asinæ cocto, quod pace tanti viri, repugnat Hippocr. Gal. rationi, & experientia

*Lacus
aqua ex
limaci-
bus.*

*Histo-
ria.*

*Lactis
præstan-
tia.*

*Lac hu-
manum.*

*Lac asi-
ninum.*

*Quæ
prohi-
beant,
lac ex-
hiberi.*

*Iacobi
Syluij*

*senten-
tia non*

*proba-
tur.*

DE CVRAND. MORB.

*Fælici-
tas no-
strorum
tempo-
rum.*

*Quæ
impe-
diat la-
ctis coa-
gulatio-
nem.*

*Prior
forma
conficiē-
di ele-
ctuariū
ex testu-
dine.*

*Altera
forma.*

quamvis lac sua humiditate, & facultate mitissima, & acrimonia experte minimè febribus ardentibus noceat, quia illius substantia facillimo negotio alteratur & corrumpitur, maximèque his & similibus morbis aduersatur, si per os sumitur, sed coctum minus: tempore namque Græcorum serum tutius aliis medicamentis acribus, & calidis purgabat: nostro tamen fælicissimo tempore manna, rhabarbarum, cassia fistularis, tamarindi, & myrobalani saluberrimè purgant, & his, aliisque, & siccis morbis minimè nocent. Quando igitur nihil est, quod lactis vsum impediat, sugat æger ipsum ab vberibus fœminæ nutritæ rebus frigidis, & humidis, vel ter in die ventriculo vacuo, vel bibat primò lac caprinum, vel asininum ab 3. ij. vsque ad 3. vj. dummodò ne alteretur ab aëre, quia facillimè corrumpitur, cui semper adde parum sacchari, ne coaguletur in ventriculo, quod etiam valentius prohibetur à sale, vel melle, si æger non possit sugere ab vberibus lac, extrahatur in vas actu calidum, vt conseruetur naturalis calor. Quod si sumpto lacte sentiat acidus ructus, vel putredinem aliquam, abstineat ab eius vsum & nutriatur cremore hordei, & iure pulli gallinacei, vel gallinæ, & confectione ex testudine, de qua statim loquemur. Quamvis cap. 29. de tabe descripta sit à nobis confectio ex testudine, tamen in præsentia maioris doctrinæ gratia, duas proponam conficiendi formas, quarum prima est minoris pretij: vel ℥. carnis testudinis aquaticæ optimæ aquæ decoctæ cum hordeo excorticato 3. ij. medullæ vuarum passarum, & amygdalarum dulcium sine cortice. an. 3. j. granorum pini aqua rosata calida prius infusorum 3. ss. pulueris electuarij resumptiui 3. ss. seminis papaueris & cinamomi electi an. 3. j. conseruæ borraginis 3. iij. sacchari dissoluti in aqua borraginis q. s. misce, & fiat electuarium ad formam manus Christi. Altera confectio est maioris pretij ad diuites: ℥. carnis testudinis nemoralis decoctæ cum iure hordei sine cortice 3. ij. carnis pectoris gallinæ iuuenis, & capi. ana. 3. j. pulueris electuarij resumptiui 3. ss. pulueris diarrhodon Abbatis, pulueris diarmargaritonis frigidi an. 3. ij. gummi dragaganti, gummi Arabici, seminis papaueris albi, & seminis portulacæ, seminis lactucæ, quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis bombacis an. 3. j. amygdalarum dulcium sine cortice, medullæ vuarum passarum an. 3. j. nucleorum pini in aqua rosarum prius calida infusorum 3. ss. interioris cinamomi 3. j. ss. sacchari dissoluti in aqua bug. ossæ. q. s. misce & fiat electuarium, ad formam manus Christi & cauratum. Dosis huius

huius confectionis vncia semis cum vnciis sex cremoris hor-
dei, & iure gallinæ, vel gallinacei cum testudine, & ranis. So-
lum electuarium resumptiuum recens est satis vtile hecti-
cis. Dosis ℥. β. cum iure prædicto, vel aliqua aqua ex superius
dictis. Inter prandium, & cœnam vel quacunque hora ven-
triculo vacuo bibat aquam hordeaccam, qua semper in po-
tu vtatur, nisi ventriculus admodum sit imbecillus, quia tunc
vinum benè aqua dilutum, vel aqua cinnamomi esset potus
conuenientior. Extra igitur mensam bibat aquam hordei
cum hac mixtura: ℥. conseruæ violarum, rosarum, nenu-
pharis & borraginis an. ℥. ij. corticis citri saccharo conditi.
℥. β. quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum,
seminis papaueris an. ℥. j. pulueris electuarij resumptiui. ℥.
β. sacchari q. s. misce, & fiat conditum auro coopertum. Do-
sis, cochlearia duo, vel tria, Iulep violarum, vel rosarum, sy-
rupus de nenuphare, & de cucurbita extinguit sitim & totum
corpus humectat, & exiccat. Refrigerant, & humectant he-
par, & totum corpus clysteres ex solo lacte caprino, vel oni-
no; aut ex oleis, violacco, nenupharis, & papaueris, aut ex
hordei cremore, & si opus fuerit adde cassiam fistularem, vel
butyrum recens. Hic clyster, vel similis est optimus: ℥. iu-
ris pulli gallinacei, decoctionis hordei sine cortice, foliorum
violarum & lactuæ ℥. x. cassiæ fistulæ præparatæ ℥. iij. mu-
cilaginis seminis cydoniorum ℥. iij. vitellos ouorum ij. sac-
chari optimi ℥. ij. misce, & fiat clyster, si tamen adsit ventris
profluuium, abstine ab iis. Vnguenta ex oleis, & rebus hu-
meçantibus & refrigerantibus spinæ, seu dorso, hepati, &
pectori admota bis vt minimum in die ventriculo vacuo
sunt utilissima, & necessaria huic feбри, inter quæ hoc vel si-
mile est optimum: ℥. oleorum violarum nenupharis, rosa-
rum & papaueris lotorum benè aqua rosata. an. ℥. j. mucila-
ginis seminis psilij, cidoniorum & althææ aqua rosata ex-
tractæ, ℥. ij. butyri recentis, axungia gallinæ, medullæ cru-
rum vituli. an. ℥. iij. pulueris electuarij resumptiui, & pulueris
diamargaritonis frigidi. an. ℥. j. β. ceræ q. s. misce, & fiat vn-
guentum. Balneum est huic morbo præsentissimum auxilium,
præsertim si non coniungatur hecticæ catarrhus, febris pu-
trida, obstructio & similes affectus, quibus multum nocet bal-
neum, siue sit ex sola aqua frigida, siue ex tepida. Primum
quamuis à Gal. laudatur 10. methodi contra Herophilum est
suspectum, & aptum ad extinguendum calorem imbecillum
hecticorum. & præter hoc sua intensa, & actuali frigiditate
per accidens calfacit, & exsiccat internas partes, ideoque pi-
tui

*Electua-
rium re-
sumptiuū.
Potus.
Condi-
tum.*

*Extin-
guentia
sitim.*

*Clyste-
rum uti-
lit as.*

Clyster.

*Vnguen-
torum
usus.*

*Vnguen-
tum.*

*Balnei
commo-
ditas.*

*Balnei.
ex aqua
frigida
cur no-
ceat.*

DE CVRAND. MORB.

*Quod
balneū
sit pro-
bādum.
Ante
balneū
seruan-
da.
Hora
balnei.*

tuitosos & crassos humores (à quibus fit retanus) resoluit, auctore Hipp. & Gal. 5. lib. aph. 2. 1. aph. nam si laborans retano carnosus, iuuenis, in æstate, & regione calidi potest curari balneo aquæ frigidaë, hecticus cum non possit esse carnosus non poterit sine periculo tolerare balneum aquæ frigidaë. Aliqui post balneum aquæ tepidaë, laudant balneum aquæ frigidaë, præcipue si æger fuerit iuuenis: non multum imbecillus, & assuetus balneo aquæ frigidaë. Alij sensim hecticos à balneis parum calidis ad minus calida, & tandem ad frigida transferunt, ne ab vno extremo in aliud fiat transmutatio. Balneum aquæ tepidaë solius, vel ex decocto lactucæ, foliorum & florum violarum, salicis, nenupharis, capitum & pedum arietinorum, vel vitulinorum est tutius, & à me sæpè expertum, aliqua tamen prius oportet animaduertere ante balneum necessaria, & in balneo, & à balneo. Ante balneum per quatuor vel quinque horas nutriatur æger solo lacte asinino cum saccharo, vel optimo iure ex gallina, & testudine, & hordei cremotu, vel duobus recentibus ouis, & sorbilibus, & parum ante balneum sint vacua intestina. In vere hora balneum ingrediendi sit octaua ante meridiem, in æstate septima, in autumnno & hyeme quinta, vel sexta à meridie. Habitatio sit moderatè calida, quemadmodum & aqua, ne sudore & fatigatione afficiatur æger: tempus ergo balnei respondeat voluntati, & delectationi ægroti. Numerus balnei sit proportionem morbi, & ægri: quamuis semel in vnoquoque die sit satis aliquando bis, & ter in hebdomada. A balneo amisso actu humore externo per pannos lini non calidos, sed per frictionem moderatam & blandam vngatur dorsum, pectus, & hepar vnguento superius scripto, vel simili, aut lacte humano, & asinino, vel caprino vel bubulo tepidis, deinde quiescat in lecto, & nutriatur cremore hordei facto iure gallinæ, & ranis, & testudine, vel confectioe ex testudine, & iure, vel aqua ex limacibus superius dictis.

Scholium.

*Hectica
quid.
Inaqua-
lis in-
tempe-
ris.*

HECTICA febris est) Hectica febris, est calor præter naturam habitum corporis occupans. In hac est æqualis intemperies in omnibus partibus corporis, quoniam in calore mutata sunt, quem habent ac si esset propria natura, & ideo ab ipso non dolent, nec molestantur, hoc autem quo ad sensum intelligere oportet. Non enim sunt omnino partes mutata à calore præter naturam, quia nec nutriendur, nec tumores qui in hecticis oriuntur, vngquam ad suppurationem venirent, nec calorem febris putridæ (quæ hectica superuenit) sentiremus. Hectica duobus modis fit. Primo sequendo alios mor-
bos.

hos, febres scilicet ardentes diarias, & inflammationes internas. **Duobus**
 Secundo incipiendo, & statim à principio. Quae similem habet cum **modis**
 diaria generationem, ex causa aliqua procatartica, ira, tristitia, **Hectica**
 exercitatione, aut lassitudine cum vitione, hoc secundo modo raro **Primus**
 contingit: hectica homines calidissimos, & siccissimos tantum inua- **Secun-**
 dens Hectica duplex est, una simplex, & altera composita. Simplex **us.**
 illa dicitur, in qua calor factus est in partibus sine humiditatis ali- **Hectica**
 cuius consumptione. Composita verò, quae siccitatem aliquam mor- **duplex.**
 bosam habet coniunctam, quam hecticam marasmodem nomina-
 mus. Absoluta harum hecticarum cognitio ex lib. 1. de diff. feb. ha-
 benda est, hoc in loco de curatione febris hectica simplicis agere in-
 stituimus unà cum auctore, hac enim febris difficile cognoscitur,
 quamvis facilius curatur.

Hectica febris priusquam ad tabem.] Febris hectica cum sit **Curatio**
 calor simplex, unam habebit & simplicem curatoriam indicatio- **altera-**
 nem ab eo assumptam. Calor enim per contraria refrigerantia sci- **tione fit.**
 licet est auferendus. Debent autem refrigerantia, humectantia **Refrige-**
 etiam esse, quia humiditas obtundit caloris vim. Tum quia, cum **rantia.**
 calor sit in partibus solidis factus, oportebit prouidere, ne siccitas
 introducatur. Huius hecticae curatio quamvis 10. method. à Ga-
 leno tradatur, breuiter tamen hoc in loco eam transferemus. Re- **Sex re-**
 media ergo, quibus hectica curatur, aut foris applicantur, aut inte- **mediis**
 rius assumuntur. Foris applicanda sunt aer, medicamenta cuti ad- **curatur**
 mota & balneum. Interius verò assumuntur cibus, potus, & aer hecticae.
 inspiramus. De quibus agendum est incipientes à cibo unà cum **Alimen-**
 auctore. Alimenti qualitas, huic febrì accommodata, debet esse fri- **ta.**
 gida & humida, quia affectus est calidus, & qui exiccat corpus.
 Vnde ptisana accommodata est, alimenta etiam temperata alterata
 tamen rebus frigidis, lactuca, succo aggregata, & similibus. Et cum
 in hac febre laborantibus magna fiat substantia dissipatio, & calor
 sit fixus in partibus, alimenta debent habere aliquam glutinositatem,
 ne dissipentur facile à calore febrili, qua ratione unà cum gallina **Dānan-**
 testudinis partem coques, comedens ius & gallinam, non autem te- **tur ali-**
 tudinem, quam nullus antiquorum commendauit, & difficile co- **qua ali-**
 quitur. Inde colliges multo minus esse exhibenda illa alimenta, quae **menta.**
 solebant exhiberi, appellata electuaria in forma manus Christi, quia **Quanti-**
 in his carnes testudinis, & frigide corruptis iam sunt. Poteris etiam **tas ali-**
 extremitates animalium, cū carnibus facilis coctionis elixare, cum **menti.**
 pauco petroselino: & hac sufficiant de qualitate alimenti. Quanti- **Lactis.**
 tatem ex robore facultatis concoctricis ventriculi habebis. **im Impe-**
 enim in hectica languida sit facultas, oportebit parum, & saepe ci- **dientia**
 bare. Inter alimenta lac commendatur. Quale autem esse debet & assum-
 qua ratione assumendum recte docet auctor. Quae impediunt lactis **ptionem.**

DE CVRAND. MORB.

- Primū.** assumptionem hac sunt. Primo, corruptio eius in ventriculo, quā deprehēdemus ex pulsu, & ructu. Ex pulsu, si inaequalis fiat, & parvus, à lactis assumptione, hic enim pulsus solet fieri affecto orificio ventriculi. Ex ructu hoc modo. Si ructus sit acidus, & à frigidityate ventriculi, corruptum erit lac, si nidorulentus & fumosus à calore. Secundo impedit lactis assumptionem febris putrida, quia ab eius calore corrūpitur, & in vapores mutatur. Tertiò dolor capitis, quia vapores multi, qui à lacte, dū coquitur, in ventriculo eleuantur, caput implent, ac grauant. Quarto, hypochondria eleuata, ab aliqua inflammatione: vapores enim multi, qui à lacte consurgunt, cōprimunt tumorem. Quinto murmurantia hypochondria, quia cum murmur, seu rugitus fiat à flatu, augebitur à vaporibus lactis. Sexto, sitis, siticulosi enim calidū habent ventriculū, à quo lac corrumpetur. Septimo aciectiones biliosae: quia haec calorem arguunt, à quo similiter lac corrumpetur. Vltimo impeditur lactis exhibitio à profuuo aliquo sanguinis, qui praecessit. Hic enim refrigerauit corpus, ventriculus autem refrigeratus non poterit recte cōcoquere lac. Potus sit cremor ptisanæ, aut decoctū hordei. Aër inspiratus sit frigidus, dummodo cutem non attingat. Sanguinis missionis, aut purgationis, nullā fecimus mentionem: quia in hectica nullus est affectus euacuationem postulans.
- De remediis, quae exterius applicantur, modò agendum est, incipientes ab aëre ambiente. Aër, etsi sit materia remedij, cum sit materia nobis connata, proinde indicat, aut sui conseruationem, quando qualitatem habet morbo contrariam, aut sui ablationem ob alterationem contrariam, quando eius qualitas morbum fouet. In hectica ergo aër aut est temperatus, aut calidus, aut frigidus. Si temperatus est, non laedit: si sit calidus fugiendus est, quia calorem augeat febrilem, aut alterandus aqua cum aceto mixta irrigantes cubiculum, in quo decumbit agrotus, aut aqua per euripes cadente, aut aspergendo frigidas herbas, & flores, ut folia salicis, arundines, rosas, myrtos, & similia: si aër frigidus sit pro gratia est habendus, habens naturam morbo contrariam. Quod si sit frigidissimus, inspiratus remedium est, quia per tracheam arteriam, & pulmones cor petit, at per cutem non poterit ingredi sibi ipsi viam pracludens, frigidityate condensans cutem, & prohibens calidorum vaporum exhalationem. Ac proinde permittendum est, ut inspiretur: corpus autem vestibus operiatur, ne aer hic cutem suo contactu alteret.
- Epithemata.** Epithemata, aut medicamenta, quae cuti applicantur, debent esse frigida & humida, non autem astringentia, qualia sunt, quae crassas habent partes, haec enim non possunt penetrare. Difficile autē erit inuenire medicamēta refrigerantia sine adstrictione, pauca enim sunt.
- Vnguentū refri-** Inter omnia tamen uti debemus medicamento à Gal. 10. met. descripto, quod officina vnguentū refrigerans Galeni appellare solent. Hoc si potest parari, ut ex eo loco colligimus: ℞. olei rosati omphacini

3. iij. cera alba & lota 3. j. liquentur in duplici vase, deinde refrige-
 rentur. Et ultimo loco agitando illa in vase addatur tantum aqua Galeni
 fontana, quantum imbibere possit: sed si tibi placet, inde parum aceti. Hoc
 medicamento utitur Gal. ad Erysipelata, & ad ulcera pudendorum,
 maximè enim refrigerat, ut simplicia, quæ ipsum componunt, osten-
 dunt. In primis oleum rosarum omphacinum duplici nomine est frigi-
 dum, & quia habet rosas permixtas, & quia factum est ex oliuis im-
 maturis. Et quamvis cera solum adhibeatur tanquam materia, laua-
 tur tamen ut amittat acrimoniam, & calorem, quem ex melle con-
 traxit. Liquatur autem cera cum oleo in duplici vase, ne ab igne ali-
 quem concipiat calorem. Tandem additur aqua, ut magis refrigeret,
 & humectet. Dixi te posse addere parum aceti, propter penetrationem.
 Aduerte tamen, in officinis seruari medicamentum refrigerans Ga-
 leni à Mesue traditum: quod, ut distinguas à primo, opus erit, ut hoc
 modo schedulam perscribas: ℞. unguenti refrigerantis Galeni ex 10
 method. &c. Hoc unguento debemus inungere regionem eam pectoris,
 quæ est supra cor, iecur, & totam spinam: ita tamen, ut cum manifestè
 iam calefactum est: à corpore abstergamus ipsum, & de nouo fiat
 inunctio. Tertio huic feбри solet applicari balneum: hoc quatuor habet
 partes, prima solum continet aërem calidum, in quo vestes deponimus,
 in quo ager parum immorari debet, ne calore fiat substantia dissipa-
 tio: secunda est ubi lauatur ager, ut meatus aperiantur: tertia est la-
 uacrum aqua frigida: debet autem hectica laborans aqua tepida
 lauari ut caliditas balnei simul cum calore agrotantis sit nutri-
 menti partibus solidis, quæ carnis tegumento constituuntur: ad hoc, ut
 cum lauantur frigida non laedatur consumpto paucò calore, qui in
 eis est. Lotio autem frigida est febris remedium. Sic dicebat Galen. hecti-
 ci nihil balneo iuuantur, nisi in frigida immergantur. Nec mirum,
 nam in lauacro tepido calor augetur, & vapor humidus, qui in cor-
 pore paucus est, multum augetur, qui mala frigida corrigit, fluxum
 coercens, & calorem extinguens. Dices, Hippo. 3. de rat. vic. in acut. c. 10.
 sent. 59. balneum, inquit, non conuenire his, quibus vires languet, non
 ergo hectici sunt lauandi, languidi cum sint. Respondeo, Hippocratem
 loqui de balneo euacuatorio, quod multos sudores mouet, quale hecti-
 cis non conuenit: bene tamen illud, quod ad refrigerandum calorem
 excedentem exhibetur. Iterum obicies, hectici exiguum habent ca-
 lorem, poterit ergo facile extinguere ab aqua frigiditate.

Balneum

partes

quatuor.

Prima.

Secunda.

Tertia.

Lotio in

frigida.

Obie-

ctio.

Solutio.

Obie-

ctio.

Respondeo, verum hoc esse, sed propter metum non est omittendum
 remedium, melius enim est cum periculo aliquid agere, quam sincere cer-
 tare hominem mori. Et quamvis Gal. lib. 3. acut. scribit languidos non pos-
 se ad frigidam peruenire sine laesione: non proinde eam omittent hecti-
 ci, quia ibi loquitur de morbis acutis, exercetque methodum in pleuri-
 tide. Quarta pars balnei est, in qua sudores absterguntur, hæc hectici pars.

inuiti

DE CVRAN. MORB.

Nostra inutilis est. Nos heclicos adhuc balnea non ducimus, sed eos in proprio. propriis cubiculis lauamus. Primum aqua tepida, & secundo perfundimus eos aqua frigida non actu, sed mixtione aqua calida temperata, qua comparatione alterius aqua frigida est. Sic Hipp. lib. 3. acutorum sent. 49. multas aqua mixturas paratas habet. Præterea oportet maxime considerare, balneum multis causis omitti. Prima causa balneum impediens. Secunda. Tertia. Quarta. Quinta. Sexta. Septima. Octava.

Prima est interna inflammatio, quia humores à balneo liquati ad ipsam confluent. Quod si Hippocr. lib. 3. de ratione victus in fine, balneum concedat pleuriticis, & peripneumonicis, id intelligendum est, post totius corporis euacuationem, quo tempore iam nil fluit ad partem affectam: imò tunc spiritus facilitatur, imminuitur inflammatio, & dolor mitescit. Secunda est alicuius partis principis imbecillitas, propter quam facile recipiet humores fluentes in balneo. Quod si pars languida non sit princeps, tunc bene poterimus balneo uti, quia ad articulos & cutem solet natura cum comodo animalis expellere. Tertia est plenitudo ad vires, vel ad vasa. Quia in plenitudine ad vires humores fusi, magis grauabunt, in plenitudine verò ad vasa rumpent aliquam venam. Quarta est febris putrida. Quia hac obstructionem habet, qua augebitur fusi humoribus. Quinta cruditas, hac enim à calore balnei ad venas attrahitur. Sexta est alui fluor. Quæ duabus de causis balneum impedit. Prima est: quia cum balneum ad cutem attrahat, impedit motum naturæ per aluum expellentis. Secunda est, quia balneum cum humectandi vim habeat, fluxiliorem reddet aluum, & ideo heclicis diarrheæ laborantibus interdicitur. Septima est alui densitas & constructio: Quia à calore balnei, tenuiores faciem portiones sursum ad hepar & alias partes ascendent. Vltima causa usum balnei impediens, est cibus & potus si parum ante assumpti sint, balneum enim ea cruda ad venas rapiet. Et ideo statim à balneo nil est sorbendum, priusquam balnei perturbatio sit sedata.

De febre pestilenti. CAP. IX.

Descriptio.

Pestilens febris est febris epidemialis perniciosa, & venenosa, qua multi afficiuntur & pereunt vno tempore & vna regione, vel ciuitate aëris ratione, vel (vt autor est Gal. lib. de theriaca ad Pisonem) pestis quædam bellua existit non paucos interimens, ciuitates quoque tutas depascens malè conficit: quippe praua quædam aëris ad corruptionem prompta mutatio efficitur, & homines cum respirationis necessitate periculum euitare nequeant, ipsum aërem veluti venenum quoddam ad se per os attrahunt. Discrimen inter pestem epidemiam, & eudemum, siue endemium demonstrat Gal. cō. 9. lib. 1. de ra. victus in morbis

bis acutis, in quo docet Hippocratem in lib. de aëre, aqua, & locis egisse de endomio morbo, & de epidemio in lib. epide. sed de peste nullum peculiarem librum confecit, quia vnum morbum ex epidemiis esse pestem, per libros epidemiorum monstrauit, & hac de causa 3. epidemiorum lib. pestilentes quasdam tempestates descripsit, vnde infert ex genere esse vulgarem morbum. Quamquam sunt multæ causæ pestis, tamen *Causa.* eas tantum, quæ medico sunt necessariae, recensabo. Fit itaque omnis pestilentia à putredine aëris autore Gal. 2. de differentiis febrium capit. 5. In pestilenti aëris constitutione inspiratio potissimum est causa, cur homines corripiantur peste: aër enim nos circumstans à putrescente euaporatione vitatur, ab aquis videlicet putribus in lacubus, paludibus: à multitudine cadauerum. A vi etiam cœlesti sæpe fieri solet *Externa.* aliquando, aliquando ira Dei mittitur nostris peccatis infensi. Semper tamen dispositio humorum, qui sunt in nostro corpore est interna causa satis potens, & ideo in eadem ciuitate, vel domo aliqui afficiuntur peste, aliqui non, & affecti non omnes ab æquali causa moriuntur. Hinc etiam accidit, rarò tamen, vnum aëre nondum infesto peste laborare, quamuis pestis propriè non sit, sed peculiaris morbus venenatus & perniciosus. Lapsus magnus aëris ad calidum, & humidum est causa satis magna pestis & ideo Gal. 1. de temperamentis capit. 4. scribit, temperamentum aëris pessimum esse calidum & humidum. Qui etiam pleni sunt malis succis, & praua victus ratione vtuntur facilè in febres pestilentes incidunt. Inter omnia anni tempora exitum æstatis & initium autumnus videmus maximè febribus pestilentibus conuenire. *Signa.* Indicia futuræ pestis sunt aër minus calidus, & humidus, multitudo exanthematum, & papularum, quæ à nostris Barbaris variolæ & morbilli dicuntur, multitudo etiam phrenitidis venenosæ, copia carbunculorum, multitudo etiam murium, & animalium quæ fiunt ex putredine. Si verò volucra aërem proprium fugiant, & in ipso pereant, præsentem constitutionem pestilentem ostendunt, & quum pisces fugiunt aquam & in ipsa moriuntur, ab aqua esse ortam pestem dices. Notæ, quæ hominem pestilentia iam correptum demonstrant, plurimæ sunt, febris scilicet ab initio maxima, quamuis sæpe exteriora frigeant, & interiora ardeant, capitis grauitas, oris siccitas, vehemens sitis & vehemens angustia, difficultas spiritus, vomitus creber, oculorum aspectus toruus, ac varius, vigilæ & deliria, aliquando propensio magna in somnum: inter ignotas est, si post aures, aut sub aliis, aut circa inguina potissimum bubones cum febre parua, &

DE CVRAND. MORB.

& magna oriantur, in aliis etiam partibus internis ad exter-
nas: si enim in collo appareat tumor præter naturam, cere-
brum potissimè malè affici ostendit, si in alis, cor: si verò in
inguinibus, iecur, quod Hippocr. 6. epidemiorum parte 2.
aphor. 4. voluit dicens, abscessus veluti bubones signa sunt
earum partium, vnde exuberant. Sed quum non semper appa-
reant bubones, alias notas bene considera. Priusquam cura-
tionem præsentis pestis demonstremus, quo modo præca-
uenda sit ostendere conabimur, quod certissimo fiet, si ad lon-
ginquas & salubres regiones fugiamus, neque reditum lau-
dabo, nisi post perfectam & integram aëris alterationem, &
commutationem: semper tamen ad Dei iram placandam
cura animam tuam: sæpè enim corporis morbi ab animi
morbis fieri solent, dicente Domino languido, quem sana-
uerat, vade, & noli amplius peccare, ne deterius aliquid tibi
contingat. Et alibi, Si oculus tuus, id est, anima tua simplex
fuerit, totum corpus lucidum erit: nam propter peccata no-
stra iratus Deus pellem, & sua fulmina in nos mittit, vt in le-
ge veteri scriptum est, & etiam in noua ante iudicij aduentum
seruatore nostro docente. Quare ieiuniis, precibus, & elee-
mosynis Dei iustitia placanda est. Anima igitur curata præ-
cautio fiet victu conuenienti. Primò, aëre non montano, non
propinquo aquis, aliisque rebus putridis, cadaueribus scili-
cet, stercorebus, coriis, brassicis euulsis, & aliis prauis arbori-
bus. Eligatur ventus septentrionalis, vel orientalis, meridio-
nalis enim est omnibus deterior, medius verò occidentalis.
Habitatio quoque admodum propinqua centro, & cauerno-
sa est passim radij solares optimi sunt, lunæ verò noxij, quia
putredinem efficiunt auctore Galen. 3. de diebus decretoriis.
Aëris alteratio & emendatio summè necessaria est, non solum
in curanda peste, sed præcauenda, quod maximè vi solius
ignis fieri solet, præsertim ex quercu, & aliis arboribus sa-
lubribus: habemus enim exemplum luis illius, quæ ex Æ-
thiopia ad Græcos peruasit, quam Hipp. multis modis ad-
mirandus curauit igne per totam ciuitatem incenso, vt Ga-
lenus eius fidissimus interpret lib. de theriaca ad Pisonem scri-
bit. Quanquam igitur ignis maximam habeat facultatem in aë-
re alterando, & puriore reddendo, multa tamen sunt calida, &
frigida & temperata cardiaca, quæ aërem efficiunt salubrem,
& illius qualitates prauas & contrarias tollunt. Calida am-
bra, muschus, thus, mastix, sandaracha Arabum, lignum aloës,
mirrha, aloe, resina pini, resina cupressi, laudanum, iunipe-
rus, aristolochia, nux muscata, gariophylli, gummi iuniperi,
eben

*Præcau-
tio pe-
stis.*

Fuga.

*Anima
curatio.*

Victus.

Aër.

Sol.

Luna.

Aër.

*Histo-
ria.*

*Aërem
salubrē
efficien-
tia.*

*Calida
simpli-
cia.*

ebenus, acorus, enula campana, squinantum, bdellium, vinum aromaticum, cortex citri, storax liquida, laurus ocymum, been cinnamomum, crocus, calamentum, cassia lignea, zedoaria, lilium album, doricum, melissa, menta, ros marinus & similia. Frigida, quæ aërem calidum alterant, & purgant sunt acetum, Karabe, rosa, labruscus, poma, pyra, cydonia, corallus, santalli, acetosa, viola, cichorea, endiuia, nenuphar, balaustræ, coriandrum, bolus armenius, terra sigillata, argentum, myrtus, malum granatum, citrangulus, arancia, limones, agresta & similia. Temperata cardiaca, quæ aërem puriorem reddunt, & pestilentem discutunt, numerantur borrago, buglossa, margarita, carbunculus, hyacinthus, zaphyrus, & similia. Ex his & aliis cardiacis medicamentis multa cardiaca componuntur, vt theriaca magna, mithridatum, confectio Gentilis cordialis contra melancholiam, confectio de hyacintho, confectio ex granis tinctorum, quam alkermes nominat, hæc efficacissima multorum regum ac reginarum testimonio est probata, & à Valentinis omnibus maxime cognita, & frequenter probata, præsertim in quibus natura languet ob longum, vel valde acutum morbum spiritum vitalem dissipantem: quamvis Valentini ob magnam corporum raritatem, & aptitudinem ad caloris & spiritus dissolutionem, & hoc simili cardiaco medicamento magis egeant, & ideo ægri omnes illa semper amant, & postulant. Quare non sunt taxandi Medici, qui in hac regione sæpè iis vtuntur, neque quorundam, & Manardi ratio demonstrat coccum baphicam solum astringere, & suo rubro colore sanguinem & spiritum ratione similitudinis ad se magis distrahere & dissipare, quam cogendo firmare: quia rubra visa mouent sanguinem, & imaginatio per visum ad externas partes etiam sanguinem euocat, sed interius sumpta cardiaca sunt, corroborant cor, quod meliorem generabit spiritum. Neque multorum recentiorum ratio probat lapidem cyaneum, seu stellatum vomitu & deiectione purgare, & naturam turbare, humoresque melancholicos exagitare, nullius enim momenti est ratio: nam etiam si rhabarbarum, & lapis cyaneus largius sumpta purgantia sint, tamen si parcius sumantur, alia substantia, astringente, & cardiaca corroborant, & purgatoria imbecilla non mouent corpus, præsertim si bene præparentur, vt in hac confectioe alkermes lapis cyaneus sæpe lotus, & in electuario ex gemmis rhabarbarum pauca quantitas. Neque vera est multorum recentiorum etiam opinio dicentium, cardiaca omnia esse odora, licet quodcunque odorum sit cardiacum, ideo

Frigida.

Temperata.

Iam confectiois alkermes.

Manardus.

De lapide cyaneo.

Error

recentiorum.

DE CVRAND. MORB.

ideóque apud hos margarita non est cardiaca, neque lapides pretiosi, & sericum, aut similia: variæ enim sunt medicamentorum cardiacorum differentia & species. Prima eorum est, quæ temperatam obtinent naturam, quamvis Auerroes velit parum calida medicamenta temperatis magis corroborare. Secunda est illorum, quæ qualitates habent secundas corroborationis aptas, quales sunt stipricitas, odor bonus, ut in rosis, & muscho & similibus experimur. Tertia eorum, quæ à proprietate agunt, siue sint coniuncta qualitati manifestæ cardiacæ, ut in spica & croco reperitur proprietas cardiaca cum bono odore & stipricitate, siue per solam occultam vim agant, ut hyacinthus, margarita, & similes. Est tamen inter hæc cardiaca tertij modi discrimen: egent enim quæ à proprietate coniuncta manifestæ qualitati agunt, reductione de potentia ad actum, hoc est quod nativus noster calor agat in ipsa, & cum in actum redacta sunt per evaporationem eorum vis, (quæ à quibusdam tertia vis dicitur) ad cor movetur, ipsumque corroborat: quæ verò sola proprietate, & occulta vi agunt, non egent reductione de potentia ad actum, sed tantum eorum vis ad cor deferitur, quæ à nonnullis medicis quarta facultas nominatur. Præter superiores modos medicamentorum, quæ per se primò corroborant, sunt etiam alij modi medicamentorum cardiacorum per accidens & secundario, quæ remouent nocumenta, & qualitates veneficas à corde vacuando, ut lapis stellatus, & mirobalani: quæ facultate propria tertia à corde magis euacuant, aut in contrarium alterando per primas qualitates, aut corroborando simul, & prohibendo vaporum elationem, ut terra sigillata, & bolus armenus: aut incidendo, ut facit aqua raphani contra fungos, & acrimonium auferendo ut butyro facimus. Sunt etiam alia medicamenta cardiaca non per se, sed mediatè, & magis per accidens, quàm superius dicta, nempe quæ aliorum medicamentorum vires ad cor deferunt, ut pulegium, stechas & similia: & quæ prohibent aliorum medicamentorum solutionem, ut opium. Ex his igitur & aliis cardiacis compone medicamentum ad formam spheræ, quod dicitur pomum, vel trochiscos, qui supra ignem positi, aut dissoluti in aqua & aceto aërem putridum & foetidum salubrem efficiunt: gumosa tamen magis amant ignem, & alia humida, & liquida per habitationem inspersa conferunt. Hoc pomum est optimum in pestilenti constitutione, quæ sit frigida: nempe: ℥. belzoin 3. ꝑ. storacis calamitæ 3. j. gariophyllorum, laudani optimi, ligni aloës, cinnamomi,

*Species
cardia-
corum.
Med.
Prima.
Secun-
da.
Tertia.*

*Defe-
rentia
ad cor.*

mi, rosarum an. 3. ij. santalorum citrinorum corticum citri, *Pomum*
 anthus an. 3. ss. thymiarni, storacis liquidæ an. 3. j. mentæ sic- *in causa*
 cæ, calami aromatici, macis, nucis muscatæ an. 3. ss. musci, *frigida.*
 ambrae, an. ḡ. x. si fuerit diues, adde quantitatem ambrae, &
 musci: omnia misceantur, & cum mucilagine gummi draga-
 ganti pauca, fiat pomum, vel duo poma perforata positis musco
 & ambra in superficie. Hoc pomum aërem calidum pestilen- *Pomum*
 tem, reddet salubrem, vel saltem puriorem. ℥. florum violato- *in causa*
 rum, nenupharis, buglossæ, rosarum, citranguli, & spodij an. 3. *calida.*
 iij. corticum citri, macis, nucis muscatæ, storacis calamitæ, carda-
 momi, masticis splendidi, ligni aloes, cubebæ ana. 3. j. lauda-
 ni 3. j. S. musci & ambrae an. ḡ. x. cum mucilagine dragaganti
 dissoluta in aqua rosarum fiat pomum, vel duo poma perforata,
 ære bene alterato præsertim igne ex lauro, rore marino, calen-
 dula, iunipero, & similibus.

Secundò, cibus facilibus concoctu, boni sanguinis, & pau- *Cibi.*
 corum excrementorum, semper tamen iis sunt miscenda, quæ *Putredi-*
 resistunt putredini, cuiusmodi sunt acetum, succus limonum, *ni resi-*
 succus citri, succus granatorum, succus agrestæ & acetosæ, & *stentia.*
 fructus acidi. Alij omnes, præsertim humidi nocent. Nocet *Quæ no-*
 quoque lac, & quæ ex lacte fiunt, & magis si cibus comedatur *cent.*
 Nocent similiter alimenta, quæ pinguedine superabundant.
 Denique nocet ciborum multa quantitas, & varietas, & inor-
 dinatus sumendi modus, ut si cibus crassus præcedat tenuem,
 & prandio minimè concocto cœnet homo. Cibus igitur uti-
 lis iis est, panis boni tritici, carnes arietinæ. Hispanæ hædi-
 næ, vitulinæ, aues montanæ, pullus gallinaceus, gallina te-
 nera, cuniculus parvus, lepus parvus, ova recentia & sorbi-
 lia, pisces parui, & saxatiles, & alij boni succi, ut lucius. Po- *Potus.*
 tus sit aqua optima fluuiialis, vel fontana, & vinum album,
 aut rubrum mediocris substantiæ, & ætatis mediæ bene di-
 lutum aqua. Aliqui in hac præcautione, pro potu & cura lau-
 dant acetum, & succum granatorum acidulcium, sed ego his
 non pro potu, sed pro medicamento in parua quantitate ad
 futuram putredinem præcauendam vtor. Somnus diurnus *Somnus.*
 nocet, & magis inassuetis, sit brevis in die, & per duas horas
 à cibo, & in loco obscuro. Nocturnus sit pro hominis natura
 sex aut septem horarum: nam ex aphorismo quarto libri se-
 cundi, somnus, & vigilia si modum exceßerint, utrunque ma- *Quin-*
 lum. Inanitio & repletio immodica nocent, fames ergo & si- *que no-*
 tis magna mala sunt, & calidis natura pessima, quemadmo- *cent, &*
 dum plenitudo frigidis. Quare in hac præcautione & curatione *toridem*
 quinque maximè nocent, fames, fatigatio, fructus, fœmina, *profunt.*

DE CVRAND. MORB.

Status, & alia quinque maximè iuuant phlebotomia, focus
 fuga, frictio, fluxus, ideòque singulis diebus saltem semel ab
 stercoribus intestina sunt purganda clystere, aut supposito-
 rio, si natura hoc non faciat. Animi perturbationes, calefaciunt,
 & spiritus motu impetuoso mouent, ac resoluunt, multum
 nocent, vt ira, tristitia, odium, & coitus, præsertim immo-
 dicus, & magis à cibo. Præter hanc debitam victus rationem
 ad præcauendam pestem necessaria est sanguinis missio, si vi-
 tium sit in sanguine. Sæpe etiam purgatio est utilis, & neces-
 saria in hac præcautione, præcipuè si fiat per pilulas Ruffi,
 quas multi Rhazis appellant, constant enim duabus parti-
 bus aloes, vna myrrhæ, & medietate croci, & vino albo. Do-
 sis est drachma semis ad drachmam vnā. Semel in hebdo-
 mada purgant sine violentia & putredinem impediunt. Aloes,
 & myrrha mortua corpora nulla putredine, & foetore affecta
 conseruant, nedum viua. Hæ pilulæ sunt valentiores, & me-
 liores multo, & à multis maximè probatæ, & expertæ. ℞.
 aloes hepaticæ ʒ. iij. myrrhæ. ʒ. ij. croci ʒ. j. rhabarbari ele-
 cti. ʒ. j. ʒ. agarici ʒ. ij. gariophyllorum. ʒ. j. spicæ. ʒ. j. ʒ.
 corticum citri ʒ. j. seminis citri. ʒ. ij. tormentillæ. ʒ. ʒ. santalo-
 rum rubrorum, & granorum ribes, vel feminis acetosæ. ʒ. ʒ.
 corallorum rubrorum ʒ. ʒ. boli armenici præparati ʒ. iij. prius
 agarico inciso, & per sex horas in oximelle simp. infuso, &
 aliis omnibus in puluerem reductis cum syrupo acetoso simpli-
 ci fiant pilulæ septem pro drachma. Dosis drachma semis ad
 drachmam vnā. Bolus armenus solus habet vim magnam in
 hac præcautione. Dosis est eius drachma semis ad drachmam
 vnā cum vino albo & aqua rosata. Hoc medicamento vsus
 fuit quidam Dux Mediolanensis, & omnes eius familiares, quo-
 rum nullus fuit peste affectus. Theriaca magna non solum
 curat præsentem pestem, sed & generari prohibet. Dosis scru-
 pulus vnus ad drachmam vnā cum aqua acetosæ, vel rosa-
 rum per horas quinque ante cibum, & per sex vel septem post
 cibum: nonnulli tamen credunt hanc theriacam afficere ve-
 neno sanos, & veneno affectos curare, quorum opinio mihi
 displicet: sed Gal. verba lib. de theriaca ad Pisonem, & auream
 de eius laudibus sententiam audi. In summa theriaca & ex-
 trinsicus apposita, & epota rabiosorum morsibus præsentia-
 nei medicaminis cuiusdam instar exactè opitulatur. Cæte-
 rum notis etiam in pestifera lue solum hoc antidotum ma-
 lo correptis prodesse adeò visum est, vt nullum aliud præsi-
 dium ad resistendum huic malo fuerit idoneum. Radix tor-
 mentillæ (quæ est species pentaphylli, dicitur vincens toxi-
 cum

cum) est optima in hoc genere. Dosis cum vino, vel aqua rosarum, vel acetosæ est ʒ. j. Radix dictami est etiam optima. Eandem habet vim scabiosa sola, vel cum aceto & pimpinella. Hæc pilulæ conducunt in hoc genere. ℞. xyloaloes ʒ. ʒ. tormentillæ ʒ. ij. dictami ʒ. j. zedoariæ ʒ. ʒ. croci ʒ. j. ʒ. verbenæ ʒ. j. cornu cerui ʒ. ij. santalorum rubrorum ʒ. j. corallorum rubrorum, seminis acetosæ an ʒ. ʒ. margaritarum electarum ʒ. j. boli armenici ʒ. iij. gemmarum, electuarij de gemmis an. ʒ. ʒ. cornu vnicorni ʒ. j. cum syrup. de acetositate citri fiant pilulæ in æstate, vel in hyeme cum syrupo de mentha. Dosis drachma seminis vsque ad drachmam vnā bis vel ter in hebdomada. Ex his, & similibus fieri possunt sacculi ad cor apti ad præcautionem, & ad curationem aptiores. Sola tractatio hyacinthi, smaragdi, zaphyri & carbunculi habet non parvam vim ad præcauendam pestem.

Ephimera pestilens periculosior est aliis, vt aliqui viri eruditi tradunt, quoniam venenum vitali spiritui aduersatur, vt hellebori succus sanguini, & cerebrum felis humano cerebro, & cantharides vesicæ: ideoque si spiritus animæ seruiens veneno afficiatur per se, & subito peribit, neque hoc repugnat aphorismo 55. lib. 4. ex inguinum videlicet tumoribus febres omnes malæ, præter diarias. Hæc igitur febris curatur statim, & summa cum festinatione medicamentis cardiacis internis & externis, & iis quæ spirituum calorem præter naturam extinguunt, & qualitati venenosæ resistunt, & tandem spirituum dissolutionem prohibent, & ipsos gignant, qualia sunt primo ius gallinæ, & arietis, vel succus eius, vel aqua carnis cum succo agrestæ, vel acetosæ, vel succo limonum, vel citri etiam, si morbus acutissimus sit, egeatque per se victu tenuissimo. Aliquando tamen in robustis & Castellanis solus succus granatorum cum saccharo, & paucō pane loto est satis idoneum alimentum, vel succus limonum, & citri cum saccharo, & paucō pane, vel pyra tosta, aut mala cydonia. Potus sit aqua hordei cum paucō vino albo optimo, vel aqua rosarum, vel acetosæ, vel buglossæ. Inter prandium & cœnam bibat aquam hordei cum julep rosato, & syrupo de citro, vel de limonibus, vel cum hoc condito. ℞. confervæ acetosæ ʒ. ij. confervæ rosarum, & nenupharis an. ʒ. j. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, pulueris radicis dictami, & boli armenici præparati. ana. ʒ. ʒ. sacchari, quod s. misce, & fiat conditum deauratum. Si diues sit, adde fragmentorum lapidum smaragdi, hyacinthi, Zaphyri. ʒ. ʒ. Omni quoque hora iuuat multum hæc confectio. ℞. confectiois de

Dicta-
mum.

Pilula.

Scabio-
sa.

Sacculi.

Curatio
diaria.Spiriti-
bus uti-
lia.

Potus.

Condi-
tum.

DE CVRAND. MORB.

*Confe-
ctio.* hyacintho ꝑ. j. ꝑ. confectioⁿis Gentilis cordialis contra me-
lancholiam, & conseruæ acetosæ, an. 3. vj. theriacæ magiæ.
3. ij. coralli rubri præparati, margaritarum electarum, boli
armenici præparati, pulueris radicis dictami, tormentillæ, &
feminis acetosæ. an. 3. j. rasuræ cornu vnicornis, ossium de cor-
de cerui. ana. ꝑ. j. ꝑ. syrupi acetositatis citri, q. s. misce, &
fiat confectio, adde lapidum pretiosorum ꝑ. ꝑ. folia auri tria.
Lapides hi, & alia multa vt sericum, os de corde cerui, & si-
milia cardiaca corroborant, & spiritus puriores, & lucidiores
reddunt à tota substantia, vel proprietate, vt nos contra quos-
dam iuniores superius docuimus, neque ratio quorundam
*Defen-
sio lapil-
lorum.* valida est. Græci hæc, & similia inter cardiaca non scribunt,
igitur non sunt cardiaca, quemadmodum neque hæc ratio
valet, cassia fistula, manna, rhabarbarum, mirobalani non
scribuntur inter medicamenta purgantia à Græcis, ergo non
purgant: si magnes attrahit ferrum, & Karabe paleas, &
pæonia collo appensa prohibet morbum comitalem fieri
à tota substantia, & non à manifesta qualitate, poterunt
*Epithi-
ma cor-
di.* quoque multa medicamenta non odora esse cardiaca. Admo-
uenda sunt cordi sæpè, imò semper, quæ calorem febris extin-
gunt, veneno resistunt, & ipsum cor corroborant in forma
sacculi, vel vnguenti, vel liquida: vt ℥. aquæ rosarum, ace-
tosæ, & buglossæ. an. 3. ij. aquæ melissæ, & ocymi. ana. 3. j.
aquæ florum aranciorum 3. ꝑ. pulueris diamargaritonis fri-
gidi 3. ij. trochiscorum de camphora 3. j. misce, & fiat epi-
thema ad cor. Putrida pestis, quæ fermè semper fit, curatur
*Curatio
putrida.* primò, victu diariæ pestis. Secundò sanguinis missione, si vi-
Victus. rium robur adsit, per sectionem vtriusque basilicæ simul, ne
*Sectio
vena.* sanguis venenosæ qualitatis particeps à parte dextra in si-
nistram fluat, extrahaturque sanguinis copia plenitudini re-
spondens. In aliis etiam morbis, vt in apoplexia sanguinea,
in articulari, & in phlegmone, amborum testium fieri solet
*Qua ve-
na se-
canda.* sanguinis missio ab vtroque brachio simul. Sed si tumor, vel
carbunculus in hac febre sit post aurem, cephalica eiusdem
partis est secanda: si verò sub ala, basilica eiusdem partis: si
tumor sit in inguine, vena tibiæ, aut pedis interna eiusdem
partis: si autem in ambabus auribus simul, vtræque cephalica
est inscindenda, & si sub duabus quoque, vtræque basilica
simul etiam scindenda: si verò in vnoquoque sit inguine, ve-
næ vtriusque pedis, aut tibiæ. Pari modo faciendum est, si si-
mul sit bubo sub ala dextra, & inguine dextro, simul secabis
*Scarifi-
catio.* basilicam dextram, & venam tibiæ, aut pedis dextri. Quan-
do vires, & ætas prohibent in hac febre per venæ sectionem,
sanguis

sanguis est mittendus per cucurbitulas cum scarificatione, seruata semper rectitudine.

Tertiò, purgatione sine concoctione, quia materia venenosa semper est turgida propriè & per se, vel ob eius læsionem: statim enim subito cor lædit, quod doctissimus Manardus vult lib. 13. epist. 1. Malè igitur contrarium contra veritatem docuit Aloisius Mundella epistola decimasexta, sed quia huius febris materia fermè semper est biliosa, hoc aut simili medicamento vacuari poterit: ℞. medullæ tamarindorum, & medullæ cassiæ fistularis recens extractæ ana. ʒ. ʒ. rhabarbari electi infusi per noctem, in aqua endiuizæ. ʒ. iiij. electuarij de succo rosarum. ʒ. iiij. syrupi acetositis citri ʒ. j. aquæ acetosæ quod sufficit misce, & fiat potus. Vel ℞. pilularum de rhabarbaro. ʒ. j. fiant pilulæ 7. Ab hac purgatione quotidie & ante ipsam excrementa sunt depellenda saltem clystere leniente.

Purgatio sine concoctione.

Aloisius Mundella.

Potio.

Pilula.

Clyster.

Quartò, corroborantibus & alterantibus, vt syrupis confectionibusque, ac conditis, & electuariis cardiacis, de quibus dictum superiùs in præcautione & curatione diariæ pestilentis. Drachma vna theriacæ magnæ vsque ad duas est nobilissimum medicamentum, si detur cum vino, aut liquore cardiaco, ægroto mox lecto imposito, vestibus & stragulis operto, quo sudor erumpens sanitatis nuntius fuit sæpissime. Multi quoque antidotorum celebre ad eundem vsum experti sunt, cuius variæ sunt descriptiones: sed ego magis eam laudo, qua doctissimi medici Germani sunt vsi, præcipuè Simon Riquinus Treuir summus Philosophus, & medicus Coloniz in stupenda illa febre sudatoria priùs Britannica, deinde Germanica dicta, quæ sic habet, ℞. ouum, & reiecto eius albumine per foramen angustum adimpleatur croco, & igne lentissimè torreatur, donec cortex croceum præbeat colorem, postea ouum in pila contundatur minutissimè, & corticis reliquiæ non appareant: huic pulueri adde medietatem oui, seminis crucæ, radicis tormentillæ, dictami albi ana. ʒ. ij. seminis cardui benedicti, seminis acetosæ ana. ʒ. j. ʒ. nucis vomicæ ʒ. j. rasuræ cornu monoceruini, vel cerui (si primùm comparari non possit) ʒ. ʒ. theriacæ magnæ ad pondus omnium, deinde in mortario simul misceantur, & confundantur, vt formari possint trochisci, quorum dosis est drachma vna semis cum pauco aceto. Omnes ferè, qui hoc antidoto diu vsi sunt, liberi à peste euaserunt. Hoc quoque medicamentum est præstantissimum in præcautione & curatione pestis, & expertum à multis principibus Germaniæ, consilio doctissimorum medicorum. ℞. rasuræ vnicornis, rasuræ eboris ana. ʒ. j. xyloaloes, myrrhæ an. ʒ. j. ʒ. been

Corroboratio & alteratio.

Antidotum nobile.

Confectionio laudatissima.

DE CVRAND. MORB.

albi, & rubri, doronici Romani an. 3. ꝑ. agarici optimi per octo horas in aqua buglossæ macerati 3. j. zinziberis ꝑ. j. gentianæ 3. j. ꝑ. carpobalsami ꝑ. xxv. rhabarbari electi. 3. j. ꝑ. corticum citri 3. j. santalorum alborum, & cirrinorum, an. 3. j. ꝑ. ossis de corde cerui 3. ꝑ. seminis citri ꝑ. ij. fragmentorum quatuor lapidum pretiosorum an. 3. j. limaturæ auri optimi 3. ꝑ. pulueris liquiritiæ. 3. ij. coriandri præparati 3. iiij. conseruæ enulæ, conseruæ rosarum an. 3. iiij. mellis. q. s. misce, & fiat confectio, adde syrupi acetositis citri ꝑ. ꝑ. conseruetur in vase argenteo, vel vitreo, & tanquam thesaurus habeatur: aduersatur enim non solum pesti, sed vniuersis ferè venenis. Dosis in aurora drachma vna semis: hæc confectio est non minoris momenti, laudata & probata à multis sapientissimis medicis, eaque non pauci peste correpti, & ferè mortui ad sanitatem optimam sunt reuocati: in præcautione quoque est optima. ℥. sanguinis anatis maris & fœminæ, anseris, hœdi, rutæ syluestris, seminis fœniculi, cymini, anethi, rapæ syluestris an. 3. iiij. piperis albi, & longi, costi, anisi, cinnamomi ana. 3. ij. radices gentianæ, trifolij, squinantij, thuris, rosarum siccarum ana. 3. iiij. agarici maris 3. ij. myrrhæ, spicæ nardi, an. 3. vj. benzoi, azari, ammoniaci an. 3. j. carpobalsami grana xxx. ireos, croci, reupontici, zinziberis, masticis ana. 3. j. stichados 3. ꝑ. fiat puluis ex his tenuissimus, & cum quadruplo melle fiat confectio, quæ conseruetur vase argenteo, vel vitreo tanquam res summa & ferè diuina ad pestem & venena alia, & præter hoc languentem ventriculum corroborat, flatûsque omnes valenter discutit. Dosis drachma vna vsque ad duas drachmas superioris medicamenti. Sed quia supradicta tria medicamenta calida satis sunt, ideoque febri nocent, necessaria præter illa erunt alia cardiaca frigida interna, & externa, de quibus superius dictum, & etiam cap. de febre ardenti, cap. 30. superioris lib. de palpitatione, & syncope. Si carbunculus huic febri superuenerit, præter vacuationem per sectionem venæ eiusdem partis, purgationem debitam, cordis confirmationem, febris, & venenosæ qualitatis curationem iam dictam, chirurgus doctus omni arte trahat exterius venenum admo- uendo carbunculo animalia viua, gallum videlicet gallina- ceum, vel gallinam, cucurbitulas, & sanguisugas, vt aliqui volunt, vel ignem actu, aut potentia, vt Angli faciunt. Mixtura ex luteo oui & sale præcedenti incisione, habet facultatem mitem attrahendi & abstergendi. Panis si actu calidus, dum à forno educitur, carbunculo admoueat, attrahit exterius venenum. Mixtura ex ficis siccis, & pulueris salis, ireos, & aloes habet magnam in hoc facultatem fermentum cum oleo, & sale est

*Confe-
ctio præ-
clarissi-
ma.*

*Commo-
da.*

*Carbun-
culi cu-
ratio.*

*Admo-
uenda.*

*Mixtu-
ra.*

Panis.

*Extra-
bentia*

venenũ.

est eiusdem facultatis. Idem efficit mixtura ex opoponaco, fermento, & sale. Cataplasma ex scabiosa, fermento & sale laudatur in hoc. Aliquando oportet ad valentiora procedere: postea tamen crusta inducta sensim, & non violenter est euellenda solo butyro, aut pinguedine suilla, non salita adhuc, vel cataplasmate ex radice althææ, butiro & pinguedine suilla nondum salsa: post crustam euulsam necessaria est vlceris purgatio, & carnis in- *Crusta euulsio.* stauratio per medicamenta probata, cuiusmodi est mixtio ex *Carnis instauratio.* sarcocolla & melle, vel diachylon, siue gummis, vel foliis ocymi, vel consolida maiori. Si fuerit cum hac febre tumor post aures vel sub alis, vel in inguine, aut in alia parte, habita prius debita, & iam superius dicta victus ratione, factisque necessariis vacuationibus, corde corroborata per ea, quæ superius dicta sunt, tumori sunt admouenda, quæ venenum exterius attrahunt: ut cucurbitulæ, & theriaca magna, quæ (Gal. autore libello de theriaca ad Pisonem) non solum exterius sumpta, sed exterius admota *Medici cuiusdam curandi ratio.* est optimum remedium. Quidam medicus doctissimus & senex mixturam ex cantharidibus, butyro & fermento his venenosis tumoribus admouere solebat. Factæ post bullæ scindantur, extrahaturque humor venenosus, & crusta, & tandem facta debita absterfione, & incarnatione vlcerum multos affectos pestilentibus bubonibus Deo auspice curauit.

Scholium.

Pestilens febris.] Morbi aut sunt epydemij, aut sporades: Epydemij à Latinis, populariter grassantes, vulgares, & communes appellari solent. Dicitur autem epydemius morbus ille, qui vnus existens multos efficit. Qui causam habet omnibus communem: Sporades morbi (à Latinis vacati sparsi) dicuntur, cum multi morbi multos homines sparsim afficiunt, ut quando eodem tempore pleuritis, angina, dyssenteria, & simul alij distincti morbi infestare solent. Hi causam habent particularem, nempe victus rationem. Rursus morbus epydemius aut est epydemius, aut seruans nomen generis epydemius dicitur. Eudemus qui à Latinis dicitur patrius, regionalis, aut vernaculus, nil aliud est, quàm vnus morbus plures afficiens in vna regione: ut lanuensis sit tussis, & catarrhus: Neapolitanis podagra: & aliis tumores in collo. Epydemius morbus diuiditur in simpliciter epydemium & pestem. Morbus epydemius simpliciter est vnus morbus multos afficiens, sed non interficiens multos: hac ratione pleuritis, dyssenteria, exanthemata, & alij huiusmodi populariter vagari solent: pestis verò est epidimia perniciofa: epydimia, quia multos afficit, perniciofa verò, *quia*

DE CVRAND. MORB.

quia multos e medio tollit. Hi morbi pestilentes varij esse solent, carbunculus, febris, & alij similes. De morbis simpliciter epydemiis egit Hippocr. in libris epydemion, in quibus etiam de peste egit, ac proinde ei particularem non dicauit librum. Cum pestis sit communis morbus, aliquando unam solam regionem, aliquando plures inuadens: qualis fuit illa qua tempore Marci Antonij totam Babylo-

Causa pestis.

niam, Graciam, & Romam inuasit. Habebit ergo causam communem ex lib. 2. de hominis natura sent. 3. & 1. epyd. in proœmio. Hæc causa communis est aer ambiens, quo omnes perpetuò utimur. Proinde dicebat Galenus 1. de differen. febr. 5. pestilentem febrem inspiratione potius contrahi. Aer autem dicitur habere pestilentem conditionem duobus modis: primo, cum habet prauam qualitatem, hoc est, putredinem, toto temperamento nobis contrariam, quam vene-

Primus natam dicimus. Hanc putredinem aer vel à se ipso contraxit, vel modus, aliunde. A seipso, quum ex vaporibus cum eo permixtis, & non quo aer putrefactis, aliqua eius pars ob prohibitam transpirationem putredicitur scit praua putredine. Aliunde eam contrahit, quum vapores à habere terra, aqua lacustris, leguminibus, oleribus, foetidis cloacis, aut pestilen. à mortuis hominibus, putredinem habentibus venenatam, cum eo tem con. permiscuntur. Aliqui, ex corporum cœlestium coniunctione hanc inditionem. aere infectionem provenire affirmant. Cum scilicet Saturnus, Iu-

Quorū- piter, & Mars: aut cum Iupiter & Mars congregitur in humana dam re- domo & signo. Qui omittendi sunt tanquam architecti, in cœlo fabricantes domos sola intellectus operatione. Neque enim in cœli corporibus vis nobis contraria est, qua creata sunt ut nobis seruirent, verum tamen est, hanc contagionem tam lethalem à cœlo proveni-

Secun- re, hoc est à Deo, ut peccata puniat. Quod temporibus David regis dus mo- euenisse in sacris bibliis legimus. Secundo modo dicitur aer habere dus. pestilentem conditionem, quum calidus & humidus est: qua ratione

1. de tempe. Galen. calidam & humidam constitutionem aeris pestilentibus morbis obnoxiam scribit. & Hipp. 2. epyd. par. 1. sen. 1. in

Obie- Cranone ex eadem constitutione carbunculos pestilentes factos testatur, erat enim æstas cum pluviarum multitudine. Dices, Nonne

æstio. pestis habet putredinem pravam? qua ergo ratione aer calidus & humidus dicitur pestilens? Respondeo, aërem calidum & humidum

Solutio. corpora nostra reddere calida & humida, in eisque humiditates augere, & hac ratione in plerisque corporibus pravam generari putredinem, ex qua vapores eleuatos, & cum aëre permixtos similem in eo generare perniciem, & tunc tam esse causam pestis. Si aer causa

Triti- cum nec aqua faciunt pestem.

pestis est, errant ergo, qui triticum putrefactum, aut aquam, pestem efficere sentiunt. Nam etiam si in tritico, aut aqua possit esse putredo venenata, interficiet ea ratione, qua pestis, non tamen dicitur pestis, quia cum non sit causa communis, non inficiet multos. Quares, si

aer

aër est infectus, cur non afficit omnes, cum omnes eum inspirent? Re- Obie-
spondeo ad actionem non solum requiri causa efficientis praesentiam, ctio.
sed passivam dispositionem: & cum non omnia corpora sint disposita ad Solutio.
pestem, non omnia eam concipient. Corpora disposita sunt illa, qua Corpora
habent aliquas obstructions, aut excrementa ad putredinem para- ad pe-
ta, qualia corporibus calidis & humidis reperiri solent, qua contactu stem dis-
aëris putris, facile putrent. posita.

Prius quam curationem praesentis pestis.] Praecautio corporis à In duo-
peste in duobus consistit: primo in status aëris consideratione: secun- bus con-
do in corporis natura. Si aër caliditate, & humiditate pestem fa- sistit pra-
ciat, ipsum alterabimus refrigerantibus, & exsiccantibus. Si aër iam cautio à
habeat putredinem, in ciuitate, & domo, ignem accendes ex tymo, peste.
pulegio, iunipero, cupresso, & aliis odoratis: qua caliditate rarefa- Primò
ciunt aërem, & siccitate humiditatem absumunt. Secundo conside- in aëre.
ra corpus, nam si aër sit calidus, & humidus, & corpus similiter, Secundo
hoc refrigerandum, & exsiccandum erit. Si corpus habeat dispositio- in cor-
nem contrariam, frigidam scilicet & siccam, conserva ipsam. Si aër pore.
habeat prauam qualitatem, considera an corpus habeat firmam sa-
nitatem, an lubricam: si habet firmam & integram sanitatem, tota
praecautio consistet in expurgatione excrementorum, qua secundum
naturam colliguntur. Sic quotidie alui excrementa ducentur (si
sponte non fluant) pilulis Rhasis, thamarindis, & cassia. Excrementa
secunda coctionis, bilis, & melancholia cum facibus expurgantur.
Urina reddenda est, quia detenta acres emittit vapores. Vt excre-
menta tertia coctionis liberè euacuentur, oportet ab aëre frigido,
aquis, & aliis astringentibus cauere, ne ab his cutis densetur. Si cor-
pora habent suauitatem lubricam (est autem hac in corporibus ple-
thoricis, & cacochimis) oportebit plethoram ipsam euacuare atque
cacochimiam expurgare. Quod si plethora coniuncta reperiatur in
corpore cum aliqua cacochimia, tunc temporis utrumque erit pra-
standum, primò igitur secabimus venam basilicam, & deinde cor-
pus purgabimus à cacochimia. Si praua in corpore excrementa re-
periantur, per conuenientes, & ad id à natura destinatas corporis
regiones sunt educenda. Si sit in aliqua vena obstructio, eam aperire
curabis. Si corpus non transpiret, & diffletur, balneo aqua tepida
cutis spiramenta rarefacies. Praeter hac omnia dicta opus etiam
erit in rebus non naturalibus seruare mediocritatem. Cibi sint fa- Cibi.
miliares, parum habentes excrementi, & extenuantes. Quod si ex
natura tales non sint, arte eos tales reddemus mixtis condimentis:
Vinum sit tenue: Aqua pura: Animi pathemata fugienda. Exerci-
tatio, & Venus modum seruent. Tandem utendum est rebus putre- Potus.
dini contrariis, qualia sunt aromata. Quod si aliquis consuevit uti
theriaca, aut alio alexipharmaco, bene poterit eo uti praecautio-
nis gratia:

DE CVRAND. MORB.

gratia : si verò non habuerit illud consuetum , omittendum erit. Quàm falsa sint, quæ hoc loco docet autor de cardiacis medicamentis, intelliges ex capite de syncope.

Non datur diaria pestilens. Epimera pestilens.] Omnis febris pestilens ex Gal. lib. 1. de diff. feb. cap. 7. ex putredine est orta : ac proinde diaria pestilens non reperitur, quia, ut cap. 1. huius lib. probauimus, spiritus non possunt putrescere. Aliqui existimant, bene dari pestilentem diariam, & respondent rationi supra dicta: non omnem pestilentem febrem esse putridam, quia ex Gal. lib. 3. de prasagio ex pulsibus c. 4. datur pestilens hectica, at hectica non fit ex putredine. Respondeo aliud esse febrem oriri ex putredine, & aliud esse putridam. Nam febris putrida est illa, qua ortum habet ex putredine existente in humeribus cavitatis cordis. At febris ex putredine orta illa est, qua ortum habet ex putredine, siue sit in cordis cavitare, siue in eius corpore. Et hac ratione hectica febris non est putrida, ortum tamen habet ex putredine, quàm ex foetore anhelitus colligimus. Putret autem in ea substantia per corpus cordis dissipata, qua ros dicitur, à cuius calore corpus cordis dispositum suscipit factam alterationem. Cum autem hac putredo sit venenata, & dispersa per corpus cordis, non est mirum, si hectica pestilens ita citò hominem interficiat corrumpendo temperamentum cordis, ut nullum medico aut remediis locum relinquat.

Aliquorum ratio probas non omnem pestilentem esse putrem. Putrida pestis quæ.] Febrem putridam pestilentem hac ratione curabis. Cum sit putrida, habebit affectus, quos 1. scholio diximus putridas febres habere. Et ita curatio est incipienda ab humore, qui fluit ad locum affectum. Vnde in principio sanguinem mittemus ex cuiuslibet brachij basilica: neque enim amba basilica simul sunt incindenda, ut autor voluit: praesertim cum eius ratio friuola sit: sectio enim vena, ex quacunque parte fiat, per ipsam euacuat sanguinem, non autem eo replet partes vicinas.

Solutio. Tertiò, purgatione.] Nunquam in principio licet purgare in febre pestilenti: quia fere omnes, qui purgantur, moriuntur, & merito: natura enim eo tempore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si expulsi, iam iuuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad externa fit, praesertim cum humor hic venenatus sit, & in motu ad interiora possit maxime ledere aliquid ex visceribus. Si natura non expulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari: neque enim turgit humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptius reddatur ea ratione, qua atrā bilem (qua etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Galen. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare:

Sanguinis missio. Putrida pestis quæ.] Febrem putridam pestilentem hac ratione curabis. Cum sit putrida, habebit affectus, quos 1. scholio diximus putridas febres habere. Et ita curatio est incipienda ab humore, qui fluit ad locum affectum. Vnde in principio sanguinem mittemus ex cuiuslibet brachij basilica: neque enim amba basilica simul sunt incindenda, ut autor voluit: praesertim cum eius ratio friuola sit: sectio enim vena, ex quacunque parte fiat, per ipsam euacuat sanguinem, non autem eo replet partes vicinas.

Purgatio. Tertiò, purgatione.] Nunquam in principio licet purgare in febre pestilenti: quia fere omnes, qui purgantur, moriuntur, & merito: natura enim eo tempore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si expulsi, iam iuuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad externa fit, praesertim cum humor hic venenatus sit, & in motu ad interiora possit maxime ledere aliquid ex visceribus. Si natura non expulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari: neque enim turgit humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptius reddatur ea ratione, qua atrā bilem (qua etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Galen. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare:

Obiectio. Tertiò, purgatione.] Nunquam in principio licet purgare in febre pestilenti: quia fere omnes, qui purgantur, moriuntur, & merito: natura enim eo tempore aut expulsi humorem ad cutem, vel non, si expulsi, iam iuuanda est, neque impediendus est eius motus, qui ad externa fit, praesertim cum humor hic venenatus sit, & in motu ad interiora possit maxime ledere aliquid ex visceribus. Si natura non expulsi humorem, cum crudus sit, non poterit purgari: neque enim turgit humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptius reddatur ea ratione, qua atrā bilem (qua etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Galen. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare:

Solutio. neque enim turgit humor, cum sit firmatus in loco obstructionis. Dices, quando ergo erit purgandum? Facilis est responsio, cum purgatio post coctionem utiliter fiat, si natura non euacuat. Dices, in hoc morbo, cum humor sit venenatus, nunquam alterabitur à natura. Respondeo, verum esse non alterari ob nutritionem, sed ut ad excretionem aptius reddatur ea ratione, qua atrā bilem (qua etiam non potest nutrire) vincit. Hoc ex Galen. lib. 5. metho. c. 12. possumus probare:

probare: ubi describit quandam constitutionem pestilentem, in qua expurgato corpore vomitionibus & alui deiectionibus: tandem omnibus, qui euadebant, apparebant nigra exanthemata, octavo, & nono die: quæ erant reliquia sanguinis, qui in febre putruerat: quas veluti cinerem natura ad cutem trussit, sicut solet alia etiam supernacua expellere. Iam expurgationem corporis vomitionibus, & alui deiectionibus factam, post coctionem sequutam fuisse, intelliges ex eo, quod utilis fuit. Si hoc ita est, poterit ergo humor venenatus coqui: & à natura utiliter expelli.

Quartò, corroborantibus.] Quando humor venenatus (obstru- Quando
 ctionis causa) in hac febre expellitur à natura ad cutem, & facit apparet
 carbonem: tunc opus est uti medicamentis interioribus assumptis, qua carbo.
 sudorem moneant, & exterioribus attrahentibus. Sudorifica sunt, primò Sudori-
 hac confectio: ℞. confectio de hyacintho & theriaca magna an 3. fica me-
 i. pulue. scordij. 3. ss. decocti scordij, aut carlina, qua est chamaleon al- dicamē-
 bus, aut cori herba quantum sufficit, misce, & fiat potio. Hac confe- ta.
 ctio habet compositionem ex hyacintho, qua roborat interna, ut ex-
 pellant ad cutem, habet theriacam & scordium, qua venenis con-
 trariantur, & renues habent partes, quibus, cum decoctione dicta-
 rum herbarum mouetur humor ad exteriora: debet tamen ager ve-
 stibus & stragulis operiri. Aut possumus etiam uti confectio ad
 modum opiata. ℞. theriaca magna. 3. iij. confectio de hyacintho. Opiata.
 3. ij. antidoti de sanguinibus Gal. 3. ss. pulueris scordij 3. iij. conserva
 capillorum veneris & acetositis citri an. 3. ss. cum syrupo acetosi-
 tatis citri fiat confectio, ex qua accipiat vsque ad 3. iij. cum decocto
 scordij, & cooperiatur. Confectio scordei à Fracastoreo descripta op-
 tima etiam est cum dictis decoctis. Exterioribus supra carbonem, ut at- Appli-
 trahant venenum animalia viua, luteum oui cum sale, panem actu canda
 calidum, & alia, qua tanquam imbecilla omittantur, oportet ergo supra
 scarificare carbunculum: deinde ipsum lauare aqua salita: & tertio carbo-
 apponendum causticū medicamentum: siue tale sit actu, ut est ignis, nem.
 siue potentia, ut argentū, & unguentum egyptiacum. Vltimò crusta
 sensim amoueatur, & vlcus ad cicatricem perducatur. Et cum in
 transitu humoris ad carbunculū detineatur humor in glandulis ex
 sua natura lāguidis, proinde fiūt bubones. Quibus opus est applicare
 etiā medicamenta, qua attrahunt, qualia sunt cucurbitula. Empla-
 strum ex quatuor gummis oppoponaco, serapino, ammoniaco, & eu-
 phorbio utile est: debent enim hac misceri, & subigi cū oleo rutaceo,
 aut camemeli, aut irino, & fieri emplastrum buboni applicandum.

De Exanthematis.

CAP. X.

EXanthemata Græcis, Plinio, & Latinis papulæ, sunt Descri-
 ptiores, & affectus cutis sponte florentes, ut Manardus prio.

de

DE CVRAN. MORB.

de re medica optimè meritis libro septimo epistolarum suarum epistola secunda est autor, quia morborum omnium nomina à nostris recentioribus medicis recepta, & ab antiquis prodita explicantur, quem hac in parte Fuchsius de omnibus bonis disciplinis non secus meritis lib. 5. cap. 8. de curandis morbis sequutus est: quamvis eruditissimus Franciscus Valleriola lib. 1. enarrationum suarum enarratione octava demonstret variolas & morbillos, qui in pestilentibus febribus sæpe (ut præsentis hoc anno, qui est 1555.) apparere per modum quendam iudicii solent, non dici à Gal. exanthemata, neque esse herpes, idem Manardus loco superius citato vult: sed missa nominum questione cum Valleriola herpes morbillos non esse

Divisio.

(pace quod Manardi dixerim) affirmamus: quod optimè probat omnium bonorum autorum sententia. Sunt ergo duplicia hæc exanthemata, quædam sublimia, & cum tumore satis perspicuo, & apparente, præsertim circa augmentum & vigorem ipsorum, quæ dicuntur à barbaris medicis variolæ, & ab His-

Lata.

panis vulgari nomine dicuntur viruelas. Alia exanthemata sunt lata & sine sensibili tumore, quæ barbaris medicis sunt

Error

morbilli, & Hispanis sarampion. Qua in re fallitur Leonar-

Fuchsy.

thus Fuchsius loco superius citato, & sensibus omnino repugnat, dicens, variolas latas esse, & morbillos sublimes: neque enim illud docet Gal. comm. 9. libr. vj. aphor. dicens pustulas, & tubercula, quæ fiunt ab humoribus calidis in acumen tendere, & altum petere, quæ verò à frigidiori, latæ sunt, & non admodum pruriunt, quia fiunt ab humore non acri, aut minùs acri, ideoque variolæ sanguineæ magis pruriunt, & sublimiores sunt iis, quæ à sanguine pituitoso fiunt. Morbilli tamen à biliosissimo fiunt sanguine, & ob id minimè petunt altum, nullumque habent sensibilem tumorem, quemadmodum erysipelas: sanguis enim maximè biliosus in hac cutis affectione maculas, & pustulas pulicum moribus similes procreat latas, & non sublimes, maiores tamen, latiores, & rubicundiores iis, quæ fiunt in pestilentibus, & maximis febribus ab Hispanis dicitur pulgon. Hi morbilli sponte in cute erumpentes brevi tempore evanescent, nulla relicta ulceratione. Quare nulla, postquam perfectè eruperunt, egent curatione.

Causa.

Fiunt papulæ sanguineæ, seu variolæ à menstruo sanguine materno, saltem aliqua ex parte, si Arabibus credimus, qui (ut inquit Valleriola nostræ ætatis eruditissimus) plenius de his, & quantum ad substantiæ rationem, & curationem, quam Græci tractauerunt. Avicenna præcipue, qui Fen. prima quarti post febris pestilentis tractationem eximiam

egit

egit de variolis, & morbillis, indicans & à sanguinis, & humorum feruore hæc papularum genera nasci, & per modum cuiusdam crisis fieri, transmittente scilicet, quæ nostrum corpus regit, facultate in eximias corporis partes vitiatos succos: vbi etiam ostendit quibus temporibus, ætatibus, anni constitutionibus eueniant potissimum, & qua ratione personari possint, idque profectò non minùs copiosè, quàm doctè. Atque hæc ipsa in præsentia de Auicenna, vt ostendam, non omnino, vt plerique nunc volunt, tanti viti dogma abiiciendum esse, sed sæpiùs amplectendum atque imitandum, vbi præsertim quid exacto iudicio illius methodum examinantibus rectè tractasse videatur, & vbi etiam apud Græcos & Latinos acuratam doctrinam non inueniamus. Morbilli verò à sanguine biliosissimo gignuntur, menstruo tamen aliqua ex parte & venenoso adiuuante in his, & variolis procreandis, aëre venenoso & praua victus ratione. Quare inter morbos epidemiales numerantur, & futuram pestem indicant, quando iis multi eodem tempore, eadem regione corripuntur. Si quis dubitat, cur hoc papularum genere omnes, modò ad legitimam peruenerint ætatem, semel afficiantur, quamuis aliquando bis, vt ego vidi, & nonnunquam ter aliqui corripiantur, illi satisfacies opinio quorundam Arabum, & aliorum, apud quos, vt diximus, menstruus sanguis est causa, saltem aliqua ex parte, huius mali: cum omnes in utero generentur ipso sanguine, ac nutriantur: nulla enim externa causa potest esse tam communis omnibus: sæpius tamen pueri, & aliquando iuuenes, rarissimè senes hoc morbo corripuntur: natura enim corpus profundum expurgans senibus est imbecillior, pueris valentior, & illorum corpus magis rarum, paratùmque ad plures morbos ob intemperantiam victus, & natura non potest diu sanguinem prauum ferre. Deprehenditur hoc malum fiens, & factum vno ex viginti signis. Primum variolarum signum est dorsi dolor, ob sanguinis feruorem: vena enim magna ascendens admodum plena est, partèsque ei proximæ, & musculos compressione, pondere, & calore, dolore afficit, vt in plethora experimur. Secundum est nasi pruritus ascendunt, namque à sanguine efferuescente vapores acres. Tertium est timor in somno, hoc est insomnia illis sunt multa, & ipsos terrent, à toto enim corpore ascendunt vapores, & fumi imaginationem, cogitationem, memoriàmque corrumpentes: quo fit vt dormientes sæpè clament. Quartum est partium sententiam vehemens punctio, præsertim earum, quæ cuti subiacent: sanguis enim

*Morbil-
lorum
origo.*

*Signa.
Dolor
dorsi.*

*Pruri-
tus nasi.
Timor
in som-
no.*

Punctio.

DE CVRAND. MORB.

nsio. enim ardens, eiúsque fuliginosi, & ignei vapores cutem distendunt, dolorémque pungentem efficiunt. Quintum totius corporis pondus, & tensio à toto sanguine feruescente partésque omnes corporis extendente. Sextum, faciei rubor, præsertim oculorum & maxillarum, quemadmodum in peripneumonia videmus. Septimum, lachrymæ ob vapores à sanguine ascendentes calidos, & acres, à quibus & humoribus aliis distillant lachrymæ. Octauum, sanguinis, & humorum feruor, & calefactio per vniuersum corpus, qualis reperitur in synochis. Nonum, est frequens pandiculatio, quam halicem medici barbari ex Græcis, qui halin & halicin vocant, nominarunt: de qua Hipp. aph. 57. lib. 7. & Gal. in com. egerunt, quo in loco de pandiculatione & oscitatione fit sermo: quamuis Fuchsius dicat eos errare, qui pandiculationem vertunt halicin, cum anxietudinem significet, quam si habuerint sani, Gal. auctore, semper præsentibus molestantur, & ab vno negotio, & actione ad aliam transeunt: eodem modo & ægros illos anxios esse, qui accubitum non ferentes iacendi figuram euariant, quia semper præsens aggrauat eos. Hoc verò præcipuè illis euenire consuevit, quibus in ore ventriculi, (quem nos abutentes vocabulo sæpe solemus stomachum nominare) certa quædam humoris qualitas continetur ventriculo molesta, quæ neque plurima est, neque in ventriculi fluitat cauitate, sed eam ipsæ imbibere tunicæ: sed meo quidem iudicio, licet illud sentiat Fuchsius, Gal. in com. non solum de oscitatione, quæ chasma dicitur græcè, sed etiam de pandiculatione, quæ Græcis est halici, agit dicens: sed & oscitari, sicut pandiculari contenta aliqua in muscoli, per quos tales fiunt motus, quos pandiculationes & oscitationes nominamus, vel humiditate flatuosa, vel spiritu vaporoso fieri, est à nobis demonstratum, sed & pandiculationem vocat Theodorus, & Marius Nizolius vir doctissimus: & teste Sebastino Corrado in literis omnibus, sed maximè Tullianis versatus conuertens Gal. expositionem linguarum Hip. halysmon, & halicin hæsitationem, & agitationem vocauit. Quin & Petrus Iacobus Steue linguarum omnium & rei medicæ peritus lib. 2. epid. sect. 6. aph. 29. contra sententiam Fuchsi halicin pandiculationem interpretatus est, ac vt Fuchsi non impedimus, quo minus anxietudinem conuertat, ita nos auctoritate horum virorum pandiculationem verè appellabimus. Hic aphorismus secundi epidimion similis est aph. 57. lib. 7. aph. præterquam quod in calce aphorismi epidimion additur, aut lac, quod pandiculationi, seu anxie

anxietudini, & oscitationi multum nocet, quum hæc symptomata à flatu, & frigidis humoribus fiant, & propterea vinum aqua temperatum ea cura, non lac. Quare adiecti-
 tiam esse illam partem fatemur: auctore enim Gal. comm. 34.
 lib. 6. aphor. quando in libris sapientis alicuius sermo inue-
 nitur aliquis manifestò falsus, non sine ratione contingit le-
 gentes dubitare, & primo quidem sibi ipsis diffidere, quasi
 neque illa, quæ sint manifestè nocentia, deinde suspica-
 ri, quod mendum fuerit interiectum. Sed his prætermiſſis
 redeamus ad signum nonum papularum. Tam igitur pandi- *Palpita-*
 culatio, quæ est, vt diximus, symptoma omnium musculo- *tio. An-*
 rum, quam oscitatio, quæ est eorum tantum, quæ sunt iuxta *helitus*
 maxillas hæc symptomata à somno fiunt) quam etiam an- *compres-*
 xietudinem ægrorum, de qua diximus, indicant exanthemata *sio.*
 ob vapores calidos acres & multos à sanguine efferuescen- *Rance-*
 te musculos omnes acriter ferientes, imò etiam totum corpus. *do.*
 Decimum est palpitatio, seu concussio, quam barbari saltum *Crassi-*
 appellant. Hæc differt maximè à conuulsione, tremore, & ri- *ties spu-*
 gore, vt docet Gal. lib. 5. cap. 2. de symptomatum causis. Vn- *ti.*
 decimum est anhelitus compressio, à copia sanguinis & va- *Capitis*
 poris, & fumi crassi thoracem comprimentis. Duodecimum *gravi-*
 est vox rauca. Decimum tertium sputum crassum à nimio *tas.*
 calore. Decimum quartum est capitis pondus, & grauitas. *Dolor*
 Decimum quintum dolor capitis non solum cum grauitate, *capitis*
 sed etiam pungens. Decimum sextum est cordis palpitatio, *pungens*
 quem Arabes caphan, & barbari tremorem cordis nominant. *simul.*
 Fit à febre ardenti & ferme pestilenti. Decimum septimum est *Palpita-*
 oris exsiccatio, & ariditas, quæ semper solet febres ardentes *tio cor-*
 consequi. Decimum octauum est animi perturbationes, con- *dis.*
 uulsio, & syncope ob materiam venenosam cerebrum, nervos *Oris sic-*
 & cor lædentem. Decimum nonum est dolor thoracis, & gut- *citas.*
 turis. Vigessimum est tremor pedum, præsertim si supra dor- *Animi*
 sum iaceat æger, nerui in tali accubitu sanguine & vaporibus *pertur-*
 impleti non liberè animalem spiritum suscipiunt: vnde *bario.*
 tremor pedum fit, & non solum pedem sed & aliarum partium, *Dolor*
 & aliquando totius corporis, vt ego vidi. Vigessimum primum *thoracis*
 est febris synochus putrida, & ardens, præsertim in morbil- *la-*
 lis, cuius febris principium, & augmentum occulta sunt: vi- *ryngis.*
 gor tamen statim apparet, cum sit tempus iudicij Rhases ta- *Tremor*
 men breuitati studens paucioribus notis demonstrat ortum va- *pedum.*
 riolarum, & morbillorum lib. 10. ad Almanforem: Cum, inquit, *Febris*
 febris acuta & conclusa pueris præcipuè, & iuuenibus euenire *syno-*
 cæperit, & cum ea costarum dolor, vasi pruritus, & in somno ti- *chus.*
 mor

DE CVRAND. MORB.

*Remo-
tio ad si-
gna pau-
ciora.*

*Discri-
men.*

mor, & capitis grauitas, & oculorum rubor, & in corpore sentitur punctio, argumentum est ægro vel variolas, vel morbillos citò superuenturos, & libro diuisionum, hoc est aphorismorum, signum, inquit, generationis variolarum est febris acuta, caliditas conclusa, & vehementia doloris dorsi, & pruritus nasi, & timor in somno. Differt morbillus à variola, vt superiùs diximus, quia non habet sensibilem tumorem, lachrymæ etiam in origine morbillorum, sunt plures, & maiores, maior calor, maior respirandi difficultas, & dolor dorsi minor. Salutaria maxime omnium signa sunt febris, omnium symptomatum remissio, facilis egressus, denique omnia boni iudicii signa: mala & sæpe lethalia signa sunt durities, color viridis, violaceus, difficilis & tarda eruptio: tarda suppuratio variolarum, frequens syncopa, & animi defectio, & si post illarum eruptionem subito euanescent, malum indicant, & si contigua sibi sunt omnia variolarum tubercula, & ferme vnum efficiant, vel si vna variola supra aliam exoriat, est signum noxium, & ostendit materiæ vitiosæ copiam. Peius etiam signum in hoc morbo erit, & lethalius, si colori viridi, violaceo, vel nigro tingantur, & si copiosius in thorace, & ventre, quam in cruribus & extremis partibus efflorescant, sunt noxiæ. Signum etiam in his lethale est vrina sanguinea, & deinde nigra, præsertim si facultatis defectus comiteretur: omnes tamen, qui hoc laborant morbo, angina præfocati ferme semper pereunt, & aliquando ventris profluuium dysenterico, vt inferiùs de puero dicemus.

*Cura-
tio.*

Duplex est curatio exanthematum ante eruptionem, & ab eruptione, prior vtriusque est necessaria, altera verò tantum variolis, quæ ex sanguine non bilioso fiunt. Ante eruptionem curatur quatuor remediorum generibus.

*Ante
eruptio-
nem vi-
tus.*

Cibus.

Potus.

Primò, victu tenui parum refrigerante, & humorum motum prohibente, vt aëre parum frigido natura, vel arte parato, floribus, herbis, & aquis frigidis. Cibis frigidis, & paucis sanguinis, vt hordei cremore, lacte amygdalarum dulcium, cucurbita saccharo condita, succo malorum granatorum acidulcium, lentibus, pyris, pomis, & cotoneis assatis, & abstinentia carnum ouorum & vini. Potus sit aqua lentium biscoctarum. Omnia calida nocent, quare alimenta multum dulcia, & salsa, vt cete salsum, & similia malè à nostris fœminis Valentinis exhibentur, quod demonstrat senex Auenzoar: ipse enim puer cum esset, absente patre medico laborans exanthematis ob esos pisces salcos, & sumptum mel

con

consilio foeminarum in pernicioſa ſymptomata incidit.

Secundò, auertentibus, vt ſanguinis miſſione per venæ ſe- *Auerſio*
ctiōem in ætate florentibus, & robore virium, vel per cucur- *Per ſe-*
bitulas cum ſcarificatione ſcapulis, aut natibus affixas, & per cle- *ctiōem*
mentem & ſalubrem purgationem, quæ fiet caſſia fiſtulari, tama- *vena.*
rindis, manna, prunis damaſcenis, rhabarbaro, & mirobalanis, & *Purga-*
non per vehementiora medicamenta, quæ dyſenteriam concita- *tio ſit*
re valeant. hoc enim ſymptoma pernicioſum ſæpe hunc mor- *clemens.*
bum ſequitur, quo multi pereunt, vt ego ſæpe vidi, præſertim *Dyſen-*
hoc anno 1555. inter alios Valentia obiit nobilis & magnifi- *teria ti-*
cus Iacobus de Sylua puer, ſex aut ſeptem annos natus, qui cū *menda.*
à variolis magnis & multis leuatus eſſet, & poſtea affectus mor-
billis ventris profluuiο correptus periit, & patiebatur anhelitus,
& respirandi difficultatem. Optimus quoque eſt hic clyſter in *Clyſter.*
hoc genere remediorum. ℞. foliorum maluarum, violarum,
& mercurialis an. m. j. hordei ſine cortice: & furfuris an. p. j.
fiat decoctum, de quo percolato accipe ꝑ. xv. diacatholiconis
ꝑ. j. olei roſarum ꝑ. iij. ſacchari rubri ꝑ. ſ. miſce, & fiat clyſter.
Suppoſitoria, ſeu glandes ex melle, ſale, & oleo auxilia ſunt, & *Suppoſi-*
neceſſaria etiam infantibus ante primum annum, & ſi oportue- *toria.*
rit, adde parum pulueris hieris ſimplicis. Clyſterem quoque *Obſerua.*
paucæ quantitatis, & vis exhibere pueris, & infantibus ſolemus:
auertentia tamen per ſanguinis miſſionem, & purgationem
nutrici, & non infanti conueniunt.

Tertiò, refrigerantibus cardiacis, vt ſyrupo granatorum, ſyru- *Refrige-*
po roſarum, de agreſta, cydoniorum, myrtillorum, de acetofitate *ratio per*
limonum, de acetofitate citri ſolis, vel cum decocto lentium bis *cardiaca*
decoctarum ſæpe & omni hora exhibitis infantibus quantitate
vnius cochlearij, grandioribus verò maiori: conſerua etiam ro-
ſarum, violarum nenupbaris, cydoniorum, & acetofæ, vel hac *Conſer-*
aut ſimili mixtura. ℞. theriacæ de citro, & limonata ſmaragdo- *ua.*
rum an. ꝑ. j. confectionis de hyacintho ꝑ. iij. coralli rubri præpa- *Cōfectio.*
rati ꝑ. ij. conſerua acetofæ, & roſarum an. ꝑ. iij. ſyrupi acetofita-
tis citri q. ſ. miſce, & fiat confection. Si æger fuerit pauper. ℞. *Pauperi.*
theriacæ de citro & limonata ſmaragdorū an. ꝑ. j. ſucci citri
angulorum & malorum granatorum acidulcium an. ꝑ. ſ. miſce
igne pauco.

Quartò, corroborantibus partes aliquibus, ne offendantur, *Corro-*
affectasque curantibus, inter quas ſæpius, & magis oculi, *boratio.*
pulmones & inteſtina læduntur: ſtatim ergo initio febris
ante eruptionem exanthematum ſæpe oculis inſtilletur hic
aut ſimilis liquor frigidus actu. ℞. aquæ roſatæ ꝑ. iij. ſemi- *Initio*
nis cydoniorum, ſumac. an. ꝑ. j. miſce. Zaphirus lapis oculos feb. *feb.*

DE CVRAN. MORB.

Visum suo tactu corroborat. Si incipiant eruptiones exanthematum,
corrobo- adde parum croci medicamentis repellentibus & parum aquæ
rans. fœniculi : si tamen oculi laborarint exanthematibus, sum-
Quando mo studio prohibenda est eorum maturatio per exsiccationem
oculi la- factam mixtura ex sale, camomilla, & fursure actu calidis,
borant aut ex semine fœniculi, milio & ruta. Oculorum albugo, &
variolis. cicatrix, ne visio pereat, curatur aqua corticum fabarum, sy-
Quibus rupo rosarum, rhodomelle, pulvere sacchari candi, pulvere
curatur ossis sæpiæ & aliis, de quibus capite 18. & 19. superioris lib.
albugo. Thorax, & pulmones corroborantur ab initio, & semper loch
Corro- ex lentibus, cuius duæ sunt præcipuæ descriptiones, prior hæc.
borantia ℥. farinæ, vel pulueris lentium. ℥. iij. seminis papaveris ℥. j.
thoracē. conseruæ rosarum ℥. ij. iulep rosati ℥. β. misce, & fiat loch:
Loch altera est in usu apud Valentinus. ℥. lentium p. ij. vuarum
lentium, passarum sine granis. p. j. seminis papaveris. ℥. ij. rosarum
cuius ℥. β. fiat decoctum ad pondus lib. i. cui percolato adde saccha-
dua sunt ri candi lib. β. Pulueris dragaganti frigidi ℥. ij. misce, & igne
descri- pauco fiat loch, de quo accipiat sensim transglutendo, ut ab
ptiones. vna via in aliam permeent. Intestina corroborantur clystere ex
Intesti- solo lacte, in quo lapides igniti extincti sint, vel calybs. Si
norum ventris profluuium adsit, adde pulueris dragaganti, masticis,
corrobo- sanguinis draconis. an. ℥. j. & si hoc non satis fuerit, illa ne-
ratio. cessaria erunt, quæ cap. 36. 37. & 38. superioris libri diximus.
Narium Naribus quoque ne impediatur capitis purgatio, & refrigera-
auxilia. tio, sunt admouenda oleum violaceum, amygdalarum dul-
Post eru- cium, sesaminum, vnguentum rosatum, & ad maiorem pur-
ptionem. gationem succus betæ, vel maioranæ cum aqua rosarum est
 bonus. Ulcera narium curantur tersione per mulsam, rhodo-
 mel, oxymel simplex, & post per vnguentum lithargyrii cum
 pauco pulvere tuthiæ præparatæ, vel consule doctum chirur-
 gum. Apparantibus exanthematis, si natura probè illa excre-
 uerit, nullam oportet facere medicinam iuxta aphorismum
 vigesimumprimum Hipocratis libri primi, quæ indicantur, aut
 indicata sunt integrè neque mouere, neque nouare siue medi-
 camētis, siue aliter irritando, sed sinere oportet, victus tamen est
 permutandus : nam omnia, quæ non impediunt eruptionem, &
 ipsam facilem reddant, sunt necessaria, ut aër calidus, victus
 tenuis, aperiens, & mouens ad cutem humores, ut est ius ex
 ciceribus, foliis raphani, petroselini, & croco, & similibus.
 Potus sit aqua hordei, & caricarum. Inspicere res rubras, &
 Inspectio puniceas summè necessarium, propter imaginationem enim
 rerum feruntur ad cutem humores. Aliqui inuoluunt infantes pannis
 rubrarū. puniceis, quod non damno, sed primum magis laudo. Quòd
 si

si natura in expellendis humoribus tardior, aut imbecillior sit, ipsaque exanthemata difficulter egrediantur, & modò emineant, modò aspectum fugiant, est signum perniciosum: si id ob magnam plenitudinem aduenit, sanguinis missio fiat secta vena iceoraria, vel ab scapulis sanguis mittatur per cucurbitulas cum scarificatione: hæc enim vacuatio non impedit opus naturæ, quemadmodum ea, quæ fit secta vena. Deinde, etiam si non præcesserit sanguinis missio, plenitudo non est, & robur virium, hoc, aut simili medicamento vtere, quod tollit obstructions clementer, humoresque ad summam cutem ducit. ℞. caricæ xv. seminis fœniculi, apij, laccæ, an. 3. ij. lentium sine corticibus 3. j. ꝑ. gummi dragaganti, rosarum, santalorum, seminis cydoniorum an. 3. ij. decoquatur in libris viij. aquæ ad medietatem, cui percolato adde croci in puluerem redacti. 3. ij. Dosis bis in die vncia vna. Hoc medicamentum est etiam expertum, & optimum huic generi. ℞. laccæ ablutæ 3. vj. lentium sine cortice 3. viij. gummi dragaganti 3. iij. decoquantur in 3. viij. aquæ ad medietatem. Dosis omni hora est cochlearium vnum præsertim ventriculo vacuo. Si ei adderes syrupi de duabus radicibus, & cap. Ve. an. 3. ij. melius saperet, & valeret. Suffitus rerum redolentium calidarum trahit quoque humores ad cutem. Inuolueret etiam totum corpus pannis calidis suffitu rerum calidarum ducit ad cutem humores. Post integram exanthematum eruptionem, & maculationem est necessaria puris euacuatio, & exsiccatio: ruptis igitur exanthemantibus acu aurea, vel argentea perfectius, & citius exsiccabuntur, & in futurum parvæ remanebunt cicatrices: pus enim, si diutius permanferit, magnam efficiet cauitatem, maioresque cicatrices apparebunt. Hoc medicamento desiccantur exanthemata. ℞. salis, farinæ fabarum, & lentium an. ꝑ. j. farinæ orobi, lithargirij, cerusæ an. ꝑ. ꝑ. misce. Exsiccantur similiter foliis salis, quo auxilio vrantur nostræ fœminæ in desiccandis exanthematibus, etiam non facta arte incisione: quamvis si, vt dixi, fiat, multò minores cicatrices, & vestigia apparebunt. Sed si cupis exanthematum vestigia tollere, & faciem pristino nitori restituere, lege, quæ diximus cap. 22. inter alia oleum roris marini (optimum fit in oppido de Octinent, & aliis Valentiniæ ditionis oppidis) & balsamum in hoc sunt sæpè probata. Mixture ex optimo melle, ex pulvere ossis sæpè admodum locis affectis omnes cicatrices, & maculas tollit. Eandem vim habet spu-

Quando sanguis vacuandus.

Optimum auxilium cum natura tarda est in educendo ad cutem.

Suffitus.

Euacuatio, & exsiccatio.

Laudatur incisio.

Ad venæ stigiam tollenda.

Mixtura optima.

DE CVRAND. MORB.

Spuma maris. ma maris. Post balneum frequens laua sæpe faciem, & alias partes affectas cicatricibus, & signis aqua calida cum farina orizæ, furfure, & amido, & curabis. Hæc aqua calida eundem præstabit

Aqua præstantissima. vsum, si ea sæpe calida lauentur partes: & radicis serpentariæ lib. j. foliorum, florum, & corticum fabarum viridium m. iij. succi saponariæ ℥. iij. aquæ rosarum, & succi limonum an. ℥. iij. misce, & fiat ex his aqua per distillationem. Idem præstat hoc

Medicamentum optimū quod dicitur. medicamentum. ℥. pinguedinis gallinæ ℥. j. gummi draganti, & arabici, florum fabarum an. ℥. ss. fiat decoctum in aqua decocti furfuris, quo reseruato in vitreo vase laua partes has saltem bis in die. Hoc quoque medicamentum est optimum in hoc genere remediorum. ℥. lithargirij bene loti, cineris radicum cannarum, ossium canis, vel leonis, farinæ cicerum, & orizæ, seminum melonum, cucurbitæ, been, costi an. ℥. ss. misceantur omnia, & cum muscilaginibus fœnugreci, seminis lini, & pauco melle fiat inixtura, quæ à nostris fœminis dicitur muda, quæ sæpè faciem, & alias partes his maculis laborantes prima nocte & summo mane lotas aliqua ex supradictis aqua, vel solo decocto furfuris proculdubio curauit. Deoque auspice, cui laus & gloria sempiterna tribuenda est.

Scholium.

Febres in variolis & morbillis. **Discrimen inter hæc.** **Curatio.** Xanthemata Græcis.] Quamuis exanthema sit nomen generale, omnes cutis efflorescentias comprehendens speciatim, per exanthemata, variolas & morbillos intelligimus. Sunt ergo duæ febres, quarum una synochos est, & altera tertiana continua: quæ eam habent naturam & constitutionem, ut celerem habeant motum, & statim crisi finiuntur, ita ut synochos humorem expellat ad cutem, qui facit variolas, quæ sunt tumores à nostris appellati pigota, tertiana verò efficit morbillos, tumores latos & leuatos parum, qui à nostris pallola dicuntur. Humor autem in his febribus neque est permixtus cum sanguine menstruo, neque est venenatus: sed aut est sanguis, aut bilis: quæ talem putredinem conceperunt, quæ citò vincitur, & expellitur: ita ut illos tumores efficiat. Inter hos tumores est discrimen: morbilli enim sunt tumores sicci, & qui non veniunt ad suppurationem: bene tamen variola, in quibus statim humor mutatur in pus: & sic vlcera multa efficiet. Inde colliges, malum esse humorem, & recurrere ad interna, quia facit in ventriculo, intestinis, & aliis partibus multa vlcera quæ lethalissima sunt, quia ex ipsis lyenteria, & alia symptomata eueniunt. Quem metum non habemus in morbillis. Harum febrium curatio, cum sint putres, ab obstructione fiente erit inchoanda, ac proinde in principio sanguinem

sanguinem mittimus. Et cum natura statim vincens humorem in *Quibus*
foco existentem efflorescentias faciat, aut verius tumores: proinde *inuenitur*
his apparentibus oportebit cessare à missione sanguinis, & motum *motus*
natura iuuare. Quod præstabimus potu, alimentis & medicamen- *natura.*
tis astringentibus, roborantes partes internas. Sic potius est secun-
dum ius lentium quod adstringit. Alimenta sunt pyra, malum gra- *Alimen-*
natum & similia. Nos solemus malum granatum totum contun- *ta.*
dere, succumque exprimere, cui permiscemus croci parum & syru-
pum de agresta, quod interdum propinamus saepe. Medicamenta sunt *Medica-*
syrupe adstringentes, & alia similia. Vnde videmus errare Ama- *menta.*
tum, & qui illum sequuntur in his exanthematis videntes rebus
sudorem mouentibus: hæc enim aperiunt meatus internos, & sic
imminet periculum, ne humor ad interiora recurrat. Hoc autem
timemus, non quia humor in transitu exulceret, ut omnes video sen-
tire, humor enim benignus est, & à natura victus: sed ne fiant in
solitis partibus internis tumores, quos variolas appellamus. Atque
hæc sufficiant. Sitque laus, gloria, & honor omnipotenti Deo semper.

F I N I S.

MEDICA DISPUTATIO.

*An cannabis, & aqua, in qua mollitur,
possint aërem inficere.*

CVM febrium tam multarum, tamque grauium, quæ pro-
ximo autumnio Valentiam inuaserunt, causam eruditissi-
mi medici scrutarentur, in eam opinionem quidam inciderunt,
ut hæc omnia detrimenta, quæ non solum ad Valentiam, sed
etiam oppida finitima redissent, ad congeries aquarum, in qui-
bus cannabis emolliretur, referrent, qua sententia intellecta
meam ut proferrem, iusserunt grauissimi inquisitores nostri,
quorum familiarum ego medicus præpositus sum. Quibus ut liben-
tissime parerem, quid sentire, volui declarare. Cannabem igitur,
& aquam in qua infunditur atque mollitur, aërem inficere atque
corrumpere qui censent, ex ingrato odore demonstrare conan-
tur, qui effectus à putredine cum sit, maximam vim affert ad
aërem alterandum, quo alterato necesse est morbos procreari.
Quod argumentum videretur Galenus in libello de theriaca ad

DE CVRAND. MORB.

Pisonem Hippocratis exemplo confirmare his verbis. Quamobrem inquit Hippocratem illum multis modis admirandum laudo qui lucem illam ex Æthiopia Græcos inuadentem non aliter curauerit, quam aëris mutatione, & alteratione, ne talis amplius inspiretur. Præterea Auicenna sententia prima, quarto libro, tractatu secundo, capite primo visus est, velle aërem infici posse ab aqua, in qua cannabis maceraretur his verbis: Putredo accidit aut propter cibum malum, quum est præparatus, vt putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suæ substantiæ, aut propterea quod velociter recipit corruptionem, quamuis sit bonæ substantiæ, sicut lac: aut quia aquosus nutrimenti mali remouens sanguinem à substantia sua, sicut illud, quod generatur à fructibus humidis, valde tardis ad digerendum, aut quoniam ex illis est, qui non conuertuntur ad sanguinem bonum, imò remanet humor malus, frigidus, quem abhorret calor innatus, & putrefacit illum, sicut ille, qui generatur à cacumine, & citrulo, pyris & similibus, aut propter malitiam artificij eius, aut horæ ipsius, aut ordinis eius, secundum quod scis: aut propter oppilationem prohibentem respirationem, & euacuationem propter complexionem corporis malam, cum non potest digestionem facere bonam: aut propter dispositiones extrinsecus ex aëribus malis, sicut est aër pestilentiae, & aër lacunarum & locorum infusorum, in quibus huiusmodi res madesunt, vt linum, & spartum paulò post alias feruè putredinis causas scribit Auicenna, motum videlicet, & balneum à cibo, & solem in æstate, & alimenta calida in secunda mensa. Sed omnibus iis argumentis aduersatur experientia, cui magna fides habenda est auctore Galeno libris prioribus de simplicium medicamentorum facultate: sunt enim vires, & oppida multa in Hispania saluberrima, in quibus magna cannabis copia seritur, & emollitur, Setabis, videlicet, Tarraco, Alcagnicium, Requena, Vtielum, Vilanoua, Infantium, & de Alcarras (sunt hæc oppidorum nomina) in quibus & plerisque aliis homines, & sanitate, & senectute fruuntur. Contra verò plurima oppida vidimus febribus vexata, in quibus nullus cannabis cultus est. Imò Valentia anno 1523. & 1530. maxima peste fuit correpta, quo tempore ne ferebatur quidem cannabis, nedum macerabatur: ab anno tamen 1530. ad hæc vsque tempora magna vis cannabis alitur, & mollitur, nec pestilens constitutio genita est. Verum his experimentis multæ subiunguntur rationes, quarum prima est non solum non alterare aërem, sed putredinem noxiam expellere, & superare quæ posset in aqua gigni. Atque vt hoc intelligentius expediatur, quid de cannabe scripserint phisici,


Experientia docet aquam cannabis non inficere aërem. Ratio confirmans experientia.

fici, & medici veteres, videndum erit. Dioscorides ergo libr. 3. Diosco-
 cap. 141. duplicem esse cannabem asseruit, vnam syluestrem, *vid. quid de can-*
 quæ inflammationes lenit, tumores discutit, tophos articulo- *nabe.*
 rum, lapidosasque durities dissipat, & funibus texendis est apta: *Plinius.*
 alteram verò satiuam, cuius semen maiori copia sumptum ge-
 nitale semen extinguit, eiusque succus auribus instillatus earum
 dolores curat. Plinius verò libr. 19. capit. 9. dicit, eam integra-
 tum habere odorem, quando seritur, & quando vellitur, cuius
 semen Italorum est cibus, & post lib. 10. cap. 23. dicit cannabis
 in syluis nata est nigriore filo & asperiore, semen eius extin-
 guere genituram virorum dicitur, succus vermiculos aurium, &
 quodcunque intrauerit eiicit, sed cum dolore capitis: tantæque
 vis ei est, ut aquæ infusus eam coagulare dicatur. Radix con-
 tractos articulos emollit in aqua cocta, item podagras, & simi-
 les impetus. Galenus post Hippocratem medicorum facile prin- *Galenus.*
 ceptus 1. de alimentorum facultatibus cap. de semine cannabis, *nus.*
 asserit quosdam ipsum contusum cum aliis tragematibus, id
 est, bellariis secundæ mensæ potus gratia comedere: & libro 7.
 de facultatibus simplicium medicamentorum eadem, quæ Dio-
 scorides scribit, additque, flatus eo dissipari. Cuius ergo tanta vis
 ut est, hæc omnia, quæ ab his autoribus scribuntur, efficiat, credi
 non facile potest, aërem infici ab eo posse, sed nec inficere pos-
 se credendum est, cum gramina omnia, & herbæ noxiæ ipsius
 vicinitate pereant. Quod si hæ vires cannabi tribuuntur, non *Enecat*
 tantum putrefaciet aquam, quantum, quæ fit putredinem excu- *herbas.*
 tuer. Vires autem hæ cannabis, quæ calidissima & siccissima est, *Ratio*
 ac planè ignea, ut ab scriptoribus proditæ sunt, & eas experimur *validis-*
 quotidie. Tam acri ergo facultate prædita cum sit, agricolæ, ut *sima.*
 ea uti possint, in aquis mergunt, ut humiditate & frigiditate con-
 trariis qualitatibus eius vis vinci possit, quæ in pugna tam re-
 missæ sunt vires harum qualitatum, ut cum neutra superet alte-
 ram, putredo noxia gigni non possit: quæ tamen caliditate &
 humiditate superante generatur. Ingratum verò odorem esse,
 & caput eo offendi ex Plinio scimus: non tamen valde putrem:
 nec enim id vilis autor affirmavit, nec ratione confirmari po-
 test, sed cum tanta sit eius acrimonia, tamque ignea eius fa-
 cultas, potest offendere non solum odoratum, sed caput etiam
 ipsum: at hoc ad gignendos morbos populares, quales isti vole-
 bant, satis esse non constitit, nec vlla ratione demonstrarunt.
 Neque locus ex Galeno indicat veram esse illorum sententiam,
 neque eo uti potuerunt, nisi ostensum fuisset, aërem canna-
 bis aqua posse infici, nam alioqui infecto aëri sola eius mu-
 tatione, & alteratione mederi possumus. De Auicennæ autori-

DE CVRAND. MORD.

tate ita iudico, vt contra nihil faciat, cum in ea nulla cannabis fiat mentio, & si vera esset, loca, in quibus spartum emollitur, essent insalubria, quod experientia aduersatur, cum oppidum del Villar regni Valentini sit saluberrimum: infunditur tamen semper spartum. Præterea si in his omnibus esset credendum Aui-
In Aui- cennæ, alimenta mali succi, vt fructus ab eo dicti, & etiam lac
cennam. optimi succi, & alia multa vt exercitationes, balneum, calida ali-
Tempe- menta à cibo essent omnino prohibenda. Scio ego temperatam
rata regionem esse omnium saluberrimam, quam non possident
omnium Valentini, vt Ledesina eruditissimus credebat: scio & hanc para-
saluber- tam esse ad morbos humidos, & pituitosos, quamuis ferè omnes
rima. sint biliosi, & propterea multi apoplexia pereunt, plurimi morbo
Valen- comitali perimuntur: sed tamen hæc omnia non conuincunt
zia qui- ad cannabis lacunas causam morborum esse reiiciendam. Sed
bus mor. his omnibus omissis non esse hæc curanda vellem, sed dico re-
bis obno. gionem hanc non iis, sed aliis circumfusiis aquis totam alterari,
ma. ideoque pars, quæ ad mare pertinet, est insalubrior, vt domus regia, & omnes domus, à via Saguntina vsque ad mare non salubri loco sunt: sunt enim humiliores, nam loca montana salubria sunt magis. Si ingratus censetur ab his odor cannabis, multò magis brutorum, & vermium, quibus nostra Valentia sæpissime est plena: si ingratus est odor cannabis, multò grauior est odor excrementorum corporis humani, quorum vacuatione carere non possumus, at multò magis iis abundant, quia cloacæ innumeræ sæuam exhalant graueolentiam, & semper apertæ sunt. Si principes ciuitates, & domus saluberrimas amant, & vaporum graueolentium expertes, eligant loca temperata, & alta, & à mari, & aliis aquis stagnantibus multum distantia, in quibus nulla arbor, nullaque herba aërem aliquando inficiant, qualis sunt nux, ficus, sambucus, helleborus, eruca & brassica. Sed cum ex his intelligi possit, pestilentium morborum aliò referendam fuisse causam, plures rationes non addam, cum tamen adiungi possint & rationi, & experientia consentaneæ.

INDEX



I N D E X

R E R V M, A C V E R B O R V M.

A



CRIA nocent
Diarrhææ.

100. a

Accipitris &
murium vis

41. a

Achorum descriptio causæ &
notæ.

17. b

Admonitio in sistendo fluxu
sanguinis à capite.

72. a

In parte difficili.

161. b

In quartana.

190. b

Adeps caprinus curat ventris
profluuium.

101. a

Aërem salubrem efficientia.

199. b

Aërius reprehenditur.

23. a

145. b

Albuginum oculorum descri-
ptio causæ & curatio.

59. b

Alexandri Tralliani medica-
mentum purgans pituitam

lethargi.

29. b

Algalia quâdo necessaria.

135. b

Amati Lusitani error.

97. b

Amor insanus quid.

43. b

Amoris insani præservatio. ibi-
dem.

Animæ curatio.

199. b

Anasaræ curatio.

122. b

Ani procidentia descriptio &
causæ.

150. b

Curatio.

ibid. b

Anodyna in arthritide.

168. b

Anginæ descriptio & causæ.

68. b

Causæ notæ & curatio.

69. a

Ante balneum quæ seruanda.

196. b

Antiquæ cephalalgia curatio.

23. a

Antidorum nobile ad pestem.

203. a

An secunda sit vena in omni

febre putrida.

181. a

A pleuritide suppurata pauci

evadunt.

78. b

Apium & alia multa epilepsiam

detegunt.

36. a

A pituita fere semper epilepsia.

ibid.

Apoplexiæ descriptio & cau-
sæ.

46. a

Notæ & curatio.

ibid. b

Apoplexiæ topica auxilia.

47. b

Apoplexiæ vitæ & mortis ex-
ploratio.

48. a

Apoplectici cur non sepelien-
di nisi post tres dies.

ibid.

ibid.

ibid.

- Apophlegmatismi, masticato-
 ria barbari vocant. 47.a
 Apoplexia proxima epilepsiæ.
 38.a
 Appetentia immodica, & eius
 causæ. 94.a
 Appetentia cur necessaria.
 95.b
 Appetentia quomodo fiat &
 quid sit. ibid.
 Apparantia bilem cum pituita
 & vacuantia. 186.b
 Aqua ligni guaiaci. 12.b
 Aqua similacis asperæ. ibid.
 Aquæ faciem tersiorem & can-
 didiorem reddentes. 66.a
 Aqua efficacissima & approba-
 ta. 56.b
 Aqua cerasorum præstantissi-
 mum remedium in epilepsia.
 36.b
 Aqua præstantissima in Tabe.
 84.b
 Aquæ carnis laus, eius præpa-
 ratio. 194.b
 Aqua roris marini vtilissima
 resolutis. 50.a
 Aqua carnis heceticis. 194.b
 Aquæ ex limacibus laus.
 195.a
 Ardoris urinae descriptio, cau-
 sæ & notæ. 137.b
 Ardoris urinae curatio. 138.a
 Arabum opinio in Iscuria.
 134.b
 Arthritidis descriptio species
 & causæ externæ. 167.a
 Arthritide pauci laborabant
 Hippocratis tempore. ibid.
 Arthritide laborantes Eun-
 chos vidit Galenus, non au-
 tem pueros. ibid.
 Arthriticus visus puer. 7.8.9.
- annorum. ibid.
 Arthritidis hæreditarius morbus.
 167.b
 Arthritidis curatio. 168.a
 Ascitis causæ & Anasarca.
 122.a
 Ascitis curatio. 123.b
 Aspectum corroborantia.
 58.b
 Acuentia. 59.a
 Asthma quid. 74.a
 Asthma ut epilepsia accessio-
 nes habet. ibid. b
 Asthmatis curatio extra acces-
 sionem. ibid.
 Asthma morbus cronicus, ibi-
 dem.
 Auertentia sanguinis impe-
 tum. 69.a
 Auertentia pituitam. 21.b
 Auertentia in accessione epi-
 lepsiæ 34.b
 Auenzoar vixit 135. annos.
 160.b
 Augentia capillos. 7.b
 Auctor quibus auxiliis curauit
 febres compositas.
 193.a
- B
- Balnei commoditas. 196.a
 Balneum ex aqua frigida no-
 cet heceticis. ibid.
 Benedictæ Nicolai compositio.
 1.b
 Bene & liberaliter nutrientia.
 26.a
 Bilis purgatorium mixtum cū
 purgatorio pituitæ purgat
 pituitam. 30.a
 Bilis flaua coquenda est. 2.a
 Bilem flauam coquentia sim-
 plicia

plicia & composita. 2.b
 Bilem atram concoquentia
 simplicia & composita. 3.a
 Bilem atram purgantia simpli-
 cia & composita. 3. b
 Bilis vacuatur in arthritide sine
 concoctione. 168. b
 Bilis turgentis purgatio.
 181. b
 Bilis non turgentis præparatio
 & euacuatio. ibid.
 Bouis mortui propinqui caro
 est boni succi. 39. b
 Brasauoli error. 71.a
 Britannica febris sudatoria.
 203. a

C

Calculi vesicæ causæ & notæ.
 131. a. b
 Calculi renum notæ. ibid.
 Calculi renum & vesicæ cura-
 tio. 132.a.b
 Camphora calida. 87.a
 Cantharides. 134.b
 Cantharidum improbatio.
 223. a
 Cancris fluuiatiles. 194. a
 Capitis doloris nomina & cau-
 sæ generales. 19. a
 Capitis doloris singularis cau-
 sæ & notæ. 19. a. b
 Capitis doloris curatio. 19.b
 Capitis distillatio diarrhæam
 facit. 100. a
 Cardiacorum species. 199.b
 Carbunculi curatio. 203.b
 Cataplasma ad hydropem.
 125. a
 Cæparum esus largus lethar-
 gum gignit. 29.b
 Cauterium in fluxu sangui-

nis quando necessarium
 146. a
 Cibi fastidium quid, causæ, no-
 notæ, & curatio. 95. b
 Cinis scorpionum. 133.a
 Cinis leporis, corticum ouo-
 rum gallinarum & mortu-
 cillæ. ibid.b
 Clyster nutriens. 40.a
 Clyster ad somnum. 102.b
 Clyster ex iure gallorum.
 112. b
 Clyster communis colici dolo-
 ris. ibid. a.b
 Clyster potentissimus in mola.
 160. b
 Clyster periculosus habentibus
 herniam. 165.b
 Clyster in quartana. 190. a
 Cholerae descriptio causæ no-
 tæ & curatio. 97.a.b
 Colici doloris descriptio, cau-
 sæ & notæ. 110. a. b
 Colici doloris curandi regulæ
 obseruandæ. 111.a.b
 Colici fetus & repellentia.
 112. b
 Colocinthidis substantia no-
 cet intestinis. ibid.a
 Comitialis morbi descrip-
 tio, diuisi o, causæ & notæ
 33. b
 Comitialis morbus hæredita-
 rius non curatur, non hære-
 ditarius difficulter, maximè
 à 25. annis. 34.a
 Composita lapidem frangen-
 tia. 134. b
 Composita pituitam conco-
 quentia 3. a. purgantia. 3.b
 Concoctio quid indicat. 2.b
 Concoctione non præcedenti
 vacuatio non faciendæ. ibid.
 Con

Conditum in hectica. 195.b
 Confectionis hamech com-
 positio. & dos. 5.a
 Confectio purgans ad Galli-
 cum morbum. 12.a
 Confectio vtilissima min-
 gentibus sanguinem. 140.a
 Confectio diabete optima.
 141.b
 Confectio vtilissima conuul-
 sioni. 49.b
 Confectio expuentibus san-
 guinem. 82.b
 Confectiones duæ in quarta-
 na. 191.a
 Confectio laudatissima ad pe-
 stem. 203.b
 Corrizæ catharrhis raucedo,
 tusses. 71.a
 Correctio rigoris & frigoris
 in tertiana. 186.b
 Corrigentia symptomata fe-
 brium putridarum. 182.b
 Corroborandus ventriculus
 in tertiana notha. 187.b
 Constantinus. 109.a
 Consuetudo Carpentanorum
 in sumendis syrupis. 3.a
 Consolida optima in hernia.
 166.a
 Conuulsionis descriptio, spe-
 cies & diuisio. 50.b. 51.a
 Conuulsionis causæ. ibid.
 Conuulsionis notæ & cura-
 tio. 52.a
 Conuulsionis purgatio sine
 concoctione. 52.b
 Conuulsioni admirabile me-
 dicamentum topicum. ibid.
 Cucurbitula vomitum & de-
 iectionem cohibet. 98.a
 Curatio achorum cum pileis.
 18.b

Curatio mixta doloris colici
 & renum. 112.a
 Curatio Arthritidis calidæ.
 168.a
 Curatio frigidæ Arthritidis.
 168.b

D

Decidentia capillorum de-
 scriptio, causa & signa. 1.a
 Decidentia capillorum mor-
 bi Gallici symptoma est.
 1.a
 Decidentia capillorum cura-
 tio. 1.a
 Decidentia capillorum à
 causa valida vnguentum.
 7.a
 Decidentia capillorum à causa
 frigida vnguentum. ibid.
 Decoctum sumendum die
 purgationis melancholiæ.
 40.a
 Defluxus humorum à capite.
 71.a
 Dentium dolores, & de ipsis
 quoque denigratis & mo-
 bilibus, & horum causis.
 67.a
 Dentium dolorum notæ &
 curatio. ibid.
 Dentes maiori cum dolore
 medicamentis quàm ferro
 euelluntur. 68.a
 Dentium omnem dolorem
 curant serpentum exuuiæ.
 ibidem.
 Dentibus enascentibus pue-
 ris multi morbi fiunt. ibid.b
 Deriuatio humorum in le-
 thargo. 30.a
 Deriuatio in vertigine pi-
 rui

tritosa.	33.a	sumpto medicamento pur-	
Deriuantia pituitam.	22.a	gante.	2.a
Diabetis descriptio & causæ.		Dosis syruporum.	3.a
140.b		Dysenteriae descriptio causæ	
Diabetis historia inaudita.		& notæ.	106.a
ibidem.		Dysenteriae curatio.	ibid.b
Diabetis signa & curatio.		Dysenteriae antiquæ curatio.	
ibidem.		107.b	
Diaphœnicon compositio &		Dyspnææ descriptio, causæ,	
dosis.	5.a	notæ.	74.a
Diarrhææ descriptio & diui-			
sio.	99.b		
Diarrhææ notæ & curatio.			
ibid.	100.a		
Diligentior epilepsiæ curatio			
in gratiam Valentinorum.			
34.b			
Discrimen doloris colici à			
magnitudine & humore			
acri.	110.b		
Discutientia reliquias in me-			
lancholia & alterantia.			
40.b			
Dissipantia humores qui an-			
ginam pepererunt.	69.b		
Dissipantia in morbo laterali.			
78.a			
Dissipantia in arthritide.			
169.a			
Discutientia pituitam.	22.a		
Dissoluentia grumos sangui-			
nis.	83.a		
Distillationis à causa frigida			
curatio.	71.b		
Distillationis à causa calida			
curatio.	72.a		
Diuerrentia in morbo comi-			
tiali.	35.b		
Doloris aurium causæ & no-			
tæ.	61.a		
Doloris aurium curatio. ibi-			
dem.b			
Dormiendūne sit an non			

E

Electuarius ferme om-	
nium purgantium compo-	
sitio & quantitas simpli-	
cium valenter purgantium	
& dosis.	6.a.b
Electuarium mirabile ad sol-	
uendam epilepsiam.	37.a
Electuarium in febre com-	
posita.	193.a
Electuarium in hectica ex te-	
stitudine.	195.b
Empyematis descriptio, cau-	
sæ, notæ.	83.a
Empyematis curatio.	ibid. b
Epilepsiæ descriptio, causæ &	
signa.	33.b
Epilepsiam mouentia.	36.a
Epilepsiæ curatio.	34.a
Epithema cardiacum.	181.b
Error quorundam in purgan-	
tibus medicamentis.	4.b
Error Fuchsi.	206.b
Error quorundam in compo-	
nendo diaphœnicon.	4.b
Error quorundam in compo-	
nendis pilulis cochus.	
6.b	
Error Auicennæ.	35. a. &
193.b	
Error indoctorum in pleuri-	
tide	

- tide. 78. b
 Error in explicatione ieteri. 95. b
 119. b
 Error in curandis hæmorrhoidibus. 147. b
 Error iuniorum super affatione rhabarbari. 97. b
 Error quorundam in præparandis cantharidibus. 124. a
 Errores digni memoria. 179. b
 Error foeminarum in victu febrium putridarum. 181. a
 Error Arabum in hectica. 193. b
 Error recentiorum in febre pestilenti. 200. a
 Errhina ad lethargum. 30. a
 Exempla duo vertiginis antiquæ. 33. a
 Excitantia & liberantia epilepticum in accessione. 35. b
 Extinguentia sitim in hectica. 196. a
 Exanthematum descriptio, diuissio, & causæ. 306. b
 Exanthematum origo. 206. b
 Exanthematum notæ multæ. ibid.
 Exanthematum curatio. 207. b
- F.
- Facultas argenti viui an timenda sit. 13. a
 Facultas lapidis Smaragdi. 102. a
 Fastidienti melancholico omnia genera ciborum offerenda. 40. a
- Fastidium cibi, quid, & fames. 95. b
 Fastidij cibi seu inappetentiæ causæ, notæ, & curatio. 96. a
 Febris sanguinem synochus putridis. 172. b
 Febris tertiana exquisita. 184. a. b
 Febris ardentis descriptio causæ, & curatio. 180. b
 Febris ardentis & tertianæ discrimen. ibid.
 Febris compositæ difficilis descriptio, difficilior cognitio, & curatio. 192. b
 Febrium compositarum diuissio. ibid.
 Febrium compositarum notæ, causæ, curationes. 193. a
 Febris pestilens quid sit. 198. b
 Febris pestilentis causæ, & signa. 199. b
 Febris pestilentis victus ratio. 199. b
 Febris pestilentis curatio. ibid. b
 Febris pestilentis putridæ curatio. 202. a
 Figura naturalis partus. 162. a
 Fluxus sanguinis quando sistendus. 146. a
 Fœlicitas nostri temporis. 195. b
 Fœminæ Valentinae damnantur in curandis infantibus. 35. a
 Fœtus mortui signa. 162
 Fœtum mortuum expellentia. ibid.
- Fœtum

I N D E X.

Fœtum mortuum suffitus expellens. 162. b
 Formulæ purgantium omnes humiores. 4. a
 Formulæ omnium medicamentorum purgantium caput per loca propinqua. 47. b
 Forma præparandi cantharides. 124. a. 134. b
 Frangentia lapidem à qualitate manifesta. 133. a
 Frangentia lapidem simplicia ferè omnia. 134. a
 Fuchsius notatur. 23. a

G

Græcorum medicamenta purgantia vehementia. 77. b
 Gallici morbi descriptio, causæ, & signa. 11. b
 Gallici morbi curationes multæ. ibid.
 Gallicum morbum iuuantia & nocentia. ibid.
 Gallici morbi antiqui curatio. 13. a
 Grandiorum epilepticorū curatio. 35. b
 Grauedo ad nares. 71. a

H

Hæmorrhoidum descriptio & differentia. 145. a
 Hæmorrhoidum causæ, notæ, & curatio. ibid. b
 Hæmorrhoidum dolor quibus curatur. 148. a
 Hæmorrhoides quatuor de causis ægrè curantur. ibid.
 Hectica quid sit. 193. b

Hecticæ notæ & curatio. 195. b

Hepatis obstructio. 117. b
 Curatio. 118. a

Hepatis inflammationis natura, causæ, & notæ. 115. b

Hepatis inflammationis in caua parte curatio. ibid.

Hepatis inflammati in gibba curatio. 116. a

Herba contra vermes. 143. b

Herniæ differentia, causæ, & notæ. 164. a. b

Herniæ flatusosæ curatio. 165. a

Herniæ carnosæ curatio. ibidem.

Herniæ aquosæ & varicosæ curatio. ibid.

Hernia facilè curatur in infantibus. 166. a

Hernia aliquando postulat operationem manuum. ibid. b

Hieræ logodionis compositio, & dosis. 5. b

Hieronimus Gabucinus. 143. b

Hieræ simplicis laus. 123. a

Historia scitu digna. 66. b

Historia puellæ habentis lumbricos multos. 142. b

Historia puellæ habentis lumbricum duodecim cubitorum. 94. a

Historia Arnaldi de ictero. 121. a

Historia in tympanite mira. 123. b

Historia de profluvio mensium. 252. a

Historia mira in hæmorrhoidum curatione. 147. b

Histo

Historia admiranda in foemina pariente flatu. 160.b

Historia febris pestilentis.

199

Historia doctissimi Dolese.

194.a

Historiae quorundam autorum quomodo, uxores utrum gererent non cognouerunt. 160.b

Hoedus bonus cibus etiam melancholicis. 39.a

Hollerius. 170.a

Homines Alexandriae vescuntur carnibus asininis atque etiam camelinis. 91.a

Horrorem & rigorem tolerantia. 186.b. 191.a

Horroris in quartana curatio. ibid.

Hora balnei. 196.b

Humores lethargum gignentis repellentia. 29.b

Hydropis descriptio & species. 122.a

Hydropis signa communia. ibidem.b

Hydropis formatum distinctio. ibid.

Hypochondriaca melancholia quomodo dignoscenda.

139. quomodo curanda.

41.a

I

Iacobi Syluij error. 195.a

Icteri descriptio & causa.

119.b

Icteri notae & curatio. 120.

a. b

Ileus quid. 110. Curatio eiusdem.

113.b

Imbecilli aspectus descriptio, causa, & curatio. 58.a

Incisio inter costas in tabe. 87.a

Incisio quomodo facienda in hydrope, & eius duae admirandae historiae. 125.a

Incubonis descriptio, causa, & notae. 42.b

Incubonis curatio. 43.a

Incurabilis tremor. 55.a

Insanientium praeter amore descriptio, & notae 43.b

Infantium praeservatio ab epilepsia. 34.a

In pharmacopolas. 35.b

Intemperies sicca quibus alteratur. 40.b

Intestina lupi. 112.a

Ischiadis doloris remedia validiora arthritidis. 169.b

Ischuriae descriptio, causa, notae, & curatio. 128.b

L

Lac virginicum. 66.a

Lactis chalybeati laus. 107.a

Lactis facultas. 195.a

Lactis genera. ibid.

Lac humanum melius. ibid.

Lacte sumpto non dormiendum. 84.b

Lac an noceat hydropicis.

124.b

Lac humanum foetum mortuum expellit. 162.b

Lac an noceat dysentericis sumptum per os. 107.a

Lac dari quae prohibet. 195.a

Lactis coagulationem quae impediunt. ibid.

Lapidis lazuli vis. 3.b

Lapi

I N D E X.

Lapidis armen. & lazuli vsus
reformidatur. 40.a

Lapidum renum, & vesicæ
causæ, discrimen, & notæ.

131.a

Lapidis renum, & vesicæ cu-
ratio duplex. ibid.b

Lapidem frangentia qualita-
te manifesta. 133.a

Lapidem frangentis composi-
ta. 134.a

Lapis Iudaicus. 133.a

Lapis spongiæ. ibid.b

Lapis lyncis. ibid.

Lapis hominis & porci. ibid.

Lapides gallorum. 134.a

Lapis Aquilæ. 161.b

Lapis cyaneus. 200.a

Laus aquæ ex limacibus.

195.a

Laus confectionis Alkermes.

200.a

Lethargi descriptio, diuisio,
causæ, & notæ. 29. a. 30.b

Lethargi curatio. ibid.

Lethargicorum pulsus & vri-
na. ibid.

Lethargicorū præcipua sym-
ptomata. 30.b

Leucophagum hecticis con-
fert. 194.a

Liquor sputum promouens.

78.a

Lienis obstructionis descri-
ptio, causæ, & curatio.

127.a.b

Loth ad sputum educendum.

78.a

Longa melancholicorum vi-
gilia. 40.a

Lucanicæ. 194.a

Lumbricorum differentia,
causæ, & notæ. 142.b. 143.a

Lumbricorum curatio du-
plex. ibid.

Lunæ radij noxij sunt.

199.b

Lyenteria. 104.a

M

Medicamenta duo præstan-
tissima ad vindicandos in-
fantes ab epilepsia. 34.b

Medicamentum visum ma-
ximè confirmans. 60.b

Medicamentum visui vtile.
ibidem.

Medicamentum visui sepe
perutile. ibid.

Medicamentum interius pus
efficiens. 78.b

Medicamenta necantia ver-
mes. 143.b

Medicamentum conseruans
vterum in suo loco. 150.b

Medicamentum optimum ad
mensium fluorem. 152.a

Medicamenta menses mo-
uentia. 155.b

Medici audaces taxantur.

37.b

Melancholiæ descriptio, cau-
sæ, & diuisio. 38.b

Melancholicorum imagina-
tionis incerta, ratio reddi-
tur. 39.a

Melancholiæ curatio. 39.a

Mel an dari possit dysenteri-
cis cum Galeno. 107.a

Mensium immodicorum cau-
sæ. 151.a

Mensium immodicorum no-
tæ, & curatio. ibid.

Mensium suppressorum cau-
sæ, notæ, & curatio. 159. b

E

Micleta

Micleta astringit satis. 101.b
 Moderatè dissipantia in ar-
 thritide frigida. 168.b
 Modus conficiendi aquam
 carnis. 194.b
 Molæ vteri descriptio & cau-
 sæ. 160.a.b
 Molæ vteri signa, historiæ, &
 curatio. ibid.
 Morbi comitialis ex lacte
 coagulato in ventriculis
 infantium curatio. 35.a
 Morbillorum origo. 207.a
 Curatio. 208.b
 Mouentia epilepsiam. 36.a
 Mundellæ error in purgan-
 dis peste laborantibus.
 203.a
 Muscus marinus. 144.a

N

Narcoticorum vsus. 26.a
 Narcotica quomodo securio-
 ra. 102.b
 Narcoticorum vsus in colico
 dolore. 113.a
 Narcotica quo vetustiora se-
 curiora. 102.b
 Necantia vermes. 67.b
 Nicolai Florentini curatio
 rara. 37.a
 Nicandri laus. 88.a
 Notantur mulieres exhiben-
 tes pueris cerusam, argen-
 tum viuum & miniũ. 35.b
 Notæ singularum causarum
 distillationis & ruffis. 71.
 a.b
 Notæ omnium causarum flu-
 xus sanguinis, & partium
 à quibus fluit. 81.a
 Nutriens clyster quando me-

lancholicis necessarius.

40.a

O

Observatio elegans in mis-
 cendis medicamentis. 5.a
 Obseruanda historia. 30.a
 Observatio in curanda verti-
 gine pituitosa. 32.b
 Obstructionis hepatis causæ,
 notæ, & curatio. 117.b
 Oculis noxia. 59.b
 Odora vehementer vterum
 ad se trahunt. 158.b
 Oleum ad secundinam expel-
 lendam. 163.a
 Ophthalmiæ diuifio, descri-
 ptio, causæ, & notæ. 55.a
 Ophthalmiæ curatio. ibid.b
 Ophthalmiæ antiquæ curatio.
 56.b
 Oribasij error. 115.b
 Ortophniæa quid. 74.a
 Ortophniæ notæ, & cura-
 tio. ibid.b
 Ossa mespilorum. 133.b
 Ossium corruptio cauterio
 eget. 13.b
 Oxyrhodinum lethargo vtile.
 29.b

P

Palpitationis descriptio, notæ,
 & curatio. 86.b
 Palpitatio à veneno. 88.a
 Paraphrenitis quid. 25.a
 Curatio. 26.a
 Paralysis descriptio. 48.a
 Paralysis causæ, notæ, & cura-
 tio. ibid.b
 Paralyfi vtilis confectio. 49.b
 Para

Paralyſi topica medicamenta.

49. b

Paralyſis curatæ pulchra hiſtoria. ibid.

Partus laborioſus & ſecundæ retentæ. 161. b

Partum facillimum quæ efficiant. ibid.

Pectinatio aſſidua capillos auget. 7. b

Peleiana non laudatur. 35. b

Pentaphylli radix. 166. a

Perdix aſſa & elixa aſtringit. 100. a

Peripneumonix deſcriptio, cauſæ, & notæ. 76. b. 77. a

Peſſi in mola. 160. b

Petri Iacobi Steuclaus. 98. a

Phrenitidis deſcriptio. 24. b

Curatio. 25. a

Phtifis deſcriptio, & cauſæ eiufdem notæ. 83. b

Phtifis antiqua incurabilis. 85. b

Phtifica furnaria vixit 28. annis. ibid.

Picra vermes necat. 144. a

Pilularum omnium ferme, quæ in uſu ſunt compoſitio, & quantitas medicamentorum valenter purgantium. 5. b. 6. a

Pilularum uſus damnatur in morbis bilioſis. 133. b

Pilulæ ex helleboro. 14. a

Pilulæ nobiliſſimæ. 33. a

Pilulæ ad epilepſiam. 37. a

Pilulæ laudatæ in aſthmate. 75. a

Pilulæ menſes euocantes. 156. a

Pituitam concoquentia ſimplicia & compoſita. 3. a

Pituitam purgantia ſimplicia & compoſita. 3. b

Pleuritidis deſcriptio, cauſæ, & notæ. 76. b

Pleuritidis curatio. 77. a

Pleuriticis quæ vena ſecunda. ibid.

Pleuriticis quæ purgantia exhiberi poſſunt. ibid.

Plinius. 132. b

Pomum confert in conſtitutione peſtis frigida. 201. a

Pomum in cauſa calida. ibid.

Porrorum barbaræ cum hordeo viſ. 29. b

Potiones vacuantes concretum lac in ventriculis infantium. 35. a

Potus lethargicorum. 29. b

Potus menſes ducens. 155. b

Potus aquæ frigidæ in ſynochō impedimenta. 173. b

Potus in quartana. 190. a

Præſeruatio ab arthritide. 169. a

Præparatio aquæ ex anguilla. 194. b

Præcautio peſtis. 199. b

Procidencia ani quomodo curanda in puero. 150. a

Procidencia vteri. ibid.

Promouentia ſputum & roborantia pulmones. 75. b

Pulmo vulpis & Ericij. 85. a

Puluis Ioannis de Vigo. 13. b

Puluis ſaluberrimus ad melancholiam. 40. b

Puluis ad dentes liueſcentes, aut nigreſcentes. 68. a

Puluis ad fulciendos dentes mobiles. ibid.

Puluis Cimicis. 133. b

Puluis anſeris. 134. a

INDEX.

Pulvis pullorum hirundi-
num. ibid.
Pulvis optimus ad resolu-
dos flatus in hydrope. 124.
b
Pulvis optimus in partu dif-
ficili. 163. a
Punctura nervi convulsio-
nem efficit. 53. b
Purgatio in hydrope per vri-
nam. 124. b
Purgatio in tertiana exquisi-
ta quando facienda. 184. b
Pyra partum impediunt.
161. b

Q

Quantitas clysteris in ven-
tris profluviis cur pauca.
107. b
Quartanae divisio, causæ, &
notæ. 189. b
Quartanae longa curatio.
190. a
Quæ dicuntur medicamenta
benedicta. 7. a
Quæ Aureos reddant capil-
los. 7. b
Quæ nigros capillos effi-
ciunt. ibid.
Quæ in vertigine fugienda.
32. a
Quæ vena secanda in melan-
cholia. 40. a
Quæ abscessum rumpunt in
peripneumonia, atque etiam
in pleuritide. 78. d
Quæ necessaria sint in hy-
drope curanda. 123. b
Quæ ano apposita hæmor-
rhoidas sanant. 147. a
Quæ hepati admouenda in

febre putrida, & quando.
182. b

Quibus partibus admouen-
dum vnguentum in cura
morbi Gallici. 13. b

Quibus fiat reuulsio in ac-
cessionibus vertiginis.
32. a

Quotidianæ febris descri-
ptio, causæ, & notæ. 188. b

Quotidianæ curatio. 187. a

R

Raparum vis oculis prodest.
58. a

Ratio cognoscendi quæ sint
benigna, & quæ valentia
medicamenta purgantia. 4.
b. 5. a

Raucedinis, tussis, corizæ, ca-
tarrhi eadem ferè natura.
71. a

Rauedo ad asperam arte-
riam. ibid.

Raucedinis causæ. ibid.

Refrigerantia & corroboran-
tia iecur. 174. a

Refrigerantia cor, iecur, &
totum corpus interius &
exterius in febribus. 182. a

Reliquias materiæ ex oculo
vacuantia & resoluentia.
56. a

Remedium optimum ad la-
uandum ventriculum &
intestina à purgatione. 2. a

Remittentia feruorem san-
guinis. 168. b

Repellentia humores angi-
næ. 69. b

Repellentia medicamenta fo-
ris non sunt admouen-
da

- da in pleuritide. 78.a Singultus descriptio, & cau-
 Resoluentia humores epile- sa. 93.a
 psia. 37.a Singultus notæ & curatio.
 Roborantia caput melancho- ibid.b
 licum. 40.b Sistentia fluxum humorum
 Rubedo faciei, & eius causæ, à capite. 72.a
 & reuulsio. 65.b Sirim extinguentia. 196.a
 Ruptio abscessus in angina. Somni profundi lethargico-
 70.a rum curatio. 30.b
 S Somnus arcendus sumpto
 Salubria medicamenta quæ veneno. 110.a
 dicantur. 20.b Somnus quando cauendus
 Sanguinem fluentem auer- in accessionibus febrium.
 tentia. 63.a 184.b
 Sanguinis è naribus fluentis Spatium accessionis tertianæ
 causæ & notæ. 62.b exquisitæ. ibid.b
 Sanguinis profluuij curatio. Species medicamentorum
 63.a cardiacorum. 200.b
 Sanguinem sistentia à tota Spiratio lethargicorum qua-
 substantia. 64.a lis. 29.a
 Sanguinè expuentibus opti- Sputi sanguinis causæ, & cu-
 ma purgatio. ibid. ratio. 81.a.b
 Sanguinè quæ medicamenta Sputi sanguinis reuulsio. ibi-
 purgantia sistunt. 82.a dem.
 Sanguinem fluentem narco- Sputo sanguinis utilia. ibid.
 tica compescunt. ibid.b Stercus lupi à tota substantia
 Sanguinem sistentibus mi- colicum dolorem mirum
 scenda pectoralia. ibid. in modum sanat. 122.a
 Sanguis mictio. 139.b Scillæ vis ad morbum comi-
 Sauanarola laudatur. 190.b tialem. 37.b
 Scirrhus lienis quibus cura- Suffusionis descriptio & cau-
 tur. 127.b sa. 60.a
 Secundinè expellentia. 62.b Suffusionis curatio. ibid.
 Sectio venæ quando simul Suppurationis descriptio, cau-
 ex duabus venis. 202.b sa, & notæ. 83.a
 Sectio venæ an conueniat in Suppurationis curatio. ibid.b
 febre putrida. 181.a Suppurati loci cognitio.
 Sedantia singultum. 93.a 60.a
 Signa causæ sine humore, & Suppressionis vrinæ descri-
 cum humore cuiuscunque ptio, causæ, notæ, & cura-
 doloris capitis. 19.b tio. 128.a.b
 Synope. 86. b. Curatio eius-
 dem. 88.a

INDEX.

Synochi descriptio, diuisio,
causæ, notæ, curatio. 172.
b. 173. a
Syrupus ex decocto ligni
guaiaci. 12. a
Syrup. vtilissimus in hepatis
obstructione. 193. a
Syrupus in quartana secundo
loco. 190. b
Syrup. ad febres compositas.
198. a

T

Tabes. 83. a
Tapus barbarus tenesmo v-
tilis. 109. b
Tempus curandi morbum
Gallicum. 12. b
Tentatoria curatio in pleuri-
tide. 78. b
Tenesmi descriptio. 109. a
Tenesmus vterum gerenti-
bus molestus. ibid.
Tenesmi causæ, notæ, & cu-
ratio. ibid. b
Tenesmus quomodo abor-
sum faciat. ibid.
Tertianæ exquisitæ descri-
ptio, causæ, notæ, & cura-
tio. 184. a. b
Tertianæ nothæ descriptio,
diuisio, causæ & notæ. 186.
a. b
Tertianæ nothæ curatio. ibi-
dem.
Theriaca magna an sanos ve-
neno afficiat. 35. a. b
Theriace commendatio. 201.
b
Theriace & Mithridati vis
191. a

Timoris vis. 191. b
Topica ad lethargum. 30. a
Topica ad sputum excitan-
dum. 75. b
Tormentilla. 201. b
Tremor ex imbecillitate ner-
uorum. 54. b
Tremoris notæ, causæ, & cu-
ratio. 55. a
Tres formulæ purgantes bi-
lem flauam. 3. b
Tres formulæ purgantes pi-
tuitam. ibid.
Tussis causæ, & curatio 71. b
72. a

Tympanitæ causæ. 122. b
Tympanitæ notæ & differen-
tiæ. ibid. b
Tympanitæ curatio. 123. a

V

Vaccarum stercus vtile coli-
co dolori. 112. b
Valentinæ mos ad tuen-
dos infantes, ab epilepsia.
34. a
Valleriana. 166. a
Variæ melancholicorum ima-
ginationes. 39. a
Vena quæ secanda in quarta-
na. 190. b
Venenum conuulsionem fa-
cit. 51. a
Venenum educentia. 53. b
Ventriculi imbecillitas, do-
lor, inflammatio. 90. b
Ventriculi gallinarū, mergi,
& struthiocameli an cor-
roborent nostrum ventri-
culum. 92. a
Verbasculum. 37. a
Verri

I N D E X.

Vertiginis descriptio & causæ.	32.a	structis admouenda.	187.b
Vertigo non differt ab scotomia.	ibid.	Vnguentum ad quartanam.	191.a
Vini generosi vsus.	95.a	Vngula mulæ.	152.b
Vini multi vsus.	53.b	Vomitus prouocandus in dolore colico.	113.a
Vinum Alkekengi valenter prouocat vrinam.	130.a	Vomitus excitatio in tertiana spuria.	187.a
Vini AlKeKengi confectio. ibidem.		Vomitus utilis in tertiana. ibidem.	
Vires theriacæ & mithridati.	190.b	Vomitus laus in quartana.	191.a
Vis cantharidum.	134.b	Vrinæ suppressio.	128.a
Visus imbecilli descriptio, causæ, & notæ, curatio.	58.a	Ardor.	137.b
Visum acuentia.	59.a	Vsus pilularum damnatur, & medicamenta vehementer purgantia in morbis biliosis.	173.b
Visui quæ nocent exterius & interius.	58.b	Vteri procidentia descriptio, & causæ.	150.b
Vnguentum expertum ad morbum Gallicum.	13.a	Vteri procidentia notæ, & curatio.	ibid.
Vnguentum humectans melancholicos.	41.a	Vteri suffocationis varia descriptio, & nomina.	157.b
Vnguentum filij Zachariæ.	109.b	Vteri suffocationis causæ, notæ, & curatio.	158.a
Vnguentum optimum ad suppressam vrinam.	129.b	Vtero admouenda in profluvio mensium.	152.b
Vnguentum optimum ad lapidem renum & vesicæ. ibidem.			
Vnguentum ad hæmorrhoidas.	147.a.b	X	
Vnguentum ad partum difficilem.	163.a	Xyloaloe.	199.b
Vnguentum optimum biliosis & febribus venenosis.	174.a	Z	
Vnguenta spleni & iecori ob-		Zaphyrus.	199.a. 201.a. 208.a
		Zeber.	158.b
		Zedoaria.	200.g

FINIS INDICIS.

